

STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY

NO. 07034

# DOS LEBEN FUN HAYES

---

Benzion Hoffman



NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER  
AMHERST, MASSACHUSETTS

NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER  
AMHERST, MASSACHUSETTS  
413 256-4900 | YIDDISH@BIKHER.ORG  
WWW.YIDDISHBOOKCENTER.ORG



MAJOR FUNDING FOR THE  
STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY  
WAS PROVIDED BY:

*Lloyd E. Cotsen Trust*  
*Arie & Ida Crown Memorial*  
*The Seymour Grubman Family*  
*David and Barbara B. Hirschhorn Foundation*  
*Max Palevsky*  
*Robert Price*  
*Righteous Persons Foundation*  
*Leif D. Rosenblatt*  
*Sarah and Ben Torchinsky*  
*Harry and Jeanette Weinberg Foundation*  
AND MEMBERS AND FRIENDS OF THE  
*National Yiddish Book Center*



The *goldene pave*, or golden peacock, is a traditional symbol of Yiddish creativity. The inspiration for our colophon comes from a design by the noted artist Yechiel Hadani of Jerusalem, Israel.

The National Yiddish Book Center respects the copyright and intellectual property rights in our books. To the best of our knowledge, this title is either in the public domain or it is an orphan work for which no current copyright holder can be identified.

If you hold an active copyright to this work – or if you know who does – please contact us by phone at 413-256-4900 x153, or by email at [digitallibrary@bikher.org](mailto:digitallibrary@bikher.org)

ארבייטער־רינג ביבליאָמעק — 16

# דאָס לעבען פון חיות זאָלאָגיע



ארויסגעגעבען פון דער  
נאציאנאלער עדיוקאישאַנאל קאָמיטע פון  
ארבייטער־רינג.

**Copyright**  
**by**  
**THE WORKMEN'S CIRCLE**

## פ א ר ו א ר ט .

דאָס פּאַרליגנענדע בוך האָט דעם צוועק באַקאַנט צו מאַכען דעם אידישען לעזער מיט די גרונד־פּרינציפּען פון דער זאָאָלאָג־שער וויסענשאַפּט. עס איז דאָס ערשטע גרעסערע ווערק, וואָס איז געשריבען געוואָרען אין אידיש אויף דעם געביט, און עס איז דעריבער פאַרשטענדליך, אַז דער פאַרפאַסער האָט באַגעגענט זעהר גרויסע שוועריגקייטען אין זיין ארבייט צו געפינען די אַלע נויטיגע נעמען און באַצייכנונגען פאַר די פאַרשיידענע חיות, זייערע גלידער און קערפּער־טיילען.

אין דער אידישער שפּראַך זיינען פאַראַן נעמען בלויז פאַר אַ קליינער צאָהל חיות. עס זיינען פאַראַן נעמען פאַר די הויז־חיות, פאַר הויז־עופות, פאַר די מעהר באַקאַנטע וואַלד־חיות און וואַלד־פּויגלען, פאַר אַ געוויסער צאָהל פּיש און פאַר אייניגע אינזעקטען. עס זיינען אויך פאַראַן זעהר וועניג נעמען און באַצייכנונגען אין דער אידישער שפּראַך פאַר די פאַרשיידענע גליד־דער און קערפּער־טיילען פון די חיות. דער פאַרפאַסער האָט דעריבער געדאַרפּט צונויפּזוכען אַלע נעמען און אַנאַטאָמישע באַצייכנונגען, וואָס די אידישע שפּראַך פאַרמאָגט, און די איבעריגע אַליין באַשאַפּען אָדער פאַראַידישען די נעמען און באַצייכנונגען פון אַנדערע שפּראַכען.

דער פאַרפאַסער איז אַליין ניט זיכער, אַז אומעטום איז עס איהם געלונגען צו שאַפּען דעם בעסטען פאַסענדען נאָמען, אָדער די בעסטע צוטּרעפּענדע באַצייכנונג. ער גלויבט פּיעל מעהר, אַז אין דער ווייטערדיגער ענטוויקלונג פון דער אידישע שפּראַך וועלען פאַר פּיעלע חיות אויסגעפונען ווערען מעהר פאַסענדע נעמען. דאָסזעלבע האָט אויך פאַסירט אין אַנדערע שפּראַכען, הגם דאָר־טען איז די ארבייט ניט געווען אַזאַ שווערע. אַלע אַנדערע פעלקער לעבען מעהר מיט דער נאַטור, ווי דאָס אידישע פּאָלק. יעדע אַנדערע שפּראַך האָט דעריבער אַ גרויסע צאָהל נעמען פון די פאַר־

שיידענע חיות און פון זייערע קערפער-טיילען, וועלכע זיינען גע-  
שאפען געוואָרען דורך דעם מויל פון פּאָלק. די זאָלאָגישע ווי-  
סענשאַפט האָט בלוז געדאַרפט שאַפען נעמען פאַר די חיות, מיט  
וועלכע דאָס פּאָלק איז ניט באַקאַנט, באַזונדערס פאַר די קליינע  
באַשעפענישען, וועלכע דער דורכשניטליכער מענש פון פּאָלק  
באַמערקט וועניג אָדער אינטערעסירט זיך ניט מיט זיי. אָבער  
דאָס איז ניט געטאָן געוואָרען מיט איינמאָל. עס האָט גענומען  
אַ לענגערע צייט ביז מען האָט זיך געאייניגט אויף די נייגעשאַ-  
פענע נעמען און ביז זיי זיינען אַריינגעבראַכט געוואָרען אין אַל-  
געמיינעם געברויך פון דער שפּראַך. עס דאַרף פאַרשטאַנען ווערען,  
אַז מיר רעדען דאָ ניט וועגען די וויסענשאַפטליכע לאַטיינישע  
און גריכישע נעמען, וועלכע ווערען באַנוצט אין די זאָלאָגישע  
ביכער פון אַלע שפּראַכען. מיר מיינען דאָ די נעמען, וועלכע  
יעדע שפּראַך האָט געשאַפען פאַר זיך אַליין און וועלכע זיינען  
אַריין אין דעם געברויך פון דער פּאָלקס-שפּראַך אָדער וועניג  
סטענס אין דער פּאָלקס-ליטעראַטור. אין דער אידישער שפּראַך  
אָבער פאַנגען מיר איצט אָן. אויף דעם געביט פון זאָלאָגישע, קען  
מען זאָגען, איז דאָס די ערשטע פּראָבע, און אין דער אידישער  
שפּראַך, ווי שוין געזאָגט, זיינען זאָלאָגישע און אַנאַטאָמישע  
נעמען און טערמינען פאַראַן זעהר וועניג. עס וואָלט דעריבער  
זיין גאָרניט באַשיידען פון איינעם צו באַהויפטען, אַז ער האָט מיט  
איינמאָל געשאַפען די בעסטע און פאַסענדסטע נעמען און טער-  
מינען. עס וועלען זיכער שפעטער קומען אַנדערע, וועלכע וועלען  
אין מאַנכע פעלע אויסגעפינען אַ פאַסענדערען נאָמען אָדער אַ  
מעהר צוטערפענדע באַצייכנונג און אויף דעם אופן וועט אויך  
די אידישע שפּראַך ענדליך באַקומען די אַלע נויטיגע נעמען, באַ-  
צייכנונגען און טערמינען, וועלכע אַנדערע שפּראַכען באַזיצען שוין.  
עס איז ניט געווען דער צוועק פון פאַרפאַסער צו שאַפען  
אַ לעהרבוך איבער זאָלאָגישע אין שטרענגען זין פון וואָרט. ער  
האָט פיעל מעהר באַצוועקט צו געבען אַ לעזע-בוך איבער זאָלאָגישע  
איידער אַ לעהר-בוך, און ער האָט דעריבער אין מאַנכע פּלעצער  
אויסגעמידען ספעציעלע וויסענשאַפטליכע איינצעלהייטען, וועל-  
כע זיינען נויטיג אין אַ לעהר-בוך, אָבער קענען אויסגעלאָזען  
ווערען אין אַ פּאָפּולער וויסענשאַפטליכען לעזע-בוך, וואָס האָט  
דעם צוועק בלוז צו באַקענען דעם לעזער מיט די גרונד-פּרינצי-

פען פון דער וויסענשאפט און איהם צו געבען אן אלגעמיינע ידיעה  
איבער דעם געווינשטען געגענשאפט. דערפאר אָבער איז אין  
דעם בוך אָפגעגעבען געוואָרען מעהר פּלאַץ פאַר דער באַשרייבונג  
פון דעם לעבען פון די חיות, ווי דאָס ווערט געטאָן אין געווענליכע  
זאָלאָגישע לעהר-ביכער. דאָס לעבען פון די חיות איז אַ באַ-  
זונדערס אינטערעסאנטער טייל פון דער זאָלאָגישער וויסענשאפט.  
דער פאַרפאַסער האָט זיך פאַר דעם צוועק באַנוצט מיט פאַרשיי-  
דענע ווערק פון באַוואוסטע נאַטור-פאַרשער און זאָלאָגען און ער  
האַט זיך געגעבען אַלע מיה צו שאַפּען אַ בוך, וואָס זאָל זיין צו-  
גענגליך פאַר דעם אידישען לעזער און פון וועלכען ער זאָל קענען  
קריגען אַן אלגעמיינע און אין דערזעלביגער צייט אַ מעהר אָדער  
וועניגער גרינדליכע און אויספיהרליכע באַקאַנטשאַפט מיט דער  
אינטערעסאַנטער און באַלעהרענדער זאָלאָגישער וויסענשאַפט.

דר. ב. האַפּמאַן (צביון).

# א י נ ה א ל מ .

## פאָרוואַרט.

### די לעבעדיגע נאָטור און די טויטע.

די איינטיילונג פון דער נאָטור-וועלט. — דער אונטערשויד צווישען פלאנצען און חיות. — אַרגאַנישע קערפער און אונאַרגאַנישע. — די הויפט סמנים פון אַרגאַנישע קערפער. ערשטער קאָפיטעל — זייט 1—6

### וואָס יעדע לעבעדיגע באַשעפעניש מוז האָבען.

די הויפט-באדינגונגען פון דעם לעבען פון חיות. — לופט, שפייזען און וואסער. — די באדינגונגען פון טעמפעראטור און דרוק. — צעלען און פראָטאָפלאַזמע. צווייטער קאָפיטעל — זייט 7—11

### פּרוכפּערונג און מעהרונג.

לעבען שטאַמט אָפּ פון לעבען. — די פארמעהרונג פון באַשעפענישען. — געשלעכט. — די פארמעהרונגס-צאָהל. דריטער קאָפיטעל — זייט 12—22

### די קלאַסיפּיצירונג פון חיות.

די איינטיילונג פון די לעבעדיגע באַשעפענישען אין פאַר-שיידענע קלאַסען. — די עהנליכקייט און קרובח'שאַפט צווישען לעבעדיגע ברואים. — האַמאָלאָגיע און אַנאַלאָגיע, גלויכארטיגקייט און עהנליכקייט. — וויסענשאַפּטליכע נעמען און די הויפט-אַפטיילונגען אין וועלכע אלע לעבעדיגע באַשעפענישען פון דער ערד ווערען איינגעטיילט. פּיערטער קאָפיטעל — זייט 23—28

### די פּראָטאָזאָען.

איינציעליגע און פּיעל-צעליגע באַשעפענישען. — די אַמביען און זייער לעבען. — די אינפּוזאָריען. — פאַר-שיידענע אַרטען פון אינפּוזאָריען און זייער לעבען. — די פאַראַזיטען-פּראָטאָזאָען. — דער הויפט-אונטערשויד צווישען נידעריגע באַשעפענישען און העכערע. פינפטער קאָפיטעל — זייט 29—47



## שוואַמען אָדער פאַריפערען.

די ענטוויקלונג פון די שוואַמען. — דאָס פרוכפערען און פארמעהרען זיך פון שוואַמען. — דער סקעלעט און דאָס „פלייש“ פון שוואַם. — די פארשיידענע פאַרמען און גרויס פון שוואַמען. — דאָס לעבען און שפייז פון די שוואַמען. — די פאַרשפרייטונג פון שוואַמען אין די ימים.

זעקסטער קאפיטעל — — — — — זייט 48—58

## צעלענטעראַמען אָדער שלויך-חיות.

דער אַרגאַניזם און דאָס לעבען פון דער הידראַ. — די הידראַזאָען אָדער הידראַעהנליכע באַשעפענישען. — די מעדווען אָדער זשעלאַטין פיש. — די סיפּאַזאַנען (גרויסע זשעלאַטין פיש). — די ים אנעמאַנען אָדער ים-רויזען. — די קאַראַלען.

זיבעטער קאפיטעל — — — — — זייט 54—70

## די ווערם.

פלאַנדווערם. — זייער פארדייאונגס־סיסטעם. — זייער נערווען־סיסטעם, פאראזמישע פלאַנדווערם. — זייער ענטוויקלונג. — באַנד־ווערם. — רונדע אָדער פעדיס ווערם. — ערד־ווערם. — ים־ווערם. — פיאַווקעס. — ראַמיפערען. — געפירעען. — לאַמפּען־מושלען.

אַכטער קאפיטעל — — — — — זייט 71—98

## די שטאַכעל־הויט ים־חיות—עכינאַדערמען.

דער שטערן־פיש. — זיין ענטוויקלונג. — דער שלאַנגען־שטערן. — דער ים־איגעל. — די ים־אויגערקע. — די ים־ליליע. — די באַוועגונגס־סיסטעם פון די שטערן־פיש.

ניינטער קאפיטעל — — — — — זייט 99—110

## די מאַלוסקען.

דריי קלאַסען מאַלוסקען: לאמעליבראַנכען, גאַסטעראַפּאַ־דען און סעפּאַלאַפּאַדען. — ווענוס־מושלען. — אויס־טערם. — מערעדאַ מושלען. — מיטילוס־מושלען. — שנעקען. — מיננפיש.

צעהנטער קאפיטעל. — — — — — זייט 111—138

## די ארטהראפּאַדען.

די אינטיילונג פון די ארטהראפּאַדען. — די אָפּשטאַמונג פון ארטהראפּאַדען. — דער פערופאַטום. — די מיריאפּאַדען.

עלפטער קאפיטעל — — — — — זייט 139—148

## די קרוסמאצעען (קרעבס־חיות).

בידעריגע קרוסמאצעען פארמען. — פעני־קרעבסען. —  
ציקלאפען. — ענטעל־מושלען. — העכערע קרוסמאצעען  
פארמען. — גארנעלען. — טייך און ים ראקעס. —  
איזאפארען און אמפופארען.

צוועלפטער קאפיטעל. — — — — — זייט 144—150

## שפינען, סקארפיאנען און מילבען.

אראכנידען אָדער שפינען חיות. — זייער עהנליכקייט צו  
די קרעבס־טהיערע. — סקארפיאנען. — שפינען. — דער  
גארטען־שפין. — די דעקעל־שפינען. — די מילבען. —  
דער קעניג־קראב.

דרייצעהנטער קאפיטעל — — — — — זייט 160—171

## אינוזעקטען.

אלגעמיינע באַראקטעריסטיק. — פרויסען. — זשוקעס  
אָדער באַבעלעס. — גרילען און הוישעריקען. — דראכען  
פליגען. — וואסער־מאָמען. — מוראשקעס. — דאָס געזעל  
שאפטליכע לעבען פון די מוראשקעס. — ביענען. — דאָס  
געזעלשאפטליכע לעבען פון די ביענען. — וואַנצען  
אינוזעקטען. — פליגען. — מוקען אָדער קאָמאַרעס. —  
פלוו. — שמעטערלינגען און מאָמען.

פיערצעהנטער קאפיטעל — — — — — זייט 172—234

## באַרדאָמען אָדער ווערמעבראָמען (ווירבעל־חיות)

די הויפט סמנים פון די ווירבעל חיות. — ענטוויקלונגס־  
פארשיידענהייטען. — די גלייכהייט פון אלע באשעפעני־  
שען אין דעם אָנפאנג פון זייער ענטוויקלונג. — די אָפֿ־  
שטאַמונג פון די ווירבעל־חיות. — די טונוקאָמען אָדער  
ים־שפּריצער.

פופצעהנטער קאפיטעל — — — — — זייט 235—242

## די פיש.

די אינומיולונג פון פיש. — די לאַנצעט־פיש. — די לאַמ־  
פרעמען. — דער בלינד־פיש. — די פאנצער־פיש. — די  
לענג־פיש. — פארשיידענע ארמען פיש. — די הושים פון  
פיש. — די פרוכפערונג און ענטוויקלונג פון פיש. —  
שוץ און קאמפּעס־מיטלען.

זעכצעהנטער קאפיטעל — — — — — זייט 243—271

## די אמפיביען.

די ענטוויקלונג פון אמפיביען. — דער פראש און זיינע מעמעמארפאזען. — די זשאבעס. — די סאלאמאנדרעס. — די פרוכפערונג פון אמפיביען.

זיבעצהנטער קאפיטעל — — — — — זייט 272—280

## רעפטיילען.

אלגעמיינע סמנים פון רעפטיילען. — עקדעשען. — כא' מעלעאָנען. — שלאַנגען. — משערעפאכעס. — קראקא' דילען. און אליגאטאָרען.

אכצעהנטער קאפיטעל — — — — — זייט 281—298

## פויגלען (אוועס).

דער אָרגאניזם פון די פויגלען. — דאָס לעבען פון די פויגלען. — די איינשטילונג פון די פויגלען אין קלאַס סען. — שוויים־פויגלען. — זומפ אָדער באַרדזשע פויגלען. — די שאַר אָדער קראַץ פויגלען. — די קלעטער פויגלען. — די רויב־פויגלען.

ניינצעהנטער קאפיטעל — — — — — זייט 299—361

## זויג־חיות (מאַמאַליען).

די כאַראַקטעריסטישע סמנים פון זויג־חיות. — די שנאָבעל חיות. — די בייטעל־חיות. — די צייהנלאָזע חיות (עדענטאָמען). — וואל־פיש און ים־קיה. — גרוי־זונעס. — אינזעקטען־עסער. — פלעדער־מייז. — הויף־חיות. — העלפאנטען. — רויב־חיות. — האלבי־אפען. — אפען.

צוואַנציגסטער קאפיטעל — — — — — זייט 362—491

## דער קאמפף פאר עקזיסטענץ.

לעבען און פארניכטונג פון לעבען. — פארמערונג און אויסראַטונג. — די מלחמה פאר'ן לעבען. — די אפהענג־ניגקייט פון מינים איינע פון די אנדערע. — די נאַטור־ליכע צוכט־וואהל. — די צופאסונגס־פערהיגקייט. — דאָס קאָמוניסטישע לעבען.

אייז און צוואַנציגסטער קאפיטעל — — — — — זייט 492—502



## ערשמער קאפיטעל.

די איינמילונג פון דער נאטור-וועלט. — דער אונטערשייד צווישען פלאנצען און חיות. — אַרגאַנישע קערפער און אַנאָרגאַנישע. — די הויפט סמנים פון אַרגאַנישע קערפער.

### די לעבעדיגע נאטור און די מויטע.

וואָס איז זאָפּלאַנציע? — די נאטור-וועלט קאָן אין אַלגע-  
מיין איינגעטיילט ווערען אין דריי הויפט-גרופען: מינעראַלען,  
פלאַנצען און חיות. אין דער עלטערער העברעאישער פילאָזאָפּי-  
שער ליטעראַטור ווערען די דריי גרופען באַצייכענט מיט די נעמען  
„דומם“, „צומח“, „חי“, דאָס מיינט: די מויטע שטומע נאטור,  
די געוויקסען אָדער פלאַנצען און די לעבעדיגע באַשעפעניסען.  
א פערטע גרופע פלעגט גערעכענט ווערען „מדבר“, די רע-  
דענדע באַשעפעניש, דער מענש. אין דער מאָדערנער וויסענ-  
שאַפט ווערט אָבער די רעדענדע באַשעפעניש ניט אויסגעטיילט  
באַזונדער, נאָר זי ווערט אַריינגערעכענט אין דער גרופע חיות.  
אויף צוויי פּיס איינע פון די זויג-חיות, וועלכע טראָגט דעם זאָ-  
אָלאָגישען נאָמען „האַמאַ סאַפּיענאַס“, אָהן וועלכען עס איז אַנדער  
יחוס.

דעם אויסדרוק „לעבעדיגע באַשעפענישען“ אָדער „לעבעדיגע  
ברואים“, וועלכע מיר געברויכען דאָ אַפּצוטיילען חיות פון פלאַנ-  
צען, איז וויסענשאַפטליך ניט קיין ריכטיגער. אין דער ווירק-  
ליכקייט ווערען אויך פלאַנצען אַריינגערעכענט אין דער לעבע-  
דיגער נאטור. ווען מען רעדט וועגען דער לעבעדיגער נאטור,  
מיינט מען ניט בלויז חיות, נאָר אויך פלאַנצען. נאָר ווי זאָגט  
די גמרא: דברה תורה כלשון בני אדם, די תורה רעדט אין דער  
געווענליכער מענשען-שפּראַך, עס הייסט, זי באַנוצט זיך מיט  
אַזעלכע אויסדריקע, וועלכע זיינען אָנגענומען אין דער אומגאַנגס-  
שפּראַך, הגם וויסענשאַפטליך זיינען זיי ניט ריכטיג. מען קען  
דאָסזעלבע זאָגען וועגען דער מאָדערנער וויסענשאַפט. זי באַ-  
נוצט זיך אָפּט מיט אויסדריקע, וועלכע זיינען וויסענשאַפטליך

ניט ריכטיג, נאָר ווייל זיי ווערען אזוי געברויכט אין דער אומגאנגס־שפראך. מען געברויכט נאָך היינט אין וויסענשאַפֿטליכע ביכער די אויסדריקע „זון־אויפגאנג“ און „זון־אונטערגאנג“, הגם די אויסדריקע זיינען פאַלשע. די זון געהט ניט אויף און געהט ניט אונטער, ווייל ניט די זון דרעהט זיך אַרום די ערד, נאָר פאַר־קעהרט. אָבער אזוי ווי אין דער אומגאנגס־שפראך זאָגט מען די „זון געהט אויף“ און די „זון געהט אונטער“, געברויכט מען דיזעלביגע אויסדריקע אויך אין ביכער. אויף דעמזעלכען גרונד געברויכען מיר דאָ אויך דעם אויסדרוק „לעבעדיגע באַשעפענישען“, אָדער „לעבעדיגע ברואים“ צום אונטערשייד פון פלאַנצען, ווייל אזוי רעדט מען אין דער אומגאנגס־שפראך, הגם וויסענשאַפֿטליך איז דאָס פאַלש.

אין דער גרופע מינעראַלען געהמען מיר דאָ אַרײַן, אויסער שטיינער, זאַלצען און פאַרשיידענע ערדען, אויך מעטאַלען — די גאַנצע טױטע נאַטור. די דאָזיגע גרופע פון דער נאַטור־וועלט ווערט באַהאַנדעלט פון די וויסענשאַפֿטען געאָלאָגיע, מינעראַלאַג־יע, כעמיע און פיזיק.

פלאַנצען און חיות — די אַנדערע צוויי גרופען פון דער נאַטור־וועלט, ווערען באַהאַנדעלט פון דער וויסענשאַפֿט ביאָלאָגיע: די לעהרע פון דער לעבעדיגער נאַטור־וועלט.

די ביאָלאָגישע וויסענשאַפֿט ווערט אָבער איינגעטיילט אין צוויי טיילען: די לעהרע וועגען פלאַנצען, וועלכע ווערט אָנגערופען באַטאַניק, און די לעהרע וועגען חיות, וועלכע ווערט אָנגערופען זאָאָלאָגיע.

די וויסענשאַפֿט, וועלכע טראַגט דעם נאָמען זאָאָלאָגיע, האָט צו טאָן מיט דער פאָרם, מיט דעם געבוי, מיט דער אַנטוויקלונג, מיט דעם כאַראַקטער און געווענהייטען פון די לעבעדיגע באַשעפעניסען. ווי אויך מיט זייער פאַרטיילונג איבער דעם ערד־קוגעל, און מיט זייערע באַציהונגען איינע צו די אַנדערע.

צוליב באַקוועמליכקייט ווערט די זאָאָלאָגישע וויסענשאַפֿט איינגעטיילט אין דריי הויפט־טיילען: מאַרפּאָלאָגיע, וועלכע פאַרנעמט זיך מיט דער פאָרם און מיט דעם געבוי פון די חיות אָדער מיט דער אַנאַטאָמיע פון זייער אָרגאַניזם; פּסיכאָלאָגיע, וועלכע פאַרנעמט זיך מיט דער טעטיגקייט און מיט דעם כאַראַקטער פון די חיות; און עקאָלאָגיע, וועלכע פאַרנעמט זיך

מיט די באציהונגען פון די חיות איינע צו די אנדערע און צו דער אומגעבונג, אין וועלכע זיי געפינען זיך.

**פלאנצען און חיות.** — אפצושיידען לעבעדיגע באשעפע- ניסען פון פלאנצען איז ניט אזוי לייכט, ווי עס דוכט זיך. מען קען לייכט געפינען דעם אונטערשייד צווישען א פויגעל און א בוים און צווישען א ציעג און א קעפעל קרויט, אבער עס איז זעהר שווער צו געפינען אן אונטערשייד צווישען די איינפאכסטע נידעריגע לעבעדיגע באשעפעניסען, וועלכע געפינען זיך אין דער נאטור, און צווישען מאנכע פלאנצען.

ווען מיר ווילען אפשיידען איין זאך פון דער צווייטער, אפטיילען זיי איינע פון די אנדערע, אלס צוויי פארשיידענע זאכען, מוזען מיר אָננעבען געוויסע סמנים אָדער אייגענשאפטען, וואָס איין זאך האָט און די אנדערע ניט. ווען מיר ווילען, אַלואַ, אַפּ- שיידען לעבעדיגע באשעפעניסען פון פלאנצען, מוז מען אָננעבען א געוויסע צאָהל סמנים אָדער אייגענשאפטען, וועלכע מען קען געפינען בלויז ביי חיות, אָבער ניט ביי פלאנצען. לאָמיר אָבער זעהן אויב דאָס איז אזוי לייכט צו טאָן.

אויב מיר וועלען זאָגען, אַז דער הויפּט־סמן אָדער אייגענ־ שאַפט, וואָס טיילט אָפּ א לעבעדיגע באשעפעניס פון א פלאַנץ איז באַוועגונג, וועלען מיר גלייך געפינען אויסנאָהמען פון דעם כּלל. עס איז אמת, אַז אין אַלגעמיין ווייסען מיר, דאָס לעבעדיגע באשעפעניסען באַוועגען זיך, וועהרענד פלאַנצען קענען זיך ניט באַוועגען, אָבער ווען מיר ווערען געהנטער באַקאנט מיט דער נאטור־וועלט, ערפּאָהרען מיר, אַז עס זיינען פאַראַן מאַנכע לעב- בעדיגע באשעפעניסען, וועלכע האָבען ניט קיין באַוועגונגס־פּע- היגקייט, וועהרענד מאַנכע פלאַנצען באַזיצען יאָ די דאָזיגע פּע- היגקייט. אַט, למשל, די שוואַמען, וועלכע געהערען צו דעם קעניגרייך פון לעבעדיגע באשעפעניסען, ווי עס וועט שפּעטער ערקלערט ווערען, די פּאָליפען, די ענטעל־מושעל (באַרנאַקל) און פאַרשיידענע פאַראַזיטען האָבען ניט קיין באַוועגונגס־פּע־היגקייט. עס זיינען אָבער פאַראַן פלאַנצען, ווי מאַנכע וואַסער־פלאַנצען, וועלכע האָבען א געוויסע באַוועגונגס־פּע־היגקייט. מען קען אויך זאָגען, אַז די קלעטערענדע אָדער קריכענדע פלאַנצען האָבען א געוויסע באַוועגונגס־פּע־היגקייט. עס זיינען זאָגאַר פאַראַן פלאַנצ-

צען, וועלכע פארמאכען זייערע בלעטער, ווען מען ריהרט זיי אָן.  
דאָס איז אַן אויסדרוק פון באַוועגונגס־פּעהיגקייט.

אויב מיר וועלען זאָגען, אַז דער אונטערשייד צווישען לעבע־  
דיגע ברואים און צווישען פלאַנצען באַשטעהט אין דעם, וואָס  
די לעבעדיגע ברואים ערנעהרען זיך פון אָרגאַנישע שפּייז, ווי  
פּרוכט, גרינסען, פלייש, תבואה, וועהרענד פלאַנצען ערנעהרען  
זיך מיט אַ:אָרגאַנישע (ניט אָרגאַנישע) שפּייז, ווי מיט קויהלעך־  
שטאָף, וואָס זיי ציהען אַרויס פון דער לופט און מיט די מינע־  
ראַלען, וואָס זיי ציהען אַרויס פון דער ערד, וועלען מיר אויך  
באַרד געפינען אויסנאַהמען. עס זיינען פאַראַן מאַכע פלאַנצען,  
וועלכע ערנעהרען זיך מיט אָרגאַנישע שפּייז, פונקט אזוי ווי לע־  
בעדיגע בריאים. אַט די זונען־טוי פלאַנצע, דער קאַנען־שטרוד  
און דער ווענוס־פליגען־פאַנגער, זיינען אזעלכע פלאַנצען, וואָס  
ערנעהרען זיך פון אינזעקטען. ווען אַ פליג אָדער אַן אַנדער אינ־  
זעקט פליהט אָדער פאַלט אַרויף אויף די בלעטער פון די דער־  
מאַנטע פלאַנצען, ציהען זיי זיך צוזאַמען און פאַנגען דעם אינ־  
זעקט, וואָס איז אַריינגעפאַלען אין זייער נעץ, און זיי פאַרצעהרען  
איהם. עס הייסט, אַלזאָ, אַז דיזעזע פלאַנצען ערנעהרען זיך מיט  
אָרגאַנישע שפּייזען פונקט אזוי ווי חיות.

ווי עס איז צו זעהן, איז עס שווער אָנצואווייזען אויף באַ־  
שטימטע סמנים אָדער אייגענשאַפטען, וועלכע מען קען געפינען  
בלויז ביי לעבעדיגע ברואים און ניט ביי פלאַנצען אָדער אומ־  
געקעהרט. פאַר דעם נאַטור־פאַרשער איז דעריבער אָפט גאַנץ  
שווער צו ציהען אַ שאַרפע ליניע צווישען דער טיער־וועלט און  
צווישען דער פלאַנצען־וועלט. און עס איז ניט בלויז שווער, נאָר  
ער קען אויך טאַקע ניט מיט באַשטימטהייט זאָגען, וואו עס ענדיגט  
זיך די פלאַנצען־וועלט און וואו עס פאַנגט זיך אָן די טיער־וועלט.  
אויף דעם גרענעץ צווישען דער פלאַנצען־וועלט און דער טיער־  
וועלט זיינען פאַראַן אזעלכע ברואים, וועלכע מען ווייס ניט גענוי  
ווי זיי צו פאַררעכענען. מען ווייס ניט, אויב מען דאַרף זיי  
רעכענען צווישען פלאַנצען אָדער צווישען חיות.

**אָרגאַנישע קערפּער און אָנאָרגאַנישע.** — און אזוי ווי

עס איז שווער צו געפינען פעסט באַשטימטע סמנים אָפּצושיידען  
לעבעדיגע ברואים פון פלאַנצען, אזוי איז עס אויך שווער אָנצו־  
געבען פעסט באַשטימטע סמנים אָדער אייגענשאַפטען, וועלכע



שיידען אָפּ אַרגאַנישע קערפּער פּון אַנאָרגאַנישע . מען באַצײַט  
 כּענט געוועהנליך אַרגאַנישע קערפּער אַלס אַזעלכע, וועלכע באַ-  
 שטעהען פּון פּאַרשיידענע גליעדער, אַרגאַנען אָדער טיילען, וואָס  
 יעדער פּון זײ האָט אַ פּאַרשיידענע פּונקציאָן אָדער טעטיגקײט,  
 אָבער אַלע אַרבייטען צוזאַמען און זײנען אָפּהענגיג אײנע פּון די  
 אַנדערע, וועהרענד אַנאָרגאַנישע קערפּער האָבען נײט קײן גליעדער  
 און באַשטעהען נײט פּון פּאַרשיידענע אַרגאַנען אָדער טיילען.  
 מיר זאָגען דעריבער, אַז לעבעדיגע ברואים און פּלאַנצען זײנען  
 אַרגאַנישע קערפּער, וועהרענד מינעראַלען, מעטאַלען און גאַזען  
 זײנען אַנאָרגאַנישע קערפּער. אין אַלגעמיין איז דיעזער אונטער-  
 שײד אַ ריכטיגער, אָבער מען קען דאָך פרעגען אויף איהם אַ  
 סך קשיות. מיר האָבען געזאָגט, אַז דער אונטערשײד צווישען  
 אַרגאַנישע קערפּער און אַנאָרגאַנישע באַשטעהט אין דעם, וואָס  
 די ערשטע באַשטעהען פּון פּאַרשיידענע אַרגאַנען, טיילען אָדער  
 גליעדער, וועהרענד די לעצטע האָבען נײט קײן אַרגאַנען און  
 באַשטעהען נײט פּון פּאַרשיידענע טיילען. קען אָבער אײנער פרע-  
 גען אַ קשײה: וואָס פאַר אַ מין בריאה איז, למשל, אַ דאַמפּף-  
 מאַשין? דאַכט זיך אַ דאַמפּף-מאַשין באַשטעהט אויך פּון פאַר-  
 שידענע טיילען און גליעדער, וואָס יעדער פּון זײ האָט אַ פאַר-  
 שידענע פּונקציאָן אָבער אַלע אַרבייטען צוזאַמען און זײנען אָפּ-  
 הענגיג אײנע פּון די אַנדערע, וועלען מיר דעריבער דען זאָגען,  
 אז אַ דאַמפּף-מאַשין איז אַן אַרגאַנישע באַשעפעניש, ווי אַ פּערד  
 אָדער אַן אַקס? נו, וועלען מיר אַפּשר ענטפּערען, אַז  
 אַ דאַמפּף-מאַשין אַרבייט בלויז, ווען מען הייצט איהר, הערט  
 מען אָבער איהר אויף צו הייצען, הערט זי אויף צו אַרבייטען. קען  
 מען אָבער דאָן פרעגען: און וואָס איז מיט אַ פּערד? אַ פּערד  
 קען אויך בלויז אזוי לאַנג אַרבייטען ווי לאַנג מען גיט איהם  
 עסען. מען קען זאָגען, אַז האָבער און היי פאַר אַ פּערד איז  
 פּונקט דאָסזעלבע, ווי הייצונג פאַר דער מאַשין. און אויף  
 אַ וויסענשאַפּטליכען לשון רופּט מען טאַקע אויך שפּײַז — הייצונג.  
 יעדער מין שפּײַז ווערט זאָגאַר אויסגערכענט לױט דער מאָס  
 וואַרעמקײט. וואָס ער גיט דעם קערפּער, פּונקט ווי עס ווערט  
 אויסגערכענט די מאָס וואַרעמקײט, וואָס יעדער מין קוהלען  
 גיט דער דאַמפּף-מאַשין. איז אָבער דאָ נאָך אַ סמן צו באַצײַט  
 כּענען אַרגאַנישע קערפּער. מיר זאָגען, אַז אַרגאַנישע קערפּער,

דאָס הייסט לעבעדיגע ברואים און פלאנצען, באשטעהען פון צעלען. דאָס געוועב אָדער דער שטאָף פון אָרגאַנישע קערפער איז צונויפגעשטעלט פון קליינציניקע קעמערלעך. אָבער מאַכע שטיינער באשטעהען אויך פון קליינע טיילכעלעך, זיי זיינען צונויפגעשטעלט פון קליינציניקע קריסטאַלכעלעך, וועלכע קענען פאַר גליכען ווערען מיט די קליינציניקע קעמערלעך פון וועלכע די אָרגאַנישע שטאָפּען זיינען צונויפגעשטעלט.

ווי מען קען זעהן איז עס אויבען אויף גאָר ניט אַזוי לייכט צו געפינען אַ פאַלשטענדיגען גענויען סמן צו אונטערשיידען אפילו צווישען אָרגאַנישע קערפער און אַנאָרגאַנישע, ניט בלויז צווישען לעבעדיגע ברואים און פלאנצען. גאָר ניט אַרײַנצוגעהן אין צו ווייטע חקירות, קען מען זאָגען, אַז אָרגאַנישע קערפער שיידען זיך אונטער פון אַנאָרגאַנישע קערפער דורך די פּאָלגענדע אייגענ־טימליכע סמנים: ערשטענס, די פּעהיגקייט צו פאַרוואַנדלען אַנאָרגאַנישע שטאָפּען אין אָרגאַנישע אָדער צו ענדערען אָרגאַנישע שטאָף פון איין פּאַרם אין אַן אַנדערע (אַ פּלאַנצע, למשל, וואָס איז אַן אָרגאַנישער קערפער, נעהמט אויף די אַנאָרגאַנישע שטאָפּען פון דער לופט און פון דער ערד, ווי קויהלען־שטאָף, שטיק־שטאָף, אייזען, קאַלץ א. א.וו. און פאַרוואַנדעלט זיי אין אָרגאַנישע פּלאַנצען־געוועב. אַ לעבעדיגע באשעפעניש פאַרוואַנדעלט אין איהר קערפער פּלאַנצען אין פלייש, בלוט, ביינער און פעט, דאָס הייסט זי פאַרוואַנדעלט איין פּאַרם פון אָרגאַנישען שטאָף אין אַן אַנדער פּאַרם); צווייטענס, די פּעהיגקייט פון עמפּינדען אדער פּיחלען; דריטענס, די פּעהיגקייט זיך צו פּרוכט פּערען און אַרויסצובריינגען אויף דער וועלט נייע וועזענס אין דער אייגענער געשטאַלט און פּאַרם; פּיערטענס, די פּעהיגקייט זיך צוצופאַסען; צו די אויסערליכע באדינגונגען אויף אַזאַ אופן, דאָס עס זאָל זיין נוצליך פאַר דער עקזיסטענץ פון אָרגאַניזם. דורך דער צופאַסונג־פּעהיגקייט, קענען אָרגאַנישע קערפער — פּלאַנצען און לעבעדיגע ברואים — פאַרטזעצען זייער עקזיסטענץ, ווען אפילו די אויסערליכע באדינגונגען האָבען זיך געענדערט. ווייל זיי ענדערען זיך אַליין מיט די אויסערליכע באדינגונגען און פאַסען זיך צו צו זיי. אָרגאַנישע קערפער באַזיצען אָבער ניט די עזע פּעהיגקייט. זיי האַלטען זיך ביי זייער פאַרם ביז זיי ווערען פאַרניכטעט פּוין די נייע, געענדערטע אויסערליכע באדינגונגען.

## צווייטער קאפיטעל.

די הויפט-באדינגונגען פון דעם לעבען פון היות. — לופט, שפייזען  
און וואסער. — די באדינגונגען פון טעמפעראטור און דרוק. — צעלען  
און פראטאפלאזמע.

### וואָס יעדע לעבעדיגע באשעפעניש מוז האָבען.

הויפט-באדינגונגען פון לעבען. — עס זיינען פאראן  
נעוויסע הויפט-באדינגונגען, וואָס יעדע לעבעדיגע באשעפעניש  
האָט נויטיג פאר איהר עקזיסטענץ. מיר ווייסען, למשל, אז פיש  
קענען ניט לעבען לאנג אָהן וואסער און אז פויגלען קענען ניט  
לעבען לאנג אין וואסער. נאָר דאָס איז בלויז אַ ספעציעלע באַ-  
דינגונג, וועלכע הענגט אָפּ פון דעם געבוי און פון דער נאטור פון  
דיעזע צוויי מינים באשעפענישען. אַ הויפט-באדינגונג פאַר זייער  
ביידענס עקזיסטענץ אין לעבען איז אָבער לופט. די פיש אין  
טייך מוזען פאַר זייער לעבען האָבען לופט, אזוי ווי די פויגלען אין  
וואַלד. אַלע לעבעדיגע באשעפענישען מוזען האָבען לופט. דאָס  
איז אַ הויפט-באדינגונג.

דער וויכטיגסטער עלעמענט אין דער לופט, וואָס לעבעדיגע  
באשעפענישען מוזען האָבען פאַר זייער עקזיסטענץ, איז זויער-  
שטאָף (אָקסיגען). די לופט, וואָס רינגעלט אונז אַרום, באשטעהט  
פון 79 מיט 2 הונדערטעל טיילען שטיק-שטאָף (ניטראָגען), שוין  
אַריינגערעכענט דעם קליינעם פראָצענט אַרנאָן, וואָס די לופט  
ענטהאַלט, פון 3 הונדערטעל טיילען קויהלען-זויערע און 20 מיט  
95 הונדערטעל טיילען זויער-שטאָף. אין רונדע צאָהלען אויס-  
נעדריקט, קען מען זאָגען, אז די לופט, וואָס רינגעלט אונז אַרום,  
באשטעהט פון 79 טיילען שטיק-שטאָף און 21 טיילען זויער-שטאָף,  
און דייעזע 21 פראָצענט זויער-שטאָף זיינען עס, וואָס מאַכען די  
לופט פאַר דעם ערשטען הויפט-עלעמענט פון לעבען.

פיעלע לעבעדיגע באשעפענישען קענען אָבער לעבען מיט  
לופט, וואָס אַנטהאַלט אַ קלענערען פראָצענט זויער-שטאָף. עקס-  
פערימענטען מיט פאַרשיעדענע היות האָבען באַוווּזען, אז אַנדערע  
פון זיי קענען לעבען אָהן שוועריגקייטען אין לופט, וואָס אַנט-

האלט בלויז 14 פראצענט זייער־שטאף. ווען אָבער דער זייער־שטאף פון דער לופט איז פארמינדערט געוואָרען ביז 7 פראָצענט, איז עס שוין געווען פאר די חיות, מיט וועלכע מען האָט די עקס־פערימענטען געמאַכט, שווער צו אָטעמען, און ווען מען האָט דעם זייער־שטאף אין דער לופט פארמינדערט אויף 3 פראָצענט, זיי־גען די חיות דערשטיקט געוואָרען. אין לופט, וואָס אַנטהאַלט ניט קיין זייער־שטאף, קענען לעבעדיגע באשעפענישען ניט עקזיסטירען. זיי ווערען דערשטיקט.

באשעפענישען, וועלכע לעבען אין וואַסער, באַקומען די נוי־טיגע מאָס זייער־שטאָפּען פאַר זייער עקזיסטענץ פון דער לופט, וואס דאס וואסער ענטהאַלט. יעדעס וואסער ענטהאַלט אין זיך לופט. דאָס וואסער איז דורכגעמישט מיט לופט, און די פיש אין וואסער אָטעמען דיעזע לופט, וואָס דאָס וואסער אַנטהאַלט, און קריגען פון איהם די נויטיגע מאָס זייער־שטאָף פאַר זייער לעבען. אין וואסער, וואָס אַנטהאַלט ניט קיין לופט, קענען פיש ניט לעבען, זיי ווערען דערשטיקט. דער גרונד איז, אַז וואו אַ לעבעדיגע באשעפעניש זאָל זיך ניט געפינען, אויף דער יבשה אָדער אין וואַסער, מוז זי האָבען זייער־שטאָף פאַר איהר עקזיס־טענץ, אַז ניט מוז זי דערשטיקט ווערען.

שפּייז. — אַלע לעבעדיגע באשעפענישען מוזען האָבען אַר ג א נ י ש ע שפּייז אויפצוהאַלטען זייער עקזיסטענץ. דאָס איז אַ צווייטע הויפט־באַדינגונג פאַר דעם לעבען פון חיות. די אָרגאַנישע שפּייז, וואָס לעבעדיגע באשעפענישען מוזען האָבען פאַר זייער עקזיסטענץ, קען באשטעהן פון פאַרשידענע פאַרמען, פון פרישע פלאַנצען אָדער טרוקענע, פון לעבעדיגע פלייש אָדער טויטע. דער עיקר איז, אַז דאָס שפּייז דאַרף באשטעהן פון אַר־גאַנישע שטאָפּען. דאָס איז אייגענטליך איינער פון די גרויסע אונטערשיידען צווישען פלאַנצען און חיות. די פלאַנצען, מיט קליינע אויסנאַהמען, נעהמען זייער שפּייז פון אַנאָרגאַנישע שטאָפּ־פען, פון די גאַזען און מינעראַלען פון דער לופט און פון דער ערד, וועהרענד די חיות מוזען האָבען פאַר זייער שפּייז אָרגאַנישע שטאָפּען.

די מאָס און סאָרט פון שפּייז, וואָס יעדע לעבעדיגע באשע־פעניש מוז האָבען פאַר איהר עקזיסטענץ, איז פאַרשידען. דאָס הענגט אָפּ פון דער גרויס פון דער באשעפעניש, פון איהר געבוי,

פון איינער טעטיגקייט, פון איהר ארט לעבען א. א. וו. אָבער אַ געוויסע מאָס שפייז מוזען אלע באשעפענישען האָבען. די חיות מיט וואַרעם בלוט, די יעניגע, וועלכע זיינען באַוועגליכער, אַר-בייטען מעהר, דאַרפען האָבען מעהר שפייז און אויך אַנדערע שפייז, ווי די וואָס האָבען קאַלט בלוט.

יעדע לעבעדיגע באשעפעניש קען אויסקומען אַ לענגערע צייט אָהן שפייז. מענשען האָבען פּרובירט פּאַסטען ביז 60 טעג און זיי זיינען געבליבען לעבען. די באשעפענישען מיט קאַלט בלוט, ווי, למשל, די רעפּטיליען (שלאַנגען, עקדעשען א. א. וו.) קענען אויסקומען אַ גאַנץ לאַנגע צייט אָהן שפייז. אַנדערע פון זיי האָבען איבערהויפט ניט די נאַטור פון אָפט עסען. זיי עסען אָפּ איין מאָל אַ גרויסען מאָלצייט און פּאַסטען נאכדעם אַ ציעמליך לאַנגע צייט. זיעלע פון די נידעריגע באשעפענישען קענען אויס-קומען זעהר אַ לאַנגע צייט אָהן שפייז און בלייבען לעבען. אָבער פאַר יעדער לעבעדיגע באשעפעניש איז פאַראַן אַ גרענעץ ווי לאַנג זי קען אויסקומען אָהן שפייז. ווען דער גרענעץ ווערט איבערשרי-טען, ווערט דער טויט אומפאַרמיידליך. יעדע באשעפעניש מוז שטאַרבן פון הונגער, ווען זי קריגט ניט קיין שפייז פאַר אַ גע-וויסער צייט.

וואסער איז פונקט אזא הויפטבאדינג פאר דעם לעבען פון חיות, ווי שפייז. אלע לעבעדיגע באשעפענישען מוזען האָבען וואסער פאר זייער עקזיסטענץ. עס איז קיין אונטערשיעד ניט אויף וועלכען אופן דאָס וואסער קומט אין דעם קערפער פון דער לעבעדיגער באשעפעניש, צי דירעקט דורך טרינקען, צי דורך שפייז זען, וואָס אלע פון זיי ענטהאַלטען אין זיך וואסער, אין אַ קלע-נערער אָדער גרעסערער מאָס, צי דורך אַרײַנוזיגען דורך די פּאָרען (קליינציניקע לעבעלעך) פון דער הויט — דער גרונד איז, אַז וואָסער איז אַ הויפטבאדינגונג פאר דעם לעבען פון אלע לעבעדיגע באשעפענישען, אויף וועלכען אופן זיי זאָלען דאָס וואסער ניט טרינקען אין זייער קערפער. שעפּסען, למשל, טרינקען זעהר זעל-טען, ווייל זיי נעהמען אַרײַן אין זיך גענוג וואסער דורך די גרינע גראַזען וואָס זיי עסען. יסדהינט טרינקען קיינמאָל ניט, ווייל זיי זיינען אַרײַן אין זיך וואסער דורך די פאַרעז פון זייער הויט. מעמפּעראַטור און דרוק. — אַלס אַ וויכטיגע באדינגונג פאַר דעם לעבען פון באשעפענישען קען אויך גערעכענט ווערען

טעמפּעראַטור. אַלע באַשעפענישען דאַרפֿען האָבען אַ געוויסע טעמפּעראַטור אין יועלכע זיי זאָלען קענען לעבען. אין אַ צו הויכער אָדער אין אַ צו נידעריגער טעמפּעראַטור מוזען זיי שטאַר-בען. ס'איז דער מינימום, ס'איז דער מאַקסימום פֿון טעמפּעראַטור, וואָס לעבעדיגע באַשעפענישען קענען אויסהאַלטען, איז פֿאַר פֿאַר-שידענע מינים באַשעפענישען פֿאַרשידען. אַנדערע באַשעפעני-שען קענען זאָגאַר פֿאַרפֿאַרענערהייט נאָך לעבען. פֿאַרשידענע אינוועקטען און אַנדערע קליינע באַשעפענישען קענען ליגען פֿאַר-פֿאַרענע אַ גאַנצען ווינטער, נאָר ווי עס קומט דער פֿריהלינג, לעבען זיי ווידער. מען האָט פֿרוברט האַלטען געוויסע פֿיש אין פֿאַרפֿאַרענע שטיקער אייז פֿון 15 צעלזיוס גראַד קעלט און זיי זיינען געבליבען לעבען. (ביי אַ צעלזיוס גראַדוסניק, וואָס ווערט באַנוצט אין אייראָפּא, איז דער פֿריד-פֿונקט 0 און דער זיד אָדער קאָך-פֿונקט 100; ביי אַ פֿאַרנהייט גראַדוסניק, וואָס ווערט באַנוצט אין אַמעריקא, פֿאַנגט זיך דער פֿריד-פֿונקט אָן פֿון 32 גראַד איבער 0 אָדער זיראָ). אָבער ווען די טעמפּעראַטור איז אַראָפּ-גענידעריגט געוואָרען ביז 20 גראַד קעלט, האָבען די פֿיש מעהר ניט אויסגעהאַלטען. די קעלט האָט זיי געטויטעט. פֿרעש קענען אויסהאַלטען 28 צעלזיוס גראַד קעלט און בלייבען לעבען, וועהרענדר געוויסע מינים שנעקען קענען אויסהאַלטען אַ קעלט פֿון 120 גראַד צעלזיוס און בלייבען לעבען. דאָסגלייכען איז אין באַצוג צו הייז. פֿאַרשידענע וואַסער-חיות קענען לעבען אין וואַסערען וועלכע זיינען אָנגעוואַדעמט ביז 50 גראַד צעלזיוס, אַנדערע קענען אַפֿילו קיין 30 גראַד ניט אויסהאַלטען.

אַן אַנדער וויכטיגע באַדינגונג פֿאַר דעם לעבען פֿון באַשע-פענישען איז יער דרוק פֿון דער לופט און פֿון וואַסער. דער דרוק פֿון דער לופט אויף דער ערד איז אומגעפֿעהר 15 פֿונט אויף יעדער קוואַדראַט צאָל (אינטש) פֿון שטח. אַ קליינע חיה, וואָס פֿאַרנעהמט, למשל, אַ שטח פֿון 100 קוואַדראַט-צאָל האָט אויסצוהאַלטען אויף זיך אַ לופט-דרוק פֿון אומגעפֿעהר 15 פֿונדערט פֿונט. אָבער דער דרוק פֿון דער לופט פֿאַרטיילט זיך גלייכמעסיג אין אַלע ריכטונגען און אַלע זייטען. יעדע באַ-שעפעניש אויף דער ערד איז אַרומגערינגעלט מיט לופט פֿון אַלע זייטען, פֿון אויסוועניג און פֿון אינוועניג. צוליב דיעזער גלייכ-מעסיגער פֿאַרטיילונג פֿון דרוק פֿון אַלע זייטען קענען די באַשע-

פענישען אויסהאלטען די שווערע געוויכט פון דער לופט וואָס דריקט אויף זיי. און ניט וואָלטען זיי צודריקט ווערען. די באַשע-  
 פענישען אויף דער ערד פיהלען זאָנאר ניט דעם דרוק פון דער  
 לופט, ווייל זיי זיינען צו איהם צוגעוועהנט. די באַשעפענישען,  
 וועלכע לעבען אין וואַסער, האָבען אויסצוהאלטען נאָך אַ גרעסערען  
 דרוק. אויסער דעם דרוק פון דער לופט אויף דער אויבערפלעכע  
 פון וואַסער, דארפן זיי נאָך אויסהאלטען דעם דרוק פון וואַסער  
 נופא, און וואָס טיעפער אין וואַסער אַלץ גרעסער דער דרוק. געד-  
 וויסע ים־פיש לעבען זעהר טיעף אין וואַסער, פון צוויי ביז פינף  
 מייל טיעף, וואו דער דרוק דערנרייכט ביז עטליכע טויזענער פונט  
 אויף יעדער קוואַדראַט־צאָל. ווען אַזעלכע פיש ווערען אַרויפ־  
 געבראַכט פון דער גרויסער טיעפעניש אויף דער אויבערפלעכע פון  
 וואַסער, ווערען ביי זיי די אויגען שרעקליך אַרויסגעשטאַרצט, דער  
 נאַנצער קערפער ווערט שטאַרק אויפגעבלאָזען און דער מאַגען  
 שפאַרט אַרויס אַן אויבערנעקעהרטער פון זייער מויל. אָפט  
 טרעפט, אַז דער קערפער זייערער ווערט אַזוי שטאַרק אויפגעבלאָ-  
 זען, דאָס ער פלאַצט. דער קערפער פון די דאָזיגע פיש, וועלכע  
 לעבען אין גרויסע טיעפענישען, איז צוגעפאַסט און צוגעוועהנט  
 צו אַ גרויסען דרוק, ווען זיי ווערען אָבער געבראַכט פון דער גרוי-  
 סער טיעפעניש אויף דער אויבערפלעכע פון וואַסער, וואו דער  
 דרוק איז פיעל קלענער, ווערען זיי אויפגעבלאָזען, די אויגען  
 שטאַרצען זיי אַרויס און זיי פלאַצען זאָנאר. אַנדערע פיש, וועלכע  
 לעבען אין דער טיעפעניש, פאַרלירען זייער לעבען, ווען זיי ווערען  
 געבראַכט אויפ־ן וואַסער, דורך דעם וואָס עס פלאַצט ביי זיי  
 די לופט־בלאָז און די בלוט־געפעס (די דינע אָדערלעך, דורך וועלכע  
 דאָס בלוט פליסט אין קערפער). דאָס עהנליכע וועט פאַסירען,  
 ווען מען זאָל אַרויפנעהמען אַ באַשעפעניש פון דער ערד אויף  
 זעהר אַ גרויסער הויך אין דער לופט, וואו דער לופט־דרוק איז  
 פיעל קלענער, ווי אויף דער אויבערפלעכע פון דער ערד. דער  
 קערפער וועט זיך אָנפאַנגען אויפגעבלאָזען און עס וועלען אָנפאַנג-  
 גען פלאַצען די בלוט־געפעס, און ווען די הויך וועט זיין זעהר  
 גרויס, וועט די באַשעפעניש מעהר ניט אויסהאלטען און שטאַרבען.  
 עס איז אמת, אַז דער טויט וועט טיילווייז קומען דערפון, וואָס  
 אין זעהר אַ ווייטער הויך אין דער לופט איז שווער צו אַטעמען  
 און צו קריגען גענוג זויער־שטאָף אויפצוהאלטען דאָס לעבען,

אָבער די ענדערונג פון דעם דרוק, צו וועלכען דאָס באַשעפעניש איז צוגעוועהנט צו לעבען, איז, ווי עס ווערט אָנגענומען, די הויפט אורזאכע וואָס בריינגט דעם טויט. אַלע לעבעדיגע ברואים זיינען צוגעוועהנט צו לעבען אונטער אַ געוויסען דרוק, און עס זיינען פאַראַן געוויסע גרענעצען פאַר דעם מאַקסימום אָדער מינימום דרוק אונטער וועלכען אַ לעבעדיגע באַשעפעניש קען עקזיסטירען און בלייבען לעבען.


**צעלען.** — ווען מען אונטערזוכט דעם שטאָף פון די פאַרשידענע קערפער-טיילען פון די מעהר אַנטוויקעלטע לעבעדיגע ברואים מיט דער הילף פון אַ גוטען מיקראַסקאָפּ (פאַרגרעסערונגס-גלאַז), זעהט מען, אַז דיעזער שטאָף איז צונויפגעשטעלט פון אַ גרויסער מאַסע קלייניקע קעמערלעך, איינע ביי די אנדערע און איבער די אנדערע. אַט דיעזע קלייניקע קעמערלעך ווערען אָנגערופען **צעלען**. ניט אַלע צעלען זיינען גלייך אין גרויס און אין פאַרם, אָבער ניט קוקענדיג אויף זייערע אונטערשיידען, האָבען זיי דאָך אַן אַלגעמיינע עהנליכקייט צווישען זיך.

ביי פיעלע פון די איינפאכע אָרגאַניזמען, דאָס הייסט, ביי די נידעריגערע, וועניג אַנטוויקעלטע לעבעדיגע ברואים, האָבען די צעלען אַן אויסזעהן פון אַ שטודען (פוטשא) עהנליכער מאַסע פון מעהר אָדער וועניגער אַ רונדליכער פאַרם, אָבער ביי די העכער אַנטוויקעלטע לעבעדיגע ברואים איז דער געבוי פון די צעלען און זייערע פאַרמען פיעל קאָמפּליצירטער. די צעלען פון מוסקול פלייש זיינען לאַנג און דין; די צעלען פון די נערווען זיינען זעהר איידעל און עהנליך צו פעדים; אין מאַנכע טיילען פון דער הויט האָבען די צעלען אַן אויסזעהן פון שופען.

די צעלען אונטערשיידען זיך ניט בלויז אין זייער פאַרם, נאָר אויך אין זייער גרויס. אַנדערע צעלען זיינען אַזוי קליין, דאָס זיי האָבען ניט מעהר ווי אַ מיקראַמילימעטער (אומגעפעהר איין 25 טויזענדטל פון אַן אינטש) אין דורכמאַס (דיאַמעטער). אום צו מאַכען זיך אַ פאַרשטעלונג פון דער קלייניקייט פון אַזעלכע צעלען איז גענוג צו זאָגען, דאָס טויזענדט מיליאָן (אַ ביליאָן) אַזעלכע מע צעלען קענען אַריינגעהן אין אַ חלל, וואָס איז אַזוי גרויס, ווי אַן אַרבעס. אין אַ טראָפען מענשליך בלוט פון דערוואַכינטער גרויס קענען זיך געפינען אַרום צעהן מיליאָן בלוט-צעלען אָדער הונדערט-טויזענדט ווי אַן אַרבעטס-רופט זיי. עס זיינען אָבער אויך פאַרען



אזעלכע גרויסע צעלען, וואָס האָבען אין זייער דורכמאָס (דיאַ-  
מעטער) פון צוויי אַ האַלב ביז פינף צענטימעטער (פון איינס ביז  
צוויי אינטשעס), ווי דאָס איז דער פאַל ביי אַן איי פון אַ הוהן  
אַדער פון אַ שטרויס־פּוּיגעל (אַן איי איז אַ צעלע). נאָר ניט  
קוקענדיג אויף דעם וואָס די צעלען אונטערשיידען זיך אזוי שטאַרק  
אין זייער גרויס און אין זייער פאַרם, איז אָבער זייער אינערליכע  
סטרוקטור (געבוי) דורכאויס עהנליך איינע צו די אַנדערע. אַלע  
צעלען זיינען אין אַלגעמיין געבויט לויט דעמזעלכען פלאַן, און  
ווען מען שטודירט גוט דורך איין צעלע באקומט מען אַ באַגריף



צייכונג 1. — פארשידענע צעלען, שטאַרק פאַרגרעסערט, פון דעם  
קערפער פון די העכער ענטוויקעלטע היות. אַ צייגט אַ לעבער צעלע;  
ב צייגט דעם קערן פון דער צעלע; ג, שפּייז־מאַטעריאַלען אין דער  
צעלע. ד, שפּייז־מאַטעריאַלען אין דער צעלע. ה, צייגט אַ בלוט־צעלע.  
ו, אַ נערווען־צעלע מיט אַ טייל פעדימלעך פון איהר. ז, מוסקעל פעדים.  
א, צעלען פון דער הויט וואָס באַדעקט די איכוועניגסטע ציכט פון גאַנגעל.  
ה צייגט די צעלען פון דער אויבערשטער הויט, ווען זי ווערט דורכגע-  
שניטען.

פון די וויכטיגסטע אייגענטימליכקייטען פון אלע אנדערע צעלען, ווי פארשידען זיי זאלען ניט זיין אין זייער גרויס און פארם. פראטאפלאזמע. — די איינפאכסטע פרימיטיווע צעלע פון א לעבעדיגער באשעפעניש באשטעהט פון א קליינער מאסע קלע-פיגער, כמעט קאלירלאזער שטאף, וואָס ווערט אָנגערופען פראטאפלאזמע. די פראטאפלאזמע, פון וועלכער די צעלע באשטעהט, איז איינגעטיילט אין צוויי טיילען, אין אַן אינוועניגסטען און אַן אויסוועניגסטען טייל. דער אינוועניגסטער טייל איז געדיכטער און ווערט גערופען דער קערן אָדער יאָדער פון דער צעלע, וועה-רענד דער אויסערער טייל, וואס באדעקט און שליסט איין דעם קערן, איז שיטערער און דורכזיכטיגער און ווערט גערופען סיטאפלאזמע. אין א צעלע קען זיין מעהר ווי איין קערן. אָפט איז די צעלע פון אויבען באדעקט מיט א הארטען היטעל. א צעלע קען אויך ענטהאלטען, אויסער די פראטאפלאזמע, אויך אנדערע שטאָפּען. זי קען, למשל, ענטהאלטען וואסער, אויל, קראַכמאַל, פארב און אנדערע שטאָפּען, וועלכע ווערען פראָדוצירט דורך דעם לעבענכ-פראָצעס פון דער פראַטאפלאזמע.

נאָר וואָס איז די פראַטאפלאזמע גופא? — דאָס איינציגע, וואָס קען געזאָגט ווערען קלאָר און באשטימט וועגען דער פראַטאפלאזמע, איז, דאָס זי איז דער הויפט-שטאָף פון לעבען. איהר פאָלשטענדיגע כעמישע צונויפשטעלונג איז אָבער נאָך ביז היינט ניט אויסגעפארשט געוואָרען. די כעמישע צונויפשטעלונג פון פראַטאפלאזמע איז אזא קאָמפליצירטע, אַז די כעמיקער און די נאטור-פארשער האָבען נאָך ביז היינט ניט געקענט פעסטשטעלען די פארשיידענע שטאָפּען, פון וועלכע זי באשטעהט. דער וויכטיג-סטער שטאָף, אָבער, פון וואָס פראַטאפלאזמע באשטעהט, איז איי-ווייס. דאָס איי-ווייס איז דאָס דער שטאָף, וואָס מאַכט די פראַטאפלאזמע פאר דעם יסוד פון לעבען.

כדי אויסצומיידען א טעות, דארף באמערקט ווערען, אַז דער באַגריף „איי-ווייס“, וואָס מיר געברויכען דאָ, איז ניט דאָסעלבע וואָס ווייסעל פון אַן איי. דער שטאָף איי-ווייס איז בלויז אויסער-ליך עהנליך צו ווייסעל פון אַן איי, אָבער זיי זיינען דורכאויס צוויי פארשיידענע שטאָפּען. ווייסעל פון אַן איי איז א טויטער שטאָף, וועהרענד איי-ווייס איז, ווי שוין געזאָגט, דער יסוד פון דעם לע-בענכ-שטאָף, פון פראַטאפלאזמע.

## דרימער קאפיטעל

לעבען שטאַמט אָפּ פֿון לעבען. — די פֿאַרמעהרונג פֿון באַשעפענישען. —  
געשלעכט. — די פֿאַרמעהרונגס־צאָהל.

### פֿרוכפֿערונג און מעהרונג.

לעבען שטאַמט אָפּ פֿון לעבען. — דער ערשטער גרעסטער  
כלל אין זאָגלאַגיע אין, אז יעדע לעבעדיגע באַשעפעניש מוז אַרויס־  
שטאַמען פֿון אַ לעבעדיגער באַשעפעניש. היינט אין דער דאָזיגער  
כלל אַ זעלבסטפֿארשטענדליכע וואַרהייט, אָבער עס זיינען געווען  
צייטען, און נאָך ניט זעהר לאַנג צוריק, ווען מען האָט געגלויבט,  
אַז לעבעדיגע אָרגאַניזמען, לעבעדיגע באַשעפענישען קענען באַשאַ־  
פֿען ווערען פֿון זיך אליין.

מען האָט, אמת, אלע מאָל געוואוסט, אַז קיח ווערען געבאָרען  
פֿון קיח, שעפּסען פֿון שעפּסען, היהנער פֿון היהנער א. א. וו.,  
אָבער עס זיינען געווען צייטען, ווען מען האָט ניט געוואוסט, אַז  
פֿליגען שטאַמען אַרויס פֿון פֿליגען. מען האָט געגלויבט, אַז זיי  
ווערען פֿון זיך געבאָרען. אַזוי האָט מען אויך געגלויבט אויף  
פֿיעל אַנדערע אינווקמען, שוין אָפּגערעדט וועגען די קליינע מיקראַ־  
סקאָפֿישע באַשעפענישען, וועלכע זיינען פֿאַר די נאַטורפֿאָרשער  
פֿון די אַלטע צייטען געווען אַ פֿאַלשמענדיגע געהיימניס.

די נאַטורפֿאָרשער פֿון די אַלטע צייטען האָבען געגלויבט, אַז  
אַ סך באַשעפענישען ווערען געבאָרען פֿון זיך אליין, אָדער ווי מען  
דריקט זיך אויס וויסענשאַפֿטליך, „זיי ענטשטעהען ספּאָנטאַן“. זיי  
האָבען געגלויבט, אַז פֿליענען ווערען געבאָרען פֿון די פֿאַרפֿוילטע  
שטאָפֿען פֿון טויטע היות. זיי האָבען געגלויבט, אַז פֿון דעם פֿלייש  
פֿון טויטע פֿערד ווערען באַשאַפֿען אונזעהליגע ווערימלעך, וועלכע  
וואַקסען שפּעטער אויס אין פֿליגען. ערשט אין מיטען פֿון 17טען  
יאָרהונדערט האָט אַן ענגלישער נאַטורפֿאָרשער באַוויזען, אַז די  
פֿליגען, וועלכע עמען די טויטע קערפֿערס פֿון פֿערד, קומען אַרויס  
פֿון אייעלעך, וואָס ווערען געלעגט אין פֿלייש פֿון טויטע פֿערד פֿון  
אַנדערע פֿליגען פֿון דעם זעלבען מין. זיי האָבן געגלויבט, אַז פרעש  
ווערען באַשאַפֿען פֿון בלאַטע און אַז די פֿאַרשיידענע פֿאַראַזיטען

ווערען באשאפען פון דעם קערפער פון דער באשעפעניש, וואו זיי לעבען. נאך אין אָנפאַנג פון 17טען יאָרהונדערט האָט אָן ענגלישער נאַטורפֿאָרשער באהויפטעט, אַז לעבעדיגע באשעפענישען קענען ענטשטעהן ספּאָנטאַן, דאָס הייסט זיי קענען באשאפען ווערען פון זיך אַליין. זיין באהויפטונג איז געווען, אַז יעדע לעבעדיגע באשעפעניש מוז זיך ענטוויקלען פון אַן איי, אָבער די איי גופא קען באשאפען ווערען פון זיך אַליין.

עס האָט גענומען אַ גאַנץ לאַנגע צייט ביז מען איז געקומען צו דער איבערצייגונג, אַז לעבעדיגע אָרגאַניזמען קענען ניט באשאפען ווערען פון זיך אַליין, נאָר מוזען אַרויסקומען פון אַנדערע לעבעדיגע אָרגאַניזמען.

פאַר די נאַטורפֿאָרשער פון די פריהערדיגע צייטען, פאַר וועלכע מען אַ גאַנצע רייה ערשיינונגען פון דער נאַטור זיינען געווען נאָך אונבאַקאַנט און פיעלע ערשיינונגען. פון דער נאַטור זיינען געווען פאַר זיי אונפאַרשטענדליך, ניט האָבענדיג דערצו די נויטיגע וויסענשאַפטליכע אפּאַראַטען און אינסטרומענטען צו מאַכען גענויע וויסענשאַפטליכע אונטערזוכונגען, ניט באזיצענדיג די גרויסע ערפֿאַהרונג, וואָס די היינטיגע נאַטורפֿאָרשער האָבען גע'ירש'ענט פון זייערע פֿאָרענגער, איז עס געווען גאַנץ לייכט צו קומען צו דעם טעות, אַז לעבעדיגע באשעפענישען קענען באשאפען ווערען פון זיך אַליין, ניט אָפּשטאַמענדיג פון עלטערען, ווייל אַנדערש האָבען זיי זיך ניט געקענט ערקלעהרען אַ גאַנצע רייה ערשיינונגען אין דער לעבעדיגער נאַטור. ווען זיי האָבען געזעהן, אַז אין אַ וואַסער אָדער אין אַן אַנדער פליסיגקייט, וואו קיין שפורען פון לעבעדיגע אָרגאַניזמען קענען זיי ניט געפינען, באווייזען זיך דאָך, אין אַ פאַרלוף פון אייניגע טעג, אַ גאַנצע מחנה פון קליינע לעבעדיגע ברואים, האָבען זיי קיין אַנדער ערקלעהרונג ניט געהאַט, אַז די מחנה קליינע ברואים איז פּלוצים באשאפען געוואָרען פון זיך אַליין. איצט ווייסען מיר, אַז די קליינע מיקראָסקאָפֿישע ברואים'לעך, וועלכע באווייזען זיך אין פּאָלשטענדיג ריינעם, קלאָרען וואַסער, וואָס שטעהט אייניגע טעג, קומען פון די פאַרשיידענע באַצילען, באַקטעריען און אַנדערע קליינע איינצעליגע באשעפענישען, וועלכע געפינען זיך אין דער לופט, און וועלכע דרינגען אַריין אין וואַסער און פאַרמעהרען זיך דאָרט, אויב דאָס וואַסער איז ניט פּאָלשטענדיג אָפּגעשלאָסען, אַז קיין לופט זאָל ניט קענען צוקומען. דאָס איז

זאגאר דער פאל, ווען דאָס וואָסער איז פּאַלשטענדיג סטעריליזירט, פּאַלשטענדיג גערייניגט פון מיקראָבען, פּראָטאָזאָען, אינפּוזאָריען, אָדער אַנדערע קליינע באַשעפענישען, וועלכע געפינען זיך, גע-וועהנליך, אין וואָסער. ווען דאָס וואָסער איז אָבער ניט סטערי-ליזירט, זיינען גענוג די קליינע ברואים/לעך, וועלכע געפינען זיך דאָרטען, צו פארמעהרען זייער צאָהל אין אַזעלכע ריעזיגע מאַסען, אַז עס זאָל איינפאַך שוויבלען און גריבלען פון זיי, ווען דאָס וואָסער שטעהט אין אַ כלי אָדער אין אַ גרוב, עס הייסט, דאָס וואָסער איז ניט קיין פליסענדעס נאָר אַ שטעהענדעס. שטעהענדע וואָסערען ווערען דעריבער פארפעסטעט פון פארשייד-דענע באַקטעריען, מיקראָבען, באַצילען און פּראָטאָזאָען, וועלכע פאר-מעהרען זיך מיט אַ ריעזיגער שנעלקייט. ווען אָבער סטעריליזירטע וואָסער ווערט אַוועקגעשטעלט אין אַ סטעריליזירטע כלי, וועלכע איז פּאַלשטענדיג אָפּגעשלאָסען פון דער לופט, אַז קיין מיקראָבען אָדער אַנדערע קליינע מיקראָסקאָפּישע באַשעפענישען זאָלען אין איהר ניט קענען אַריינדרינגען, דאַן וועלען אין דעם וואָסער קיין לעבעדיגע אָרגאַניזמען זיך ניט באווייזען.

דער גרונד איז, אַז לעבען קען אָפּשטאַמען בלויז פון לעבען, פון זיך אַליין קען אַ לעבעדיגער אָרגאַניזם ניט באשאפן ווערען. די פאַרמעהרונג פון באַשעפענישען. — די עקזיסטענץ פון דער לעבעדיגער נאַטור הענגט אָפּ פון דער פּעהיגקייט פון יעדער באַשעפעניש זיך צו פרוכפערען און צו פארמעהרען. די מעטאָדען פון פאַרמעהרונג אין דער נאַטור זיינען זעהר פאַרשיידענאַרטיג.

די איינפאַכסטע פּאַרם פון פאַרמעהרונג איז די שפּאַלטונג אָדער טיילונג, וואָס עקזיסטירט ביי די גאַנץ נידעריגע ברואים. דער קערפּער פון דער באַשעפעניש צושפּאַלט זיך אין צוויי טיילען, אין צוויי גלייכע העלפטען. פון איין באַשעפעניש ווערט צוויי. די דאָזיגע איינפאַכע פּאַרם פון פאַרמעהרונג עקזיסטירט ביי די אַמיבען און ביי פיעלע אַנדערע נידעריגע, איינפאַכע באַשעפענישען. מען קען אין דעם פּאַל ניט רעדען וועגען עלטערען און קינדער. די „קינדער“, די נייע אַמיבען, זיינען אין דערזעלביגער צייט די עלטערן, וועלכע האָבען זיך צושפּאַלטען אין צווייען. די עלטערן בלייבען אימער לעבען, זיי שטאַרבען ניט, ווען זיי האָבען פּראָ-דוצירט זייערע קינדער. זיי בלייבען לעבען און האַלטען זיך כסדר אין שפּאַלטען. די נייע אָפּגעשפּאַלטענע אַמיבען, וועלכע זיינען

א טייל פון זייערע עלטערן, שפאלטען זיך ווייטער אין צווייען. עס הייסט, אז די קערפערס פון די פריהערדיגע עלטערן האָבען זיך איצט געשפאלטען אין פיערען. און וויפיעל די שפאלטונגען זאלען ניט אָנגעהן, וועט יעדע נייע אַמיבע זיין אַ טייל פון דער פריהערדיגער אַמיבע, זי וועט אימער זיין אַ טייל פון דער אור־אור עלטער אַמיבע. ווי עס איז צו זעהן, קען אַן אַמיבע ניט שטאַרבען מיט אַ נאַטיר־ליכען טויט. מען קען זי בלויז טויטען. די אַמיבע איז, אַלזאָ, אומשטערבליך, זי קען אייביג לעבען.

אַ מעהר קאָמפליצירטע פאָרם פון פאַרמעהרונג ביי די איינ־צעליגע באַשעפענישען איז די, וועלכע קומט פאָר דורך פאָרונג און שפאלטונג. עס טרעפן זיך צונויף צוויי אינדיווידואומס פון דעמוזעלביגען מין באַשעפענישען און בייטען זיך מיט זייערע צעלען. דאָן שיידען זיי זיך איינע פון די אַנדערע און יעדע צושפאלט זיך אין צוויי העלפטען. די נייע אָפגעשפאלטענע באַשעפענישען זיי־נען שוין אַ פראָדוקט פון צוויי אינדיווידואומס, און אויב עס איז פאַראַן וועלכער עס איז אויסערליכער אונטערשייד צווישען די צוויי אינדיווידואומס, וועלכע האָבען זיך געפאָרט, וועלען שוין די נייע אינדיווידואומס, וועלכע ענטהאַלטען אין זיך טיילען פון יעדען פון זיי, זיין אויסערליך עטוואָס פאַרשיידען פון ביידען. עס איז איינע פון די כאַראַקטעריסטישע ערשיינונגען פון דער נאַטור, צו שאַפען נייע פאָרמען און אז יעדעס נייע פראָדוצירטעס אינדיוויר־דואום זאָל עטוואָס זיין פאַרשיידען פון די, וועלכע האָבען איהם פראָדוצירט. מען קען אין דער נאַטור ניט געפינען צוויי אינדי־ווידואומס, וועלכע באַלאַנגען אפילו צו דעמוזעלביגען מין, אַז זיי וואָלען זיין פונקט גלייך. אַ קליינער אונטערשייד איז אַלע מאָל פאַראַן.

אַ ווייטערדיגע ענטוויקלונג אין די מעטאָדען פון פאַרמעהרונג ביי די איינצעליגע באַשעפענישען איז די פאָרונג פון צוויי צעלען פון איין קאָלאָניע אָדער פון צוויי באַזונדערע קאָלאָניעס פון דער־זעלביגער ספעציע באַשעפענישען. די צוויי פאָרענדע צעלען זיינען איינע פון דער אַנדערער פאַרשיידען. די צעלע, וועלכע ווערט גערופען די איי־צעלע, איז גרעסער און רונדער, ווי די זאָמענ־צעלע, וועלכע באַפּרוכפערט איהר. די איי־צעלע איז ניט באַוועגליך, וועהרענד די זאָמענ־צעלע איז אַ באַוועגליכע. די פאַרמעהרונג

קומט אין דעם פאל שוין ניט דורך שפאלטונג, נאָר אלס אַן אַרויס וואָס פון דער באַפֿרוכטעטער אייִצעלע.

**געשלעכט.** — ביי די איינפֿאַכע, נידעריגע באַשעפענישען

קען איין אינדיווידואַם פֿראָדוצירען סאָי די אייִצעלען סאָי די זאָמענ־צעלען, ביי די העכערע מינים באַשעפענישען אָבער ווערען די אייִצעלען און די זאָמענ־צעלען שוין פֿראָדוצירט פֿון צוויי פֿאַרשיידענע אינדיווידואַמס. די אינדיווידואַמס, יועלכע פֿראָדיר־צירען די אייִצעלען, ווערען גערופֿען נקבות, וועהרענדר די וואָס פֿראָדוצירען די זאָמענ־צעלען, ווערען גערופֿען זכרים. עס זיינען, הייסט עס, פֿאַראַן צוויי געשלעכטער, אַ ווייבליכער געשלעכט און אַ מענליכער געשלעכט. די באַגריפען „מענליך“ און „וויבליך“ קענען אויך אָנגעווענדעט ווערען צו די זאָמענ־צעלען און צו די אייִצעלען. מען קען זאָגען, אַז ביי די נידעריגע באַשעפענישען פֿראָדוצירט איין אינדיווידואַם אי מענליכע אי וויבליכע צעלען. מעי קען אָבער זאָ אַז אינדיווידואַם ניט אָנרופֿען ניט מענליך ניט וויבליך; עס באַלאַנגט ניט צו קיינעם פֿון די צוויי געשלעכטען. אזעלכע באַשעפענישען ווערען גערופֿען הערמאַפֿראַדרימען. אזעלכע הערמאַפֿראַדרימען זיינען פֿאַראַן אויך צווישען אייניגע העכערע באַשעפענישען, אָבער זיי קענען גערעכענט ווערען בלויז אלס אויס־נאַהמע. דער אַלגעמיינער כלל איז, אַז ביי די העכערע ענטוויקעלטע באַשעפענישען עקזיסטירען צוויי געשלעכטער, מענליך און וויבליך.

כמעט ביי אַלע העכערע ענטוויקעלטע באַשעפענישען קומט פֿאַר די פֿאַרמעהרונג דורך אַ פֿאַראייניגונג פֿון מענליכע און וויבליכע פֿרוכפֿערונגס־צעלען. די פֿרוכפֿערונג איז אַ פֿראָדוקט פֿון דער פֿאַראייניגונג פֿון דעם קערפֿערליכען שטאַף פֿון צוויי פֿאַרשיידענע אינדיווידואַמס. דאָס נייע אינדיווידואַם, וואָס קומט אַרויס פֿון דער דאָזיגער פֿאַראייניגונג, איז עטוואָס פֿאַרשיידען פֿון זיינע עלטערן, ווייל עס באַשטעהט פֿון טיילען, וועלכע קומען פֿון צוויי פֿאַרשיידענע אינדיווידואַמס.

די זכרים און די נקבות זיינען ביי די מייסטע באַשעפענישען פֿאַרשיידען איינע פֿון די אַנדערע אין זייער אויסזעהן. בלויז ביי די נידעריגע באַשעפענישען איז דער אונטערשייד אין אויסזעהן וועניג באַמערקבאַר, אָדער זאָגאַר אינגאַנצען ניט באַמערקבאַר, אויב סער דער אונטערשייד אין די געשלעכטליכע אָרגאַנען. ביי די העכערע באַשעפענישען אָבער קען מען מייסטענס לייכט אונט־

טערשיידען די צוויי געשלעכטער דורך זייער אויסערליכען אויס-  
 זעהן. ביי אנדערע באשעפענישען איז דער אונטערשייד אזא  
 גרויסער, דאָס מען קען מיינען, אז זיי געהערען צו פארשיידענע  
 מינים. ביי די פאזעס, למשל, האָט דער זכר אַ גאנץ אנדער אויס-  
 זעהן ווי די נקבה. דער זכר איז דאָס דער שטאַלצער פּויגעל מיט  
 די פראַכטפולע לאַנגע עקספּעדערען פון פארשיידענע קאָלירען,  
 וועהרענד די נקבה זעהט אויס גאנץ באַשיידען אָהן וועלכער עס איז  
 באַפּוצונג. נאָך אַ גרעסערער אונטערשייד איז ביי די גן עדן  
 פּויגלעך. די בונטע, פארשיידענפארביגע און פאַנטאַסטישע-  
 קרויזמע פּעדערען באַלאַנגען צו דעם זכר, וועהרענד די נקבה איז  
 אַנגעמאַן אין אַ גאנץ באַשיידענעם ברוינעם קאַסום, אָהן וועלכע  
 עס איז באַפּוצונגען. דאָסזעלבע איז אויך ביי די פּאַזאַנען. די  
 רייך-אויסגעפּוצטע, מיט גאָלדענע און זילבערנע פּעדערען זיינען  
 עס די זכרים, וועהרענד די נקבות האָבען גאנץ באַשיידענע קאָלירען.  
 דער דאָזיגער אונטערשייד אין אויסזעהן צווישען די זכרים  
 און די נקבות ווערט אַנגערופּען געשלעכטס דעמאָרפּיזם. דער  
 דאָזיגער דעמאָרפּיזם איז באַזונדערס צו באַמערקען ביי די באַשע-  
 פענישען, ביי וועלכע עס עקזיסטירט פּאָליגאַמיע (פּיעל-זווייבעריי),  
 אָדער ביי די, וואו איין זכר פּאַרט זיך מיט פּיעלע נקבות, און דאַרף  
 אַנפּהירען אַ קאַמפּף זיי צו קריגען אין זיין באַזיץ. דאָס שעהנע,  
 גלענצענדע און אַנציהענדע אויסזעהן פון דעם זכר איז אַ וויכטיגער  
 מיטעל אין דעם דאָזיגען קאַמפּף.

אפילו צווישען די נידעריגערע מינים באַשעפענישען זיינען  
 פאַראַן פּיעלע, וואו דער אונטערשייד צווישען די זכרים און די  
 נקבות איז זעהר אַ גרויסער. עס זיינען פאַראַן מאַמען, וואָס די  
 זכרים האָבען פּיער פּליגלען, וועהרענד די נקבות האָבען גאָר קיין  
 פּליגלען ניט. ביי די ווייסע מוראַשקעס איז די נקבה אָפט אַ  
 האַלבען פּוס די לענג, וועהרענד דער זכר איז קוים אַ האַלב צאָל  
 (אינטש) די לענג.

מאַנכע באַשעפענישען האָבען די אייגענשאַפט, וואָס ניט  
 קוקענדיג אויף דעם, וואָס זיי זיינען איינגעטיילט אין זכרים און  
 נקבות, קענען דאָך די נקבות פּראָדוצירען אַ נייעם דור פון אייער,  
 וועלכע זיינען ניט באַפּרוכטעט געוואָרען פון די זכרים. די קע-  
 ניגין פון די ביענען, למשל, לעגט צווייערליי סאָרטען אייער, באַ-  
 פּרוכטעט און ניט באַפּרוכטעטע.



פון די באפרוכטעטע אייער קומען ארויס נקבות, קעניגנים און ארבייטער־ביענען, וועלכע זיינען אומפרוכטבארע נקבות, וועהרענד פון די אומבאפרוכטעטע אייער קומען ארויס די זכרים, אָדער דראָנען, ווי זיי ווערען גערופען (זעה קאפיטעל „אינוועסטען“). די דאָזיגע ערשיינונג ווערט אָנגערופען פּאַרטהענאָגענעזיס (פּאַר־מעהרונג אָהן געשלעכטליכער באפרוכטונג).

די פּאַרמעהרונגס צאָהל. — די צאָהל קינדער אָדער אייער, וואָס די פּאַרשיידענע מינים באשעפענישען קענען פּראָדוצירען, איז זעהר שטאַרק פּאַרשיידען. פון די חיות און די עופות, מיט וועלכע מיר זיינען מעהר באקאנט, זיינען די מייסטע ניט זעהר פּראָדוקטיוו. א קוה האָט בלויז איין קעלבעל א יאָהר. א קאץ האָט עטליכע קעצעלעך מיט אמאָל. א טויב לעגט אויס צו צוויי אָדער צו פיער אייער צוויי מאָל אָדער דריי מאָל א יאָהר און בריהט זיי אויס. היה־נער זיינען מעהר פּרוכטבאר. אָבער ביי פיעלע אנדערע באשעפענישען איז די פּרוכטבאַרקייט אומפּאַרגלייכליך א גרעסערע. א ראק, למשל, לעגט אויס זעהן טויזענד אייער אין איין צייט. א בינען־קע־ניגין לעגט אויס אַן ערך פינף מיליאָן אייער אין דעם משך פון איהר פינף אָדער זעקס יעהריגען לעבען. א נקבה פון די ווייסע מוראַש־קעס לעגט אכציג טויזענד אייער אין א טאָג אין א משך פון עטליכע חדשים. אין א גרויסען שטאַק־פּיש, וועלכען מען האָט אויפגע־שניטען, האָט מען געפונען אַן ערך אכט מיליאָן אייער.

ווען מיר זוכען די אורזאכע וואָרום עס עקזיסטירט אזא גרוי־סער אונטערשייד אין דער פּרוכטבאַרקייט פון די באשעפענישען, קענען מיר עס אמבעסטען געפינען נאָכפּאַרשענדיג ווי לאַנג עס לעבט די אָדער יענע באשעפעניש, וואָס פאַר אַן אַרט לעבען זי פיהרט און אויף וויפיעל זי זאָרגט פאַר דער ערציהונג און ענט־וויקלונג פון איהרע קינדער. מען קען אָננעהמען פאַר אַן אַלגעמיי־נעם כלל, אַז באשעפענישען, וועלכע לעבען לאַנג, און וועלכע פּאַסען אויף אויף זייערע קינדער, זיינען וועניגער פּרוכטבאר, וועהרענד די באשעפענישען, וועלכע לעבען א קורצע צייט און פּאַסען ניט אויף אויף זייערע קינדער, זיינען זעהר פּרוכטבאר. דער שטאַק־פּיש לעגט אויס מיליאָנען אייער, אָבער וועניג פּיש קומען פון זיי ארויס. הונדערטע טויזענדע פון זיי ווערען אויפגענעסען פון פּאַרשיידענע פּישען און אנדערע ים־באשעפענישען, איידער זיי ווערען נאָך אויס־געבריהט, און פון די אויסגעבריהטע פּישלעך דערלעבען זעהר

וועניג גרויס צו ווערען, זיי ווערען פארשלונגען קליינערהייט. פון די מיליאָנען אייער וואָס אַ שטאַק־פּיז לעגט אויס, ענטוויקלען זיך, אַלזאָ, בלויז אַ קליינע צאָהל פּיז, וועלכע וואַקסען אויס פאַרצור זעצען זייער געשלעכט. די טויבען היטען זייערע אייער און באַ-שיצען זיי. און ווען זיי בריהען זיי אויס, זוכען זיי צו באַזאָרגען שפּייז פאר די נייגעבאַרענע, זיי קאָרמענען זיי און באַוואַכען זיי ביז זיי ווערען אַליין פעהיג זיך צו באַזאָרגען מיט שפּייז און זיך צו שיצען.

אונטער נאָרמאַלע באַדינגונגען וועט אין אירגענד וועלכען עס איז פּלאַץ אימער בלייבען אומגעפעהר די גלייכע פארהעלטניס אין דער צאָהל פון די פארשיידענע באַשעפענישען, וועלכע לעבען דאָר-טען. די פּיז, וואָס לעגען הונדערטע טויזענדע אייער אין אַ יאָהר און די פּויגעל, וואָס לייגען בלויז עטליכע אייער אַ יאָהר, וועלען אין ענדרעזולטאַט אָנהאַלטען אומגעפעהר דיזעלביגע פּראָפּאָרציע פון זייערע צאָהלען. אין איין פּאַל ווערען אַ סך געבאַרען אָבער וועניג בלייבען לעבען, וועהרענד אין דעם צווייטען פּאַל ווערען וועניג געבאַרען, אָבער דער גרעסטער טייל פון זיי בלייבט לעבען.

## פיערטער קאפיטעל.

די איינטיילונג פון די לעבעדיגע באשעפענישען אין פארשיידענע קלאסען. — די עהנליכקייט און קרובה'שאפט צווישען לעבעדיגע ברואים. — האמאלאגיע און אנאלאגיע, גלויבארטוגקייט און עהנליכקייט. — וויסענשאפטליכע נעמען און די הויפט־אפטיילונגען אין וועלכע אלע לעבעדיגע באשעפענישען פון דער ערד ווערען איינגעטיילט.

## די קלאסיפֿיצירונג פון חיות.

איינטיילונג אין קלאסען. — אום צו קענען בעסער שטרך דירען די גרויסע צאָהל פארשיידענע לעבעדיגע ברואים אויף דער וועלט, טיילט מען זיי איין אין קלאסען, לויט זייער עהנליכקייט און קרובה'שאפט. יעדער איינציגער, וואָס האָט אַפילו ניט שטודירט דאָס לעבען פון די חיות, ווייס, אַז צווישען פארשיידענע לעבעדיגע באשעפענישען עקזיסטירט א נעהענטערע אָדער ווייטערע עהנליכקייט. א פערד, למשל, איז עהנליכער צו אַן זעעל, ווי צו אַ הונט, אָבער אַ פערד איז דאָך עהנליכער צו אַ הונט, ווי צו אַ הוהן. שוין אין דער געוועהנליכער אומגאַנג־שפראַך האָבען מיר אַ געוויסע איינטיילונג פון די לעבעדיגע באשעפענישען אין פארשיידענע קלאסען, לויט זייער עהנליכקייט און קרובה'שאפט. אין דער געוועהנליכער שפראַך זיינען אלע לעבעדיגע ברואים איינגעטיילט אין חיות, בהמות, עופות, פיש, אינזעקטען און שרצים. די דאָזיגע איינטיילונג קומט פון דער עהנליכקייט און קרובה'שאפט, וואָס דער מענש האָט באַמערקט צווישען די פארשיידענע מינים לעבעדיגע ברואים. אַן אַקס איז טאַקע זעהר שטאַרק פארשיידען פון אַ שעפּס, אָבער ער איז דאָך עהנליכער צו אַ שעפּס און אַ נעהנטערער קרוב צו איהר, ווי צו אַ טויב. אַ שוואַלב ווידער איז שטאַרק פארשיידען פון אַ שטרויס־פויגעל, אָבער ער איז דאָך עהנליכער צו אַ שטרויס־פויגעל און אַ נעהנטערער קרוב צו איהם, ווי צו אַ גאַלד־פישעל. אויף דעם גרונד פון די דאָזיגע עהנליכקייטען און קרובה'שאפטען, האָט דער מענש שוין פון גאַנץ אַלטע צייטען איינגעטיילט די פאַרשיידענע לעבעדיגע ברואים אין פארשיידענע קלאסען. ווען מיר

ווילען אָבער נעהנטער און גרינדליכער שטודירען דאָס לעבען און די נאַטור פון די פאַרשיידענע לעבעדיגע ברואים, איז די קלאַסען־איינטיילונג, וואָס מיר האָבען אין דער געוועהנליכער שפראך, ניט קיין געניגענדע, מיר מוזען מאַכען אַ פיעל פינקטליכערע איינטייל־לונג, מיר מוזען צונויפבריינגען די מעחר עהנליכע לעבעדיגע ברואים אין איין קלאַס, און אָפטיילען פון זיי די וועניגער עהנליכע. אָט די דאָזיגע איינטיילונג פון די פאַרשיידענע לעבעדיגע ברואים אין קלאַסען לויט זייער עהנליכקייט און קרובה'שאַפט, ווערט אָנגע־רופען קלאַסיפיקאַציע אָדער קלאַסיפיקאַצירונג.

האַמאָלאָגיע און אַנאָלאָגיע. — ביי דער קלאַסיפיקאַצירונג פון לעבעדיגע ברואים, ווי אויך ביי פלאַנצען, דאַרף מען האָבען אין זינען וועניגער די אויסערליכע עהנליכקייט, ווי די אינערליכע גלייכ־קייט אָדער קרובה'שאַפט אין דעם געבוי, אָדער ריכטיגער געזאָגט: מען דאַרף האָבען אין זינען ניט די צופעליגע אויסערליכע עהנ־ליכקייט, נאָר די פונדאַמענטלע גלייכאַרטיגקייט אין דער סטרוקטור (געבוי) פון קערפער אָדער פון די גליעדער. פונדאַמענטאַלע גלייכ־אַרטיגקייט (אידענטיטעט) רופען מיר האַמאָלאָגיע, וועהרענדר צור פּעליגע עהנליכקייט רופען מיר אַנאָלאָגיע. מיר זאָגען, למשל, אַז אַ האַנט (אַרעם) פון אַ מענשען איז האַמאָלאָג מיט דער פאַך־דערשטער פוס פון אַ הונט, ווייל ווען מיר פאַרגלייכען זיי ביידען, באַמערקען מיר אַז צווישען זיי איז פאַראַן אַ פונדאַמענטאַלע גלייכ־אַרטיגקייט אין זייער געבוי. מיר געפינען אין יעדען ביין, אין יעדען מוסקול, אין יעדען אָדער און נערוו פון זיי ביידע אַ געוויסע אינערליכע קרובה'שאַפט און גלייכאַרטיגקייט. דאָס איז אָבער ניט דער פאַך, ווען מען פאַרגלייכט, למשל, אַ פליגעל פון אַ פויגעל מיט דעם פליגעל פון אַ שמעטערלינג. אויסערליך האָבען זיי טאַקע אַ גרויסע עהנליכקייט, אָבער ווען מען אונטערזוכט זייער געבוי, זעהט מען, אַז זיי האָבען ניט קיין אינערליכע גלייכקייט צווישען זיך. אַ פליגעל פון אַ שמעטערלינג איז בלויז אַ נאָל אָ: צו אַ פליגעל פון אַ פויגעל אָבער ניט האַמאָלאָג.

ווען מען וויל דעריבער מאַכען אַ ווירקליכע, נאַטירליכע קלאַסיפיקאַצירונג פון לעבעדיגע ברואים, מוז מען זיי איינטיילען לויט זייער האַמאָלאָגיע קרובה'שאַפט, אָבער ניט לויט זייער אַנאָלאָגישער. ווען מיר זאָלען וועלען קלאַסיפיקירען די לעבעדיגע ברואים לויט אַנאָלאָגיע, דאָס הייסט, לויט די אויסערליכע עהנ־

ליכקייטען פון זייערע אייגענשאפטען אָדער פונקציאָנען, דאָן וואָל-טען מיר געדאַרפט אריינשטעלען אַ פּראָש און אַ קאַנגורו אין איין קלאַס, ווייל אַ פּראָש שפּרינגט און אַ קאַנגורו שפּרינגט. אין דער ווירקליכקייט אָבער געהערען זיי צו צוויי פאַרשיידענע קלאַסען. אַנאַלאָגיש וואָלטען מיר געדאַרפט אריינשטעלען אַ פּויגל, אַ פּלע-דערמויז און אַ שמעטערלינג אין איין קלאַס, ווייל אַלע האָבען פּליגלען און פּליהען. אין דער ווירקליכקייט אָבער געהערען זיי צו דריי פאַרשיידענע קלאַסען.

די גרעסטע האָמאָלאָגיע געפינט מען ביי חיות, וועלכע קומען אַרויס פון איין אָפּשטאַמונג. די האָמאָלאָגיע איז דער בעסטער צייכען פון קרוב'שאַפט, פון בלוט-פאַרוואַנדשאַפט. די פונדאָ-מענטאַלע עהנליכקייט, וועלכע מען געפינט צווישען די פאַרשיידענע מענשליכע ראַסען, באַווייזט, אַז אַלע מענשען קומען אַרויס פון איין אָפּשטאַמונג. דורך אַ גוטע קלאַסיפיקאַציע קענען מיר אויסגעפינען די אָפּשטאַמונג פון יעדער לעבעדיגער באַשעפעניש. דורך פאַרגלייכען דעם געבוי, די אינערליכע סטרוקטור פון די פאַרשיידענע לעבעדיגע ברואים אין אונזער איצטיגער צייט, קענען מיר אויסגעפינען זייער אָפּשטאַמונג פון די באַשעפענישען, וועלכע האָבען אַמאָל געלעבט אין אַ פּיעל פּריהערהדיגער צייט און וועלכע עקזיסטירען שוין היינט ניט מעהר. מען קען אויסגעפינען ווי אזוי פון יענע פאַרשוואַנדענע באַשעפענישען האָבען זיך אין אַ פאַר-לויה פון צעהנדליגער טויזענדער יאָהרען ענטוויקעלט די איצטיגע באַשעפענישען.

**וויסענשאַפּטליכע נעמען.** — יעדער פאַרשיידענער סאָרט פון לעבעדיגע באַשעפענישען אָדער פּלאַנצען ווערט אָנגערופען אַ ספּעציע (אַרט). די רויטע וועווערקעס, למשל, זיינען איין ספּעציע פון וועווערקעס, וועהרענד די גרויע וועווערקעס זיינען אַ צווייטע. די שוואַרצע וועווערקעס אָבער זיינען שוין ניט קיין באַזונדערע ספּעציע, ווייל שוואַרצע וועווערקעס ווערען אָפט געבאַרען פון גרויע וועווערקעס, און גרויע וועווערקעס ווערען גע-באַרען פון שוואַרצע. מען געפינט אָבער ניט, אַז רויטע וועווער-קעס זאָלען געבאַרען ווערען פון גרויע, אָדער אַז גרויע זאָלען געבאַרען ווערען פון רויטע.

אַ גרופע פון נאָהענט פאַרוואַנדטע ספּעציעס ווערט אָנגע-רופען אַ גענוס (גאַטונג, מין). אַלע סאָרטען וועווערקעס, למשל,

געהערען צו איין גענוס. מען דארף אָבער דערביי קיין טעות ניט מאַכען און ניט אַריינרעכענען אין דעם גענוס פון וועווערקעס אויך אַזעלכע חיות, וועלכע זיינען בלויז עהנליך צו וועווערקעס. דער פריירע הונט, די פליהענדע וועווערקע זיינען עהנליך צו וועווערקעס, אָבער זיי געהערען צו אַנדערע גענוסען.

! דער באַריהמטער נאַטור־פּאַרשער לינעע האָט, אין יאָהר 1758, פאַר דער באַצייכענונג פון די פאַרשיידענע לעבעדיגע באַ־שעפענישען איינגעפיהרט אַ דאָפעלטען נאָמען, אַ מין פאַרנאָמען און פאַמיליע נאָמען. דער פאַרנאָמען איז פאַר דעם גענוס פון דער באַשעפעניש און דער פאַמיליע נאָמען איז פאַר דער ספעציע. די נעמען זיינען פון דער לאַטיינישער און פון דער גריכישער שפּראַך. אַזוי, למשל, רופט מען די רויטע וועווערקע מיט איהר וויסענשאַפטליכען נאָמען „סציאָרום הודסאָניקוס“; די גרויע וועווערקע — „סציאָרום קאַראַלינענסים“ און די פּוסק־וועווערקע — „סציאָרום לודאָוויציאַנוס“. אויף דעם אופן ווערען באַצײ־כענט אַלע אַנדערע חיות מיט צוויי נעמען, וואָס דער ערשטער ניט אָן צו וועלכען גענוס (נאַטונג) זי באַלאַנגט, און דער צווייטער נאָמען — צו וועלכער ספעציע (אַרט) זי געהערט.

אייניגע מינים חיות ווערען באַצייכענט מיט דריי נעמען. דער דריטער נאָמען ווערט צוגעשטעלט צו אַזעלכע מינים חיות, וועלכע האָבען אין פאַרשיידענע געגענדען עטוואָס אַן אַנדער אויס־זעהן. צום ביישפּיעל, די גרויע וועווערקעס, וועלכע געפינען זיך הויפטזעכליך אין די דרום־געגענדען פון אַמעריקא, זיינען אויך פאַראַן אין די צפון־געגענדען. זיי זעהען אָבער אַביסעל אַנדערש אויס אין די צפון־געגענדען. זיי זיינען אַביסעל גרעסער און האָבען ווייסע אויערלעך און זיי ווערען אָנגערופען מיט אַ דרייפאַכען נאָמען „סציאָרום קאַראַלינענסים לייקאַטיס“.

אַ גרופע פון נאָהענט פאַרוואַנדטע גאַטונגען ווערט אָנגערופען אַ פאַמיליע. אַלע חיות, וועלכע זיינען, למשל, עהנליך צו ווע־ווערקעס, געהערען צו איין פאַמיליע. די רויטע וועווערקעס, די גרויע, די פּוסק־וועווערקעס, די פליהענדע וועווערקעס, די פריירע הינט און אַלע אַנדערע חיות, וועלכע זיינען עהנליך צו וועווערקעס, געהערען צו איין פאַמיליע. אַ גרופע פון נאָהענט פאַרוואַנדטע פאַמיליעס ווערט אָנגערופען אַרדננג. די קלאַסיפיקאַציע און געהט, אַלואָ, אין דער פאַלגענדער אַרדננג: צוערשט קומט די ספעציע

(ארט), וועלכע נעמט ארום דעם סאָרט חיות, וועלכע האָבען די נאָר הענטסטע קרובה'שאַפט און גלייכקייט צווישען זיך, אַזעלכע, נאָס ווערען געבאָרען פון גלייכע עלטערן; דערנאָך קומט דער גענוס (גאַטונג), וועלכע נעהמט ארום אַ גרופע פון ספעציעס, נאכהער קומט די פאַמיליע, וועלכע נעמט ארום אַ גרופע פון גאַטונגען, דאָן קומט די אָרדנונג, וועלכע נעמט ארום אַ גרופע פון פאַמיליעס, נאָכדעם קומט דער קלאַס, וועלכער נעמט אַרײַן אין זיך אַ גרופע אָרדנונגען, און צום סוף קומט די אפטיילונג, וועלכע נעמט אַרײַן אין זיך אַ גרופע קלאַסען. דער סדר פון דער קלאַסיפיקאַציע איז, אַלזאָ, דער פּאָלגענדער: ספעציע, גענוס, פאַמיליע, אָרדנונג, קלאַס, אַפטיילונג.

דאָס טיער־רייך, דאָס הייסט, אַלע לעבעדיגע באַשעפענישען אויף דער וועלט, ווערען אין אַלגעמיין איינגעטיילט אין זיבען אַפטיילונגען, ווי פאלגט: די פּראָטאָזאָען, די פּלאַנצען־חיות (צעלענטראַטען) — די באַשעפענישען, וועלכע זיינען עהנליך צו פּלאַנצען און האָבען אַ חלל, וואָס פאַרנעהמט זייער גאַנצען קערפער און דיענט פאַר זיי אַלס פאַרדייאָונגס־סיס־טעם און אַלס בלוט־צירקולאַציע־סיסטעם, די מאָלוסקען, די וועריס, די אָרטהאָפּאָדען — די באַשעפענישען, וועלכע זייערע קערפער און זייערע פיס באַשטעהען פון רינגעלעך און האָבען אויף זייער אויבערשטען טייל פון קערפער אַ צודעק פון אַ וועניגער אָדער מעהר האַרטערען שטאָף, ווי פאַרשיידענע אינזעקטען, ווי זשוקעס (באַבעלעס), ראַקעס (קרעכסען) א. א. ז. עכיאָדער־מאַטען (די שטאַכעל־חיות חיות) — די באַשעפענישען, וואָס זייער קערפער איז באַדעקט מיט קורצע דיקע שטעכיגע האָר, די באַראַ־חיות — די באַשעפענישען, וועלכע האָבען אַ רוקען־סטרוך נע (דאָס זיינען די באַשעפענישען, וועלכע האָבען נאָך ניט קיין רוקען־ביין, נאָר האָבען אַן אַנלאַגע אויף אַ רוקען־ביין, וואָס דאַרף זיך ענטוויקלען. זיי האָבען אין קערפער אַזאַ לענגליכע שטיקעל מין כאָמסקע אָדער קנאָרפעל. אין דיעזער גרופע ווערען שוין אויך אַרײַנגערעכענט די ווירבעל־חיות, די העכער ענטוויקעלטע באַשעפענישען, וועלכע האָבען אַ רוקען־ביין).

דיזע זיבען אפטיילונגען, וועלכע זיינען כולל אין זיך אַלע לעבעדיגע באַשעפענישען פון דער ערד, פון די פרימיטיווסטע, די איינפאַכסטע ביז די העכסט ענטוויקעלטע, ווערען צוטיילט אין

פארשיידענע קלאסען, ווי זויג-חיות, פויגעל, רעפטילען, פיש, אמפיביען (באשעפענישען וועלכע קענען לעבען אי אין וואסער אי אויף דער יבשה, ווי פרעש, קראקאָדילען א. א. וו.). יעדער קלאס ווידער ווערט איינגעטיילט אין רייען אָדער אָרדנונגען. צום ביישפּיעל, די גריזשענדע אָדער נאָגענדע חיות, ווי מייז, וועווערקעס, קראָליקעס א. א. וו., שטעלען מיט זיך צונויף אן אָרדנונג אדער רייה פון די זויגענדע חיות. די חיות, וועלכע האָבען קאָפיטעס (קלויען) שטעלען מיט זיך צונויף א צווייטע אָרדנונג אָדער רייה פון די זויג-חיות. יעדע פון די עזע אָרד-נונגען ווידער ענטהאלטען א גאנצע רייה פאמיליעס, און יעדע פאמיליע ענטהאלט א רייה גאטונגען (גענוסען) און יעדער גענוס ענטהאלט א רייה ספעציעס (ארטען).

ווען מען וויל, למשל, אָננעבען דעם גאנצען זאָלאָגישען יחוס פון א היזדקאץ, וועט מען אזוי זאָגען: זי געהערט צו דער אָפּטיילונג פון די כאַרדאָמען אָדער ווערטעבראָמען (חיות מיט א רוקען-ביין), פון דעם קלאס זויג-חיות, פון דער אָרדנונג רויב-חיות (פלייש-עסענדע), פון דער פאמיליע פעלידען (קעץ-עהנליכע חיות), פון דער גאטונג פעלים (קעץ), פון דער ספעציע פעלים דאָמעסטיקוס (הויז-קעץ). און אויב די קאץ, וועגען וועל-כער עס האַנדעלט זיך, האָט נאָך וועלכען עס איז לאָקאלען אונ-טערשייד, אויב, למשל, עס איז אן אנגאָראַ קאץ, וועט מען נאָך דארפן צולעגען דעם נאָמען פון דער אָרטיגער וואַריעטעט (אונ-טערשייד), מען וועט צו די צוויי נעמען „פעלים דאָמעסטיקוס“ דארפן צולעגען א דריטען נאָמען „אנגאָרענעסיס“. און אָט אזוי דאָרף מען זיך נוהג זיין מיט יעדער באשעפעניש, ווען מען וויל אָננעבען איהר פולען זאָלאָגישען נאָמען.



## פינפטער קאפיטעל.

איינצעליגע און פיעלצעליגע באשעפענישען. — די אטיבען און זייער לעבען. — די אינפוזאריען. — פארשיידענע ארשען פון אינפוזאריען און זייער לעבען. — די פאראזיטען-פראטאזאען. — דער הויפטראנטערשייד צווישען נידעריגע באשעפענישען און העכערע.

## די פראטאזאען.

איינצעליגע און פיעלצעליגע באשעפענישען. — די גרויסע צאָהל לעבעדיגע ברואים אויף דער וועלט ווערען איינגע-טיילט אין צוויי גרויסע אפטיילונגען: אין אַזעלכע, וואָס באַשטעהען פון בלויו פון איין צעלע און אין אַזעלכע, וואָס באַשטעהען פון מעהרערע צעלען. די איינצעליגע באשעפענישען ווערען אָנגערופען פראַטאָזען, און די פיעלצעליגע באשעפענישען ווערען אָנגערופען מעטאָזאָען.

די פראַטאָזאָען אָדער די איינצעליגע באשעפענישען גע-פינען זיך כמעט אין אלע טיילען פון דעם ערד-קוגעל אין פאר-שיידענע מינים און אין זעהר גרויסע צאָהלען. זיי לעבען מיט-סטענס אין וואַסער אָדער אין זומפען. דער גרעסטער טייל פון זיי זיינען אזוי קליין, דאָס מען קען זיי זעהן בלויז מיט אַ מיקראַסקאָפּ (פאַרגרעסערונגס-גלאָז). דער גרויסער ברייטער עולם איז וועניג באַקאַנט מיט דעם לעבען פון די דאָזיגע קליינצינקע נידעריגע ברואים/לעך און מיט זייער שווערען קאַמפּפּ פאַר זייער עקזיסטענץ. אָבער אויך דאָס לעבען און דער קאַמפּפּ פון די דאָזיגע אַרימע מי-זעראַבלע קליינצינקע באשעפענישען איז אינטערעסאַנט און העכסט באַלעהרענד צו שטודירען. אַנדערע פון זיי פיהרען צוויי-שען זיך מלחמות פאַר זייער עקזיסטענץ, פאַרשלינגען איינע די אַנדערע אום אויפצוהאַלטען זייער לעבען; אַנדערע זיינען גע-צוואונגען צו ציהען זייער חיונה פון דעם, וואָס זיי סאַכען זיך אַ נעסט אין דעם קערפער אָדער אויף דער הויט פון אַנדערע לע-בעדיגע באשעפענישען און לעבען אויף זייער חשבון. מאַנכע פון זיי האָבען אויסגעקליבען פאַר דעם קוואַל פון זייער חיונה דעם קערפער פון דעם קרוין פון דער בריאה — דעם מענשען. זיי באַ-

זעצען זיך אין פארשיידענע טיילען פון זיין קערפער, מאכען זיך דאָרטען אַ נעסט, פרוכפערען זיך און מעהרען זיך און פארשאַפֿען איהם אָפֿט פארשיידענע קראַנקהייטען און זאָנאַר אַ פֿריהצייטיגען טויט. ווען די דאָזיגע קליינע ברואים'לעך וואָלטען געקענט טראַכטען, וואָלטען זיי געווים באַשלאָסען, אַז דער מענש איז באַשאַפֿען געוואָרען צוליבע זיי, כדי זיי זאָלען האָבען פֿון וועמען צו ציהען זייער חיונה און קענען עקזיסטירען אויף דער וועלט..

זייענדיג געצוואונגען צו לעבען אונטער פארשיידענע אומ-שטענדען און באַדינגונגען, האָבען זיך פֿאַרמירט פארשיידענע טיפֿען און מינים פון פֿראַטאָזאָען, וועלכע אונטערשיידען זיך זעהר שטאַרק אין זייער אויסזעהן. נאָר ווען מען אונטערזוכט די פֿאַרשיידענאַרטיגע מינים זייערע און מען פֿאַרגלייכט זיי איינע מיט די אנדערע, קען מען זיי איינטיילען אין דריי הויפט קלאַסען, און שטודירענדיג זיי קען מען באַקומען אַן אלגעמיינעם באַגריף וועגען אלע מינים פֿראַטאָזאָען.

די דריי קלאַסען, אין וועלכע די פֿראַטאָזאָען ווערען איינגע-טיילט, זיינען די פֿאַלגענדע:

1) רהיזאָפֿאָדען, וואָס דאָס מיינט „וואָרצעל־פֿיסיגע“. צו די רהיזאָפֿאָדען באַלאַנגען די אלע איינצעליגע באַשעפעניסען, וועלכע קענען אַרויסלאָזען פֿון יעדער זייט פֿון זייער קערפער פארשיידענע אַרויסשטאַרצונגען אָדער וואָרצלען, מיט וועלכע זיי באַוועגען זיך און פֿאַנגען זייער שפייז. צוליבע דער דאָזיגער אייגענשאַפט זייערער האָבען זיי עס באַקומען זייער נאָמען „וואָרצעל־פֿיסיגע“. נאָר אַזוי ווי די אַרויסשטאַרצונגען אָדער וואָרצעלען, וואָס זיי לאָזען אַרויס פֿון זיך און ציהען אין זיך, זיינען באַמת ניט קיין פֿיס, האָט מען זיי אויך אַ נאָמען געגעבען פֿסידאָפֿאָדען. דאָס הייסט „פֿאַלש־פֿיסיגע“.

צו דעם דאָזיגען קלאַס געהערען די אַמיבען, די איינפֿאַכסטע איינצעליגע באַשעפעניסען; די פֿאַרמאָניפֿערען אָדער גלאָביגע־רינען, וועלכע זיינען באַדעקט מיט קליינע מיקראַסקאָפֿישע מושלען און די ראַדיאָלאָרען, וועלכע זיינען אויך באַדעקט מיט קליינע מיקראַסקאָפֿישע מושלען (די לעצטע צוויי זיינען ים־פֿראַטאָזאָען און האָבען געשפּיעלט אַ זעהר וויכטיגע ראָלע מיט זייערע מושלען אין באַשאַפֿונג פֿון קרייד־בערג און פעלזען, ווי עס וועט שפּעטער אויספֿיהרליכער באַשריבען ווערען).


2) אינפּוזאָרען. די דאָזיגע פּראָטאָזאָען זיינען מייסטענס פּאַראַייניגט מיט פּלאַנצען, און דערפון קומט זייער נאָמען אינפּוזאָרען, וואָס מיינט צונויפגעשמאַלצענע אָדער פּאַראַייניגטע. די אינפּוזאָרען זיינען באַצויגען מיט אַ פעסטע הייטעל, און זייער קערפּער קען זיך ניט ענדערען אין פּאַרשיידענע פּאַרמען דורך פּאַרשיידענע פּרייע אַרויסשטאַרצונגען אָדער „פּאַלש־פּיסלעריי“. דער קערפּער פון די אינפּוזאָרען האָט אַ באַשטימטע פּאַרם און די מייסטע פון זיי זיינען באַדעקט מיט קליינע, באַוועגליכע פּראָ-טאַפּלאַזמע הערעלעך, וועלכע דינען זיי אַלס שוויים־אַרגאַנען און שפּייז־פּאַנגער.

3) ספּאַראָזאָען. די פּראָטאָזאָען, וועלכע באַלאַנגען צו דעם קלאַס זיינען אַלע פּאַראַזיטען, זיי לעבען אין אָדער אויף די קערפּער פון אַנדערע באַשעפעניסען, און אַ גרויסער טייל פון זיי ברענגען פּאַרשיידענע קראַנקהייטען. זייער נאָמען „ספּאַראָזאָען“ האָבען זיי באַקומען צוליב דעם וואָס זיי פּאַרמעהרען זיך דורך שפּאַלמען זיך אין פּיעלע טיילכעלעך, וועלכע ווערען גערופּען „ספּאַרען“.

די אַמביען. — די איינפאַכסטע איינצעליגע באַשעפעניש איז די אַמביע. זי געפינט זיך כמעט אין יעדען זומפ, אין דעם בלאָטיגען גרונד פון יעדער לוושע אָדער סאַזשעלעקע. מיט אַן אומבאַוואַפענטען אויג קען מען זי כמעט ניט זעהן, אָבער ווען מען נעהמט זי אונטער אַ מיקראַסקאָפּ קען מען איהר קערפּער גאַנץ גוט זעהן און באַטראַכטען איהרע באַוועגונגען און איהר אַרט לעבען. איהר קערפּער באַשטעהט פון אַ שטודען (פּוטשא) עהנ־ליכע מאַסע, פון פּראָטאָפּלאַזמע, וואָס האַלט כסדר אין ענדערען איהר פּאַרמע. דאָ נעהמט זי אַן אַ רונדליכע פּאַרם, דאָ אַ לענג־ליכע, דאָ שטאַרצט אַרויס אַ שפּייץ פון איין זייט, דאָ פון דער אַנדערער זייט, דאָ וואַקסט אויס אַ רונדער גוז אָדער קנאַפּ אין איין אַרט און ציהט זיך באַלד אַריין צוריק און וואַקסט אַרויס אין אַנאַנדער אַרט, ווערט גרעסער און אַרויסשטאַרצענדער און ציהט זיך ווידער אַריין אינוועניג. און אזוי ענדערענדיג כסדר איהר פּאַרם האַלט זיך די אַמביע אין אַ באַשטענדיגער באַוועגונג פון איין פּלאַץ אויף אַ צווייטען.

ווען די אַמביע טרעפט זיך מיט אַ קלענערען אָרגאַניזם, וועל־כען זי קען געברויכען אַלס שפּייז פאַר זיך, פּאַנגען אַן פון איהר

קערפער ארויסשטארצען שפיצען, וועלכע לאָזען זיך פאנאנדער ביסלעכווייז ארום דער רויב וואָס זי האָט באַגעגענט, פאַרכאַפּען זי און דריקען זי אַרײַן אינוועניג אין דער צעלע. די אַמײַבע האָט אויף דעם אופן באַקומען איהר שפייז, זי האָט פאַרשלונגען אַן אַנדער באַשעפּעניש, וועלכע איז קלענער פון איהר. זי האָט איהר אָבער ניט פאַרשלונגען מיט'ן מויל. די אַמײַבע האָט ניט קיין מויל, נאָר יעדער טײל פון איהר קערפער קען איהר דיענען פאַר אַ מויל. יעדער טײל פון איהר קערפער קען אויפּנעהמען שפייז און זויער־שטאָף, וואָס איז נויטיג פאַר איהר עקזיסטענץ. און אזוי ווי די אַמײַבע קען מיט יעדען טײל פון איהר קערפער אויפּ־נעהמען שפייז און זויער־שטאָף, אזוי קען זי אויך מיט יעדען טײל פון איהר קערפער אַרויסשטויסען פון זיך דעם אָפּפאַל פון די פאַרדײַטע שפייז. דער קערפער פון דער אַמײַבע איז פון דער



צײַכנונג 2. — א, אַ שטאַרק פאַרגרעסערטע אַמײַבאַ. ק צײַגט דעם קערען פון דער אַמײַבאַ; ש, שפײַז־שטאָף, וואָס די אַמײַבאַ האָט אַרײַנגענומען; פ, דאַס פּוּלסירענדע לעכעלע אין דער אַמײַבאַ. די פּוּל־צײַכען צײַגען די רײַכטונג ווי די אַמײַבאַ באַוועגט זיך. ב צײַגט ווי די אַמײַבאַ האָט געענדערט איהר פּאַרם אין אַ פאַרלױף פון אַ האַלבער מינוט. ג און ד, אַמײַבאַ־הענליכע באַשעפּענישען, וועלכע זײַנען טײלױוויז באַ־דעקט מיט אַ מושעל (שטאַרק פאַרגרעסערט). ה, אַן אַמײַבאַ אין דעם פּראָצעס פון איהר שפּאַלטונג.

איינפאכסטער פאָרם, זי האָט ניט קיין באַזונדערע אָרגאַנען פאַר אויפנעהמען שפייז, פאַר פאַרדייען און אַרויסשטויסען דעם אָפּ פאַל פון דער פאַרדייטער שפייז. אַלעס ווערט געטאָן פון דער איינציגער צעלע, פון וועלכע זי באַשטעהט.

ווען די אַמיבע וואַקסט אויס ביי צו אַ געוויסער גרויס, צו שפאַלט זי זיך אויף צוויי גלייכע טיילען און פון איין גרויסע אַמיבע ווערען צוויי קליינע, וועלכע וואַקסען באַזונדער און זוכען זייער חיונה באַזונדער, און ווען זיי ווערען גרויס, שפאַלט זיך יעדע פון זיי ווידער אין צוויי און עס קומט אויף דער וועלט אַ נייער דור פון אַמיבעס. און אַט אזוי וואַקסען די אַמיבעס און שפאַלטען זיך אויף העלפט דורות נאָך דורות און פרוכפערען און מעהרען זיך. ניטאָ ביי די אַמיבעס קיין מאַן און קיין ווייב, קיין זכרים און נקבות. אַן אַמיבע איז ניט קיין זכר און ניט קיין נקבה. אַמיבעס געבערען ניט קיין קינדער אויפצוהאַלטען זייער מין. זיי שפאַל־טען זיך אויף העלפט און דאָס הייסט ביי זיי האָבען קינדער.

ווען די לוזשע אָדער סאַזשעלעקע, וואו די אַמיבע לעבט, טריי קענט אויס, דאָן פאַרוואַנדעלט זיך דער קערפער פון דער דאָזיגער קליינער נישטיגער באַשעפעניש אין אַ רונדע קייקעלע און ווערט באַצויגען מיט אַ האַרטען הייטעל, ווי פון האָרן, און אזוי לעבט עס אַריבער די טריקעניש ביז עס קומען ווידער בעסערע צייטען, ווען די אויסגעטריקענטע לוזשעס און סאַזשעלעקעס ווערען פול מיט וואַסער און די אַמיבע קעהרט זיך אום צוריק צו איהר נאָרמאַלען אויסזעהן און איהר נאָרמאַלען לעבען. אין דער צייט פון דער טריקעניש טרעפט עס, אַז די ווינטען פאַרטראָגען פון די אויס־געטריקענטע לוזשעס און סאַזשעלעקעס מאַסען אַמיבעס פאַר הונג־דערטע טיילען ווייט און פאַרזען זיי דאָרטען.

עס זיינען פאַראַן אַ גאַנצע רייה פראַטאָזאַען (איינ־צעליגע באַשעפענישען), וועלכע זיינען עהנליך צו אַט דער אַמיבע, עס זיינען פון זיי אפשר פאַראַן אַרום טויזענד ספּעציעס. זיי באַווע־נען זיך אויף דעמזעלביגען אופן, ווי די באַשריבענע אַמיבע, שפייז זען זיך אזוי ווי זי און מעהרען זיך און פרוכפערען זיך דורך שפאַל־טונג אזוי ווי זי. פיעלע פון זיי האָבען אָבער אַן אנדער אויסזעהן און האָבען באַזונדערע כאַראַקטעריסטישע אייגענטימליכקייטען. נאָר אַפילו די איינפאַכסטע פראַטאָזאַע, די אַמיבע, ערפילט אַלע פונקציאָנען פון לעבען. זי באַוועגט זיך, ניט האָבענדיג קיין ספּע־

ציעלע באַוועגונגס־אַרגאַנען; זי עסט און פאַרדייט, ניט האָבן בענדיג קיין ספּעציעלע מויל און פאַרדייאונגס־סיסטעם; זי אַטעמט איין זויער־שטאָף און אַטעמט אויס קוהלען־זויערע, ניט האָבענדיג, קיין לונגען אָדער אַנדערע ספּעציעלע אַטעמונגס־אָרגאַן נען. איהר קערפּער איז ניט איינגעטיילט אין באַזונדערע אָרגאַנען, נאָר יעדער טייל פון איהר קערפּער קען ערפילען די פאַרשיידענע לעבענס־פונקציאָנען, יעדער טייל קען אויפנעמען שפייז, פאַר־דייען, אַטעמען א. א. ו. זי קען אויך פיהלען. ווען די אַמיבע קומט אין באַריהונג מיט אַ זאַמד־קערענדעל אָדער מיט עטוואָס אַנדערעס, וואָס קען איהר ניט נוצען אַלס שפייז, רוקט זי זיך לאַנגזאַם אָפּ. דאָס באַווייזט, אַז זי פיהלט. מען קען אָפּשטעלען אָדער ענדערען איהרע באַוועגונגען דורך ענדערען די טעמפּעראַטור אָדער דורך כעמישע שטאָפען. דאָס באַווייזט, אַז זי פיהלט און עמפּינדעט.

די אינפּוזאַריען. — עס איז באַמערקט געוואָרען שוין מיט איבער צוויי הונדערט יאָהר צוריק, דאָס אין אַ שטיל־שטעהענדען וואַסער פאַרמעהרען זיך געוויסע מינים פּראָטאָזאָען מיט אַ באַזונדערער שנעלקייט און אין זעהר גרויסע מאַסען. דיעזע מינים פּראָטאָזאָען ווערען אָנגערופען אינפּוזאַריען, און זיינען, מייסטענס, ווי די אַלע אַנדערע איינ־צעליגע באַשעפענישען, זעהר קליין, דאָס מען קען זיי בלויז זעהן דורך אַ מיקראָסקאָפּ.


דאָס כאַראַקטעריסטישע פון די אינפּוזאַריען איז, וואָס זיי זיינען באַדעקט מיט אַ דין אָבער פעסט הייטעל, וואָס ניט זייער קערפּער אַ באַשטימטע פּאָרם. דערמיט שידען זיך די אינפּוזאַריען אונטער פון די פריהער באַשריבענע אַמיבען, ביי וועלכע די פּאָרם פון זייער קערפּער האַלט זיך כסדר אין ענדערען. עס איז דעריבער אויך פאַרשטענדליך, אַז די באַוועגונג פון די אינפּוזאַריען מוז זיין אַן אַנדערע ווי ביי די אַמיבען. די באַוועגונג פון די אַמיבען קומט דורך די ענדערונגען פון זייער קערפּער, ווי עס איז פריהער ערקלערט געוואָרען, ביי די אינפּוזאַריען אָבער האָט דער קערפּער אַ באַשטימטע פּאָרם און זיי מוזען דעריבער האָבען אַנדערע מיטעל זיך צו באַוועגען. די אינפּוזאַריען האָבען ספּעציעלע אָרגאַנען פאַר באַוועגונג. די דאָזיגע באַוועגונגס־אָרגאַנען געפינען זיך ביי די פאַרשיידענע מינים אינפּוזאַריען אין צוויי פּאָרמען אָדער טיפען. די ערשטע פּאָרמע געפינט זיך ביי די בייטש־

אינפוזאריען, אָדער ווי זיי רופען זיך מיט זייער וויסענשאפטליכען נאָמען, די אייגלענען. דאָס איז אַ מין אינפוזאָריע, וועלכע האָט אַ שפינדלע-הענליכען קערפער, וועלכער איז באַצויגען מיט אַ דין הייטעל, וואָס איז אין איין פלאַץ דורכגעלעכערט און איז אריינגעדריקט פון אינוועניג און האָט די פאָרם פון אַ לייקע. דאָס איז דער שלונד אָדער דאָס מויל פון דער אייגלענע, וואָס פיהרט צו דער פראַטאָפלאַזמע, מיט וועלכער דאָס הייטעל פון דער אייגלענע איז אָנגעפילט. פון דעם דעק פון דער דאָזיגער לייקע-הענליכער פאָר-טיעפונג שטאַרצט אַרויס אַ דין לאַנג פעדימעל פון פראַטאָפלאַזמע עהנליך צו אַ בייטש, וואָס ווערט אָנגערופען פלאַגעלום (בייטש). דאָס פלאַגעלום האַלט זיך כסדר אין באַוועגען, עס וואַרפט זיך מיט גרויס שטעלטייט היין און צוריק. דאָס איז דער באַוועגונגס-אָרגאַן פון די אייגלענען און מיט איהם פאָנגען זיי אויך זייער שפייז. ווען דאָס פלאַגעלום באַוועגט זיך אין וואַסער, טרייבט עס אַריין די קליינע אָרגאַניזמען, וועלכע עס באַגענענט אין וועג, אין דעם שלונד פון דער אייגלענע. און פון דעם שלונד געהען זיי גראַד אַריין אין די ווייכע פראַטאָפלאַזמע, וואו זיי ווערען פאָר-דייט. ביי אַנדערע אייגלענען איז די פראַטאָפלאַזמע אַרום דעם פלאַגעלום אין דער פאָרמע פון אַ בעכערעל.

אַ צווייטער טיפ פון באַוועגונגס-אָרגאַנען געפינט מען ביי דער האָר-אינפוזאָריע אָדער, ווי זי ווערט גערופען מיט איהר וויסענשאפטליכען נאָמען פאָראַמעציום. ביי דיעזער אינפוזאָריע האָט דאָס הייטעל, וואָס באַדעקט איהר לאַנג רונדליכען קערפער, זעהר פיעל לעכעלעך, דורך וועלכע עס שטאַרצען אַרויס אַ סך קורצע דינעקע פראַטאָפלאַזמע פעדימעלעך, וועלכע האַלטען זיך כסדר אין באַוועגען. די דאָזיגע פעדעמעלעך ערפילען דיזעלביגע אויפ-גאַבע, וואָס דאָס פלאַגעלום ביי די אייגלענען אינפוזאָריען. מיט זייער הילף באַוועגט זיך די האָר-אינפוזאָריע און מיט זייער הילף פאָנגט זי איהר שפייז.

אין איין זייט פון איהר קערפער האָט די האָר-אינפוזאָריע אַ גראַבענדעל, וואָס ווערט אלץ טיעפער, וואָס נעהנטער עס קומט צום מויל אָדער צום שלונד, דורך וועלכע די האָר-אינפוזאָריע בריינגט אַריין איהר שפייז אין איהר קערפער. דאָס גראַבענדעל אין דער שלונד איז אויסגעפוטערט מיט הערעלעך, וועלכע באַוועגען זיך און העלפען אריינברענגען די געפאָנגענע שפייז אינוועניג אין


דער פראטאפלאזמע, וואו עס ווערט פארדייט. אין איהר קערפער געפינען זיך אויך צוויי פולסירענדע לעכעלעך, וועלכע האלטען זיך כסדר אין צונויפציהען און פאנאנדערציהען. דאָס זיינען די ניערען פון דער דאָזיגער באַשעפעניש. אויסער דעם האָט זי אויף איהר היימעל, צווישען די דינע הערעלעך, אַ געוויסע צאָהל קליינציקע ביימעלעך, וואָס יעדע פון זיי ענטהאַלט אַ צונויפגעדערעהטען הערעלע ווי אַ פרוזשינע, וואָס קען אַ שנעל געבען און אָפּטרייבען אַ ניט געווינשמען גאַסט, וואָס קומט איהר נאָהענט צום קערפער. די האַר-אינפּוזאָריע האָט, אַלזאָ, ספּעציעלע אָרגאַנען זיך צו שיצען געגען פיינד. און די גאַנצע באַשעפעניש באַשמעהט בלוז פון איין צעלע און איז אזוי קליין, דאָס מיט'ן נאַקעטען אויג, אָהן אַ פאַרגרעסערונגס-גלאָז, קען מען זי ניט זעהן.



צויכנונג 4 — אַ ביימשי-אינז פּוואַריע (זעהר שטאַרק פאַרגרעט סערט). ב, דאָס ביימשי-הנליכע פראָטאָפלאָזמע-פּעדימעל; ג, דער קראָגען אָדער בעכערעל אַרום דעם ביימשי; ד, דער קערען פון דער צעלע; ע, די פולסירענדע לעכעלעך.

צויכנונג 3 — אַ אַ פאַר-ראַמעציום (אַ האַריגע אינפּר-זאָריע), זעהר שטאַרק פאַרגרעט סערט. ה, די פראָטאָפלאָזמע הערעלעך; א, די אינוועניגסטע לאַנגע פראָטאָפלאָזמע הערעלעך פון מויל; ב, דער שלונד (וּשט); ג, שפּיז-מיולכעלעך; ד, די פולסירענדע לעכעלעך; ע, דער קערן פון דער צעלע.





צייכנונג 5. — אינפוזאריען, וועלכע זיינען באוואקסען מיט פראטאפלאזמע הערעלעך. א, א פאראמעציאום, וואס פ צייגט די פול-סירענדע לעכעלעך און ק דעם קערען. ב, א פאראמעציאום, וואס האלט זיך אין שפאלטען. פ צייגט די פולסירענדע לעכעלעך, ק, דעם קערען, ק', די קליינע קערענדלעך פון דעם שפאלטענדען פאראמעציאום. ג, צוויי פאראמעציאומס, וועלכע האבען זיך טיילווייז צונגיפגעשטאלצען.

אינטערעסאנטע באשעפענישען זיינען די גלאקען-אינפוזא-ריען, די וואַרטיצעלעך, ווי מען רופט זיי וויסענשאפטליך. די וואַרטיצעלעך געפינען זיך אויף פארשידענע וואסער-פלאנצען אָדער אויף אנדערע געגענשטענדע, וועלכע ליגען אונטער'ן וואסער. דער קערפער פון דער וואַרטיצעלע האָט די עהנליכקייט פון אן איבער-געקעהרטען גלעקעל, וועלכער איז מיט זיין שמאָלערען ענד באַ-העפט צו אַ דינעם שטענגעל. אויף דעם מויל אָדער עפנונג פון גלעקעל געפינט זיך אַ דינער דעקעל, וועלכער איז פול מיט די-ניקע באַוועגענדע הערעלעך. אויך דער ראַנד פון גלעקעל, מיט וועלכען דער דעקעל קומט זיך צונויף, איז באַדעקט מיט דיניקע הערעלעך, וועלכע האַלטען זיך אין איין באַוועגען. צווישען דעם דעקעל און דעם ראַנד פון גלעקעל געפינט זיך אַ קליין גראַבענדעל, וואָס איז אין איין פונקט אַביסעל טיעפער. דאָס איז דאָס מויל אָדער דער שלונד פון דער וואַרטיצעלע.


ווען די וואַרטיצעלע ווערט פון קיינעם ניט געשטערט, איז דאָס שטענגעל, אויף וועלכען דאָס גלעקעל האַלט זיך, אויסגע-צויגען און גראַד, דאָס מויל אָפען און די הערעלעך פון דעם דעקעל און פון דעם ראַנד פון גלעקעל באַוועגען זיך. ווען אָבער זי ווערט מיט עטוואָס געשטערט, ציהט זיך דאָס דעקעל אַרײן אין דעם

גלעקעל, דער ראנד פון גלעקעל ציהט זיך צונויף און דער קערפער פון דער אינפוזאריע באקומט דאן די פאָרם עהנליך צו אַ קייקעלע, די הערעלעך פאַרשווינדען און דער שטענגעל דרעהט זיך צונויף ווי אַ ספּיראַלע און ציהט אַרונטער די אינפוזאריע געהנטער צו דעם גרונד, צו וועלכען זי איז באַהעפט, ווי זי צו שיצען פון דער דראָהענדער געפּאָהר.

די וואָרטיצעלע באַקומט איהר שפּייז דורך די באַוועגונג פון די הערעלעך אויף דעם דעקעל און אויף די ראַנדען פון גלעקעל. דורך זייער באַוועגונג ברײַנגען זיי אַרײַן פון וואַסער פאַרשיידענע קליינע אָרגאַניזמען אין דעם שלונד פון דער וואָרטיצעלע, פון וואַגען זיי קומען אַרײַן אינוועניג אין דער פּראָטאָפּלאַזמע פון דער דאָזיגער באַשעפעניש, וואו זיי ווערען פאַרדייט.

די פאַרמעהרונג פון די אייניגע באַשריבענע אינפוזאָד ריען קומט פּאָר, ווי ביי דער אַמיבע, דורך טיילונג אָדער שפּאַלטונג.


ווי עס איז שוין פריהער באַמערקט געוואָרען, זיינען פאַר ראַן פאַרשיידענע אַרטען אינפוזאָריען. זייער צאָהל איז איבער טויזענד. דאָ זיינען כלוויז באַשריבען געוואָרען די מעהר באַראַקטעריסטישע פון זיי, פון וועלכע מען קען קריגען אַ באַגריף וועגען אלע אַנדער רע.



צײַכנונג 6. — א, אַ וואָרטי־צעלען גרופּע; ב, אַן אָפּגעטיילטע וואָרטיצעלע.

מאָכע פון די אינפוזאָריען האָבען זיך געמוזט צופאַסען צו דעם לעבען פון פאַראַזיטען, פון אַזעלכע וואָס לעבען אין אַ פרעמד דען קערפער און ציהען זייער חיונה פון איהם. די דאָזיגע פאַר ראַזיטען־אינפוזאָריען האָבען ניט קיין באַוועגונגס־אָרגאַנען, זיי האָבען זיי ניט נויטיג. זיי האָבען אויך ניט קיין מויל, זיי וויגען אַרײַן זייער שפּייז דורך די אויבערפּלעכע פון זייער קערפער. פון די פאַרשיידענע אַרטען פּראָטאָזאָען (איינצעליגע באַשע־

פּענישען) איז ווערטה צו דערמאָנען די גרעגאַרינען, וועלכע עק-זיסטירען אין פאַרשיידענע פּאָרמען. די גרעגאַרינען זיינען פאַר-ראַזימישע פּראָטאָזאָען. זיי לעבען מייסטענס אין די געדערים פון פאַרשיידענע אינועקטען און ציהען זייער חיונה פון דעם זאָפּט פון דעם אינועקט אין וועמעס געדערים זיי האָבען זיך באַזעצט. זיי האָבען ניט קיין באַוועגונגס אָרגאַנען און האָבען אויך ניט קיין מויל. זייער שפייז זויגען זיי אַרײַן דורך דער אויבערפלעכע פון זייער קערפּער. זיי דאַרפען זיך אָבער האַלטען פּעסט פאַר די ווענטעלעך פון זייער „דירה“, אַז זיי זאָלען ניט אַרויסגע-וואָרפען ווערען פון דעם באַלעבאָס, ביי וועמען זיי האָבען זיך אויסגעקליבען צו וואוינען. מאַנכע אַרטען פון די גרעגאַרינען האָבען דעריבער אין זייער קערפּער אַזעלכע קרוטשיקלעך, מיט וועלכע זיי האַלטען זיך פּעסט אין די געדערים פון דעם אינועקט. אינטערעסאַנט איז ווי די גרעגאַרינען פּרוכפּערען זיך. אין דעם פּרט אונטערשיידען זיי זיך שטאַרק פון די אַמיבען און אַנדערע פּראָטאָזאָען. ווען עס קומט די פּרוכפּערונגס-צײַט פון די גרעגאַרינען, ציהט זיך זייער לענגליכער און פּלאַכער קערפּער צונויף אין אַ רונדען קייקעלע און באַדעקט זיך מיט אַ האַרטען הייטעל פון אויבען. דאַן פּאַנגט אָן דער קערען און די פּראָ-טאָפּלאַזמע פון דער גרעגאַרינא אין דעם הייטעל זיך צו שפּאַלטען אין אַ סך קליינע טײלכעלעך, וועלכע ווערען אָנגערופּען ספּאַרען. נאָכדעם פּלאַצט דאָס הייטעל און די ספּאַרען פּאַלען אַרויס און ווערען אַליין גרעגאַרינען.



צײכנונג 8. — פּיער צושטאַנדען פון אַ פּראָטאָזאָע, וועלכע פאַראורזאַכט מאַלעריאַ. א, דער צושטאַנד פון דער פּראָטאָזאָע, ווען זי איז אַרײַנגעדרינגען אין אַ בלוט קייקעלע פון אַ מענשען; ב, איהר פאַרגרעסערטער צושטאַנד; ג, ווען זי פּאַנגט זיך אָן שפּאַלטען אין ספּאַרען; ד, ווען איהרע ספּאַרען זײַנען פּאַלשמענדיג ענטוויקעלט און דאָס בלוט קייקעלע פּלאַצט און די פּרינע ספּאַרען דרינגען אַרײַן אין אַנדערע בלוט קייקעלעך.

צײכנונג 7. — גרעגאַרינא (א פּאַראַזיטישע פּראָטאָזאָע), זעהר שטאַרק פאַר-גרעסערט. זי געפינט זיך אין דעם צור-שטאַנד, ווען זי האַלט זיך ביים שפּאַלטען אין ספּאַרען.


אין א נאָהענטער קרובה'שאַפט מיט די גרענאַרינען שטעהען די פּאַראַזיטען פּראָטאָזאָען, וועלכע געפינען זיך אין די בלוט-קייקעלעך פון מענשליכען קערפּער. דיזע פּאַראַזיטען-פּראָטאָזאָען רופּען זיך העמאַטאָזאָען. געוויסע אַרטען פון די דאָזיגע הע-מאַטאָזאָען פּאַראַרואַכען די מאלאַריע קראַנקהייט אין מענשלי-כען קערפּער.

יִם-פּראָטאָזאָען. — די פּאַרשפּרייטעסטע באַשעפענישען אין ים זיינען די ים-פּראָטאָזאָען. זיי איבערטרעפּען אין זייער צאָהל אלע אַנדערע באַשעפענישען. אין יערען טראַפּען וואַסער פון ים געפינען זיך אַ גרויסע מאַסע ים-פּראָטאָזאָען. דאָס וואַסער מעג אויסזעהן קלאָר און אָהן אַ שפּור פון לעבעדיגע באַשעפע-נישען, אָבער ווען מען נעמט עס אונטער אַ פּאַרגרעסערונגס-גלאַז דערזעהט מען דאָרטען אַ לעבעדיגע וועלט פּול מיט פּראָטאָזאָען. אין אַ קוואַרט ים-וואַסער געפינען זיך מיליאָנען פּראָטאָזאָען. און די דאָזיגע פּראָטאָזאָען שפּיעלען אַ העכסט וויכטיגע ראָלע אין ים. זיי זיינען אייגענטליך דער יסוד פון לעבען אין ים. זיי און די איינצעליגע פּלאַנצען, וועלכע געפינען זיך אין ים, שטעלען צו שפּייז פאַר אַלע אַנדערע ים-באַשעפענישען. אַלע ים-חייות נעהרען זיך דירעקט אָדער אינדירעקט מיט די פּראָטאָזאָען און מיט די פּראָטאָפּיטען (איינצעליגע ים-פּלאַנצען). אָדער זיי פאַרשלינגען זיי דירעקט אָדער זיי פאַרשלינגען די באַשעפענישען, וועלכע נעהרען זיך מיט די פּראָטאָזאָען און פּראָטאָפּיטען. ווען די פּראָטאָזאָען און די פּראָטאָפּיטען זאָלען פאַרשווינדען פון ים, וועלען די אַלע אַנדערע ים-באַשעפענישען, קליין און גרויס, ניט קענען עק-זיסטירען. צוערשט וועלען ניט האָבען די קליינע קיין שפּייז און זיי וועלען מוזען אונטערנעהן און נאָכדעם וועלען די גרויסע מוזען אונטערנעהן, ווייל זיי וועלען קיין שפּייז ניט האָבען. אַלע לע-בעדיגע באַשעפענישען פון ים הענגען אָפּ איינע פון די אַנדערע מיט זייער שפּייז. די גרעסערע עסען די קלענערע, די קלענערע די נאָך קלענערע א. א. וו. ביז די פּראָטאָזאָען. בלוז די פּראָטאָזאָען און די פּראָטאָפּיטען ניט אָנקומען צו דער שפּייז פון אַנדערע לעבעדיגע באַשעפענישען, זיי שפּייזען זיך מיט די איינצעליגע פּלאַנצען. די פּראָטאָזאָען מוזען דעריבער זיין די עלטעסטע ים-באַשעפענישען. זיי מוזען זיין די ערשטע לעבעדיגע באַשעפע-נישען, וועלכע האָבען זיך באַווזען אין ים, און אזוי ווי דאָס

לעבען אין ים האָט זיך אָנגעפאָנגען פריהער ווי אויף דער יבשה, מוזען, אלזאָ, די פראַטאָזאָען זיין פון די ערשטע לעבעדיגע באַ-שעפענישען אויף דער וועלט.


עס געפינען זיך פאַרשיידענע פראַטאָזאָען אין ים. באַזונדערס באַראַקטעריסטיש זיינען אָבער די גלאַביגערינען און די ראַדיאָלאַרען. זייער קליינער מיקראַסקאָפּישער קערפּער איז אַרומגערינגעלט מיט אַ מיקראַסקאָפּישען מושעל. ביי די גלאַביגערינען איז דער מושעל געמאַכט פון קאַלציום קאַרבאָנאַט (קאַלץ), וועהרענד דער מושעל פון די ראַדיאָלאַרען באַשטעהט פון קיזעל-ערד. די מושלען האָבען פאַרשיידענע פאַרמען און מושטערען און די מייסטע פון זיי זיינען אויסגעבילדעט באַזונדערס שעהן און סימעטריש. די מושלען האָבען מייסטענס קליינע לעבעלעך, דורך וועלכע עס שטעקען אַרויס לאַנגע, דינע פראַטאָזאָמע פעדימלעך, וועלכע זיינען איינע מיט די אַנדערע פאַרפלאַכטען אַרום דעם מושעל.

די דאָזיגע מושעל-פראַטאָזאָען געפינען זיך אין אומצעהליגע ביליאָנען אין דעם וואַסער פון ים. גרויסע שטרעקען פֿון דעם גרונד פון דעם אַטלאַנטישען אָקעאַן זיינען דיק באַדעקט מיט די טויטע מושלען פון די גלאַביגערינען. ווען די פראַטאָפלאַזמע אין דעם מושעל שטאַרבט, פאַנגט דער מושעל אָן לאַנגזאַם צו וינקען צו דעם גרונד פון ים, און אין אַ פאַרלויה פון אַ סך טויזענדער יאָהרען האָט זיך אויפֿן דעם פון ים אָנגעזאַמעלט אַ דיקער שיכט פון די דאָזיגע מושלען. און ניט בלויז אויפֿן גרונד פון ים האָבען זיך די דאָזיגע קליינע, מיקראַסקאָפּישע מושלען אָנגעזאַמעלט אין ריזיגע מאַסען, נאָר אויך איבער דער גאַנצער וועלט. די



צייכונג 9. — א, אַ גלאַביגעריין מיט זיין מושעל און „פּוס-וואַרען“ לען (זעהר שטאַרק פאַרגרעסערט). ב און ג, ראַדיאָלאַרען מיט זייערע מושלען און „פּוס-וואַרעלען“ (זעהר שטאַרק פאַרגרעסערט).

גרויסע קרייד-בערג פון ענגלאַנד זיינען געשאַפֿען געוואָרען הויפּט־זעכליך פון די מיקראַסקאָפּישע מושלען פון די גלאַביגערדינען. דאָסזעלבע איז מיט די גרויסע קרייד־מאַסען פון פראַנקרייך, שפּאַן־ניען און גריכענלאַנד. די עקזיסטענץ פון אַזעלכע קרייד־בערג אָדער קרייד־שיכטען צייגט, אַז אַמאָל זיינען יענע געגענדען גע־ווען באַדעקט מיט ים, וואו די גלאַביגערדינען האָבען געלעבט אין גרויסע מאַסען. זייערע מושלען האָבען זיך אָנגעזאַמעלט אין גרויסע, דיקע שיכטען אויפ'ן גרונד פון ים. דורך פאַרשידענע געאָלאָגישע ענדערונגען, וועלכע זיינען שפּעטער פאַרגעקומען אין אינערען פון ערד (ווי ערד־ציטערנישען), האָט זיך דער דעק פון ים אויפֿגעהויבען און עס זיינען געשאַפֿען געוואָרען נייע שטיקער יבשה, וואו די איצטיגע קרייד־בערג אָדער קרייד־שיכטען געפינען זיך. מאַנכע אַזעלכע ערטער געפינען זיך איבער טויענד מייל ווייט פון ים, ווי די קרייד־לאַגערען אין קענזעס, אין די פאַראיי־ניגטע שטאַטען פון אַמעריקאַ. דאָס באַווויזט, אַז דער אַטלאַנטישער אָקעאַן איז אַמאָל, מיט אַ סך טויענדער יאָהר צוריק געווען טויענדער מיילען ווייטער פאַרשפּרייט, ווי ער איז איצט. די ראַדיאָלאָרען לעבען היינט אין גרויסע מאַסען אין ים, הויפּטזעכליך אין די טראָפּישע (הייסע) און מעסיגע געגענדען. פון זייערע קיעזעל־שטיין מושלען זיינען געשאַפֿען געוואָרען שטיי־



צייכונג 11. — אַ שטיקעל בלאַמע פון דעם גרונד פון אַטלאַנטישען אָקעאַן אונטער אַ שטאַרקען פאַרגרעסערונגס־גלאַז, וואו מען קען זעהן די מושלען פון גלאַביגערדינען און אַנדערע אָרגאַניזמען.



צייכונג 10. — אַ שטיקעל קאלך אונטער אַ שטאַרקען פאַר־גרעסערונגס־גלאַז, וואו מען קען זעהן די גאַנצע און צו־בראַכענע מושלען פון גלאַביגערדינען.

נערנע פעלזען, אויף דעמזעלביגען אופן, ווי די קרייד-בערג זיינען געשאפען געווארען פון די גלאַבינערינען.

שפייז-פאַרדייאונג. — ביי אלע פראטאָזאָען, וועלכע זיינען דאָ באַשריבען געוואָרען, אי ביי אלע, וועלכע זיינען עהנליך צו זיי, קומט פאַר די פאַרדייאונג פון שפייז אויף אַ גלייכען אופן. נאכדעם ווי די שפייז קומט אַרײַן אין דער צעלע, ווערט עס דאָר-טען, ווי עס איז אָנצונעהמען, באַפייכטעט מיט אַ פאַרדייאונגס-פליסיגקייט און ווערט אויפגעלעזט אין דער פראטאָפלאַזמע. דער זויער-שטאָף, וואָס איז נויטיג אויפצוהאַלטען דאָס לעבען פון יעדער לעבעדיגער באַשעפעניש, ווערט אַרײַנגעזויגען פון די פראַטאָזאָען דורך דער אויבערפלעכע פון זייער קערפער. דער אָפּפאל פון דעם פאַרדייטען שפייז ווערט ביי די מייסטע פראטאָזאָען דורכ-געפילטערט דורך זייער קערפער, ניט האַבענדיג פאַר דעם צוועק קיין ספעציעלען אָרגאַן. ביי מאַנכע פראטאָזאָען אָבער זיינען פאַר דעם צוועק פאַראַן אַ מין נייערען, אַזעלכע פולסירענדע לע-כעלעך, ווי ביי די פאַראַמעציאָם אינפּוזאָריען, וועלכע זיינען אוי-בען באַשריבען געוואָרען. דער אָפּפאל פון די פאַרדייטע שפייז קלייבט זיך פריהער צונויף אין די פולסירענדע לעכעלעך און פון דאָרטען ווערט ער אַרויסגעשטויסען פון דעם קערפער פון דער פראטאָזאָע.

ווי עס איז צו זעהן, האַבען אָט די קליינציניקע, מיקראָס-קאָפּישע איינצעליגע באַשעפענישען דורכצופיהרען די וויכטיג-סטע פונקציעס פון לעבען, ווי די גרויסע, קאָמפּליצירטע און ענטוויקעלטע באַשעפענישען. זיי באַוועגען זיך, זיי פיהלען, זיי עסען, זיי פרוכפערען זיך און מעהרען זיך און שיצען זיך זאָגאַר פון געפאָהר. דער וויכטיגער אונטערשייד צווישען די נידעריגע באַשעפענישען און די העכער ענטוויקעלטע באַשטעהט, אַלזאָ, ניט אין זייערע פונקציע, אין זייער טעטיגקייט, נאָר אין זייער קער-פער-געבוי, אין זייער סטרוקטור, אין זייער מעכאַניזם. וואָס בע-סער עס איז ענטוויקעלט דער קערפער-געבוי און דער מעכאַניזם פון דער באַשעפעניש, אַלץ אויף אַ העכערע מדרגה שטעהט זי. אָט פאַרנלייכענדיג די פאַרשיידענע פראטאָזאָען, וועלכע זיינען דאָ באַשריבען געוואָרען, וועלען מיר געפינען, אַז די פאַראַמעציאָם אינפּוזאָריע שטעהט אויף אַ העכערע מדרגה, ווי די אַמיבע. ביידע ערפילען דיזעלביגע פונקציעס פון לעבען, אָבער ביי דער אַמיבע

דאָרף יעדער טייל פון איהר קליינעם קערפער. טאָן אַלע נויטיגע אַרבייט. יעדער טייל פון קערפער מוז זיין אַ מויל צו עסען און יעדער טייל פון קערפער מוז זיין אַ באַוועגונגס-אַרגאַן, וועהרענד ביי דער פאַראַמעציאָם אינפּוּזאַריע איז פאַר יעדע פון די צוויי פּונקציעס פאַראַן אַ ספּעציעלער אַרגאַן: פאַר באַוועגונג די באַ-וועגונגס-הערעלעך און פאַר פאַנגען שפייז אַ שלונד אָדער מויל. עס פאַרשטעהט זיך, אַז ווען פאַר יעדער פּונקציע איז פאַראַן אַ ספּעציעלער אַרגאַן, קען די אַרבייט בעסער דורכגעפיהרט ווערען, ווי ווען יעדער טייל פון קערפער דאָרף ערפילען אַלע פּונקציעס. מיר האָבען דאָ צו טאָן מיט דעם פּרינציפּ פון אַרבייטס-טיילונג. וואָס מעהר און וואָס בעסער די אַרבייט איז צוטיילט אין פאַר-שיידענע ספּעציאַליטעטען, אַלץ פּראָדוקטיווער און בעסער ווערט זי געמאַכט. די אַמביע, ביי וועלכער יעדער טייל פון קערפער דאָרף ערפילען פאַרשיידענע פּונקציאָנען, איז דעריבער אַ נידע-ריגערע באַשעפּעניש ווי די פאַראַמעציאָם אינפּוּזאַריע, וועלכע האָט ספּעציעלע אַרגאַנען צו ערפילען די דאָזיגע פּונקציעס.

קאַלאָניען-פּראָטאָזאָען. — די פּראָטאָזאָען, וועלכע זיינען ביז איצט באַשריבען געוואָרען, לעבען אָפּגעזונדערט איינע פון די אַנדערע. די פאַרמעהרונג פון די פּראָטאָזאָען, ווי עס איז אָנגע-געבען געוואָרען, קומט פּאָר דורך שפּאַלטונג. ווען אַ פּראָטאָזאָע האָט זיך געשפּאַלטען און פון איינע איז געוואָרען צוויי, טיילען זיי זיך אָפּ איינע פון די אַנדערע און יעדע פיהרט איהר לעבען באַזונדער. עס זיינען אָבער פאַראַן פּראָטאָזאָען, ביי וועלכע די צושפּאַלטענע טיילען, ניט קוקענדיג אויף דעם, וואָס יעדער אָפּנע-שפּאַלטענער טייל איז אַ באַזונדערער אינדיוידואַם, אַ באַשע-פּעניש פאַר זיך, דאָך בלייבען זיי לעבען צוזאַמען. זיי באַשאַ-פען אַ קאַלאָניע. די דאָזיגע קאַלאָניען-פּראָטאָזאָען באַלאַנגען צו דער גרופּע אַרגאַניזמען, וועלכע ווערען גערופּען מיט דעם נאָמען וואָלוואַצינען.

די וואָלוואַצינען, אויסער, איינער פון זיי, לעבען אין קלענערע אָדער אין גרעסערע קאַלאָניעס. דאָס הייסט עטליכע פּראָטאָזאָען לעבען צוזאַמען, הגם יעדע פּראָטאָזאָע אָדער צעלע איז אַ באַשעפּע-ניש פאַר זיך. זיי לעבען צוזאַמען אין אַזאַ זשעלאַטין היימעל. אין די מייסטע פון אַזעלכע קאַלאָניעס האָט יעדע פּראָטאָזאָע



צוויי אָדער דריי לאַנגע פּלאַנאַלעמען (בייטש־עהנליכע פּראָטאָ־פּלאַזמישע הערעלעך), מיט וועלכע די קאָלאָניע שווימט.

די מעהר איינפאַכע גאַטונג (גענוס) פון די קאָלאָניען־פּראָ־טאָזאָען זיינען די גאַנז־פּראָטאָזאָען. ווען די גאַנז־פּראָטאָ־זאָע שפּאַלט זיך, געהט די טאָכטער ניט אַוועק פון דער מוטער, ביידע פּראָטאָזאָען בלייבען איינע ביי דער אַנדערער. די קאָ־לאָניע באַשטעהט דאָן פון צוויי פּראָטאָזאָען. דאָן שפּאַלט זיך יעדע פון זיי אין צווייען, און די קאָלאָניע באַשטעהט שוין פון פיער, די שפּאַלטונג געהט אַזוי ווייטער ביז עס ווערען זעכצען פּראָטאָזאָען און די קאָלאָניע איז דאָן פאַרטיג. ווען מען זאָל אָפּטיילען איין פּראָטאָזאָע פון דער קאָלאָניע וועט זי לעבען באַ־זונדער און אומאָפהענגיג פונקט אַזוי גוט ווי אין דער קאָלאָניע, אָבער זיי טיילען זיך ניט אָפּ, נאָר לעבען צוזאַמען און בילדען אַ קליינע, פּלאַכע פּלאַטען־עהנליכע קאָלאָניע. יעדע פּראָטאָזאָע פון דער קאָלאָניע אָבער עסט, אַטעמט און פיהלט פאַר זיך אַליין, יעדע פון זיי ערפילט אַלע פונקציעס פון לעבען פאַר זיך אַליין אומאָפהענגיג פון די אַנדערער. און ווען די קאָלאָניע איז פאַרפול, ווען עס זיינען שוין פאַראַן זעכצען פּראָטאָזאָען, דאָן צוטיילען זיי זיך און יעדע פּראָטאָזאָע פאַנגט אָן שאַפען אַ נייע קאָלאָניע. עהנליך צו די גאַנז־פּראָטאָזאָען זיינען די פאַנדאַרינען, אויך זייערע קאָלאָניעס באַשטעהען פון 16 צעלען, נאָר זיי בילדען רונ־דע פילקע־פאַרמיגע קאָלאָניעס אַנשטאַט פּלאַכע, פּלאַטען־פערמיגע. ווען די פאַנדאַרינען קאָלאָניע איז רייה זיך צו פאַרמעהרען, פאַנגט אָן יעדע צעלע זיך צו שפּאַלטען ביז עס ווערט פון יעדע צעלע געשאַפען 16, דאָן לעזט זיך אויף דאָס זשעלאַטין הייטעל, וואָס האָט די קאָלאָניע געהאַלטען צוזאַמען, און די ניי־געשאַפענע 16 קאָלאָניעס טיילען זיך אָפּ איינע פון די אַנדערע און שווימען אַוועק אין פאַרשיידענע ריכטונגען. די דאָזיגע אַרט פאַרמעהרונג האַלט אָן פאַר עטליכע דורות, אָבער ניט אומענדליך. נאָך אייניגע אַזעלכע פאַרמעהרונגען, טיילט זיך יעדע צעלע פון דער קאָלאָניע בלויז אין 8 טאָכטער־צעלען, וועלכע טיילען זיך אָפּ איינע פון די אַנדערע און שווימען איינציגוויי אַוועק. ווען איינע פון דאָזיגע צעלען טרעפט זיך מיט אַ צווייטע פריי־שווימענדע צעלע פון אַן אַנדער קאָלאָניע, פאַראייניגען זיי זיך און גיסען זיך צווייה אין איין צעלע. די ניי־געשאַפענע צעלע באַדעקט זיך דאָן מיט אַ

הייטעל און טרעט אריין אין א רוה־צושטאנד פאר א געוויסער צייט. שפעטער, אונטער ניכטיגע באדינגונגען, פלאצט דאס הייטעל און עס קומט ארויס א פרייע שווימענדע צעלע, וועלכע פאנגט זיך אן פארמעהרען (שפאלטען), ביז עס ווערען געשאפען 16 צעלען, וועלכע שטעלען צוזאמען א נייע קאלאניע.

פיעל עהנליך צו די פאנדארינען זיינען די איידארינען. אויך די איידארינען קאלאניע איז רונד ווי א פילקע און ענט־האלט 16 מיטגלידער, אמאל אבער אויך 32. עס איז אבער פאראן איין וויכטיגער אונטערשייד צווישען די פאנדארינען און איידא־רינען, אין באצוג פון דער פאראייניגונג פון צוויי פריי־שווי־מענדע צעלען וועלכע פארשמעלצען זיך אין איין צעלע. ביי די פאנדארינען זיינען די צעלען, וועלכע פאראייניגען זיך, גלייכע, וועהרענד ביי די איידארינען זיינען זיי פארשיידען. די צעלען פון דער איידארינען קאלאניע זיינען געוועהנליך לאנגרונד. ווען די קאלאניע ווערט רייה צו פארמעהרען זיך, שפאלטען זיך בלויז עטליכע צעלען און פארמעהרען זיך ביז 16 אָדער 32, די אנדערע אָבער שפאלטען זיך ניט. די יונגע צעלען, וואָס יעדע פון זיי האָט צוויי בייטש־פערמיגע פראָטאָפלאַזמע הערעלעך, טיילען זיך אָפּ פון דער קאלאָניע, אָבער ניט איינציגווייז, נאָר אין בינמלעך, וועלכע בלייבען צוזאמען פאר א געוויסער צייט. די איבעריגע צעלען פון דער קאלאָניע, וועלכע האָבען זיך ניט געשפאלטען, וואַקסען אויס עטוואָס גרעסער און ווערען רונדער. ווען אזא בינמלע צעלען באַנענענט זיך מיט אַן אנדער בינמלע, וואָס איז ניט אויסגעוואַקסען גרעסער און האָט ניט געענדערט זיין רונד־לענגליכע פאָרם אויף א פאַלשטענדיג רונדע, דאַן צוטיילען זיך די צוויי בינמלעך צעלען אין איינצעלנע צעלען און עס קומט פאַר א פאראייניגונג צווישען יעדע פון די גרעסערע רונדע צעלען מיט איינער פון די קלענערע לאַנגליכע צעלען, און בילדען איין צעלע. די דאָזיגע פאראייניגטע צעלע באַדעקט זיך מיט א הייטעל און טרעט אריין אין א רוה־צושטאנד. שפעטער פלאצט דאָס הייטעל און די צעלע פאנגט זיך אן שפאלטען און עס ווערט געשאפען א נייע קאלאָניע פון 16 אָדער 32 מיטגלידער.

אַן אנדער אינטערעסאַנטע קאלאָניע־פראָטאָזאָע איז דער וואַלוואַקס. די וואַלוואַקס־קאלאָניעס באַשטעהען פון עטליכע טויזענד צעלען, וועלכע זיינען אויסגעלייגט אין א רונדען פילקע־

פאַרמיגען שיכט. די קאָלאָניע שטעלט מיט זיך פאַר אַ פּוסטע פּילקע. די צעלען זיינען רונד־לאַנגליך און יעדע פון זיי האָט צוויי פּלאַנאַלעטען (בייטש־פּערמיגע פּראָטאָפּלאַזמע הערעלעך). דורך די באַוועגונגען פון די טויזענדע פּלאַנאַלעטען, וואָס די רונדע וואָלוואַקס קאָלאָניע באַזיצט, באַקומט זי אַ קרייז־באַוועגונג, זי דרעהט זיך ווי אַ ראָד, שווימענדיג אין וואַסער. די צעלען האַל־טען זיך צוזאַמען דורך אַ זשעלאַטין־אַרטיגען שטאָף און דורך דינע פּראָטאָפּלאַזמע פעדימלעך, מיט וועלכע איין צעלע איז פאַרבונדען מיט דער צווייטער. ווען די קאָלאָניע איז ריף פאַר פאַרמעהרונג, קומט פאַר אין געוויסע צעלען פון דער קאָלאָניע גרויסע ענדערונג נען. מאַנכע פון זיי ווערען באַדייטענדיג גרעסער, ווי די אַלע אַנדערע, און באַקומען אַן אַנדער פאַרם. זיי קענען אָנגערופען ווערען אייער־צעלען. די דאָזיגע אייער־צעלען פאַנגען זיך דאָן אָן שפּאַלטען און בילדען אַ טאַכטער קאָלאָניע פון קליינע צעלען, וועלכע האַלטען זיך צוזאַמען און טיילען זיך אָפּ פון דער מוטער־קאָלאָניע און שווימען אוועק פון איהר. די טאַכטער־קאָלאָניע וואַקסט דאָן אויס און דורך ווייטערדיגע שפּאַלטונגען ענטוויקעלט זי זיך אין אַן עהנליך גרויסער קאָלאָניע, ווי די פון וועלכער זי האָט זיך אָפּגעטיילט. די פאַרמעהרונג פון דער וואָלוואַקס קאָלאָניע פּראָטאָזאָען קומען אַמאָל אויף פאַר אויף אַן עהנליכען אופן ווי ביי די איידאָרינען פּראָטאָזאָען, וועלכע זיינען פריהער באַשריבען געוואָרען, אָבער אַ גרויסע צאָהל צעלען פון דער קאָלאָניע נעמען אינגאַנצען ניט קיין אַנטייל אין דער פאַרמעהרונג. זיי בלייבען ווי זיי זיינען, זיי שפּאַלטען זיך ניט און שטאַרבען אָפּ.

די קאָלאָניען־פּראָטאָזאָען, ווי עס איז צו זעהן, שטעלען מיט זיך פאַר שוין אַ קאָמפּליצירטערע לעבענס־פאַרם, ווי די איינצעלנע פּראָטאָזאָען. און ביי די קאָלאָניען־פּראָטאָזאָען גופא זעהען מיר, אז די לעבענס־פאַרם פון די גאַנצן פּראָטאָזאָען איז קאָמפּליצירטער ווי פון די וואָלוואַצינען, און די לעבענס־פאַרם פון די פּאַנ־דאָרינען איז קאָמפּליצירטער, ווי פון די גאַנצן פּראָטאָזאָען, און אזוי ווייטער. דאָס לעבען ענטוויקעלט זיך פון דעם איינפאַכערען צום קאָמפּליצירטערען. אין דער וואָלוואַקס־קאָלאָניע האָבען מיר שוין זאָנאַר אַ געוויסען אָנפאַנג פון אַרבייט־פאַרטיילונג. ניט אַלע צעלען פון דער קאָלאָניע נעמען אַנטייל אין דער פאַרמעהרונג פון דעם מיין, בלויז אַ טייל פון זיי פאַרריכטען אָט די אַרבייט.

## זעקסמער קאפיטעל.

די ענטוויקלונג פון די שוואַמען. — דאָס פּרוכפּערען און פּאַרמעהרען זיך פון שוואַמען. — דער סקעלעט און דאָס „פּלויש“ פון שוואַם.  
— די פּאַרשיידענע פּאַרמען און גרויס פון שוואַמען. — דאָס לעבען און שפּיז פון די שוואַמען. — די פּאַרשפּרויטונג פון שוואַמען אין די ימים.

## שוואַמען אָדער פּאַריפּערען.

די ענטוויקלונג פון שוואַם. — אַלס אַן איבערנאַנג פון פּראָטאָזאָען צו מעטאָזאָען, ד. ה., פון איינצעליגע באַשעפענישען צו פּיעל-צעליגע, קענען גערעכענט ווערען די שוואַמען, ווייל דער שוואַם איז די איינפאַכסטע פּיעל-צעליגע באַשעפעניש.  
אַמאָל האָט מען געדענקט, אַז די שוואַמען זיינען וואַסער-פּלאַנצען, אָבער ווען מען האָט זיי אָנגעפּאַנגען גרינדליכער שטו-דירען, האָט מען אויסגעפונען, אַז זיי זיינען לעבעדיגע באַשע-פענישען. די שוואַמען, מיט וועלכע מען באַנוצט זיך צום וואַשען און פאַר פּאַרשיידענע אַנדערע צוועקען, זיינען עס די סקעלעמען פון לעבעדיגע באַשעפענישען, וועלכע לעבען אויף דעם גרונד פון ים, באַהעפט צו פּעלזען, צו שטיינער אָדער צו אַנדערע פעסטע געגענשטענדע, וועלכע געפינען זיך אויפ'ן גרונד פון ים.  
דער שוואַם איז איינע פון די נידעריגסטע פּאַרמען פון די פּיעל-צעליגע באַשעפענישען, אָבער ער איז דאָך שוין אַ מדרגה העכער ווי די איינצעליגע באַשעפענישען. דער וויסענשאַפּט-ליכער נאָמען, מיט וועלכען מען האָט געקרוינט די שוואַם באַשע-פענישען, איז פּאַריפּערען און עס איז אַ פּאַסיגער נאָמען, ווייל דער קערפּער פון דער דאָזיגער באַשעפעניש איז פול מיט פּאַרען (לעבעלעך) אָדער מיט קאַנאַלען פון פּאַרשיידענע פּאַרמען און גרויס.


דער שוואַם האָט אַן אויסערליך הייטעל, וואָס באַדעקט איהם פון אויבען און אַן אינערליך הייטעל, וואָס באַדעקט די פּאַרען פון אינוועניג. דאָס אויסערליכע הייטעל ווערט אָנגערופּען עקטאָדערם און דאָס אינערליכע הייטעל ענדאָדערם. צווישען

דיעזע ביידע הייטלעך געפינט זיך, אויסער דער סקעלעט פון שוואַם, אַ ווייכע מאַסע פון צעלען, דאָס „פלייש“ פון דעם שוואַם. דיעזע ווייכע צעלען-מאַסע, וועלכע געפינט זיך צווישען עקטאָדערם און ענדאָדערם, ווערט אָנגערופען מעזאָדערם.

דיעזע דריי טיילען — עקטאָדערם, ענדאָדערם און מעזאָ-דערם פון דעם שוואַם דאַרף געהאַלטען ווערען אין זכרון, ווייל זיי זיינען די כאַראַקטעריסטישע טיילען פון אַלע אַנדערע פיעל-צעליגע באַשעפענישען, וועלכע וועלען שפעטער באַשריבען ווערען. די פּרוכפערונג פון די שוואַמען איז אין אַ געוויסען זין אַ געשלעכטליכע. דער שוואַם ווערט געבאָרען פון אַן אייעלע, וואָס בילדעט זיך אין דעם מעזאָדערם (צעלען-מאַסע) פון דעם שוואַם. אייניגע פון די צעלען אין דעם מעזאָדערם ווערען פאַרגרעסערט און רונד. דאָס זיינען די אייער-צעלען פון דעם שוואַם. אייניגע אַנדערע צעלען אין דעם מעזאָדערם שפאַלטען זיך אין קליינע רונד-לענגליכע צעלען, וועלכע ענדיגען זיך מיט אַ קליינער עק-עהנליכער אַרויסשטאַרצונג. דיעזע קליינע צעלען קענען זיך באַ-וועגען אין וואַסער. זיי זיינען עס די באַפּרוכטונגס-צעלען. ווען אַן אייעלע טרעפט זיך מיט אַ באַפּרוכטונגס-צעלע פאַראייניגען זיי זיך און עס ווערט פון זיי איין צעלע. די אייעלען און די באַפּרוכטונגס-צעלען קענען זיך געפינען אין דעם מעזאָדערם פון איין שוואַם, אָדער אין צוויי באַזונדערע שוואַמען. די פאַראייניגטע צעלע פאַנגט זיך דאָן אָן שפאַלטען. פון איין צעלע ווערען, אַלזאָ, צוויי. יעדע העלפט טיילט זיך ווידער אין צוויי און ווערט פיער צעלען און יעדע פון די פיער טיילען זיך אין אַכט א. א. וו., ביז דער נייגעבאָרענער שוואַם באַקומט די פאַרמע פון אַ רונדען קיין קעלע, וואָס איז אינוועניג פּוסט. אין דעם צושטאַנד ווערט דער יונגער שוואַם אָנגערופען גאַסמולאַ, ער רייסט זיך דאָן אָפּ פון זיינע עלטערען און פאַנגט אָן פיהרען אַ לעבען פאַר זיך.

די ווייטערדיגע ענטוויקלונג פון דעם יונגען שוואַם קומט פאַר אויף דעם פּאַלגענדען אופן: איין זייט פון דער קייקעלע ווערט ביסלעכווייז אַריינגעדריקט נאָך אינוועניג, אזוי ווי מען דריקט איין אַ גומענע פילקע מיט'ן פינגער. די פאַרטיעפונג ווערט ענדליך אזוי גרויס, אַז דאָס קייקעלע באַקומט די פאַרם פון אַ יאַרמולקע אָדער פון אַ צונויפגעדריקטע גומענע פילקע, פון וועלכער די לופט איז אַרויס. אין דיעזער פאַרם ווערט דער יונגער

שוואַם אָנגערופען מיט דעם נאָמען גאַסטרולאַ. אין דעם דאָזיגן צושטאַנד זעצט זיך דער יונגער שוואַם אָפּ אויף אַ פעלן, אויף אַ שטיין אָדער אויף דעם זאַמד פון גרונד פון ים און ענטד וויקעלט זיך אין אַ פּאַלשמענדיגען שוואַם, עהנליך צו דעם פון וועמען ער שטאַמט אָפּ. עס ענטוויקלען זיך ביי איהם די פאַר-



צייכונג 12. — די ענטוויקלונג פון אַ שוואַם. א, די אינצעלע; ב, דער קערען פון דער צעלע. ב, ווען די צעלע האָט זיך געשפּאַלטען אין צוויי; ג, ווען זי האָט זיך געשפּאַלטען אין פּיער; ד, ווען זי איז געשפּאַלטען אין זעכצעהן; ה, דער בלאַסטולאַ צושטאַנד; ו, אַ דורכשניט אין מיטען פון אַן ענטוויקעלטער בלאַסטולאַ; ז, דער גאַסטרולאַ צושטאַנד; ח, אַ יונגער שוואַם; ט, אַ דורכשניט אין אַ מיטען פון אַ גאַנץ יונגען שוואַם.


שיידענע פּאַרען און קאַנאַלען, עס וואַקסט זיך פּאַנאַנדער זיין סקעלעט און ער ווערט אַ שוואַם מיט שוואַמען גלייך.

ביי אַנדערע שוואַמען איז דער פּאַרמערונגס-פּראָצעס אייני פּאַכער. אַ גרופּע צעלען טיילען זיך אָפּ פון שוואַם, ווערען באַ- צויגען פון אויבען מיט אַ הייטעל, און די איינצעלנע צעלען פּאַנגען זיך אָן שפּאַלטען, און זייער צאָהל ווערט אזוי גרויס, דאַס עס ווערט געשאַפען אַ נייער שוואַם.

די שוואַמען, וועלכע ווערען פון אונז באַנוצט פאַר פּאַרשיי- דינע צוועקען, זיינען טויטע. דאַס זיינען בלויז סקעלעטען פון שוואַמען. ביי לעבעדיגע שוואַמען איז דער סקעלעט באַדעקט מיט „פּלייש“, מיט אַ ווייכע מאַסע, מיט פּראָטאָפּלאָזמע, מיט לעבע- דיגע צעלען, וועלכע ערפילען אַ גאַנצע רייה פון לעבענס-פונקציעס. דער שוואַם איז אַ לעבעדיגע באַשעפעניש, וואָס באַוועגט זיך ניט פון אָרט צו אָרט. ער ליגט אימער אויף איין אָרט, אויף דעם פּעלזען אָדער אויפ'ן זאַמד פון גרונד ים, וואו ער האָט זיך אין זיין פּריהער יוגענד אָנגעקלעפט, אָדער ריכטיגער, אָנגעזויגען. די לעבענס-טעטיגקייט פון דעם שוואַם דריקט זיך אויס דורך די שטענדיגע צירקולאַציע פון וואַסער, וואָס פליסט דורך זיינע פּאַרען און קאַנאַלען. אָנצוהאַלטען די באַשטענדיגע צירקולאַציע פון וואַסער האָט דער שוואַם פאַר דעם צוועק ספעציעלע צעלען, וועלכע האָבען דינינקע, זיך אימער באַוועגענדע, הערעלעך. יעדע פון דיזע צעלען האָט דעם אויסזעהן, ווי אַ באַשעפעניש פאַר זיך. זי זעהט אויס ווי איינע פון די פּלאַנאַלעטען פּראָטאָזאָען (די איינצעלניגע באַשעפענישען, וואָס זייער באַוועגונגס-אָרגאַן באַ- שטעהט פון אַ לאַנגען דינעם הערעלעך, וואָס האָט די פּאַרמע פון אַ בייטש). די פּאַרען און די קאַנאַלען פון דעם שוואַם זיינען אויסגעפומערט מיט די דאָזיגע צעלען, און דורך די באַשטענדיגע באַוועגונג פון זייערע הערעלעך ווערט געשאַפען אַ שטראָם אין דעם וואַסער, וואָס פליסט דורך די פּאַרען און קאַנאַלען פון דעם שוואַם.

אין דעם וואַסער, וואָס ווערט אַריינגעצויגען אין שוואַם, גע- פינען זיך טיילכעלעך פון פּלאַנצען אָדער קלייניקע היה'לעך. די הערעלעך פון די שוואַם-צעלען פאַרהאַלטען זיי אַלס זייער שפייז. יעדע פון דיזע האָריגע צעלען פאַנגט שפייז פאַר זיך און פאַרדייט אַליין איהר שפייז. אָבער אַ טייל פון דעם פאַרדיימען שפייז ניט

זי איבער צו די אַנדערע צעלען נעבען איהר, וועלכע האָבען ניט קיין הערעלעך צו פאַנגען שפּייז פאַר זיך.  
 דער שוואַם האָט ניט קיין ספּעציעלע פאַרדייאונגס-אָרגאַנען און אויך ניט קיין ספּעציעלע אַטעמונגס-אָרגאַנען. יעדע צעלע נעמט אויף שפּייז און פאַרדייט עס, און אויך יעדע צעלע ציהט אַרויס די לופט פון וואַסער און אַטעמט.  
 די פאַרשפּרייטונג פון שוואַמען. — די שוואַמען זיינען פאַרשפּרייט אין די ימים פון אַלע וועלט-טיילען. עס זיינען אויך




צייכונג 18. — אן איינפאַכע שוואַם. א, די אויבער-פלעכע פון שוואַם מיט זיינע פּילע קלוינע עפענונגען (מיילער) און אַ גרעסערע עפענונג פון אויבען. ב, אַ דורכשניט אין מיטען פון שוואַם פאַר זיין לענג.

פאַראַן אייניגע ארטען שוואַמען, וועלכע לעבען אין טייכען און אָזערעס, אָבער זייער צאָהל איז קליין און זיי זיינען ניט כאַראַקטעריסטיש. מייסטענס וואַסען די שוואַמען ניט ווייט פון ברעג ים, וואו דאָס וואַסער איז ניט שטאַרק טיעף. ביי די ים-ברעגען אין די טראַפּישע (הייסע) געגענדען געפינען זיך די שוואַ-מען אין באַזונדערס גרויסע מאַסען. עס זיינען אָבער אויך פאַראַן געוויסע אַרטען שוואַמען, וועלכע לעבען אין די גרויסע טיפּע-נישען פון די ימים, אַנדערע זאָגאַר ביז איבער פּיער ענגלישע מיילען טיעף.



די גרויס פון די שוואַמען איז פאַרשיידען. אַנדערע וואַקסען ניט גרעסער ווי אַ קליין קערענדעל, וועהרענד אַנדערע וואַקסען אויס אזוי גרויס, דאָס זייער דיאַמעטער (דורכמאַס) איז מעהר ווי דריי פּוס. אויך זייערע פאַרמען זיינען פאַרשיידען. אַנדערע וואַקסען אויס רונד, ווי אַ פּילקע; אַנדערע זיינען פּלאַך און פּלאַטשיג, אַנדערע זיינען לאַנג און דין, אַנדערע האָבען די פאַרמע פון רעהרען און אַנדערע וואַקסען אויס מיט פאַרשיידענע צווייגען. די אויסערליכע באַדינגונגען האָבען אַ גרויסען איינפּלוס אויף דער ענטוויקלונג פון די שוואַמען. סאי די גרויס, סאי די פאַרם פון פאַרשיידענע אַרטען שוואַמען הענגט אָפּ פון די באַדינגונגען.



צייכונג 14. — אַן עדעל־שוואַם, וועלכער ווערט געבראַכט אין האַנדעל פאַר פאַרשיידענע צוועקען. דאָס מלויש (די פּראַטאָפּלאַזמע) פון שוואַם לאַזט מען צופּוילט ווערען, דאָן ווערט דער סקעלעט געוואַשען און גערייניגט און איז פאַרטיג צום געברויך.

גונגען אין וועלכע זיי לעבען. דערזעלביגער שוואַם, וואָס איז אין אַ שטיקען וואַסער און אונטער אומניסטיגע באַדינגונגען אויסגעוואַקסען פּלאַך און נידעריג, וואַלט אין אַ שטראָמיגען וואַסער און אונטער ניסטיגע באַדינגונגען אויסגעוואַקסען גרויס, הויך, פּול און מיט צווייגען.

פון די שוואַמען, וועלכע ווערען באַנוצט פאַר'ן מענשליכען געברויך, רעכענען זיך די בעסטע, וועלכע וואַקסען אין מיטעל־לענדישען ים. עס זיינען אָבער אויך פאַראַן גוטע שוואַמען פאַר'ן געברויך אין אַנדערע ימים, ווי אין רויטען ים, אין גאַלף פון מעסקאָ און אין פּיעלע אַנדערע.

## זיבעמער קאפיטעל.

דער אָרגאַניזם און דאָס לעבען פון דער הידראַ. — די הידראָזאָען אָדער הידראַ-עהנליכע באַשעפענישען. — די מעדוּזען אָדער זשעלאַטין פּיש. — די סיפּאָזאָען (גרויסע זשעלאַטין פּיש). — די ים אַנעמאַנען אָדער ים רויזען. — די קאַראַלען

## צעלענטעראַטען אָדער שלויך-חיות.

די הידראַ. — נאָהענט צו די שוואַמען אָדער פּאַריפּערען שטעהען די צעלענטעראַטען אָדער שלויך-חיות.

מיט דעם נאָמען צעלענטעראַטען ווערט באַצייכענט אַ געוויסע אָפּטיילונג פון פּיעל-צעליגע וואַסער-באַשעפענישען פון זעהר אַן איינפאַכען קערפּער-געבוי. דאָס גאַנצע באַשעפעניש באַשטעהט פון אַ מאָגען מיט אַ מויל. דער נאָמען שלויך-טייערע איז צו זיי ריכטיג צוגעפאַסט. דער קערפּער פון דייעזע קליינע וואַסער-כרואים באַשטעהט פון אַ שלויך אָדער זעקעל אַלס מאָגען און מיט אַן עפענונג פון אויבען, אַלס מויל. צו די צעלענטעראַטען אָדער שלויך-חיות געהערען די זשעלאַטין-פּיש, די ים-אַנעמאַנען אָדער ים-רויזען און די קאַראַלען. אייניגע אַרטען פון די צעלענטע-טעראַטען לעבען אין טייכען און אָזערעס, אָבער דער גרעסטער טייל פון זיי לעבט אין די ים, וואו מען קען זיי געפינען אי-בעראַל, ביי די ברעגען, אויף דער אויבערפּלעכע און אין די גרעס-טע טיעפענישען. צוליב דעם, וואָס זיי מוזען זיך צופאַסען צו פאַרשיידענע באַדינגונגען, אין וועלכע זיי קומט אויס צו לעבען, זיינען זייערע פּאַרמען און אויסזעהען אזוי פאַרשיידענאַרטיג, דאָס עס איז שווער אָנצוגעבען זייער צאָהל. אין מאַנכע פעלע זיינען זיי אזוי עהנליך צו פּלאַנצען, דאָס מען קען זיי ניכער אָננעהמען פאַר פּלאַנצען איידער פאַר לעבעדיגע באַשעפענישען. די אַמאָ-ליגע נאַטור-פּאַרשער פּלעגען זיי דעריבער רופען זאָאָפּיטען, וואָס דאָס מיינט „פּלאַנצען-חיות“, ווייל זיי האָבען זיי ניט גערעכענט פאַר אַמת'ע לעבעדיגע באַשעפענישען, נאָר פאַר אַ מין ברואים, וועלכע שטעהען צווישען דער וועלט פון פּלאַנצען און פון חיות. דעם געבוי פון קערפּער ביי די צעלענטעראַטען קען מען אַמ-


בעסטען באטראכטען ביי דער הידראָ, וואָס לעבט אין טייך-וואַסער. די הידראָ געפינט זיך אין טייכען און אין אָזערעס באַהעפט צו די בלעטער אָדער צו דעם שטאַם פון פאַרשיידענע וואַסער-פלאַנצען, וועלכע וואַקסען אונטער'ן וואַסער. דער קער-פער פון דער הידראָ, וואָס איז פון אַ גרינגליכען אָדער גרויען קאָליר, איז ניט דיקער פון אַ געוועהנליכער שפילקע אָדער נאָדעל און איז ניט לענגער ווי אַ האַלבער צאָל (אינמיטש). ווען מען קומט אויף דער הידראָ מיט אַ פאַרגרעסערונגס-גלאָז, באַמערקט מען, אַז פון איהר פרייען ענד (איינ ענד איהרער איז אימער באַהעפט צו אַ וואַסער-פלאַנצע) שטאַרצען אַרויס זעקס אָדער אַכט פינגערלעך אָדער הערנדלעך. דיעזע פינגערלעך אָדער הערנדלעך ווערען פון דער הידראָ באַנוצט צו פאַנגען שפייז. דאָס געפאַנגענע שפייז ווערט פון די הערנדלעך אַריינגעפיהרט אין דער עפענונג, וואָס געפינט זיך אין זייער מיטען, וואָס איז דאָס מויל פון דער הידראָ און פון מויל קומט דאָס שפייז גראַד אַריין אין מאַגען, וועלכער פאַרנעהמט כמעט דעם גאַנצען קערפער פון דער באַ-שעפעניש.

**שוין-אַרגאַנען.** — די הידראָ האָט אויך געוויסע שוין-אַרגאַנען זיך צו שיצען פון שונאים, דאָס זיינען איהרע שטעך-צעלען. מאַנכע פון איהרע אויסערליכע צעלען האָבען אין זיך אַן איי-רונדען זעקעלע אָנגעפילט מיט אַ פליסיגקייט און אויפ'ן דעק פון זעקעלע געפינט זיך אַ דין הערעלע מיט שטעכערלעך צונויפנע-דרעהט ווי אַ ספיראַלע. אַחוץ דעם שטאַרצט אַרויס אַ דין שפייזיג הערעלע פון דעם אויבערשטען טייל פון דער צעלע. ווען אַ פינדליכע באַשעפעניש קומט נאָהענט צו דער הידראָ און באַ-ריהרט דאָס הערעלע פון וועלכער עס איז שטעך-צעלע, ניט דאָס ספיראַל-הערעלע, וואָס געפינט זיך אין איהר, אַ שנעל דעם אָנ-גרייפנדיען שונא און די שטעכערלעך פון דעם הערעלע דרינגען אַריין אין זיין קערפער, וועלכער ווערט פאַראַליזירט פון דער פלי-סיגקייט, וואָס דאָס ספיראַל-הערעלע ברענגט מיט זיך פון דעם זעקעלע פון דער צעלע.

אַזעלכע צעלען געפינען זיך אין אַ גרויסער צאָהל אין די הערענדלעך, וועלכע פאַנגען דאָס שפייז פאַר דער הידראָ. אין די הערענדלעך ערפילען די דאָזיגע צעלען אַ דאָפּעלטען צוועק. אי זיי שיצען די הידראָ פון געפעהרליכע שונאים, אי זיי זיינען אַ

גומער מיטעל צו פאנגען שפיין. א קליין באשעפענישעל, וואָס האָט דאָס אומגליק צו באַריהרען איינע פון די שוין-צעלען פון די הערענדלעך, פאלט שוין א קרבן און ווערט פארשלונגען אין דעם מאַגען פון דער הידרא. די דאָזיגע צעלען ווערען דעריבער גע-רופען „פאנג-צעלען“, אָדער „לאס-אַ-צעלען“.

די שפיין, וואָס עס קומט אַרײַן אין דעם מאַגען פון דער הידרא, ווערט באַפייכטעט דורך אַ פאַרדייאונגס-פליסיגקייט, וואָס מאַכע צעלען פון די ווענטעלעך פון מאַגען ענטהאַלטען. דורך



צײכנונג 15. — אַ הידראַ וואָס לעבט אין מײד-וואַסער (פּרײז-וואַסער). א, אַ גאַנצע ענטוויקעלטע הידראַ (25 מאל פאַרגרעסערט). ב און ג, די שמעל-צעלען פון דער הידראַ; ק, דער קערען פון דער צעלע; ד, אַ דורכשניט אין מיטען פון דעם קערפער פון דער הידראַ; מ, דאָס מויל פון דער הידראַ.


דיזע פארדייאונגס-פליסיגקייט ווערט דאָס שפייז צוברעקעלט אין קליינע טיילכעלעך און ווערט דורך די באוועגליכע הערעלעך, וואָס מאַנכע צעלען פון מאַגען באַזיצען, פארטיילט צווישען די אלע אנדערע צעלען פון דעם מאַגען, וואו זיי ווערען פאַלשטענדיג פאַרדייט. דאָס פאַרדייטע שפייז ווערט דאָן אַריינגעזויגען אין די פאַרשיידענע צעלען פון דער הידראָ'ס קערפער און פאַרוואַנד-דעלט זיך אין פראָטאָפלאַזמע, דאָס הייסט אין לעבענס-שטאַף.

דער פאַרמערהונגס פראָצעס. — ווען די הידראָ איז אויס-געוואַקסען און האָט גענוג נאָהרונג, וואַקסען פון איהר קערפער אַרויס קנאַספּען-עהנליכע אַרויסשפראַצונגען, וועלכע ענטוויקלען זיך און באַקומען די פאָרם פון אַ הידראָ, ביז זיי טיילען זיך אָפּ און פאַנגען אָן פיהרען אַ לעבען פאַר זיך. דיעזער פראָצעס פון פאַרמערהונג ווערט אָנגערופען אַסעקסועל (ניט-געשלעכטליך). אין מאַנכע פעלע אָבער קומט דער פאַרמערהונגס-פראָצעס פון די הידראָ פאַר דורך באַפרוכטעטע אויעלעך. אַזאָ פאַרמערהונגס-פראָצעס ווערט אָנגערופען סעקסועל (געשלעכטליך). סאי די אויעלעך און סאי די זרע, וואָס באַפרוכטעט זיי, ענטשטעהען אין דערזעלביגער הידראָ, אָבער די באַפרוכטונג קומט אימער פאַר, ווען אַן אויעלעך פון איין הידראָ טרעפט זיך מיט דער זרע פון אַן אנדער הידראָ. דאָס באַפרוכטעטע אויעלעך באַדעקט זיך מיט אַ פעסטע הייטעלע, לאָזט זיך דאָן אַרונטער אויפ'ן גרונד פון וואַסער און אין אַ משך פון אַ געוויסער צייט ענטוויקעלט עס זיך אין אַ קליינע הידראָ.

הידראָזאָען. — עס איז פריהער באַמערקט געוואָרען, אַז די הידראָ איז די איינפאַכסטע באַשעפעניש צווישען די צעלענ-טעראַטען (שלויך-חיות). עס זיינען אָבער פאַראַן פאַרשיידענע פאַרמען פון דעמזעלביגען קלאַס באַשעפענישען, וועלכע זיינען פיעל קאָמפּליצירטער ווי די באַשריבענע הידראָ. נאָר אזוי ווי זייערע פונדאַמענטאַלע כאַראַקטעריסטישע אייגענשאַפטען זיינען דיזעלכע ווי ביי דער הידראָ, האָט מען זיי אַ נאָמען געגעבען הידראָזאָען, אָדער הידראָ-עהנליכע באַשעפענישען.

די הידראָ, וועלכע איז דאָ פריהער באַשריבען געוואָרען, לעבט אין פרישען וואַסער, דאָס הייסט אין טייכען אָדער אין אַנערעס. די הידראָזאָען אָבער לעבען, מיט וועניג אויסנאַהמען, אין ים-וואַסער. מייסטענס געפינען זיי זיך ניט ווייט פון ברעג ים, וואו

ויערע פלאנצען-עהנליכע קערפערס זיינען באהעפט צו שטיינער,  
פעלזען, ים-גראַזען און צו די קערפער פון פארשיידענע ים-חיות,  
באזונדערס צו ראַקעס (קרעכסען) און שנעקען.  
מאכט פון די הידראָזאָען וואַסען אויס אזוי הויך ווי 25



צייכונג 16. — א טייל פון א הידראָזאָען קאלאָניע.  
א, די נאָטורליכע גרויס פון דער הידראָזאָע. ב, א טייל פון  
איהר שטאַרק פאָרגרעסערט; פ, א פאלשמענדיג ענטוויקעלמער  
פאלוף פון דער הידראָזאָע; ק, ניש קיין פאלשמענדיג ענטווי-  
קעלמע קנאָספע; ס, א מעהר ענטוויקעלמע קנאָספע. ג, א  
פריישווימענדע קנאָספע, וועלכע האט זיך אָפגעטיילט פון דער  
הידראָזאָע און פון וועלכער עס ענטוויקעלט זיך שפעטער א  
נייע קאלאָניע.

סענטימעטער (אן ערך צעהן אינטשעס) און זעהען אויס ווי קליינע בוימעלעך. אין זייער פריהער יונגענד זיינען זיי כמעט אינגאנצען עהנליך צו די הידרען, אָבער וואָס עלטער זיי ווערען, אַלץ ווע- ניגער ווערט זייער אויסערליכע עהנליכקייט צו די הידרען. די צווייגעלעך, וואָס וואַקסען אַרויס ביי די הידראָזאָען, אַלס זייערע קינדער, טיילען זיך פון זיי ניט אָפּ ווען זיי ווערען גרויס, ווי דאָס איז דער פּאַל ביי די הידרען. די קינדער פון די הידראָזאָען בלייבען ביי זייערע עלטערען, זיי שיידען זיך ניט מיט זיי, און ווען זיי ווערען גרויס, וואַקסען פון זיי אַרויס צווייגעלעך, דאָס זיינען זייערע קינדער. און אזוי וואַקסט זיך אַ הידראָזאָע פּאַנאַל- דער אין אַ פּעל פּאַרצווייגטען בויס, וועלכער שטעלט מיט זיך פּאַר אַ קאָלאָניע אָדער פּאַמיליע פון אור-עלטערען מיט אור- אייניקלעך, וועלכע זיינען צונויפגעוואַקסען צוזאַמען. די הידר- ראָזאָע לאָזט דערביי אַרויס פון זיך וואַרצעלע-עהנליכע אַרויס- שטאַרצונגען, וועלכע דרינגען אַרײַן אין דעם שטיין אָדער אין דעם ים-גראָז, אויף וועלכען די הידראָזאָע האָט זיך באַזעצט. אין דערזעלביגער צײַט ווערען די צעלען פון דעם אויסערען שיכט פון דער הידראָזאָע פּאַרהאַרטעוועט און זיי בילדען אַ האָרן-עהנ- ליכע הויט, וואָס באַדעקט דעם גאַנצען אָרגאַניזם פון דער באַ- שעפּעניש, אויסער איהר ענד-טייל, וואו עס געפינען זיך די פינ- גערלעך אָדער הערענדלעך, מיט וועלכע זי פּאַנגט איהר שפייז (ווי די הידראַ).

יעדער פון די צווייגען אָדער פּאַמיליען מיטגליעד פון דער הידראָזאָע האָט זיך זיינע אייגענע הערענדלעך צו פּאַנגען שפייז און זיין אייגענעם מאָגען, אָבער די מאָגענס פון אַלע פּאַמיליען- מיטגליעדער זיינען פּאַרבונדען איינע מיט די אַנדערע, און דאָס שפייז, וואָס ווערט געפּאַנגען פון איין מיטגליעד פון דער פּאַ- מיליע, ווערט פּאַרטיילט אין די מאָגענס פון אַלע אַנדערע מיט- גליעדער פון דער פּאַמיליע. די הידראָזאָען פּאַמיליען לעבען אין פּאַלשטענדיגער קאָמונע.

זשעלאַטין-פּיש. — צו די הידראַ-עהנליכע באַשעפּענישען אָדער הידראָזאָען באַלאַנגען אויך די מעדווען אָדער „זשעלאַטין- פּיש“ („דזשעלי-פּיש“), ווי זיי ווערען געוועהנליך גערופּען. דער שטאַם, פון וועלכען דער זשעלאַטין-פּיש וואַקסט אַרויס, איז עהנליך צו די הידראָזאָען פּאַמיליעס, וועלכע זיינען דאָ ערשט

באשריבען געוואָרען. זיי וואַקסען אין בוימער־עהנליכע פּאַרמען אויף פעלזען אָדער ים־גראַז, אָבער די פּרוכט זייערע, וואָס טייל לען זיך פון זיי אָפּ, באַקומען אַ גאַנץ אַנדער פּאַרם.

דער זשעלאַטין־פּיש, ווען ער דערגרייכט זיין פּאַלשטענדיגע ענטוויקלונג, האָט דאָס אויסזעהן פון אַ רונדער יאַרמולקע מיט אַ באַפּראַנזשעטען ראַנד. דעם נאָמען זשעלאַטין־פּיש האָט דיזע באַשעפעניש געקראָנען, ווייל די מאַסע, פון וועלכע איהר קערפּער באַשטעהט, האָט די פּאַרמע פון זשעלאַטין אָדער שטורענע. די דאָזיגע זשעלאַטין־מאַסע געפינט זיך צווישען צוויי הייטלעך, צוויי־שען דעם עקטאָדערם (אויסערליכע הייטעל) און דעם ענדאָדערם (אינערליכע הייטעל) פון דער באַשעפעניש און זי איז דורכזיכטיג.

ווען דער זשעלאַטין פּיש איז נאָך יונג איז זיין פּאַרם אַ גאַנץ אַנדערע, גאַנץ וועניג עהנליך צו די, אין וועלכער ער איז שפּעטער אויסגעוואַקסען. אין דעם אָנפאַנג פון זיין ענטוויקלונג, ווען ער פּאַנגט אָן אַרויסוואַקסען פון זיין אייעלע אין זיין על־טערנס שטאַם, זעהט ער אויס ווי אַ דיק שטעקעלע, וואָס ענט־וויקעלט זיך ביסלעכווייז אין די פּאַרם פון אַ יאַרמולקע מיט אַן עפענונג אין מיטען, וואָס דאָס איז זיין מויל. אַרום דעם ראַנד פון יאַרמולקע וואַקסען אויס הערעלעך, וועלכע צויען איהר אַרום ווי מיט פּרענוש. דאָס זיינען די הערענדלעך, מיט וועלכע דער זשעלאַטין־פּיש פּאַנגט זיין שפּייז. אין דיעזען צושטאַנד רייסט זיך דער יונגער זשעלאַטין־פּיש אָפּ פון זיין עלטערנס שטאַם און פּאַנגט אָן פּיהרען אַ לעבען פּאַר זיך. ער איז נאָך דאָן קליין, אָבער עס דויערט ניט לאַנג און ער וואַקסט אויס אין זיין פּולער גרויס.

דער זשעלאַטין־פּיש באַוועגט זיך אָדער שווימט דורך דעם וואָס זיין יאַרמולקע־עהנליכער קערפּער ציהט זיך צונויף און ציהט זיך פּאַנאָדער, עהנליך צו דער טיילווייזער עפענונג און שליסונג פון אַ רעגען־שירם.

אין מאַנכע גענענדען פון ים זיינען די זשעלאַטין־פּיש פּאַראַן אין אַזעלכע גרויסע מאַסען, דאָס גאַנצע מיילען פון ים זיינען מיט זיי געדיכט אָנגעפּילט.

דאָס לעבען פון די זשעלאַטין־פּיש איז קורץ. מאַנכע אַרמען פון זשעלאַטין־פּיש לעבען בלוז עטליכע שטונדען, מאַנכע לעבען ביז צוויי אָדער דריי וואָכען. אָבער אין דער קורצער צייט פּראָ־



דוצירען זיי אַ גרויסע צאָהל אייעלעך, פון וועלכע עס קומען אַרויס נייע קליינע באַשעפענישען, וועלכע זעצען זיך אָן אויף פעלזען אָדער ים גראַז און וועלכע ענטוויקלען זיך און וואַסען אויס אין בוימער-עהנליכע קאָלאָניעס, פון וועלכע די זשעלאַטין-פיש קומען שפעטער אַרויס.


ווי עס איז צו באַמערקען, זיינען די עלטערן פון די זשעלאַטין-פיש אַליין ניט קיין זשעלאַטין-פיש, נאָר בוימלעך-עהנליכע באַשעפענישען, וועלכע לעבען אין קאָלאָניעס, זייענדיג באַהעפט צו פעלזען אָדער ים-גראַז. פון די אייעלעך פון די דאָזיגע בוי-מעלעך-עהנליכע באַשעפענישען קומען אַרויס די זשעלאַטין-פיש און פון די אייעלעך פון די זשעלאַטין-פיש קומען ווידער צוריק אַרויס די בוימלעך-עהנליכע באַשעפענישען, וועלכע זיינען גלייך צו די עלטערען פון זשעלאַטין-פיש. מיר האָבען דאָ אַ מין באַ-שעפענישען, וואָס די קינדער זיינען ניט עהנליך צו זייערע על-טערען, אָבער די אייניקלעך ווערען צוריק עהנליך צו זייערע זיי-דעס. עס קומט ביי די זשעלאַטין-פיש פאָר אַ כסדר'דיגע ענדע-רונג אין דער אָפּשטאַמונג. פון די בוימלעך-עהנליכע באַשעפע-נישען קומען אַרויס די זשעלאַטין-פיש און פון די זשעלאַטין-פיש קומען אַרויס די בוימלעך-עהנליכע באַשעפענישען. מיר האָבען דאָ אַ כאַראַקטעריסטישע פאָרם פון צופאַסונג צום לעבען. ווען די פאַרמעהרונג פון די זשעלאַטין-פיש הידראָזאָען וואַלט פאָר-געקומען דירעקט דורך דער פאַרשפּרייטונג פון אַנדערע בוימלעך-עהנליכע קאָלאָניעס וואַלט, צוליב דער גרויסער פּרוכטבאַרקייט פון דיעזע באַשעפענישען, ניט נאָר זעהר גיך ענג געוואָרען פאַר זיי דער פּלאַץ, וואו זיי האָבען זיך באַזעצט, נאָר זיי וואַלטען אויך ניט געהאַט גענוג שפייז פאַר זייער נאַהרונג. דורך דעם אָבער וואָס זייער פאַרמעהרונג קומט פאָר אין דער פאָרם פון פריי שווימענדע זשעלאַטין-פיש, קענען נייע הידראָזאָען קאָלאָניעס געשאַפען ווערען אין פאַרשיידענע געגענדען פון ים, וואו עס איז פאַראַן גענוג פּלאַץ און גענוג שפייז.

די זשעלאַטין-פיש, וועלכע זיינען דאָ באַשריבען געוואָרען, זיינען נאָנץ קליין. עס זיינען אָבער פאַראַן אַזעלכע אַרטען זשע-לאַטין-פיש, וועלכע זיינען נאָנץ גרויסע. אַנדערע פון זיי זיינען אזוי גרויס, דאָס זייער דיאַמעטער דערגרייכט ביז צוויי מעטער (אן ערך 6 פוס). די קלענערע פון זיי זיינען פון אַ האַלבען פוס

ביז א פוס אין דיאמעטער. מיט זייער וויסענשאפטליכען נאָמען רופט מען זיי סיפאָזאָען. ביי די גרויסע זשעלאַטין־פּיש זיינען אחוץ די קליינע הערענדלעך אַרום דעם ראַנד פון זיין יארמולקע־עהנליכען קערפער אויך פאַראַן גרויסע, לאַנגע פינגער־עהנליכע אַרויסשטאַרצונגען, וועלכע קומען אַרויס פון די ראַנדען פון זיין מויל. זיי זיינען אָפט עטליכע פוס לאַנג. מיט זיי קען דער זשעלאַטין־פּיש פאַנגען זאָגאַר קליינע ראַקעס (קרעבסען) און קליינע פּישלעך פאַר זיין שפּיז. דערפאַר אָבער דיענען די זשע־




צייכנונג 18. — דער זשע־לאַטין־פּיש, וואָס האָט געקראָגען דעם נאָמען „פאַרטוגעזישע קריעגס־שיף“.




צייכנונג 17. — אַ פּרוי־שווימענדער זשעלאַטין־פּיש, וועלכער ווערט אָפט גערופען מיט דעם נאָמען „יס־לאַמפּ“.

לאַטין־פּיזש אַלס אַ שפּייז פאַר גרעסערע ים־באַשעפענישען, ווי וואַל־פּיזש און פאַרשיידענע אַנדערע מינים פּיזש וועלכע יאָגען זיך נאָך זיי און פאַרשלינגען זיי. עס איז אמת, אז קיין פּיעל נאָהרונגס־שטאַף קען אַ זשעלאַטין־פּיזש ניט געבען זיינע פּאַנגער, ווייל דער גרעסטער באַשטאַנד־טייל פון דעם קערפּער פון אַ זשע־לאַטין־פּיזש ענטהאַלט ביז 99 פּראָצענט וואַסער. נאָר ווי עס שיינט זיינען זיי אַ געשמאַקע שפּייז פאַר די פּיזש, וועלכע יאָגען זיך נאָך זיי.

די ענטוויקלונג פון די סיפּאָזאָען (די גרויסע זשעלאַטין־פּיזש) קומט פאַר גאַנץ אַנדערש ווי ביי די קליינע זשעלאַטין־פּיזש. די אייעלעך, פון וועלכע עס קומען שפעטער אַרויס די גרויסע זשע־לאַטין־פּיזש, בילדען זיך צוערשט אויס אין דער אינטערליכער שיכט פון דער הידראָזאָע, פון וועלכער זיי שטאַמען אָפּ. פון דער אי־נערליכער שיכט פאלען זיי אַריין אין דעם מאָגען פון דער היד־ראָזאָע, וואו זיי ענטוויקלען זיך אין אַ האָריגען זעקעלע, וועלכער באַשטעהט פון צוויי שיכטען, אין מאַנכע הינזיכטען עהנליך צו דער גאַפּאַנגס־ענטוויקלונג פון אַ יונגען שוואַם. דאן שווימט דער נייגעבאַרענער זשעלאַטין־פּיזש אַוועק פון זיינע עלטערען און באַד זעצט זיך אויף אַ פעלז אָדער אויף אַ ים־גראָז, וואו ער זעצט פאַרט זיין ווייטערדיגע ענטוויקלונג, ביז ער וואַקסט אויס אין אַ פּאַל־שטענדיגען זשעלאַטין־פּיזש. און די ווייטערדיגע ענטוויקלונג פון דעם נייגעבאַרענעם זשעלאַטין־פּיזש איז אַ גאַנץ אינטערעסאַנטע. זי קומט פאַר אויף דעם פּאַלגענדען אופן: צוערשט פּאַנגען זיך אָן באַווייזען אַ רייה קליינע גראָבענדלעך, וועלכע רינגלען אַרום דעם קערפּער פון דער יונגער באַשעפעניש. די גראָבענדלעך ווע־רען ביסלעכווייז אַלץ טיעפער ביז דער קערפּער פון דער באַשע־פעניש באַקומט די פּאַרם פון אַ זייל, וואָס איז צונויפגעשטעלט פון אַ רייה טעפלעך אָדער טיעפע טעלערלעך, וועלכע זייקען אַריינגעשטעלט איינע אין די אַנדערע. נאָכדעם פּאַנגט אָן איין טע־לערעל נאָכ'ן צווייטען זיך אויפצוהויבען פון דעם זייל און שווימט אַוועק. צוערשט דער אויבערשטער טעלערעל, נאָכדעם דער צוויי־טער א. א. וו. יעדער טעלערעל איז אַ זשעלאַטין־פּיזש, וועלכער האָט ניט די פּאַלשטענדיגע פּאַרם פון אַ דערוואַקסענעם, אָבער נאָך אַ ווייטערדיגער ענטוויקלונג באַקומט ער דעם פּאַלשטענדיגען אויסזעהן פון אַן אויסגעוואַקסענעם, גרויסען זשעלאַטין־פּיזש.




צייכונג 19. — די ענטוויקלונג פון א סיפאזאע זשעלאמיון-פיש, וועלכער ווערט גערופען „זון-פיש“. א, א פרוי-שווימענדע עמבריא פון זשעלאמיון-פיש; ב, דער יונגער אַנגעוואַקסענער זשעלאמיון-פיש; ג, די ענטוויקלונג פון מעלער-עהנליכע מיילען, וועלכע הויבען זיך אויף איינע נאך די אנדערע, שווימען אוועק און ענטוויקלען זיך אין זשעלאמיון-פיש; ד, א טייל פון די מעלערלעד האבען זיך שוין אויפגעהויבען און אַוועקגעשוואומען.



צייכונג 20. — א פאלשמעדיג-ענטוויקלטער זשעלאמיון זון-פיש, אומגעפער פעהר איין דריטעל פון זיין נאטירליכער גרויס.

פיעלע פון די גרויסע זשעלאטיין־פיש האָבען פאַרשיידענע קאָלירען און זיי זעהען אויס אין וואַסער זעהר שעהן. ווען זיי שוויימען אין קאָלאָניעס האָבען זיי דעם אויסזעהן פון בוקעטען בלומען, וועלכע זיינען געמאַכט פון דורכזיכטיגען קריסטאַל. די דאָזיגע שעהנע זשעלאטיין־פיש באַלאַנגען צו דעם גרופע מיט דעם נאָמען סיפאָנאָפאָרען.

די הירדראָזאָען זיינען אזוי פאַרשיידענארטיג, דאָס מען קען אָנצעהלען פון זיי איבער טויזענד פאַרשיידענע פאָרמען. ביי מאַנכע פון זיי געפינט מען אַ גאַנץ אינטערעסאַנטע צוטיילונג פון דער אַרבייט, וועלכע ווייזט אָן אויף אַ העכער ענטוויקעלטען



צייכונג 21. — א מעדווען קאלאָניע (זשעלאַטין פיש פון דער אַרדנונג סיפאָנאָפאָרען), נאַטירליכע גרויס. א, דער אויבערשטער טייל פון דער קאלאָניע; ב, זיינע מיילעד; ש, די שוויים־גלעקלעך פון די פּאַליפען; ע, די עפּנונגען פון די שוויים־גלעקלעך; פ, די פּיהל־פעדים (פּיהל־אַרגאַנען) פון דער קאלאָניע. ב, אַן אפּגעטויילטער, שטאַרק־פאַרגרעסערטער פּאַליפּ פון דער קאלאָניע; ש, זיין שוויים־גלעקעל; ז, די עפּנונג פון שוויים־גלעקעל פ, זיינע פּיהל־פעדים.


טיפ פון באשעפענישען. אויף די מושלען פון ים-שנעקען האָט מען אויסגעפונען אַ הידראָזאָע, וועלכע איז גאַנץ באַזונדערס באַ-לאַקטעריסטיש. זי איז גאַנץ קליין און פאַר'ן נאַקעטען אויג זעהט זי אויס ווי אַ קליינע איידעלע פלאַנצע. ווען אָבער מען באַ-טראַכט זי מיט אַ שטאַרקען פאַרגרעסערונגס-גלאַז, באַמערקט מען, אַז זי באַשטעהט פון אַ גאַנצע מענגע הידראָ-עהנליכע באַשעפעני-שען, וועלכע זיינען פאַראייניגט דורך אַ פאַרצווייגטען סיסטעם פון אויסגעהוילטע (מיט אַ חלל אין מיטען) וואָרצלען, וואָס פאַר-בינדט די מאָגענס פון דער גאַנצער פאַמיליע אָדער קאָלאָניע.

אייניגע אינדווידואַלס פון דער דאָזיגער הידראָזאָען קאָ-לאָניע האָבען הערענדלעך צו פאַנגען שפייז און אַ מויל, און זיינען עהנליך צו דער הידראַ. אַנדערע האָבען ניט קיין מויל און ניט קיין הערענדלעך, נאָר זיי האָבען שטעך-צעלען, ווי די הידראַ, צו שיצען זיך געגען שונאים. אַנדערע וויעדער האָבען ניט קיין מויל און ניט קיין שטעך-צעלען, נאָר זיי האָבען אַ גאַנצע מענגע קליינע אַרויסשטאַרצונגען, וועלכע ענטהאַלטען פאַרמערונגס-צעלען אָדער אייעלעך. די ערשטע, וועלכע האָבען אַ מויל און הערענדלעך צו פאַנגען שפייז, באַזאָרגען די קאָלאָניע מיט שפייז, וועלכע זיי פאַנגען און פאַרדייען און פאַרטיילען דורך דעם אויסגעהוילטען פאַרצווייגטען וואָרצל-סיסטעם צו די איבעריגע מיטגליעדער פון דער קאָלאָניע. די צווייטע, וועלכע האָבען די שטעך-צעלען, באַ-שיצען די קאָלאָניע פון אויסערליכע פיינד, זיי זיינען עס די שוין-וואָך אָדער די סאָלדאַטען פון דער קאָלאָניע. די דריטע פראָדור צירען אייער, פון וועלכע נייע באַשעפענישען וואַסען אַרויס און האַלטען אויף זייער מין.

די ים-אַנעמאָנען אָדער ים-רויזען. — אַן אינטערעסאַנטער טיפּ פון די הידראָזאָען זיינען די ים-אַנעמאָנען. זיי האָבען אַ גרויסע עהנליכקייט צו דער הידראַ, אָבער זיי זיינען פיעל גרעסער פון איהר. די ים-אַנעמאָנען וואַסען אויס אין אַ גרויס פון 1 סענטיממעטער ביז 45 סענטיממעטער (אַ האַלבער אינטש ביז אַנדער-האַלבען פוס) אין דיאַמעטער. זיי האָבען דעם אויסזעהען פון רויזען און האָבען אַפט זעהר שעהנע פאַרשידענאַרטיגע קאָלירען. מען רופט זיי דעריבער ים-רויזען. פון זייער אויסערליכען אויס-זעהן קען מען זיי אָננעהמען פאַר וואַסער-פלאַנצען אָדער וואַסער-בלומען, אין דער ווירקליכקייט אָבער זיינען זיי לעבעדיגע באַ-

שעפענישען, וועלכע האָבען אַ מויל מיט אַ מאַגען, ווי די אַנדערע הידראָזאָען, וועלכע זיינען פריהער באשריבען געוואָרען. די ים-אַנעמאָנען פאַנגען זייער שפייז אויף דעמזעלביגען אופן ווי די הידרא, מיט דער הילף פון פאַנגהערענדלעך, וועלכע זיי האָבען אין אַ גרויסער צאָהל. די ים-אַנעמאָנען נעהרען זיך פון קליינע קרעפסען אָדער פישלעך, וועלכע זיי פאַנגען מיט זייערע פאַנג-הערענדלעך. זיי האָבען אויך שטעך-צעלען, מיט וועלכע זיי שיצען זיך געגען אָנגרייפערע פייגל.

די פאַרמעהרונג פון די ים-אַנעמאָנען קומט פאַר דורך אייעלעך, וועלכע געפינען זיך אין אַ געוויסען טייל פון קערפער פון דער באשעפעניש און ווערען דאָרטען אויסגעבריהט און ענט-




צייכנונג 22. — אַ ים-אַנעמאָנע, אָדער ים-רויז.

וויקעלט. ווען די נייע אויסגעבריהטע ים-אַנעמאָנען זיינען שוין אויף אזוי פיעל אויסגעוואַקסען, אז זיי קענען שוין אָנפאַנגען פיהרען אַ לעבען פאַר זיך, פאַרלאָזען זיי דעם קערפער פון זייערע עלטערען, אַרויסקריבענדיג דורך די עפענונג פון זייער מויל, און שווימען אוועק זוכען אַ פאַסערען פלאַץ, וואו זיך צו באַזעצען און צו פאַרבלייבען. ביי מאַנכע ספעציעס פון די ים-אַנעמאָנען קומט די פאַרמעהרונג פאַר, ווי ביי די הידראַס, דאָס הייסט ניט דורך אייעלעך, נאָר דורך אַן אַרויסוואַקס פון דעם קערפער פון דער באשעפעניש.

די קאָראַלען. — עהנליך צו די ים-אַנעמאָנען זיינען די

קאראלען פאליפען. דער נאָמען „קאראלען“ איז גוט באקאנט פון די פארשיידענע ציערונגס־זאכען וואָס ווערען געמאכט פון די פעסטע סקעלעמען, וועלכע די קאראלען פאליפען באשאפען אַלס שטיצע און שוץ פאַר זייערע קערפערס. די סקעלעמען באשטעהען פון אַ האַרטען, שטיינערדיגען שטאַף, מייסטענס פון אַ רויטליכען אָדער העל־ראַזען קאָליר און דיענען אַלס קאָסטבארער מאַטעריאַל אויסצואַרבייטען פון איהם פארשידענע צירונגס־זאכען, ווי שנור־לעך, קארעלען, בראָשען א. א. וו.




צייכנונג 23. — די ענטוויקלונג פון אַ קאראל פאליפ. א, די גאַסט־רילא (די עמבריאָ פון קאראל פרוי שווימענדיג); ב, דער יונגער פאליפ אין 12 טיילען; ג, דער יונגער פאליפ אין זיין ווייטערדיגער ענטוויקלונג; ד, די אַנפאַנג בילדונג פון קאראל אין זיין פארבינדונג מיט קאלך.

צייכנונג 24. — א טייל פון אַ קאראלען קאלאניע.


די קאראלען פאליפען פארמעהרען זיך דורך אַרויסוואקסען פון זייער קערפער, וועלכע בלייבען באהעפט צו זיי אפילו ווען זיי וואקסען אויס גרויס. פון די אַרויסוואקסען קומען אַרויס אנדערע אַרויסוואקסען און אויף אזא אופן ענטוויקעלט זיך אַ קאראלען קאלאניע, וואָס זעהט אויס ווי אַ פיעל פאַרצווייגטער בויס. יעדער קאראלען פאליפ פראָדוצירט כסדר פון דעם אויבערשטען שיכט פון זיין קערפער דעם שטאַף פון דעם סקעלעט, וואָס באַדעקט די קאראלען קאלאניע ווי מיט אַ דעקע, בלויז די ענדען פון די צווייגען,



וואו עס געפינט זיך דאָס מויל און די פאנגהערענדלעך פון די קאָראַלען־פּאָליפען, זיינען ניט באַדעקט. די קאָראַלען־פּאָליפען געפינען זיך אין פאַרשיידענע טיילען פון די ימים, ביי די ברעגען און אין די גרעסטע טיעפענישען. מעהר ווי אומעטום אָבער געפינען זיי זיך אין די וואַסערען פון די טראָפישע (הייסע) געגענדען. זיי וואַסען דאָרטען אומגע־פעהר אין אַ טיעפעניש פון זעכציג ביז הונדערט פוס. אין מאַנכע ערטער, וואו דאָס וואַסער איז רוהיג, וואַסען זיי זיך פאַנאָנדער אין גרויסע, געדיכטע אונטערוואַסערדיגע וועלדער. אין די ער־טער אָבער, וואו די וואַסערען זיינען ניט קיין רוהיגע, ווערען די




צייכונג 25. — פאַרשיידענע אַרטען קאָראַלען. א, ראָהר קאָראַלען; ב, איינפאַכע קאָראַלען־פּאָליפען; ג, רויטע אָדער ראַזע קאָראַלען (וועלכע ווערען געבראַכט אין האַנדל פאַר פאַר־שוידענע ציערונג).



צייכונג 26. — אַ לעבעדיגע קאָראַלען קאלאָניע.

קאראלען בוימער באשטענדיג צובראָכען און צוריקען פון די כוואַ-  
ליעס, וועלכע טראָגען זיך איבער זיי. פון די צובראָכענע און צו-  
ריבענע קאראלען-בוימער, האָבען זיך אָנגעקליבען אין מאַנ-  
כע פלעצער פון ים, וואו די קאראלען-פאָליפען האָבען ענטווי-  
קעלט גרויסע קאָלאַניעס, אזעלכע גרויסע מאַסען, דאָס צוזאַמען  
מיט די מושלען פון די פארשיידענע מאָלוסקען און די סקעלעמען  
פון די פארשיידענע פראַטאָזאָען, זיינען געשאַפען געוואָרען גאַנץ  
באַדייטענדע אינזלען. ביי דעם ים-ברעג פון דעם שטאַאַט פלאָ-  
רידא, אין די פאראייניגטע שטאַאַטען פון אמעריקא, און אין דעם



צייכונג 27. — א קאראלען-אינזלעל.

פאָסיפישען ים געפינען זיך קאָהאַלען אינזלען, וואָס מאַכע פון  
זיי פארנעהמען אַ שטח פון עטליכע הונדערט מייל.  
ווי עס איז צו זעהן פון דעם לעבען פון די הידראָס, פון די  
הידראָזאָען, די קאראלען און זשעלאַטין-פיש, עקזיסטירען ביי זיי  
שוין פיעל-קאָמפליצירטערע לעבענס-פאָרמען, ווי ביי די קאָלאַניען-  
פראַטאָזאָען און שוואַמען. זיי האָבען שוין פארשיידענע אָרגאַ-  
נען פאר פארשיידענע לעבענס-פונקציעס און עס עקזיסטירט צוויי-  
שען די אָרגאַנען אַ געוויסע ארבייטס-פארטיילונג.

## אַכטער קאפיטעל.

ולאָדווערם. — זייער פאַרדייאונגס־סיסטעם. — זייער נערווען־סיסטעם.  
— פאַראַזיטישע פלאַך־ווערם. — זייער ענטוויקלונג. — באַנד־ווערם.  
— רונד אָדער פעדים ווערם. — ערד־ווערם. — ים־ווערם. — פּיאָור  
קעס. — ראַטיפּערען. — געפירעען. — לאַמפּען־מושלען.

## די ווערם.

די פלאַך־ווערם. — אַ באַדייטענדע שטופּע העכער אין דעם  
זעניגרייך פון די לעבעדיגע ברואים שטעהען די ווערם. אין פאַר־  
לײך מיט די נידעריגע וואַסער־באַשעפענישען, וועלכע זיינען ביז  
איצט באַשריבען געוואָרען, זיינען די ווערם פּיעל מעהר ענטווי־  
קעלטערע, פּיעל מעהר קאָמפּליצירטערע און פּיעל מעהר פּאַלקאַ־  
מענערע באַשעפענישען, מיט פאַרשיידענע אָרגאַנען פאַר באַווע־  
נונג, פּיהלען, זעהן, אָריענטירונג א. אַז. וו. די פאַרשיידענע פּראָד־  
טאַזאַען און הידראָזאַען, וועלכע זיינען ביז איצט באַשריבען גע־  
וואָרען, זיינען אויסערלײך זעהר וועניג עהנלײך אויף לעבעדיגע  
באַשעפענישען, לויט דעם באַגריף, וואָס דער דורכשניטליכער  
מענש האָט וועגען לעבען. די ווערם אָבער זיינען אויסגעשפּראַך  
בענע לעבעדיגע ברואים, מיט אויסגעשפּראַכענע לעבענס־פּונקציעס,  
וואָס יעדער קען זעהן.

די ווערם ווערען איינגעטיילט אין מעהרערע גרופּען, לויט דער  
פּאַרמע פון זייער קערפּער און דער איינאָרדנונג פון זייערע אַי־  
נערליכע אָרגאַנען. די וויכטיגסטע גרופּען זיינען די פלאַך־ווערם,  
די רונד־ווערם און די רינגעל־ווערם.

די פלאַך־ווערם זיינען, ווי זייער נאָמען צייגט אָן, פלאַך און  
פלאַטשיג און האַבען די פּאַרם פון בלעטער. מאַנכע פון זיי לעבען  
אין זומפּען און פּייכטע ערד, אין טייכען, אין לוזשעס און ביי די  
ברעגעס פון ים. אַנדערע וויעדער פּיהרען אַ פאַראַזיטען לעבען.  
זיי לעבען אין די קערפּערס פון אַנדערע באַשעפענישען, פון וועלכע  
זיי ציהען זייער חיונה. די ערשטע זיינען מייסטענס פון קליינעם  
וואַוקס, זיי דערגרייכען קוים די לענג פון פינג ביז זיעבען סענ־  
טימעטער (פון 2 ביז 3 אינמיטשע), די צווייטע אָבער, די פאַראַזי־

טען, דערגרייכען אָפט אַ לענג פון זעקס ביז דרייצעהן מעטער (פון 20 ביז 40 פוס).

די יעניגע פלאַך־ווערם, וועלכע לעבען אין פרייען, ניט אין די קערפערס פון אנדערע באשעפענישען, קלייבען זיך מייסטענס אויס זייער וואוינונגס־אָרט אונטער אַ שטיין. מאַנכע פון זיי זיי-נען אזוי דעליקאַט, דאָס איין לייכטער ריהר מיט'ן פינגער מאַכט אַ סוף פון זייער לעבען. מאַנכע פון זיי זיינען כמעט קאָלירלאָז און דורכזיכטיג, אנדערע וויעדער האָבען אזעלכע קאָלירען, וועלכע שטימען מיט די קאָלירען פון דער אומגעבונג, וואו זיי געפינען זיך. די צופאַסונג פון קאָליר צו דער אומגעבונג איז די בעסטע שוץ פאַר די דאָזיגע שוואַלע און אומבאוואַפענטע באשעפענישען נענען אַן אַנגריף פון זייערע פיינד. צוליב זייער קאָליר, וואָס



צייכונג 28. — פלאַך־ווערם. דער אויבערשטער איז אַ ים־פלאַך־וואָרם; דער אונטערשטער אַ פּרוש־וואָסער פלאַך־וואָרם (ביידע פארגרעסערט).

איז צוגעפאַסט צו זייער אומגעבונג, באַמערקט מען זיי ניט. זייער שפייז געהען זיי אַרויס זוכען ווען עס קומט אָן די נאַכט, אָדער אין דונקעלע טעג. ווען מען בעאַבאַכטעט זייער באַוועגונג, זעהט מען, אַז זי איז מעהר עהנליך צו אַ גליטשען זיך ווי צו אַ קריכען. אויפ'ן וועג פאַנגען זיי וואָס עס מאַכט זיך זיי, קליינע ווערמלעך, שנעקען אָדער אינזעקטען, וועלכע זיי געפרויכען אַלס זייער שפייז. אונטערזוכענדיג די דאָזיגע סאַרטען פלאַך־ווערם, וועלכע מען קען לייכט געפינען אונטער די שטיינער פון ניט טיעפע טייכען, באַמערקט מען, אַז זייער פאָדערשטער טייל איז נאָך ניט פאָל־שטענדיג ענטוויקעלט אין אַ קאָפּ, ווי דאָס איז דער פאַל ביי די העכער ענטוויקעלטע ווערם גרופען. דער קאָפּ פון די דאָזיגע


פלאך-ווערם איז אָבער שוין גענוג קענטיג דורך די אויגען און ד. פיהל-הערענדלעך, וואָס זיי האָבען אין דעם פאָדערשטען ענד פון זייער קערפער, פון אויבען, און דורך אַ קליינע עפענונג, דאָס מויל, פון אונטען.

ביי די קליינע פלאך-ווערם איז דאָס פאָרדייאונגס סיסטעם גאַנץ איינפאך. עס באַשטעהט אינגאנצען פון איין קאנאַל, אָהן שום פאַרצווייגונגען. מען קען זאָגען, אַז דאָס פאָרדייאונגס-סיסטעם באַשטעהט בלויז פון אַ מאַגען אָהן אַנדערע געדערס. ביי די גרעסערע פלאך-ווערם איז אָבער דאָס פאָרדייאונגס-סיסטעם שוין קאָמפליצירטער. פון דעם שפייז-קאנאַל אָדער זאָגענאנטען מאַגען געהען אַרויס פאַרשיידענע פאַרצווייגונגען, וועלכע פאַר-שפרייטען זיך אין פאַרשיידענע טיילען פון קערפער, וואוהין זיי בריינגען דאָס פאָרדייטע שפייז.

די פלאך-ווערם האָבען אויך אַ ספעציעלען אָרגאַן פאַר דער אויסשיידונג פון דעם אָפפאַל פון די פאַרדייטע שפייזען פון קער-פער. די שוואַמען און די צעלענטעראַמען האָבען ניט קיין ספע-ציעלען אָרגאַן פאַר דער אויסשיידונג פון אָפפאַל. די אויסשיידונג פון אָפפאַל קומט ביי זיי פאַר דורך די פאַרשיידענע צעלען פון זייער קערפער, אָהן אַ ספעציעלען אויסשיידונגס-אָרגאַן פאַר דעם צוועק. ביי די פלאך-ווערם אָבער זיינען פאַראַן ספעציעלע אויס-שיידונגס-אָרגאַנען, וועלכע זיינען פאַרצווייגט כמעט איבער זייער גאַנצען קערפער. מאַנכע פאַרצווייגונגען פון די אויסשיידונגס-אָרגאַנען האָבען עפענונגען אין דער אויבערפלעכע פון דעם קערפער פון וואָרם, דורך וועלכע דער אָפפאַל פון די פאַרדייטע שפייזען ווערט אויסגעשיידט, וועהרענד די אַנדערע פאַרצווייגונגען האָבען זייערע עפענונגען אין די אינערליכע טיילען פון וואָרם קערפער. זיי ענדיגען זיך אין די חללים (אויס-הוילונגען), וועלכע געפינען זיך צווישען די אָרגאַנען פון וואָרם, וועלכע ווערען אָנגערופען פלאַם-צעלען. דער אָפפאַל פון דער פאַרדייטער שפייז, וואָס ווערט געבראַכט פון די פאַרצווייגונגען פון דעם אויסשיידונגס-סיסטעם אין די דערמאָנטע חללים, ווערט שפעטער אויפגעזאַמעלט אין דעם חלל פון די פלאַם-צעלען און פון דאָרטען ווערט דער אָפפאַל אַרויס-געשטויסען נאָך אויסען דורך די באַוועגונגען פון אַ בייטש-עהנ-ליכען הערעלע, וואָס געפינט זיך אין דעם חלל פון די פלאַם-צעלען. דער נאָמען „פלאַם-צעלען“ קומט טאַקע פון דעם דאָזיגען בייטש-

עהנליכען הערעלע, וואָס זיינע באַוועגונגען זיינען עהנליך צו דעם ציטערען פון אַ פּלאַם אין ווינט.


די פּלאַך־ווערם האָבען אויך אַ באַשטימטען נערווען־סיסטעם, וואָס האָט זיין צענטער אין קאָפּ, וואו די אויגען געפינען זיך. ביי די באַשעפענישען, וועלכע זיינען פריהער באַשריבען געוואָרען, האָט מען ניט אויסגעפונען אַזעלכעס, וואָס זאָל קענען אָנגערופען ווערען נערווען־סיסטעם. ביי מאַנכע צעלענטעראַטען האָט מען אויסגעפונען אַזעלכע צעלען אין קערפּער, וועלכע קענען אָנגערופען ווערען נערווען־צעלען. די דאָזיגע צעלען זיינען אויך מעהר אָדער וועניגער פאַרבונדען צווישען זיך מיט נערווען־פּעדימלעך, אָבער מען קען עס דאָך נאָך ניט אָננעהמען אַלס אַ באַשטימטען נערווען־סיסטעם. ביי די פּלאַך־ווערם אָבער איז דאָס נערווען־סיסטעם



צייכונג 29. — א, דער נערווען־סיסטעם פון אַ פּרישוואַסער פּלאַך־וואָרם; ב, זיין פאַרדייאונגס־סיסטעם; ש, די פּלאַם־צעלען.

פּאַלשטענדיג באַשטימט. אין דעם קאָפּ פון דעם פּלאַך־וואָרם, אין דעם פּלאַץ, וואו די אויגען געפינען זיך, זיינען קאָנצענטרירט צוויי גרופען נערווען־צעלען, פון וועלכע עס געהען אַרויס בינמלעך נערווען־פּעדים, וועלכע פאַרצווייגען זיך איבער'ן גאַנצען קערפּער פון וואָרם. די דאָזיגע נערווען־פּעדים רעגולירען די טעטיגקייט פון די מוסקולען און פון די אָרנאָנען פון דעם וואָרם און גיבען איהם אויך די מעגליכקייט צו עמפּינדען אָדער צו פיהלען יעדע באַ־ריהרונג פון אויסען. די פיהלס־נערווען אָדער עמפּינדונגס־נערווען געפינען זיך אין דער הויט און אין דעם פּאָדערשטען טייל פון דעם וואָרם. די נערווען, וועלכע זיינען פאַרבונדען מיט די אויגען, גיבען דעם וואָרם די מעגליכקייט צו אונטערשיידען צוויי־

שען ליכט און פינסטערניס. עם ווערט אויך אָנגענומען, אַז דאָס נערווען־סיסטעם פון וואָרם גיט איהם אויך די מעגליכקייט, הגם אין אַ גאַנץ קליינעם גראַד, צו דערשמעקען אַ ריח און צו פיהלען אַ טעם. אויף דעם אופן באַזיצען די פלאַך־ווערם פיער פון די פינף חושים, נעמליך: חוש הראייה (זעהן), חוש המשוש (עמפּינד־ליכקייט פון טאַפּען), חוש הריח (ריכען) און חוש הטעם (געשמאַק). עם פעהלט איהם בלויז דער חוש השמיעה (געהער), קיין געהערס־אָרגאַנען האָט ער ניט.



צייכונג 30. — אַ פאַראַזיטישער פלאַך־וואַרם (שמאַרק פאַרגרעסערט). מ, זיין מויל; ע, די עפענונג פון זיינע פרוכט־פערונגס־אָרגאַנען; ק, זיין זויג־אָרגאַן און די קרום־שקלעך, מיט וועלכע ער פרעסט זיך איין אין פרעמדען קערפער. (דאָס נערווען־סיסטעם איז געצייכענט שוואַרץ, דאָס פאַרדייאונגס־סיסטעם איז פונקטירט).


**פאַראַזיטישע פלאַך־ווערם.** — עם זיינען פאַראַן אַזעלכע פלאַך־ווערם, וועלכע לעבען אויף דעם חשבון פון אַנדערע לעבע־דיגע באַשעפענישען. אַנדערע פון זיי באַזעצען זיך אין די מושלען פון געוויסע שנעקען אָדער אויף די קערפערס פון שטערען־פּיש, וואו זיי זיינען זיכער פון פיינד און קענען אָהן געפאַהר זאַמלען זייער שפּיז. די דאָזיגע פלאַך־ווערם זיינען בלויז האַלבע פאַראַ־זיטען. זיי באַנוצען זיך בלויז מיט אַ פרעמדענס מושעל אָדער מיט אַ פרעמדענס קערפער פאַר אַ דירה. זיי ציהען אָבער ניט זייער חיונה פון דעם זאַפט פון די שנעקען אין וועמענס מושלען זיי באַזעצען זיך אָדער פון דעם שטערען־פּיש, אויף וועמענס קער־

פער זיי האָבען זיך באַזעצט. עס זיינען אָבער פאַראַן פּלאַך־ווערם, וועלכע זיינען פּאַלשטענדיגע פאַראַזיטען, וועלכע עסען זיך איין אין דעם קערפּער פון פרעמדע לעבעדיגע באַשעפענישען און ציהען פון זייער זאַפט זייער חיונה. די דאָזיגע פאַראַזיטישע פּלאַך־ווערם האָבען זיך גאַנץ באַדייטענר געענדערט, אונטער די באַדינגונגען וואָס זיי קומט אויס צו לעבען, פון זייערע אור־עלטערען, די איינ־פאַכע פּלאַך־ווערם, פון וועלכע זיי שטאַמען אַרויס. לעבענדיג אויף אָדער אין אַ פרעמדען קערפּער און ציהענדיג פון איהם זייער חיונה, זיינען ביי די פאַראַזיטישע פּלאַך־ווערם פאַרשוואַנדען זייערע באַוועגונגס־אַרגאַנען. זיי זיינען פאַר זיי ניט נויטיג, זיי דאַרפען זיך ניט באַוועגען פון פּלאַץ צו פּלאַץ צו זוכען זייער חיונה. אַנשטאַט די פאַרשוואַנדענע באַוועגונגס־אַרגאַנען האָט זיך ביי זיי ענטוויקעלט אַנדערע אַרגאַנען, וועלכע זיינען נויטיג פאַר זייער פאַראַזיטישע לעבענס־באַדינגונגען. עס האָט זיך ביי זיי ענטוויקעלט אַזעלכע אַרגאַנען, מיט וועלכע זיי זאָלען זיך קענען פעסט האַלטען אין דעם פרעמדען קערפּער, פון וועלכען זיי לעבען. זיי האָבען אַזעלכע קרוטשעקלעך אָדער שטעכערלעך, מיט וועלכע זיי עסען זיך איין אין דעם פרעמדען קערפּער, און אַ זויג־אַרגאַן צו זויגען דעם זאַפט פון דעם פרעמדען קערפּער פאַר זייער חיונה.

די ענטוויקלונג פון די פאַראַזיטישע פּלאַך־ווערם — די ניי־געבאַרענע דורות פון פאַראַזיטישע פּלאַך־ווערם, וועלכע לעבען אַ ו י פּ דעם קערפּער (ניט אינעוועניג) פון אַ פרעמדער באַשע־פעניש, זיינען ניט געצוואַונגען צו בלייבען לעבען אויף דעם זעלבי־גען קערפּער, וואו זייערע עלטערען לעבען. די יונגע אויסגעבריה טע פאַראַזיטישע פּלאַך־ווערם קאָנען לייכט אַוועקוואַנדערען פון זייער עלטערנס היים און אויסזוכען פאַר זיך אַ קערפּער פון וועל־כער עס איז באַשעפעניש, וואו זיך צו באַזעצען. דאָס איז אָבער פיעל שווערער אַזוי צו טאָן פאַר דעם יונגען דור פון די פאַראַזי־טישע פּלאַך־ווערם, וועלכע לעבען אַ י ז דעם קערפּער, אין די נעדערס פון אַ באַשעפעניש. פאַר זיי איז שוין ניט אַזוי לייכט אויסצוגעפינען אַ נייע היים וואו זיך צו באַזעצען. די צופאַסונגס־פעהינקייט פון דער נאַטור האָט אָבער אויך דאָ געפונען אַ מיטעל ווי אַזוי אויפצוהאַלטען דעם מין. דער מיטעל איז זעהר אַ פאַר־שווענדערישער, ווי דאָס איז אָפט דער פאַל אין דער נאַטור, אָבער ער עררייכט דעם געווינשטען רעזולטאַט.



כדי פארטזועצען דעם מין, לעגען די פאראזיטישע פלאך-ווערים א ריעזיגע צאהל אייעלעך און ווען אפילו די גרעסטע צאהל פון זיי געהט פרוכטלאז פארלאָרען, האָבען אָבער אייניגע פון זיי א שאַנס דורך אַ צופאַל צו געפינען זייער וועג אין אַ פרעמערן קערפער און דאָרטען פאָרטזועצען זייער מין. אַלס אַ ביישפּיעל קאָנען די פאראזיטישע פלאך-ווערים, וועלכע לעבען אין די גאַל-קאַנאַלען פון שעפּסען. יעדער פון די דאָזיגע ווערם לעגט אויס עטליכע הונדערט טויזענד אייעלעך, וועלכע ווערען שפעטער אויסגעשיעדען פון דעם שאַפּס קערפער, און ווען אייניגע פון די דאָ-זיגע אייעלעך האָבען אַ געלעגנהייט אַריינצופאַלען אין אַ לוזשע, אַין אַ זומפ אָדער אין וועלכען עס איז פייכטען פלאַץ, דאַן קענען זיי זיך ענטוויקלען, ווען די אַרומיגע באַדינגונגען זיינען פאַר זיי גי-סטיג. געפינענדיג זיך אין וואַסער אָדער אין זומפ, קריכט דאָס



צייכונג 31 — אַ לעבער-וואַרם (א פאראזיטישער פלאך-וואַרם, וואָס לעבט אין דעם לעבער פון אַ שעפּס). א, דאָס אויסזעהן פון וואַרם איידער ער איז אַריינגעקומען אין לעבער פון שעפּס; ב, זיין אויסזעהן נאַכדעם ווי ער האָט זיך שוין אין לעבער באַזעצט.

יונג ווערימעל אַרויס פון דעם היימעל פון אייעלע און פאַנגט אָן אַרומשווימען אָדער אַרומקריכען אָהן אַ אָפרוה ביז עס באַגעגענט אַ געוויסען זאָרט שנעק און עס באַזעצט זיך אין זיין קערפער. אין אַ קורצער צייט אַרום ווי דער יונגער וואַרם האָט זיך באַזעצט אין דעם קערפער פון דעם שנעק, קומט פון איהם אַרויס אַ נייער וואַרם, וועלכער איז עהנליך צו אַ פראַשוואַרם (איינער פון די ערשטע שטופען אין דער ענטוויקלונג פון אַ פראַש). דער דאָ-זיגער נייער וואַרם פאַרלאָזט דעם קערפער פון שנעק, קריכט אַרויף אויף אַ גראַז און באַדעקט זיך דאָרטען מיט אַ האַרטען שאַלאַכץ, וואו ער קאָן אין אַזאַ צושטאַנד אָפּליגען עטליכע וואָכען. ווען אַ שעפּס עסט אויף דעם דאָזיגען גראַז, האָט דער יונגער פאראזיט ענדליך ערריכט זיין ציעל. ער קומט דאַן אַריין אין דעם גאַל-קאַנאַל פון שעפּס, באַזעצט זיך דאָרטען און וואַקסט אויס אין אַ פאַלשטענדיגען פאראזיט, געראַטען אין זיינע עלטערען.

דער דאָזיגער לאַנגער, גערעהטער וועג, וואָס דער דאָזיגער פאַראַזיט האָט געדארפט דורכמאַכען, ביז ער זאָל ענדליך ערריי- כען זיין ציעל, באַווייזט וואָס פאַר אַ וואונדערליכע פעהיגקייט לע- בעדיגע באַשעפענישען באַזיצען זיך צוצופאַסען צו די באַדינגונג- גען, וועלכע רינגלען זיי אַרום, כדי צו עקזיסטירען און פאַרטצווע- צען זייער מין.

די באַנד-ווערם. — צווישען די פאַראַזיטען-ווערם צייכענען זיך באַזונדער אויס די באַנד-ווערם (צעסטאָדען), וועלכע האָבען פאַרשידענע פאַרמען. די באַנד-ווערם מאַכען זיך זייערע נעסטען אין די געדערס פון די העכערע מינים חיות, אין די ווערטעבראַ- טען (די חיות וואָס האָבען אַ רוקען-ביין) און אויך אין די געדע- רים פון מענשען. די שוויין-באַנד-ווערם, אָדער ווי זיי רופען זיך מיט זייער וויסענשאַפֿטליכען נאָמען „טעניאַ סאַליאַום“, זיינען עס די איינוואוינער פון די מענשליכע געדערס. מאַנכע פון די דאָ- זיגע שוויין-באַנד-ווערם זיינען זעהר לאַנגע, אנדערע דערגרייכען אַ לענג פון 16 מעטער (אַן ערך 50 פוס). דער קערפער פון אַ שוויין-באַנד-וואָרם האָט די עהנליכקייט צו אַ באַנד, צונויפגע- שטעלט פון פלאַכע רינגעלעך, וועלכע ווערען אַלץ קלענער ביז זיי קומען צום ענד, וועלכער לאָזט זיך אויס מיט דעם „קאָפּ“ פון וואָרם.


ווען מען אונטערזוכט דעם באַנד-וואָרם אונטער אַ פאַרגרע- סערונגס-גלאַז, באַמערקט מען, אַז פון דעם מאַרד פון זיין „קאָפּ“ ציהען זיך נערווען איבער דעם גאַנצען לענג פון זיין קערפער. דער „קאָפּ“ אין קערפער פון באַנד-וואָרם האָט אַ גאַנצע רייע פאַרשידענע קרוטשקעלעך, שטעכערלעך און זויג-אַרגאַנען מיט וועלכע ער עסט זיך איין אין די געדערס און מיט וועלכע ער זויגט דעם זאַפט פון זיי.

יעדעס רינגעלע פון דעם באַנד-וואָרם ענטהאַלט אין זיך אַ פאַלשטענדיגען רעפראָדוקציע-אַנס סיסטעם, דאָס הייסט, אַז עס האָט אין זיך אַי מענליכע אַי ווייבליכע געשלעכטס-אַרגאַנען און יעדעס רינגעלע קאָן פיהרען אַ לעבען פאַר זיך און זיך פאַרמעהרען, ווען עס טיילט זיך אַפילו אָפּ פון די איבריגע.

די ענטוויקלונג פון דעם באַנד-וואָרם איז זעהר אַן אינטע- רעסאַנטע. עס איז שוין באַמערקט געוואָרען אַז יעדעס רינגעלע פון וואָרם ענטהאַלט אין זיך ביידע געשלעכטליכע אַרגאַנען, מענ-

ליכע און ווייבליכע, אָבער זיין רעפּראָדוקציע־אָנס טעטיגקייט קען זיך ענטוויקלען בלויז, ווען עס טיילט זיך אָפּ פון די אַנדערע רינגער־לעך פון וואָרם, ווערענדיג אויסגעשידען פון די געדערם פון דער באַשעפעניש, אין וועלכע עס האָט זיך פריהער געפונען און אריינגעקומענדיג אין די געדערם פון אַן אַנדער באַשעפעניש.

יעדעס רינגעלע איז פול מיט קליינציגע אייעלעך. די רינגעלעך, וועלכע ווערען רייה, טיילען זיך אָפּ פון די אַנדערע און ווערען אַרויסגעשטויסען פון די געדערם פון דער באַשעפעניש, וואו זיי האָבען געלעבט. די אַרויסגעשטויסענע רינגעלעך שטאַרן בען אין אַ קורצע צייט אָפּ און די אייעלעך, וואָס זיי האָבען ענט־



צייכונג 32. — א, אַ באַנד־וואָרם (נאַטירליכע גרויס). ק, זיין „קאָפּ“; ב, אַן אָפּגעטיילטער אויפגעשניטענער סעגמענט (טויול) פון באַנד־וואָרם, וואָס קען אַליין דורך זיין אייגענעם פּרוכפּערונגס־אַרגאַן זיך פאַרמעהרען און אויסוואַקסען אין אַ גאַנצען באַנד־וואָרם; פ, דער פּרוכפּערונגס־אַרגאַן פון דעם סעגמענט; ע, די געבורטס־עפענונג. ג, דער „קאָפּ“ פון באַנד־וואָרם שטאַרק פאַרגרעסערט.

האַלטען קומען אַרויס אויף דער פרישער וועלט. יעדעס אייעלע איז באַדעקט מיט אַ שאַלאַכץ, אָדער קאַפּסול, וואָס שיצט עס פון באַשעדיגונג. ווען אזא אייעלע ווערט דורך אַ צופאַל פאַרשלונגען פון אַ שוויין, פאַנגט זיך אָן אַ נייע סעריע פון ענטוויקלונגען. דער שאַלאַכץ פון דעם פאַרשלונגענעם אייעלע ווערט אויפגעלעזט אין דעם מאָגען פון דעם שוויין און אַ קליין, יונג ווערימעל ווערט פריי פון אייעלע. וואָס באַפרייעטע קליין ווערימעל פאַנגט זיך אָן דורכבראַבען דורך די ווענטלעך פון מאָגען פון שוויין, ביז עס געפינט פאַר זיך אַ פאַסענדען אָרט אין די מוסקולען פון דעם

שוויין וואו עס שטעלט זיך אָפּ. דאָן באַדעקט עס זיך מיט אַ זע-  
קעלע-הנליכען הייטעל און פון זיין אונטערען ענד ענטוויקעלט  
זיך אַ קליין פענכערי, אָנגעפילט מיט אַ קלאַרע וואַסערדיגע פלי-  
סיגקייט. אין דעם דאָזיגען צושטאנד ווערט דער באַנד-וואָרם  
אָנגערופען „פענכערוואָרם“. ער באַשטעהט פון אַ פענכער, מיט  
אַ קורצען האַלז און אַ קליין לאַנגרונדען קעפעל, וואָס האָט פיער  
זויג-אַרגאַנען און אַ קליין קרוינדעל פון קרוטשקעלעך. אין נאַני-  
צען איז זיין לענג אַרום אַ פערטעל צאָל (אינטש). אין דעם דאָ-  
זיגען צושטאנד קען דער יונגער באַנד-וואָרם פאַרבלייבען אַ לאַנגע  
צייט, ווייל געפינענדיג זיך אין די מוסקעלען פון שוויין קען ער  
זיך ווייטער ניט ענטוויקלען. פאַר זיין ווייטערדיגע ענטוויקלונג  
האָט ער נויטיג די געדערים פון אַ מענשען. די דאָזיגע געלעגענ-  
הייט קריגט ער ווען אַ מענש עסט אויף אַ שטיקעל שוויין-פלייש,  
וואו, ער, דער יונגער באַנד-וואָרם געפינט זיך. ווען דער יונגער  
באַנד-וואָרם איז אַריינגעקומען אין די געדערים פון אַ מענשען, באַ-  
פרייט ער זיך פון זיין אויבערשטע הייטעל, עסט זיך איין מיט  
זיינע קרוטשקעלעך און זויג-אַרגאַנען אין דעם שליים-הויט פון די  
מענשליכע געדערים, וואַרפט אַוועק דעם פענכער זיינעם און פאַנגט  
אָן אַ נייעם לעבען. צוערשט פאַרוואַנדעלט ער זיך אין אַ קאָפּ  
פון אַ דערוואַקסענעם באַנד-וואָרם און פון אונטערען ענד פון  
קאָפּ פאַנגען אָן אַרויסוואַקסען איין רינגעלע נאָכ'ן צווייטען, ביז  
עס וואַקסט אויס אַ לאַנגער באַנד-וואָרם.

אויף אַן עהנליכען אופן קומט פאַר די ענטוויקלונג פון די  
אַנדערע סאָרטען באַנד-וואָרם. עס זיינען פאַראַן באַנד-וואָרם,  
וועלכע מאַכען דורך די ערשטע סטאַדע פון זייער ענטוויקלונג אַלס  
„פענכערוואָרם“ אין די מוסקעלען פון אַן אָקס. עס זיינען פאַראַן  
באַנד-וואָרם, וועלכע לעבען אין די געדערים פון קעז, און זייער  
ענטוויקלונג אַלס פענכערוואָרם מאַכען זיי דורך אין די מוסקולען  
פון מייז. די באַנד-וואָרם, וועלכע געפינען זיך אין די געדערים  
פון הינט האַבען אין זייער פריהער יוגענד געלעבט אין די מוסקולען  
פון קראַליקעס אָדער האַזען. אַן אַנדע סאָרט באַנד-וואָרם וואָס  
מען געפינט אין די געדערים פון אַ הונד, האָט אין זיינע יוגענד-  
יאָהרען געלעבט אין דעם מאַרץ פון אַ שעפּס. עס איז אויך פאַראַן  
אַ באַנד-וואָרם ביי הינט, וועלכער האָט אין זיין יוגענד געלעבט  
אין די געדערים פון אַ מענשען. דער דאָזיגער באַנד-וואָרם איז

זעהר א קורצער, אן ערך א פערטעל צאָל לאַנג און ער האָט אויסער'ן קאָפּ, בלוז דריי רינגען.

כאַראַקטעריסטיש איז, וואָס מעהר ווי איין באַנדוואָרם באַ-  
זעצט זיך ניט אין די געדערם פון א מענשען אָדער פון א חיה.  
די באַנדווערם זיינען אָפט זעהר שעדליך פאַר די חיות, אין  
וועלכע זיי מאַכען זיך זייער נעכט, און זיי בריינגען מאַנכעס מאָל  
גרויסע פאַרניכטונגען צווישען הויז-חיות, באַזונדערס צווישען  
שעפּסען.

די באַנדווערם האָבען ניט קיין ספעציעלע מויל און האָבען  
אויך ניט קיין ספעציעלע שפייז און פארדייאונגס-אָרגאַנען. זיי  
האָבען עס ניט נויטיג. זיי באַדען זיך אין דעם זאָפט פון די גע-  
דערם, וואו זיי געפינען זיך און זייגען איהם אריין דורך פאַרשי-  
דענע עפּנונגען פון זייער קערפּער.

עס זיינען אויך פאַראַן אַזעלכע באַנדווערם, וועלכע טיילען  
זיך אַליין פאַנאָדער אין צווייען און יעדער טייל ענטוויקעלט זיך  
אין אַ גאַנצען, פּוילדערוואַקסענעם באַנדוואָרם.

די רונד ווערם (נעמאַטאָדען). — די רונדווערם אָדער פּע-  
דיסווערם, ווי זיי ווערען אויך גערופּען, באַשטעהען פון פּיעלע  
פאַרשידענאַרטיגע ספעציעס. מעהרערע פון זיי זיינען פאַראַזיטען  
זייער גאַנצען לעבען, אַנדערע פון זיי בלוז אַ טייל פון זייער לע-  
בען און אַנדערע זיינען פּרייע וואַנדערער און זוכען זייער שפייז  
וואו זיי קענען נאָר געפינען.

דער קערפּער פון די דאָזיגע ווערם איז רונד און דין, און די  
מייסטע פון זיי זיינען גאַנץ קורצע. אום זיך צו באַקענען מיט דער  
גרונד כאַראַקטעריסטיק פון די פאַרשידענע רונדווערם, וועט זיין  
גענוג צו באַשרייבען אַ פּאַר פון זיי — דעם עסיגוואָרם און די  
טריכינאַ.

דער עסיגוואָרם איז אַ גאַנץ קליינער, ער האָט די לענג פון  
בלויז איין מילימעטער ביז צוויי מילימעטער (א מילימעטער איז  
אַן ערך אַ 25טעל פון אַן אינטש). ער געפינט זיך אין דעם שימעל  
פון אַן איבערגעזייערטע פּרוכט-זאָפּט. זיין קערפּער איז באַדעקט  
מיט אַ האַרטען הייטעל, וואָס באַשיצט זיינע דעליקאַטע אָרגאַנען  
געגען דער ווירקונג פון דער זויערקייט, אין וועלכער ער לעבט.  
דורך דעם הייטעל קען מען אָבער זעהן די מוסקולען בענדער, וועל-  
כע ציהען זיך איבער דער גאַנצער לענג פון ווערימעל און וועלכע


ווערען באַנוצט פון איהם זיך צו באַוועגען, צו שווימען און צו קריכען. אויף די מוסקול־בענדער שטיצט זיך אויך דער מאַרך פון ווערימעל, וואָס געפינט זיך נאָהענט פון זיין קאָפּ, און די נער־ווען, וועלכע ציהען זיך פון דעם מאַרך. מען קען אויך זעהן דורך דעם דורכזיכטיגען קערפער פון דעם עסיג־ווערימעל, זיינע געדע־רים, וועלכע ציהען זיך ווי אַ גראַד רעהרעל. אין דעם זעלביגען רוים, וואו די געדערים געפינען זיך, איז אויך פאַראַן גענוג פּלאַץ פאַר די פּרוכפּערונגס־אַרגאַנען פון דעם ווערימעל און פאַר די אייעלעך, וועלכע זיי פּראָדוצירען. אין דעמזעלביגען רוים גע־פינט זיך אויך פּלאַץ פאַר אַ פּליסיגקייט, וואָס עס ווערט אָנגענו־מען אַלס דאָס בלוט פון דעם קליינעם באַשעפענישעל. מען גלויבט, אַז די דאָזיגע פּליסיגקייט האָט די אויפּגאַבע צו פאַרטיילען שפּיז און זויער־שטאָף אין דעם קערפער פון ווערימעל און פיהרט דעם אָפּפאַל פון די פאַרדייטע שפּיזען צו זיינע נירען, וועלכע שידען דעם אָפּפאַל אַרויס פון קערפער.

די פּרוכפּערונג פון דעם עסיג־ווערימעל קומט פאַר דורכדעם, וואָס אין זיין קערפער ענטוויקלען זיך אייעלעך און פון זיי ווערען ביי איהם אין קערפער געבאַרען ווערימעלעך. ביי אַנדערע רונד אָדער פּעדים ווערען די אייעלעך פריהער אויסגעלעגט אין דער פּליסיגקייט, אין וועלכע די ווערעם לעבען, און דאָרטען קומט פון זיי אַרויס ווערימעלעך, וועלכע וואַקסען אויס און ענטוויקלען זיך עהנליך צו זייערע עלטערען.

ביי די מייסטע רונד אָדער פּעדים ווערען דאָרפּען זייערע קינדער דורכמאַכען אַ לאַנגען אומוועג, איידער זיי ענטוויקלען זיך און וואַקסען אויס. די טריכינאַ שטעלט מיט זיך פאַר אין דער הינזיכט אַ כאַראַקטעריסטישען פאַל.

די טריכינאַ איז אַ פאַראַזיטישער ווערימעל פון וועלכען עס ליידען פאַרשיידענע חיות, באַזונדערס ראַצען, הינט און חזירים. ווען אַ טריכינאַ האָט זיך, למשל, באַזעצט אין די געדערים פון אַ ראַץ, פאַנגט זי גלייך אָן דאָרטען לעגען איהרע אייעלעך. זי לעגט זיי אין אַ ריזיג גרויסע צאָהל, מאַנכעס מאָל מעהרערע מיליאָנען. פון די אייעלעך קומען אַרויס גאַנץ קליינע ווערימעלעך, וועלכע קריכען אַריין אין די מוסקולען פון דעם ראַץ, דרעהען זיך דאָרטען צונויף ווי אַ ספּיראַלע און בלייבען אַזוי ליגען. זיי קענען אַזוי אָפּליגען יאָהרען. ווען אַזאַ ראַץ ווערט אָבער אויפּגעגעסען פון

וועלכער עס איז חיה, דאן ווערען די קליינע טריכינא ווערימלעך, וועלכע האָבען זיך געפונען אין די מוסקולען פון דעם ראַץ באַ- פרייט אין דעם מאָגען פון דער חיה, זיי פארשפרייטען זיך אין איהרע געדערס און פאנגען אָן שנעל וואַסען און זיך ענטוויקלען ביז זיי ווערען עהנליך צו זייערע עלטערען. דאן פאנגען זיי אָן



צייכונג 83. — פעדיסווערם אָדער רונד-ווערם. א, אָן עסיג-וואַרם. מ, זיין מויל; ה, זיין האַל; ש, שפּויד-קאַנאַל; ו, די יונגע ווערימלעך, וואָס האַלטען זיך אין ענטוויקלען אין די געדערס פון עסיג-וואַרם. ב, אַ טריכינא אין די מוסקל-פלייש פון אַ מענשען.


לעגען אייעלעך, פון וועלכע עס קומען אַרויס קליינע ווערימלעך, וועלכע מאַכען ווידער דורך דעמזעלביגען פראצעס פון ענטוויקלונג, ווי זייערע עלטערען.

די ערד-ווערם. — אַ העכערע שטופע אין דער ענטוויקלונג פון די ווערם, זיינען די פאַרשידענע רינגעל-ווערם, וואָס די באַ- קאַנטעסטע פון זיי זיינען די ערד-ווערם. די דאָזיגע ווערם האָבען שוין מעהרערע אָרגאַנען, וועלכע שטעלען זיי אוועק ביז אַ געוויסען גראַד אין דער רייהע פון די העכער ענטוויקעלטע באַשעפענישען. דער קערפער פון ערד-וואַרם איז רונד און איז צונויפגעשטעלט פון אַ רייהע קליינע רינגעלעך. ביי דעם ערד-וואַרם איז שוין גוט קענבאַר די ענטוויקלונג פון אַ רוקען און פון אַ בויך, פון אַ פּאָד-דערשטען טייל און פון אַ הינטערשטען טייל, וואָס דאָס איז די כאַראַקטעריסטיק פון די העכער ענטוויקעלטע באַשעפענישען. דער קאָפּ פון דעם ערד-וואַרם, וואו עס געפינט זיך זיין מויל, איז אין דער פּאַרם נאָך וועניג ענטוויקעלט, אָבער ער דיענט איהם אַלס אַן אויסגעצייכענטער אינסטרומענט צו גראָבען די ערד, אין וועלכער ער לעבט. צום גראָבען זיך אין דער ערד העלפען איהם אויך

זעהר פיעל די אייניגע הארטע הערעלעך, וועלכע געפינען זיך אין די רינגעלעך פון זיין קערפער. מיט די דאזיגע הארטע הערעלעך, אריינשמעקענדיג זי אין דער ערד, שיצט ער זיין קערפער, ווען ער גראַבט אין דער ערד מיט זיין קאַפּ.

ניט ווייט פון דעם פאָדערשטען ענד פון וואָרם געפינט זיך אַן אויפגעשוואָלענער ברייטער, ווייסער שטרייף, וואָס ווערט גערופֿן פֿען „זאָמעל“, אָדער „קראַגען“ און ווערט באַנוצט פֿון וואָרם צו באַשיצען די אייעלעך, וואָס ער לעגט, ווי עס וועט ווייטער באַשריבען ווערען.

אונטער זיין הויט געפינען זיך צוויי שיכטען מוסקולען. דער אויבערשטער שיכט באַשמעהט פֿון רינג מוסקולען דורך וועלכע דער וואָרם ציהט אַויס זיין קערפער אין דער לענג, און דער אונט-



צייכונג 34. — די ענטוויקלונג פֿון אַן ערד-וואָרם. א, דאָס אייעלע פֿון וועלכע עס קומט אַרויס דער ערד-וואָרם; ב, אַ יונגער ערד-וואָרם, וואָס קומט אַרויס פֿון אַי; ג, אַ פֿול ענטוויקעלטער ערד-וואָרם, מיט דעם קראַגען, וועלכען ער ציהט אַריבער איבער זיינע אייעלעך; ד, אַ פֿאָרגרעסערטער טייל פֿון ערד-וואָרם, וואָס צייגט די קלוינע שטייפע הערעלעך אויף זיין בויך, מיט וועלכע ער באַוועגט זיך.

טערשטער שיכט באַשמעהט פֿון לענג-מוסקולען, דורך וועלכע ער קאָרטשעט זיין קערפער צונויף, אַז ער זאָל ווערען קירצער. אויף דער בויך-זייט שטאַרצען אַרויס פֿון דער הויט פיער דאָפּעלטע ריי-זען האַרטע הערעלעך, וועלכע העלפֿען דעם וואָרם זיך באַוועגען. דער ערד-וואָרם באַוועגט זיך, אַלזאָ, טיילווייז דורך דעם, וואָס ער ציהט צונויף און ציהט אַויס זיין קערפער און טיילווייז דורך שאַרען מיט די האַרטע הערעלעך פֿון זיין בויך. ער קריכט זעהר גוט אויף ווערטיקאַלע (שטעהענדע) פֿלעכען מיט דער הילף פֿון אַזאַ קלעפּיר-נער פֿליסיגקייט וואָס זיין הויט גיט פֿון זיך אַרויס.

די ערד-ווערם זיינען נאַכט-חיות. זיי באַווייזען זיך זעל-טען אויף דער אויבער-פלעכע פֿון דער ערד בייטאָג, אויסער ווע-



זיי זיינען געצוואונגען עס צו טאן דורך דעם, וואָס זייערע לעכער אין דער ערד ווערען אָנגעפילט מיט וואַסער, אָדער ווען זיי ווערען פאַרפאַלגט פון שונאים. ווען עס קומט אָן די נאַכט פאַנגען זיי אָן אַרויסצוקריכען פון דער ערד זוכען שפייז, אָבער אויך דאָן קריכען זיי ניט אַרויס אין גאַנצען, זיי שטעקען בלויז אַרויס זייער פּאָדערשטען טייל פון דער ערד, וועהרענד דעם הינטערשטען טייל לאָזען זיי שטעקען אין דער ערד. און אַזוי האַלטענדיג זיך אין דער ערד מיט דעם הינטערשטען ענד, זוכט ער אַרום זיך מיט זיין פּאָדערשטען ענד, וואו זיין מויל געפינט זיך, צו געפינען שפייז. עס ווערט אָנגענומען, אַז דער ערד-וואָרם האָט וועלכען עס איז שפור פון אַ חוש הריח, וואָס העלפט איהם ביים אויסגעפינען שפייז. אַפט נעהמט זיך דער ערד-וואָרם גראָבען טיעפער און ברייטער אין דער ערד, כדי צו פאַרגרעסערען זיין וואָהנונג, און גראָבענדיג לאָזט ער דורך דורך זיין קערפער גאַנץ באַדייטענדע מאַסען ערד, פון וועלכע ער פערדייט די נאָהרונגס-שטאַפען, וועלכע כע געפינען זיך אין זיי, אַרויסוואַרפענדיג די אונפאַרדייטע ערד-טיילען ביי דעם אַריינגאַנג פון די לעכער, וועלכע ער האָט אויס-געגראָבען. מען קען אַזעלכע ערד-שפורען באַמערקען אין די ער-טער, וואו אַ וואָרם האָט זיך דורכגעגראָבען, זיי זעהען אויס ווי געדעהטע ספיראל-פערמיגע שנירלעך. דער ערד-וואָרם, ווען ער גראָבט זיינע לעכער אין דער ערד, לאָזט ער דורך די אויסגעגראָבענע ערד דורך זיין קערפער. מען קען זאָגען אַז ער צוקייט און פאַרדייט די ערד וואָס ער גראָבט אויס.

דורך דעם דאָזיגען צוגראָבען און צוקייען די ערד, בריינגען די ערד-ווערם גרויסע נוצען דער לאַנד-אַרבייט. זיי העלפען דורכ-אַקערען און דורכמישען די ערד און מאַכען זי דערמיט באַדייטענד פרוכטבאַרער.

הגם די ערד-ווערם זיינען ניט קיין אויסקלייבער אין שפייז, זיי עסען אַלעס, וואָס עס מאַכט זיך זיי, דאָך האָבען זיי צו געוויסע שפייזען אַ פאַרליעבע, באַזונדערס צו קרויט און פלייש. מען וויל דערפון דרינגען, אַז זיי האָבען אַ חוש הטעם (אַ געשמאַקס-גע-פיהל). דער ערד-וואָרם האָט אַ זעהר גוט ענטוויקעלטען חוש המשוש (טאַפונגס-געפיהל). ניט האָבענדיג קיין אויגען, קען ער דאָך מיט זיין פּאָדערשטען טייל פון זיין קערפער אונטערשיידען צווישען ליכט און פינסטערנים און ער ווייס אימער, ווען עס איז

ליכטיג און ווען עס איז פינסטער. אין דער ליכטיגקייט קריכט ער ניט ארויס פון זיין לאך, ווי עס ווערט אָבער פינסטער לאָזט ער זיך אַרויס זוכען שפייז. און אזוי ווי עס פעהלט דעם ערד־וואָרם אױר־גען, אזוי פעהלט איהם אויך אויערען. עס פעהלען איהם, אַלזאָ, דער חוש הראיה און דער חוש השמיעה אין נאנצען, וועהרענר ער האָט אין אַ שוואַכען גראַד אַ חוש הריח, אַ חוש הטעם און אַן אויסגעצייכענט גוט ענטוויקעלטען חוש המשוש.

דער ערד־וואָרם האָט אַ גוט ענטוויקעלטען פארדייאונגס־אפאָראַט, וועלכער באַשטעהט פון אייניגע טיילען, וואָס יעדער פון זיי האָט צו ערפילען אַ באַשטימטע אויפגאַבע אין דעם פארדיי־אונגס־פראָצעס. פון דעם מויל פון ערד־וואָרם געהט דאָס שפייז אַריין אין האַלז, וועלכע האָט מוסקולען, דורך וועלכע דער וואָרם קען דאָרטען פאַרהאַלטען דאָס שפייז. איידער ער פארשלינגט עס. פון דעם האַלז געהט דאָס שפייז אַריין אין דעם שלונד אָדער שפייז־ראָהר (ושט). פון דאָרטען געהט דאָס שפייז ווייטער אין אַ רויס, וואָס איז עהנליך צו אַ קראַפּ (וואַליע) פון אַ פויגעל, און פון קראַפּ געהט דאָס שפייז צום מאַגען, וואו עס ווערט פארדייט מיט דער הילף פון דער פארדייאונגס־פליסיגקייט, וואָס דער מאַגען טיילט פון זיך אַרויס.

דער ערד־וואָרם באַזיצט אויך אַ בלוט־צירקולאַציאָנס סיס־טעם. ער האָט אַ רוקען בלוט־אָדער, דורך וועלכען רויט בלוט פליסט אין דער ריכטונג פון די הינטערשטע טיילען פון זיין קער־פער, וועהרענר אין דעם בויך בלוט־אָדער, וואָס ער האָט, פליסט דאָס בלוט אין אַן אונגעקעהרטער ריכטונג, צו די פאָדערשטע טיילען. עס קומט, אַלזאָ, פאָר אַ פאָלשטענדיגע בלוט־צירקולאַ־ציע. אין יעדען רינגעלע פון זיין קערפער געפינען זיך איינס אָדער צוויי דינע אָדערלעך פון יעדער זייט, וועלכע זיינען פאַרבונדען מיט דעם רוקען־אָדער און מיט דעם בויך־אָדער. די אָדערלעך אין די פאָדערשטע רינגעלעך, פון זיבעטען רינגעלע ביז'ן עלפטען, זיינען גרעסערע און זיי פולסירען דורך די צונויפציהונג און פאַנאַנ־דערציהונג פון זייערע ווענטלעך. די דאָזיגע אָדערלעך פאַרנעהמען ביי דעם ערד־וואָרם דעם פלאַז פון אַ האַרץ.

קליינע, דינע אָדערלעך, אין וועלכע עס פליסט רויט בלוט זיינען אויך פארשפרייט איבער'ן הויט פון דעם וואָרם. נאָר אוי־

סער דאָס רויטע בלוט האָט דער ערד־וואָרם אויך בלוט פון אנדערע קאָלירען.

קיין ספעציעלע אָטעמונגס־אַרנאָנען באַזיצט ניט דער ערד־וואָרם. ער זויגט אַריין דעם זויער־שטאָף, וואָס איז נויטיג פאַר זיין עקזיסטענץ, דורך זיין הויט, וועלכע איז אימער פייכט צוליב דעם צוועק.


דאָס נערווען־סיסטעם פון דעם ערד־וואָרם באַשטעהט פון אַ מאַרץ, וואָס איז צונויפגעשטעלט פון צוויי שטיקלעך פאַראייניגטע מאַסעס, וואָס יעדע פון זיי האָט די פאָרם פון אַ באַרנע. פון דעם דאָזיגען מאַרץ, וועלכער געפינט זיך, וואו דער האַלז פון וואָרם פאַנגט זיך אָן, ציהען זיך נערווען צו דער אויבערשטער ליפּ פון וואָרםס מויל און צו זיין קאָפּ. די דאָזיגע נערווען מאַכען דעם קאָפּ פון וואָרם באַזונדערס עמפּינדליך. אַ גאַנצע רייהע אנדערע נערווען ציהען זיך פון דעם מאַרץ איבער די פאַרשידענע טיילען פון דעם וואָרםס קערפּער.

די פאַרמעהרונג פון די ערד־ווערם קומט פאַר דורך לעגען אייער. ווען מען גראַכט אויף ערד, וואו ערד־ווערם געפינען זיך, באַמערקט מען אָפט קליינע געלבלעכע אָדער ברוינליכע קייקעלעך, וועלכע זיינען עהנליך ווי ווייץ־קערנער. אָט אין די דאָזיגע קייקעלעך געפינען זיך די אייעלעך, וואָס די ערד־ווערם לעגען.

דער פּראָצעס פון לעגען אייער איז ביי די ערד־ווערם אַ זעהר כאַראַקטעריסטישער. עס איז שוין פריהער דערמאָנט געוואָרען, אַז ניט ווייט פון האַלז האָט דער ערד־וואָרם אַן אויפגעשוואָלענעם ווייסען ברייטען שטרייף, וואָס ווערט גערופּען „זאָטעל“. ווען עס קומט די צייט, ווען דער ערד־וואָרם פאַנגט אָן לעגען זיינע אייער, לאָזט אָט דער ווייסער שטרייף פון זיך אַרויס אַזאַ פּליסיגקייט, וואָס ווערט פאַרהאַרטעוועט און בילדעט אַ ברייטען רינג ווי אַ קראַגען אַרום דעם וואָרם. דער וואָרם פאַנגט דאָן אָן דורך צונויפ־ציהען און אויסציהען זיך צו רוקען דעם קראַגען צו דער ריכטונג פון זיינע געשלעכטס־אַרנאָנען (צו דער ריכטונג פון קאָפּ), און ווען דער קראַגען ווערט אַהין צוגערוקט, ווערען די אייעלעך און די באַ־פּרוכטונגס־פּליסיגקייט (זרע) אַרײַנגעשטויסען אין איהם. דאָן רוקט זיך דער קראַגען ווייטער צום קאָפּ צו. ווען ער האָט זיך איבערגערוקט איבער דעם קאָפּ פון וואָרם, ציהען זיך זיינע ענדען צונויף און ער פאַרוואַנדעלט זיך אין אַ פאַרמאַכטען זעקעלע. דאָס

דאזיגע זעקעלע ווערט אָננערופען „קאָקאָן“. אין איהם ליגען עס די אייעלעך פון דעם וואָרם צוזאמען מיט אַ מילך־עהנליכען נאָר־האפטען שטאָף. אין אַ משך פון עטליכע וואָכען ענטוויקעלט זיך דאָרטען אַ ווערימעל, ער צורייסט דאָן די ווענטלעך פון זעקעלע, קומט אַרויס אין דער פריי און פאנגט אָן פיהרען אַ זעלבסטשטענדיגן לעבען און גראָבט די ערד, ווי זיינע עלטערן האָבען עס געטאָן.

די ערדווערם זיינען פארשפרייט אין אלע ערד־טיילען פון דער וועלט און איבעראַל האָבען זיי דיזעלבע עהנליכקייט. ים־ווערם. — עהנליך אין געבוי און אין אָרגאַניזם צו די ערד־ווערם זיינען די ים־ווערם. די ים־ווערם צייכענען זיך אָבער אויס




צייכנונג 35. — דער ים־וואָרם נערמס. א, דאָס אויסזעהן פון וואָרם אין זיין פרוכפערונגס־צייט; ב, זיין געווענליכער אויסזעהן.

פון די ערד־ווערם מיט דעם וואָס זייער קאָפּ איז גוט ענטוויקעלט און וואָס די זייטען פון זייער קערפער זיינען באוואקסען מיט אַ סך הארטע הערעלעך, וועלכע העלפען זיי זיך באוועגען אויף דער ערד און שווימען אין וואַסער. איינער פון די פארשפרייטעסטע ים־ווערם איז דער „נערייס“. מען געפינט איהם כמעט ביי יעדען ברעג פון ים. זיין קערפער באשטעהט פון רינגעלאַך פונקט אזוי, ווי דער ערד־וואָרם, אָבער ווען דער ערד־וואָרם האָט גאַנץ שוואַכע סמנים פון אַ קאָפּ, האָט דער נערייס אַ פאָלשטענדיג ענטוויקעלטען קאָפּ אין וועלכען עס געפינען זיך פארשידענע פיהל־אָרגאַנען, פיער אויגען און עטליכע פיהל־הערענדלעך.

פון יעדען רינגעלע פון זיין קערפער שטארצען אַרויס פון די זייטען מעהרערע הארטע הערעלעך, אזוי, דאָס זיינע זייטען זעהען

אויס ווי בערשטלעך. דער ערד־וואָרם אָבער האָט בלוז וועניג אַזעלכע הערעלעך. דער נערייס אַטעמט, עהנליך צו דעם ערד־וואָרם דורך די אויבערפלעכע פון זיין קערפער, אָבער עס זיינען ביי איהם שוין פאַראַן די ערשטע סמנים פון באַזונדערע אַטעמונגס־אָרגאַנען אין אייניגע רינגעלעך, וועלכע זיינען דורכגעדרונגען מיט אַ רייע בלוט־אַדערלעך און שטעלען מיט זיך פאַר אַ מין זשאַברעס (אַטעמונגס־אָרגאַנען ביי פיש).

אין דעם אינערליכען אָרגאַניזם זיינען די ים־ווערם כמעט אין גאַנצען עהנליך צו די ערד־ווערם. אַן אונטערשייד איז בלוז פאַר־




צייכונג 36. — א, אַ פאַרגעסערטע קאַפּ פון דעם ים־וואָרם נערייס; ב, אַ פאַרגעסערטער טייל פון זיין זויט, וואו ז צייגט זיין אַטעמונגס־אָרגאַן; ג, זיין שפיז קאַנאַל; ד, זיינע שטויפע הערעלעך, מיט וועלכע ער באַוועגט זיך.

ראַן אין דעם פרוכפערונגס־סיסטעם. וועהרענד ביי דעם ערד־וואָרם געפינען זיך פרוכפערונגס־אָרגאַנען בלוז אין עטליכע פון די פאַדערשטע רינגעלעך, באַזיצען די ים־ווערם אַ פרוכפערונגס־אָר־גאַן כמעט אין יערען רינגעלע פון זייער קערפער.

אין דעם פרוכפערונגס־סעזאָן ענדערט דער נערייס די פאַרם פון זיין קערפער. ער ווערט קירצער און דיקער. זיינע אייער לעגט ער אין וואַסער, וואו ער שווימט אַרום די גאַנצע צייט פון זיין פרוכפערונגס־סעזאָן. די יונגע ווערימלעך, וועלכע קומען אַרויס פון די אייער, שווימען אויך אַרום פריי אַ געוויסע צייט אין

ים, שפעטער אָבער הערען זיי אויף אַרומצואוואַנדערען, נאָר באַ-  
זעצען זיך אויף וועלכען עס איז פּלאַץ אויפ'ן גרונד פון ים, וואו זיי  
וואַקסען אויס און פּאננען אָן לעבען, ווי זייערע עלטערען.  
ביי מאַנכע זאָרטען ים-ווערם קומט פּאָר די פּאַרמערהונג, ווי  
ביי מאַנכע פּלאַד-ווערם, וועלכע זיינען באַשריבען געוואָרען אין  
אַנפּאַנג קאַפּיטעל, געמליך דורך טיילונג. דער וואָרם צוטיילט  
זיך אין צוויי אָדער מעהרערע טיילען און פון יעדען טייל ענטווי-  
קעלט זיך אַ זעלבסטשטענדיגער וואָרם.  
דער ים-וואָרם פּאננט פּאַר זיין שפּייז פּאַרשידענע קליינע  
קרעכסען, מאַלוסקען און ווערם, וועלכע ער טרעפט אין זיין וועג.




צייכנונג 37. — דער טוביקאליס ים-וואָרם. א, זיינע  
פּיטלהערענדלעך; ב, זיינע זשאַבעס (אַטעמונגס אָרגאַנען).

ער עסט זאָגאַר זיינע אײגענע ברידער פון זיין אײגענעם מין. עס  
זיינען אָבער אויך פּאַראַן מאַנכע זאָרטען ים-ווערם, וועלכע שפּיי-  
זען זיך מיט ים-גראַז, אָדער שלײנגען דעם זאַמד פון גרונד פון ים  
און ווינען אַרויס די נאַרהאַפטע שטאַפּען, וועלכע זיינען פּאַרמישט  
מיט'ן זאַמד.

מאַנכע זאָרטען ים-ווערם האָבען אונטער דעם צוואַנג פון אומ-  
שטענדען געמוזט ענדערען זייער אַרט לעבען. פון אַ פּרייען, באַ-  
וועגליכען לעבען האָבען זיי געמוזט איבערגעהן צו אַ צוגעבונדענעם  
לעבען אויף אײן אָרט. פּאַרפּאָלגט פון פּיעלע שונאים, וועלכע האָ-  
בען פון אַלע זייטען געלויערט אויף זייער לעבען, האָבען זיי זיך

געמוזט איינארדנען אזוי, אז זיי זאלען זיין געשיצט מיט זייער לעבען. מאַנכע פון די דאָזיגע זאָרטען ים ווערם, נאָכדעם ווי זיי האָבען דורכגעמאכט די פעריאָדע פון פרייער אַרומוואַנדער־רונג אין זייער פריהער יוגענד, באַזעצען זיך אויפ'ן גרונד פון ים, בויען אויס אַרום זייערע קערפערס רעהרלעך פון קאלץ און זאַמד און ליגען אין זיי באַהאַלטען. זיי קריכען אַרויס פון זיי בלוז, ווען זיי געהען זוכען שפּייז.




צייכונג 38. — דער ים וואַנדער־וואַרם (גראַנדיס).

מאַנכע זאָרטען ים־ווערם בויען זייערע שוין־רעהרלעך נאָהענט איינע ביי די אנדערע און אין מאַנכע פלעצער אויפ'ן גרונד פון ים זיינען זיי פאַראַן אזוי פיעל און אזוי דורכגעפלאַכטען איינע מיט די אנדערע, אז זיי ערשיינען ווי גרויסע שטיינער מאַסען פון מעה־דערע פּוס די גרויס. פון דעם דאָזיגען אַרט באַזיצליכען לעבען קומען פאַר גרויסע ענדערונגען אין דעם אַרגאַניזם פון די ים־ווערם.

די פיאָווקעס. — דער קערפער פון דער פיאָווקע באַשטעהט פון רינגעלעך אזוי ווי דער קערפער פון ערד-וואַרם. זי באַשטעהט פון אַן ערך 80 ביז 100 רינגעלעך. אין איהר קאָפּ האָט זי עטליכע פּאַר אויגען. אַנדערע פון זיי האָבען 10 פּאַר אויגען. זי קען אויסנעצייכענט שווימען און אויך גוט קריכען.

די פיאָווקעס לעבען געוועהנליך צווישען די גראַזען אין ניט-שטאַרק שטראָמיגע טייכען, מאַנכע פון זיי אָבער געפינען זיך אויך אין פייכטע פלעצער אויף דער ערד, און אַ נאָנץ באַדייטענדער צאָהל פון זיי לעבען אין ים. די פיאָווקע איז אַ בלוט-זוויגענדע באַשעפעניס. איהר מויל איז באַזאָרגט מיט דריי שאַרפע צייהן און מיט אַ זויג-אַרגאַן. זי בייסט דורך מיט די צייהן די הויט פון איהר קרבן און פאַנגט איהם אָן זויגען. געוועהנליך באַפאַלט



צייכנונג 39. — א, אַ פיאָווקע (וועלכע ווערט געברויכט פאַר מעדיצינישע צוועקען); ב, איהר מויל אָדער זויג-אַרגאַן און קינבאַקען (שטאַרק פאַרגרעסערט); ג, אויגער פון איהרע קינבאַקען נאָך מעהר פאַרגרעסערט, וואו מען קען זעהן דעם האַלב-רונדליכען צייהנערדיגען ראַנד.

זי פיש, פרעש, און טשערעפאַכעס (שילד-קראַטען) פון וועלכע זי זויגט דאָס בלוט ביז זי ווערט זאַט. זי גרייפט אָבער אויך אָן בהמות און חיות, וועלכע קומען טרינקען צום טייך. אין מאַנכע פון די טראָפישע לענדער זייגען פאַראַן פיאָווקעס, וועלכע לעבען אין גרויסע מאַסען אויף דער יבשה און וועלכע ליגען באַהאַלטען צווישען די בלעטער פון פלאַנצען. ווען מעהרערע פון זיי באַפאַ-לען אַ חיה אָדער אַ מענשען איז שווער זיך אַרויסצוראַטעווען פון זיי מיט'ן לעבען. זיי זויגען אויס ביז דעם לעצטען טראָפען בלוט פון זייער קרבן.


ווען די פיאָווקע זויגט זיך אָן ביז זאַט, לאָזט זי איהר קרבן אָפּ און לעגט זיך אוועק רוהען, כדי צו פאַרדייען איהר מאָהלצייט.



פאר מאַנכע זאָרטען פּיאָווקעס איז איין גוטער מאָהלצייט גענוג פאַר צוויי אָדער דריי חדשים. די פּיאָווקעס, וועלכע ווערען גע- ברויכט פאַר מעדיצינישע צוועקען, אָפּצוווינגען דאָס שלעכטע בלוט ביי מענשען אָדער פּערד, קענען זאָגאַר אָפּלעבען אַ גאַנץ יאָהר מיט איין פּולען מאָהלצייט.

די פּיאָווקעס פאַרמעהרען זיך דורך לעגען אייער, וועלכע זיי באַהאַלטען אונטער שטיינער אָדער באַהעפטען צו אונטער- וואַסערדיגע פּלאַנצען.

די ראַטיפּערען. — עס זיינען פאַראַן אייניגע זאָרטען ווערם, וואָס די זאָאָלאָגען האָבען זיך ניט געקענט אייניגען צו וועלכע פאַר מיליעס זיי געהערען. עס איז נאָך ביז היינט ניט באַשטימט צו וועלכער פּאַמיליע עס געהערען די ראַטיפּערען אָדער „רעדער- חיה'לעך“, ווי מען רופט זיי. די דאָזיגע באַשעפענישען זיינען גאַנץ קליין. זעלטען ווען זיי זיינען לענגער פּון דריי פּערטעל צענטימעטער אָדער אַ דריטעל פּון אַ צאָל (אינטש). זייער צאָהל איז אָבער אין מאַנכע טייכען אָדער סאָזשעלעקס אָפט מאָל אַזוי גרויס, אַז דאָס וואַסער באַקומט אַ רויטליכען קאָליר. ווען מען אונטערזוכט די ראַטיפּערען אונטער אַ מיקראַסקאָפּ, באַמערקט מען, אַז זייער לענגליכער קערפּער האָט ביי זיין פּאָדערשטען ענד זעלכע צוויי רונדע רעדעלעך, וואָס זייערע ראַנדען זיינען באַזעצט



צייכנונג 40. — אַ ראַטיפּער (אַ רעדער-חיה'לע).

מיט פעסטע באַוועגליכע הערעלעך. פּון דעם נעהמט זיך דער נאָ- מען „רעדער חיה'לע“. די הערעלעך אַרום די רעדעלעך זיינען דער ראַטיפּעראַ פאַר די צוועקען פּון באַוועגונג, אָדער, צו פּאַנגען שפּייז, ווען דאָס חיה'לע שטעהט אויף אַן אָרט באַהעפט צו אַ גע- גענשטאַנד מיט דער קלעפיגער פּליסינגקייט פּון איהר פּוס. באַ- טראַכטענדיג איהר אונטער אַ מיקראַסקאָפּ, זעהט מען דורך די דורכזיכטיגע ווענטעלעך פּון איהר קערפּער, ווי דאָס שפּייז געהט אַרײַן פּון איהר מויל אין איהר מאַגען, וואו עס ווערט שנעל צו-


האקט און צורבען אין א קאשע דורך עטליכע צייהנער, וועלכע געפינען זיך דאָרטען.

אין פאַרלוף פון זומער לעגען די ראטיפערען צווייערליי זאָרטען אייער פון צוויי פאַרשידענע גרויסען, וועלכע ענטזויקלען זיך אָהן דער באַפּרוכטונג פון זרע. פון די גרעסערע אייעלעך קומען אַרויס וויבליכע ראטיפערען, וועהרענד פון די קלענערע — מענ-ליכע. זייערע ווינטער אייער זענען שוין באַפּרוכטעט מיט דער זרע פון די מענליכע ראטיפערען און זיי ווערען באַדעקט מיט אַ פעסטען שאַלאַכץ. זיי קענען דאָריבער אויסהאַלטען די קעלטען פון ווינטער. די ראטיפערען האָבען אין אַלגעמיין די פעהיגקייט זיך צו באַדעקען מיט אַ פעסטע שוץ-הייטעל געגען די ווינטער-קעלטען. ווען דאָס אייז צוגעהט ווערט זייער הייטעל צוגאנגען אין וואַסער און אין אַ גאַנץ קורצער צייט באַוויזען זיי זיך פריש לעבעדיג, ווי עס וואָלט מיט זיי קיין זאך ניט פאַסירט.

די געפיררען. — אַ צווייטער זאָרט באַשעפענישען, וואָס זייער פאַמיליע איז אונבאַשטימט, זיינען די געפיררען. די דאָר-זיגע באַשעפענישען שטעלען מיט זיך פאַר אַ ציעמליך גרויסע גרוי-פע פון אונגעפעהר הונדערט פאַרשידענע ספעציעס. זייער אָר-גאַניזם איז עהנליך ווי פון ווערם, אָבער מען איז ניט זיכער, אַז זיי געהערען צו דער ווערם פאַמיליע.

מאַנכע ספעציעס פון די געפיררען לעבען ביי די ברעגעס און אין די שפּאַלטען פון פעלזען אָדער גראָבען זיך איין אין זאַמר. זיי האָבען אַ שפינדעל-ענהליכען קערפער, פון אונטען ברייט און אויבען שמאַל. דער שמאַלער ענד, וואו דאָס מויל געפינט זיך, איז אַרומגערינגעלט מיט אַ קראַנץ פון פיהל-הערענדלעך. זיי האָבען מיט זייער אויסערליכען אויסזעהן אַ גרויסע עהנליכקייט צו די ים-אונגערקעס, וועלכע זיינען באַשריבען אין ניינטען קאַפיטעל. מען האָט זיי דאָריבער אנפאַנגס אָנגענומען אַלס נאָהענטע קרובים פון די ים-אונגערקעס. ווען מען האָט אָבער אונטערזוכט זייער אָרגאַניזם האָט מען אָנגעפאנגען צווייפלען אין זייער קרובה'שאפט מיט


די ים-אונערקעס. מעהרערע זאאלאָגען זיינען גענייגט צו גלויבן בען, אז זיי שטאמען אָפּ פון רינגעל-ווערם. די דאָזיגע מיינונג ווערט פארשטארקט דורך דעם, וואָס אין דער פריהער יוגענד, אין דער לארווא-צושטאנד, איז דער קערפער פון די געפירעען געמיינט אין רינגעלעך, נאָר ווען זיי ווערען עלטער, פארשווינדען די רינגעל-צייכענס. א צווייטער אַרגומענט, אז די געפירעען שטאמען אָפּ פון רינגעל-ווערם, ווערט אָנגעגעבען פון דעם, וואָס זיי שפייזען זיך אויף אן עהנליכער אַרט ווי די ערד-ווערם. די געפירעען פארשלינגן גען מאַסען זאַמד, פון וועלכע זייער מאַגען זיינט אַרויס די נארהאַפּט מע שטאָפען און שטויסט אַרויס פון די געדערם די אונפאַרדויליג-כע שטאָפען. זיי טוען דאָס זעלבע מיט זאַמד, ווי די ערד-ווערם מיט ערד.



צייכונג 41 — א געפירעע וואָרם.

די פּאָליזאָען. — אומבאַשטימט צו וועלכער פאַמיליע זיי גע-  
הערען זיינען אויך די פּאָליזאָען. זיי שמעלען מיט זיך פאַר א  
ציעמליך גרויסע גרופע פון וואַסער-חיות, וועלכע לעבען אין פעל-  
זען שפאַלמען און אין פלאַנצען ביי די ברעגעס פון ים. מען בא-  
געגענט זיי אויך מאַנכעס מאָל אין טייכען, מאַנכע פון זיי לעבען  
אַלס אָפּגעזונדערטע אינדיווידיוםס, איינזאַם אַליין אָהן געזעל-  
שאַפט, אָבער די מייסטע פון זייערע ספּעציעס וואַקסען זיך פאַנאַנ-


דער אין קאַלאָניעס. פון איין באַשעפּעניש וואַסען אַרויס צוויי-  
גען און פון די צווייגען אַנדערע צווייגען ביז עס ענטוויקעלט זיך  
אַ גרויסע פּאַליזאָען קאַלאָניע. ביי אַנדערע פון זייערע ספּעציעס  
וואַסען אַרויס צווייגען, וועלכע זיינען עהנליך צו פּעדערען אַדער  
מאָך, און די פּאַליזאָען קאַלאָניע האָט מיט איהר אויסזעהן אַ נאָך-  
הענטע עהנליכקייט צו געוויסע פּלאַנצען. דאָס פּאַלק נעמט זיי  
אויך אָן פאַר פּלאַנצען און רופט זיי ים-מאָך.  
עס איז נאָך היינט ניט באַשטימט צו וועלכער פּאַמיליע די  
פּאַליזאָען געהערען. לויט זייער ענטוויקלונג נעהמט מען אָן, אַז  
זיי זיינען ווייטע קרובים פון די רינגעל-ווערם, אָבער מען איז ניט  
זיכער, אַז דאָס איז אזוי.



צייכונג 42. — אַ געווענליכע פּאַליזאָע, וועלכע מען רופט „ים-מאָך“.

די לאַמפּ-מושלען (בראַכיפּאַדען). — מען ווייס אויך ניט  
זיכער פון וועלכער פּאַמיליע עס שטאַמען אַרויס די ים-באַשעפּער-  
נישען, וועלכע מען האָט אַ גאַמען געגעבען לאַמפּ-מושלען. אין  
אַן אַנדער פּעריאָד פון אונזער ערד-קוגעל זיינען די לאַמפּ-מושלען  
געווען זעהר שטאַרק פאַרשפּרייט אין פאַרשידענע טיילען פון דער  
וועלט. דאָס ווייס מען פון די שפּורען, וועלכע מען געפינט פון  
זיי אין פּיעל ערטער. עס שיינט אָבער, אַז זיי האָבען זיך ניט  
געקענט צופאַסען צו די געענדערטע באַדינגונגען פון זייער לעבען


אָדער זיי האָבען זיך ניט געקענט וועהרען געגען זייערע פיינד, וועלכע האָבען זיי פארפּאָלגט און געלויערט אויף זייער לעבען, און דער גרעסטער טייל פון זייערע פּאַרשידענאַרטיגע ספּעציעס זיינען אומגעקומען. עס זיינען בלויז געבליבען די יעניגע ספּעציעס, וועלכע האָבען זיך געקענט בעסער צופאַסען צום לעבען.



צייכנונג 43 — פּאַליזאָען. (1) אַ טייל פון אַ „ים־מאַך“ פּאַליזאָע, נאַמירליכער גרויס. (2) אַן איינצעלנער פּאַליפּ פון אַ וואַלקערוואַ פּאַליזאָע, זעהר שטאַרק פּאַרגרעסערט. (3) אַ זעהר שטאַרק פּאַרגרעסערטער פּאַליפּ פון אַ פּרישוואַסער פּאַליזאָע. פ, די פּיילהערענדלעך; ש, דער שלונד, מ, דער מאַגען; נ, געדערום (שפּייז־קאַנאַל); ק, דער קראַפּ אָדער וואַליאַ ווי ביי אַ פּויגעל); ר, דער רעקטום.

די לאַמפּ־מושלען זיינען ווייכע חי'ה'לעך, וועלכע לעבען אין צוויידעקעלדיגע מושלען. איין דעקעל איז איבער דעם רוקען פון דער באַשעפּעניש און אַ צווייטער אונטער איהר בויך. זי האָט אַ פּאַר אויסגעשטעלטע ליפּען, ווי אַרעמס אַרום איהר מויל, וועלכע זיינען צונויפגעדרעהט ווי צוויי שפּיראַלען. די דאָזיגע ליפּען זיינען באַוואַקסען מיט באַוועגליכע הערעלעך, וועלכע דינענען איהר צו פּאַנגען שפּייז, וואָס באַשטעהט פון קליינע ים־חי'ה'לעך און

פלאנצען. מען נעמט אָן, אַז אויך די לאַמפּ-מושלען פיהרען זייער יחוס-בריעף פון די רינגעל-ווערם, אָבער דאָס איז ניט זיכער.



צייכנונג 44 — לאַמפּ-מושלען (בראַכיפּאָדען). א, אַ  
בראַכיפּאָד מיט זיין מושעל און מוסקעל-שמענגעל (ש), מיט  
וועלכען ער באַהעפט זיך צו שטוינער, שטיקער האַלץ א. א. וו.  
ב, דער מושעל געזעהן פון הינטען, וואו עס זעהט זיך דער ברעג  
פון דעם אונטערשטען דעקעל, און די עפענונג (ע), דורך וואָס  
עס געהט דורך דער שמענגעל. ג, אַן אויפגעשניטענער מושעל,  
וואו מען קען זעהן דעם מאַגען (מ), די ספּיראל-עהנליכע  
אַרעמס (ה), דעם לעבער (ז), די עפענונג (ע), דורך וועלכע  
עס געהט דורך דער מוסקעל-שמענגעל (ש).


## ניינטער קאפיטעל

דער שמערן-פיש. — זיין ענטוויקלונג. — דער שלאנגען-שמערן. — דער  
ימ-איגעל. — די ימ-אוגערקע. — די ימ-ליליע. — די באוועגונגס-  
סיסטעם פון די שמערן-פיש.

### די שטאכעל-הויט ים-חיות—עכינאָדערמען.

דער שמערן-פיש. — די שטאכעל-הויט ים-חיות, אָדער  
עכינאָדערמען, ווי זיי ווערען גערופען מיט זייער וויסענשאפטליך-  
כען נאָמען, שטעלט מיט זיך פאַר אַ גרופע ים-באַשעפענישען, וואָס  
די געמיינשאפטליכע אויסערליכע כאַראַקטעריסטיק זייערע באַ-  
שמעהט אין דעם, וואָס זייער הויט איז באַדעקט מיט שטאכעלען  
אָדער שטעכיגע קערנדלאך. פון דעם דאָזיגען אויסערליכען סמן  
קומט דער נאָמען פון דער דאָזיגער גרופע באַשעפענישען. די  
עכינאָדערמען גרופע שליסט איין אין זיך די שמערן-פיש, די  
שלאנגען-שמערן, די ים-אינגלען, די ים-ליליען און די ים-אוגערקעס.  
זיי זיינען אלע ים-חיות און מען געפינט זיי כמעט ביי אלע ברע-  
גען פון די ימים איבער דער גאנצער וועלט. די פארשידענע זאָר-  
טען באַשעפענישען, וועלכע געהערען צו דער דאָזיגער גרופע, לע-  
בען אין ים אינטער פארשידענע באדינגונגען, און די פאָרם פון  
זייערע קערפער און פון זייערע אָרגאַנען זיינען דאָריבער אין אַ  
גרויסער מאָס פארשיידען ווייל זיי האַרפען זיך צופאַסען צו די  
פארשיידענע באדינגונגען אין וועלכע זיי לעבען. דאָך, ניט קוקענדיג  
דיג אויף די אלע פארשידענהייטען, שטעלען די פארשידענע מיט-  
גלידער פון דער עכינאָדערמען גרופע מיט זיך פאַר אין זייער הויפט-  
כאַראַקטעריסטיק אַ באַזונדערע עהנליכקייט איינע צו די אַנדערע.  
דער שמערן-פיש איז די באַזונדערס טיפישע פאָרם פון דער  
עכינאָדערמען גרופע. די דאָזיגע באַשעפעניש האָט אַ שמערן-  
עהנליכע פאָרם, און דערפון קומט איהר נאָמען שמערן-פיש.  
דער קערפער פון שמערן-פיש באַשמעהט פון אַ דיסק (רונדע  
פלאַטע) פון וועלכען עס געהען אַרויס פינף אָרעמס אָדער שטראַלען  
(ווי מען צייכענט געוועהנליך אַ שמערן). אין מיטען פון דעם

דיסק פון דער אונטערשטער זייט געפינט זיך דאָס מויל, פון וועל־  
 כען עס ציהט זיך טיעפע גראָבענדלעך, אָנגעפילט מיט אַ מאַסע  
 קליינע רעהרעלעך, ביַן צו דעם ענר פון יעדער אָרעם. די דאָזיגע  
 רעהרעלעך דיענען דעם שטערן־פיש אַלס פיס, מיט וועלכע ער באַ־  
 וועגט זיך און מיט וועלכע ער זויגט זיך אָן צו פעלזען אָדער צו  
 אַנדערע געגענשטענדע און קען זיך פעסט האַלטען. אין די  
 ווענטלעך פון זיין קערפער געפינען זיך אַ גרויסע אנצאָהל קליינע



צייכונג 45. — אַ געווענליכער שטערן־פיש (נאַטירליכע גרויס).

פלאַכע קאָל־פלאַטען, וועלכע זיינען צונויפגעשטעלט איינע ביי  
 די אַנדערע, ראַנד צו ראַנד, און דיענען אַלס שוץ פאַר די אינער־  
 ליכע אָרגאַנען. צווישען די פלאַטען געפינען זיך אַ סך פּאַרען  
 (לעכעלעך), כּדי דאָס וואַסער זאָל קענען צוקומען צום קערפער.  
 דער גאַנצער קערפער פון שטערן־פיש איז באַדעקט מיט  
 שטאַכעלען אָדער שפּילקעס, וועלכע דינען איהם פאַר שוץ גע־  
 גען אָנגרייפּענדע פיינד. זיין באַליעבטעסטע שפייז זיינען געווי־



סע מאָלוסקען, באזונדערס אזעלכע, וועלכע געפינען זיך אין צוויי דעקעלדיגע מושלען, אַיסטערס, למשל. די קליינע מאָלוסקען, וועלכע ער געפינט פריי אָהן זייערע מושלען, פארשלינגט ער גלייך. ווען אָבער דער שטערן־פּיש געפינט אַ גרעסערע מושעל אין זיין וועג, זוכענדיג שפייז, לעגט ער זיך אַריבער איבער איהם מיט זיין קערפער, עפענט פונאָנדער דעם מושעל, שטאַפט אַרויס זיין מאַגען דורך זיין מויל און דריקט איהם אַריין אין דעם מושעל אַיבער דעם ווייכען קערפער פון דעם מאָלוסק, און אזוי פאַרדייט אַיהם דער שטערן־פּיש ביסלעכווייז ביז ער זיגט איהם אַריין אין זיין קערפער. די שטערן־פּיש זיינען גרויסע פאַרניכטער פון אַיסטערס. אַיסטער־פּישער געברויכען פאַרשיעדענע מיטלען אויס־צוראַטען די שטערן־פּיש, וואו זיי באַמערקען זיי נאָר. צוהאַקען אָדער צורייסען אַ שטערן־פּיש אויף שטיקער העלפט ניט איהם צו פאַרניכטען. אין געגענטייל, דורך דעם פאַרמעהרט מען זיי נאָך, ווייל עס זיינען פאַראַן סאָרטען שטערן־פּיש, וואָס פון יעדער שטיק וואָס מען האַקט אָדער רייסט אָפּ קען זיך ענטוויקלען אַ גאַנצער שטערן־פּיש. די אייגענשאַפט צוריקצוגעווינען פאַרלאָרענע גליעדער באַזיצען אלע שטערן־פּיש. ווען מען האַקט אָפּ פון אַ שטערן־פּיש זיינע אַרעמס, דויערט עס בלוז אַ צוויי דריי מאָנאַט און זיי וואַקסען איהם אָפּ צוריק. און ווען מען האַקט אַפילו אַראַפּ דעם דיסק און מען לאָזט אַ קליינעם טייל פון איהם מיט זיין אַרעם וואַקסט אויס פון דעם געבליבענעם שטיק אין צוויי אָדער דריי מאָנאַטען צוריק אַ גאַנצער שטערן־פּיש.

דאָס פאַרדייאונגס־סיסטעם איז ביי די פאַרשיעדענאַרטטיגע שטערן־פּיש אונגעפעהר גלייך. דאָס מויל פון שטערן־פּיש געהט כמעט דירעקט צום מאַגען, וועלכער האָט די פאַרם פון אַ זעקעל אין קנייטשען און פאַלבען. דער מאַגען געפינט זיך אין צענד־טער פון קערפער, אין דעם דיסק, איבער דעם מויל. טיילען פון מאַגען געהען אויך אַריין אין די אַרעמס פון שטערן־פּיש, וואו זיי זיינען פאַרבונדען מיט אַ געדערם־קישקע, וועלכע געפינט זיך אין יעדען אַרעם. מיט יעדער געדערם־קישקע פון יעדען אַרעם איז פאַרבונדען אַ לעבער, וועלכע גיט פון זיך אַרויס אַ זעהר ביטערע פליסיגקייט.

די ענטוויקלונג פון שטערן־פּיש. — עס זיינען פאַראַן מענליכע שטערן־פּיש און ווייבליכע. מען קען דעם געשלעכט פון


די שטערן־פיש זאגאר דערקענען לויט'ן קאליר. די וויבליכע שטערן־פיש האָבען אַ בלויליכען קאליר, וועהרענר די מענליכע זיינען פון אַ רויט־ברוינליכען קאליר. סאי די אייעלעך, סאי די זרע, וואָס באַפרוכטעט זיי, ווערען פון די שטערן־פיש אַריינגע־לאָזען פריי אין וואַסער. די אייער זיינען אזוי קליין, דאָס מען קען זיי קוים זעהן מיט'ן נאָקעטען אויג. יעדעס אייעלע איז איינ־געשלאָסען אין אַ דין, דעליקאט הייטעלע. יעדעס אייעלע מאַכט דורך אַ גאַנצען פראָצעס פון שפּאַלטונגען. צוערשט שפּאַלט עס זיך אין צוויי קייקעלעך, נאָכדעם אין פיער, אכט, זעכצען א. א. ז. ו. ווען דאָס אייעלע ענדיגט זיך שפּאַלטען ווערט געבילדעט אַ רונדער פוסטער באַל, וואָס זיינע ווענטלעך באַשטעהען פון די אלע קייקעלעך, אָדער צעלען, אויף וועלכע דאָס אייעלע האָט זיך געשפּאַלטען. דער דאָזיגער פוסטער באַל ווערט אָנגערופען „בלאַס־טולאַ“. דאן פאנגט זיך אָן איין זייט פון דעם דאָזיגען פוסטען באַל אַריינדרינגען נאָך אינוועניג, ביז ער דריקט זיך אַריין אין גאַנצען און פון דעם באַל באַקומט זיך די פאָרם פון אַ דאָפּעלטע יארמעלעקע, איינע אין דער אַנדערער. די דאָזיגע „דאָפּעל יאר־מולקע“ ווערט אָנגערופען „גאַסטרולאַ“. אין דער ווייטערדיגער ענטוויקלונג פון דעם קערפּער פון שטערן־פיש, ברעכט זיך דורך אַן עפענונג אין דער „גאַסטרולאַ“, דאָס איז דאָס מויל פון דעם צוקינפטיגען שטערן־פיש. דאן פאנגען אָן אַרויסוואַקסען פון די זייטען פון דעם יונגען קערפּער אַרעמס, וועלכע זיינען אָפּגעזוימט מיט דינע הערעלעך. אונטערדעסען פאנגט זיך אָן אינוועניג, אין דעם קערפּער, פאָרמירען די קאלך־פלאַטען און די וואַסער־רעהרען, וואס דער שטערן־פיש האָט אין זיין קערפּער, וועלכע וועלען שפעטער באַשריבען ווערען. אין דער ווייטערדיגער ענט־וויקלונג, ווערען די ערשטע אַרעמס, וועלכע זיינען אַרויסגעוואַקסען, פארשוואונדען צוזאַמען מיט דער „גאַסטרולאַ“ און דער יונג־געבאָרענע שטערן־פיש, וועלכער איז ביז איצט פריי אַרומגע־שוואַמען אין וואַסער, באַזעצט זיך אויף דעם גרונט פון ים צו ענדיגען זיין ענטוויקלונג. אין דעם צושטאַנד איז דער דיסק פון דעם יונגען שטערן־פיש אזוי גרויס און זיינע אַרעמס אזוי קורץ, דאָס ער איז גאַנץ וועניג עהנליך צו זיינע עלטערען. ביסלעכווייז אָבער ווערען זיינע אַרעמס לענגער און אין אַ משך פון דריי יאָהר וואַקסען זיי אויס און דער יונגער שטערן־פיש באַקומט דאָס אויס־

זעהן פון זיינע עלטערן. אין די יונגע יאָהרען האָבען אַלע שטערן-פיש בלוזי פינף ארעמס אדער שטראַהלען, אָבער ווען זיי ווערען עלטער וואַקסען ביי מאַנכע ספעציעס אויס נאָך אַרעמס, ביי אַנדערע זאָגאר ביז דרייסיג שטיק.

די מייסטע שטערן-פיש געפינען זיך אין די וואַסערען ביי די ברעגעס פון די ימים, וואו זיי קריכען ארום זוכען זייער שפייז, אָדער ליעגען באהאלטען אין די שפאלטען פון די פעלזען, וואו מען קען זיי געפינען אין דער צייט פון עבע (ווען דאָס וואַסער פאַלט אָפּ).

דער שלאַנגען-שטערן. — אַ צווייטער אין דער גרופע פון עכינאָדערמען איז דער שלאַנגען-שטערן. ער איז אין אַלגעמיין עהנליך צו דעם באַשריבענעם שטערן-פיש, ער אונטערשיידעט

זיך אבער פון איהם דער מיט, וואס זיין דיסק זעהט זיך מעהר אָן. ער איז מעהר אַרויסגעטיילט און די אַרעמס זיינע זיינען פיעל לענגער און דינער. זיינע ארעמס האָבען די עהנלייכקייט צו שלאַנגען און פון דעם קומט זיין נאָמען „שלאַנגען-שטערן.“ צוליב זייער נע לאַנגע ארעמס קען זיך דער שלאַנגען-שטערן זעהר




צייכונג 46. — אַ שלאַנגען שטערן-פיש.

שנעל און לייכט באוועגען אויף דעם גרונד פון ים אָדער דורך די פעלזען-שפאלטען, וואו ער געהט זוכען זיין שפייז.

ביי דעם שלאַנגען-שטערן קומען די פאַרדייאונגס-אָרגאַנען ניט אַרײַן אין די אַרעמס, ווי דאָס איז דער פאַל ביי דעם שטערן-פיש. ער וואַרפט דעריבער אָפּט אין גאַנצען אַוועק זיינע אַרעמס. זיי ברעכען זיך לייכט ביי איהם אָפּ און עס שאַדט איהם ניט. צוליב דעם, וואָס זיינע אַרעמס ברעכען זיך אזוי לייכט, ווערט ער אויך גערופען „ברעך-שטערן.“

ביי אייניגע ספעציעס, וועלכע זיינען זעהר נאָהנט עהנליך צו דעם שלאַנגען-שטערן, צוטיילען זיך די אַרעמס אין נייע אַרעמס און די נייע אַרעמס טיילען זיך ווידער אין נייע. מיט זייערע


פיעל אָרעמס, וועלכע זיינען צונויפגעדערעהט און צונויפגעפלאַכט טען, זעהען זיי אויס ווי קערבלעך. מען רופט זיי דעריבער „קאַרב־שטערן.“ זיי לעבען אין די טיעפערע וואַסערען פון ים. זיי געהן רען זיך, צוגלייך מיט די שלאַנגען־שטערן, פון פארפּוילטע פלאַנצן צען אָדער רעשטען פון טויטע חיות, וועלכע זיי געפינען אויפ'ן גרונט פון ים.



צייכונג 47. — אַ קאַרב־שטערן־פּיש.

דער ים־איגעל. — אַ גאַנץ כאַראַקטעריסטישע באַשעפער ניש פון דער עכינאָדערמען גרופע איז דער ים־איגעל אָדער ים־יאָזשיק. פון ערשטען בליק, ווען מען זעהט דעם רונדען באל־פערמיגען מיט נאָדלען באַדעקטען קערפער פון דעם ים־איגעל, קען עס ניט איינפאַלען, אז ער איז אזא נאָהנטער קרוב פון דעם שטערן־פּיש, אָבער ווען מען אונטערזוכט איהם גענויער, געפינט מען אין איהם אלע סמנים פון גאַנץ נאָהנטער פאַרוואַנדשאַפט. דער ים־איגעל האָט זיין מויל, אזוי ווי דער שטערן־פּיש, אין זיין אונטער־שטער זייט, ד. ה. אין דער בויך זייט. ער האָט אָבער פינף שאַר־פע צייהנער אין זיין מויל, וואָס דער שטערן־פּיש האָט עס ניט. די צייהנער אין דעם מויל פון דעם ים־איגעל באַוועגען זיך מיט דער הילף פון ספעציעלע מוסקולען. פון מויל טיילען זיך פונאַנט־

דער אין פינף ריכטונגען פינף רייהען פיס, וועלכע ענדיגען זיך  
ניט ווייט פון צענטער אויף דער רוקען-זייט. אזוי ווי ביי דעם  
שטערן-פיש איז אויך ביי דעם ים-איגעל דער סקעלעט פון זיין  
קערפער צונויפגעשטעלט פון קאלך-פלאטען. ביי דעם ים-איגעל




צייכונג 48. — א ים-איגעל (ים-אָזשוק).

זיינען די דאָזיגע פלאטען נאָר רעגעלמעסיגער און פעסטער אריינ-  
געפאסט איינע אין די אנדערע. יעדע פון די פלאטען באזונדער  
האָט איהרע אייגענע שטאכלען, וועלכע באוועגען זיך אויף א גע-  
לענק. די דאָזיגע שטאכלען ווערען פון דעם ים-איגעל באנוצט  
זיך צו באוועגען און אין מאנכע פעלע אריינצובריינגען שפייז אין

זיין מויל. ווען מען קוקט זיך גוט צו צו דעם קערפער פון דעם ים־איגעל געפינט מען אין איהם אויך די שטערן־פערמינקייט. דער אונטערשיעד איז נאָר, וואָס זיין דיסק איז גרויס און ענטוויקעלט, וועהרענדר זיינע אָרעמס זיינען קורץ און ניט גוט ענטוויקעלט.

דער ים־איגעל ליעגט מייסטענס איינגעגראָבען אין בלאַטע אָדער אין לעכער פון פעלזען, וועלכע ער גראַבט אויס. אַנדערע באַדעקען זיך מיט ים־גראַז, כרי זיי זאָלען זיך ניט אַרויסזעהן. ער לעבט מעהר אַ באַהאַלטענעם לעבען ווי דער שטערן־פּיש. ער עסט פאַרשיעדענע קליינע ים־חיה'לעך, וואָס ער פאַנגט, און ווען ער איז גוט הונגעריג שלינגט ער די בלאַטע, אין וועלכע ער גע־פינט זיך, און זויגט אַרויס די אָרגאַנישע שטאָפּען, וועלכע זיינען אין דער בלאַטען פאַראַן.

עס זיינען אויך פאַראַן אַזעלכע ים־איגעלען, וואָס זייער קער־פער איז פלאַטשיג. זיי לעבען אין דעם זאַמד פון ים און מען רופט זיי „זאַמד־פלאַטען“. אין אַמעריקא רופט מען זיי „זאַמד־דאָלאַרס“.



צייכנונג 49. — אַ ים־אונגערקע.

די ים־אונגערקע (קוקומאַריאַ). — ווען מען זאָל נעהמען דעם קערפער פון אַ ים־איגעל, מיט איין האַנד האַלטען איהם פאַר'ן מויל און מיט דער אַנדערער האַנט פאַר'ן מיטען פון זיין רוקען און איהם ציהען, וואָלט ער דאָן אָנגעמען די פאָרם פון דער ים־באַשעפעניש, וועלכע מען האָט אַ נאָמען געגעבען „ים־אונגערקע“. די דאָזיגע באַשעפעניש באַלאַנגט אויך צו דער גרופע עכינאָדער־מען און לויט אַלע איהרע סמנים שטעהט זי אין גאַנץ נאָהנטע קרוב'ה־שאַפט מיט דעם שטערן־פּיש. זי האָט דאָס אויסזעהן פון אַן אונגערקע און דערפון קומט איהר נאָמען. זי לעבט אין די

שפאלטען פון ים־פעלזען, אין דעם זאמד אָדער בלאָטע פון גרונט ים. דער סקעלעט איהרער באשטעהט פון אייניגע קאלך־פלאטען, וועלכע זיינען פארטיילט אין איהרע פליישיגע ווענטלעך פון איהר קערפער. זי האָט פיעל וועניגער קאלך־פלאטען אין איהר קערפער, ווי דער ים־איגעל און אויך וועניגער ווי דער שטערן־פיש. פאר דעם ארט לעבען, וואָס די ים־אונגערקע פיהרט, וואָלטען מעהרערע קאלך־פלאטען אין איהר קערפער געווען פאר איהר מעהר א שטע־רונג ווי א נוצען. עס וואָלט געמאכט איהר קערפער שטייפער און וועניגער באַוועגליך. איהר שפיז איז אונגעפעהר דאָסזעל־בע, וואָס פון דעם ים־איגעל. כאַראַקטעריסטיש פאר דער ים־אונגערקע איז, וואָס ארום איהר מויל געפינט זיך א קראַנץ פון פיהל־הערענדליך. עס איז ניט גענוי באַשטימט וועלכען צוועק זיי דיענען, צי זיי דיענען איהר פאר דעם צוועק צו אָטעמען, צי פאר דעם צוועק פון באַוועגונג, אָדער צו פאנגען שפיז.


אין כינא ווערט א געוויסער סאָרט ים־אונגערקעס געברויבט אלס שפיז פון די כינעזער. זיי ווערען געפאנגען אין דעם פאסי־פישען און כינעזישען ים, וואו זיי זיינען באַקאנט אונטער דעם נאָמען „טרעפאנגען“. זיי ווערען אויפגעשניטען, געוואשען, גע־קאכט, געטריקענט און מאַנכעס מאַל אויך גערויכערט. די כינע־זער האַלטען זיי פאר א גרויסע דעליקאַטעסע.

די ים־ליליע (קרינאָיד). — אן אינטערעסאַנטער מיטגליעד פון דער עכינאָדערמען גרופע איז די ים־ליליע. זי זעהט אויס ניכער ווי א פלאַנצע, ווי א בלום, וואָס וואַקסט אויף א שטענ־געל, איידער אלס א ים־חיה. נאָר ווען מען זאָל געהמען א קאָרב־שטערן, וואָס איז פריהער באַשריבען געוואָרען, און איהם ארויפ־שטעקען אויף א שטענגעל, וועט זיך פון איהם באַקומען א גרוי־סע עהנליכקייט צו דער ים־ליליע, וועלכע איז טאַקע אליין אייגע פון די ספעציעס פון די שטערן־פיש.

די ים־ליליען לעבען אין די טיעפע וואַסערען פון ים. זיי זיינען צוגעוואַקסען צום גרונד פון ים דורך א שטענגעל. מאַנכע זאָרטען פון די ים־ליליען רייסען זיך אין זייערע עלטערע יאָהרען אָפּ פון זייער שטענגעל און שווימען פריי ארום אין ים.

די ים־ליליען זיינען אין א געוויסער עפאָכע פון דער ענט־וויקלונג פון אונזער וועלט געווען זעהר שטאַרק פאַרשפּרייט אין די וועלט ימים, אָבער איצט איז פון זיי וועניג געבליבען. מעה־

רערע ספעציעס פון זיי זיינען אין גאנצען אויסגעשטאָרבען און מען קען זיי בלויז געפינען אין פארשטיינערטע פארמען. פון די, וועלכע זיינען נאָך געבליבען לעבען ביז דער איצטיגער צייט, זיינען די מעהר פארשפרייטע די „פערער־שטערן“, ווי מען רופט זיי. דער קערפער פון דעם פערער־שטערן באשטעהט פון אַ דיסק, וועלכער איז אויסגעבילדעט פון קאלך־פלאַטען. פון דעם ראַנד




צייכונג 50. — אַ ים־ליליען, אָדער פערער־שטערן (קרינאיד).

פון דעם דיסק געהען ארויס פינף אָרעמס, וואָס יעדער פון זיי צו טיילט זיך שפעטער אין צווייען און עס באַקומען זיך, ווען זיי וואַקסען אויס, צעהן לאַנגע, דינע שטראַהלען אָדער אָרעמס. יעדער אָרעם איז באַוואַקסען פון ביידע זייטען מיט קליינע נאָדער לעך און ער זעהט אויס עהנליך צו אַ פערער, און דערפון קומט דער נאָמען פערער־שטערן.  
די באַוועגונגס־סיסטעם. — באַזונדערס כאַראַקטעריסטיש



פאר דער עכינאדערמען גרופע, וועלכע איז דאָ באַשריבען גע-  
וואָרען, איז די באַוועגונגס־סיסטעם, וועלכע איז, מיט קליינע ענ-  
דערונגען, כמעט דיזעלבע ביי אלע מיטגלידער פון דער דאָזיגער  
גרופע.

ווען מען אונטערזוכט די אָרגאנען פון דעם שטערן־פיש מיט  
אַ מיקראַסקאָפּ באַמערקט מען, אַז די רונדע־פלאַטע פון דער רוי-  
קען־זייט, וועלכע געפינט זיך אין דעם ווינקעל פון צוויי אָרעמס,



צייכנונג 51. — די ענטוויקלונג פון אַ פעדער־שטערן  
אָדער ים־ליליע. א, אַ גאַנץ יונגער פעדער־שטערן; ב, זיין  
ווייטערדיגע ענטוויקלונג; ג, אינגאנצען ענטוויקעלט זיך אַפֿ-  
צומילען פון שטענגעל און ווערען אַ פרוי־שווימענדער פעדער־  
שטערען (זעהר שטאַרק פאַרגרעסערט); ד, אַ פּאַלשטענדיגער  
ענטוויקעלטער פרוי־שווימענדער פעדער־שטערען.

איז פול מיט קליינע לעכעלעך. די דאָזיגע פלאַטע איז פאַרבונ-  
טען מיט אַ רעהרעל, וואָס געהט צו דער געגענגעזעצטער זייט  
פון קערפער און וועלכער געהט אַרײַן אין אַ קאַנאַל, וואָס רינ-  
געלט אַרום דאָס מויל פון שטערן־פיש, ווי אַ רינג. צו דעם דאָ-  
זיגען רינגקאַנאַל זיינען באַהעפט אַן אַנצאַהל קליינע זאַקע־הנ-  
ליכע רעזערוואַרען, פון וועלכע עס ציהט זיך אַ רעהרעל ביז צו  
דעם שפיץ פון דער אונטערשטער זייט פון יעדען אָרעם. פון די  
דאָזיגע הויפּט־רעהרען ציהען זיך אַן אַנצאַהל זייטען־רעהרען, וועל-

כע ענדיגען זיך אין קליינע רעזערוואווארען, עהנליך צו די, וועל-  
 כע געפינען זיך אויף דעם רינגקאנאל. די דאָזיגע רעזערוואווארען  
 פאראייניגען זיך דורך די וואנט פון קערפער מיט די רעהרען  
 פיסלעך פון דעם שטערן-פיש, וועלכע געפינען זיך אין א גרויסער  
 צאָהל אין די גראַבענדלעך פון דער אונטערשטער זייט פון זיינע  
 אָרעמס. דאָס דאָזיגע גאנצע סיסטעם פון רעהרען און רעזערוואווא-  
 רען ווערט אָנגעפילט מיט וואַסער דורך די לעכעלדיגע רונדע קאַלך-  
 פלאַטע, וועלכע איז דאָ באַשריבען געוואָרען. ווען דער שטערן-  
 פיש וויל זיך באַוועגען, ציהען זיך פיעל פון די קליינע רעזערוואווא-  
 רען צוזאַמען און דריקען אַרײַן דאָס וואַסער, וואָס געפינט זיך אין  
 זיי, אין די רעהרען-פיסלעך, וועלכע געפינען זיך אין די גראַ-  
 בענדלעך פון דער אונטערשטער זייט פון די אָרעמס. יעדעס רעהר-  
 רען-פיסעל האָט ביי זיין ענד אַ קליינע זויג-מויל. ווען דאָס וואַ-  
 סער פון די קליינע רעזערוואווארען ווערט געדריקט אין די רעהר-  
 רען פיסלעך, זויגען זיך זייערע זויג-מייילכעלעך צו צו דעם געגענ-  
 שטאַנד, אויף וועלכען זיי שטעהען. ווען דאָס וואַסער ווערט פון  
 זיי צוריקגעצויגען, לאָזען די זויג-מייילכעלעך פון די רעהרען-פיסלעך  
 אָב דעם געגענשטאַנד, צו וועלכען זיי האָבען זיך צוגעזויגען. דורך  
 דאָס כסדר'דיגע אַרײַנדריקען און צוריקציהען פון וואַסער אין די  
 רעהרען-פיסלעך, לאָזען זיי זיך אראַפ און הויבען זיך אויף, ציהען  
 זיך אויס און ציהען זיך צוזאַמען און אויף אַזאַ אופן באַוועגט  
 זיך דער שטערן-פיש אין דער ריכטונג אין וועלכער ער וויל געהן.  
 די דאָזיגע מעטאָדע פון באַוועגונג האָבען אויך די ים איגלען  
 און די ים-אונגערקעס. דער שלאַנגען-שטערן אָבער באַוועגט זיך  
 מיט דער הילף פון זיינע לאַנגע, דינע אָרעמס. די רעהרען-פיס-  
 לעך האָבען זיך ביי דעם שלאַנגען-שטערן פארוואנדעלט אין פיהל-  
 הערענדלעך. דאָס זעלבע האָט אויך פאַסירט ביי דער ים-לייליע,  
 וועלכע האָט אין אַלגעמיין ניט קיין באַוועגונגס-פעהיגקייט.  
 ביי מאַנכע ים-אונגערקעס ציהען זיך פינף רייען רעהרען-  
 פיסלעך, גלייך אָפגעטיילט איינע פון די אַנדערע, פון איין ענד  
 פון קערפער ביז'ן צווייטען, און די באַשעפעניש באַוועגט זיך מיט  
 זיי אויף וועלכער זייט זי זאָל ניט ליעגען. די יעניגע ספּעציעס  
 פון ים-אונגערקעס, וועלכען לעבען אין זאַמר, וואו עס איז שווער  
 זיך צו באַוועגען מיט רעהרען-פיסלעך, האָבען אין גאַנצען פאַרלאָז-  
 רען די רעהרען-פיסלעך און זיי קריכען ווי ערדיווערים.

## צעהנמער קאפיטעל.

דריי קלאסען מאָלוסקען: לאַמעליבראַנכען, גאַסטעראַפּאָדען און סעפּאַ-  
לאַפּאָדען. — ווענוס-מושלען. — אויסטערס. — מערעדא מושלען. —  
מיטילוס-מושלען. — שנעקען. — טיגנפיש.

## די מאָלוסקען.

די איינטיילונג פון די מאָלוסקען. — די מאָלוסקען שטע-  
לען מיט זיך פאַר א גרויסע גרופע פון באַשעפענשיען פון פאַר-  
שיעדענעם אויסזעהן און גרויס אבער זיי האָבען אלע אַ גרונד-  
עהנליכקייט און גלייכע פונדאַמענטאַלע אייגענשאַפטען, וועלכע  
צייגען קלאָר זייער נאָהנטע קרובה'שאַפט, ווי פארשיעדען אין  
אויסזעהן זיי זאָלען ניט זיין. זייענדיג געצוואונגען זיך צו צו-  
פאַסען צו פארשיעדענע באדינגונגען פון לעבען האָבען זיך ביי  
די מאָלוסקען אויסגעבילדעט פארשיעדענע ענדערונגען אין זייער  
קערפער און אָרגאַניזם, אבער די פונדאַמענטאַלע עהנליכקייטען  
זיינען געבליבען. ביי אלע מאָלוסקען איז די הויט אַ ווייכע און  
א שלימיגע, זיי נויטיגען זיך דעריבער צו לעבען אין נאַסע ער-  
טער און דארפן כמעט אימער אַ שאַל, וואס זאָל באדעקען און  
שיצען זייער קערפער. דער אינערליכער אָרגאַניזם ביי די פאַר-  
שיעדענע מאָלוסקען האָט אַ געוויסע איינפערמיגקייט, און מען  
קען אָננעבען אַ רייה באַשטימטע כללים, וועלכע זאָלען זיין צו-  
געפאַסט צו די פארשיידענסטע אַרטען פון די מאָלוסקען. דער  
קערפער פון די פארשיעדענע מאָלוסקען איז אויסגעבילדעט אין  
אין שטח (פלעכע), כדי דער גאַנצער קערפער זאָל קענען דיענען  
אלס אַ פוס זיך צו באוועגען.


די מאָלוסקען ווערען איינגעטיילט אין דריי קלאַסען: די  
„לאַמעליבראַנכען“, די „גאַסטעראַפּאָדען“ און די „סעפּאַלאַפּאָד-  
דען“, וועלכע וועלען דאָ באַשריבען ווערען יעדע באַזונדער.  
די לאַמעליבראַנכען. — צו דעם קלאַס לאַמעליבראַנכען  
באַלאַנגען די צוויי-שאַליגע אָדער צוויי-דעקעלדיגע מאָלוסקען, ווי  
ווענוס-מושלען (קלעמו, אין ענגליש), אויסטערס און אַנדערע מיר  
שעל-חיות, וועלכע לעבען ביי די ברעגעס פון ים, אָדער אין  
111

טייכען און אָזערעס. זיי רופען זיך מיט דעם נאָמען „לאַמעלי-בראַנכען“, צוליב דעם, וואָס זייערע אָטעמס-אָרגאַנען (בראַנכי-כעס) האָבען די פאָרם פון בלעטער-עהנליכע (לאַמעלאַ) זשאַברעס, וועלכע זיינען באַדעקט מיט באַוועגליכע הערעלעך, און וועלכע געפינען זיך צו צוויי (אַ מאָל בלויז איינע) פון יעדער זייט קער-פער. זיי צייכענען זיך אויס פון די אַנדערע מאָלוסקען דערמיט, וואָס זיי האָבען ניט קיין באַשטימטען פאָרמירטען קאַפּ און זייער קערפער איז געשיצט דורך אַ מושעל, וואָס באַשטעהט פון צוויי שאַלען, דעקלעך אָדער מולטערלעך, וועלכע זיינען פאַראייניגט מיט אַ זאווייעסקע. דער מאָלוסק לעגט אין דעם מושעל אזוי, אַז די זאווייעסקע קומט אויס איבער זיין רוקען און די מולטערלעך אָדער דעקלעך פון זיינע זייטען. איין מושעל איז, אַלזא, אַ רעכ-טער און דער צווייטער אַ לינקער. ווען מען געפינט איינעם פון די צוויי דעקלעך באַמערקט מען, ווי דער הויפּט-טייל פון דעם מאָלוסק קערפער פאַרנעהמט כמעט אין גאַנצען דעם אויבערשטען טייל פון דעם מושעל, וואו די זאווייעסקע איז, וועהרענד אין דעם אונטערשטען טייל פון מושעל איז בלויז אַרויסגעשטעקט דער האַק-עהנליכער פּוס פון דעם מאָלוסק, מיט וועלכען ער קריכט דורך די זאַמד און בלאַטע, אין וועלכער ער לעבט. פון יעדער זייט פון דעם רוקען פון מאָלוסק וואַקסט אַרויס אַ שטיק הויט, וואָס ציהט זיך איבער דער גאַנצער לענג פון זיין קערפער און באַדעקט די אינוועניגסטע זייט פון יעדען דעקעל פון דעם מושעל, ווי אַן אונטערשלאַק. די דאָזיגע הויט ווערט אָנגערופען דער „מאַנטעל“ פון מאָלוסק. צווישען די צוויי „פאַלעס“ פון דעם דאָזיגען „מאַנטעל“ געפינט זיך דער פּוס פון מאָלוסק, די בלעטער-עהנליכע זשאַברעס (אָטעמונגס-אָרגאַנען), וועלכע הענגען פון ביידע זייטען פון מאָלוסק צווישען זיין פּוס און „מאַנטעל“, און איינע אַנדערע אָרגאַנען. מען קען דעם גאַנצען מאָלוסק מיט זיין מושעל, מאַנטעל, זשאַברעס און פּוס פאַרגלייכען צו אַ בוך. די צוויי דעקלעך פון מושעל זיינען די טאָוולען, די צוויי פאַלעס פון „מאַנטעל“ זיינען די פאָדער-בלעטער, די ערשטע צוויי בלעטער און די לעצטע צוויי זיינען די זשאַברעס, און די איבריגע בלעטער זיינען דער פּוס.

ביי מאַנכע ספּעציעס פון די צוויידעקעלדיגע מאָלוסקען קור מען זיך די הינטערשטע ברעגען פון זיין מאַנטעל צוזאַמען און בילדען אַ דאָפּעל-רעהר, וועלכער קען זיך איינציהען און אויס-

ציהען. דער דאָזיגער דאָפעל־רעהר ווערט אָנגערופען „סיפאָן“, און ער דינט דעם מאָלוסק פאַר אַטעמונגס־אָרגאַנען. דורך אײן עפענונג פון סיפאָן געהט דאָס וואסער אריין און דורך דעם צווייטען אַרויס.

דער ווענוס־מושעל (קלעם). — די באַשרייבונג, וועלכע איז דאָ געגעבען געוואָרן וועגען די צוויי־דעקעלדיגע מושעלען איז אין אַלגעמיין צוגעפאַסט צו דעם ווענוס־מושעל, וועלכער איז שטאַרק פאַרשפּרייט אין די וואסערען פון אמעריקא און ווערט



צייכונג 52. — די אַנאַטאָמיע פון אַ דעקעל מאָלוסק. דער לינקער דעקעל און לינקער מאַנטעל־פּאַלע איז אַראָפּגענומען. ס, די אַטעמונגס־סיפּאָנען. די פּוילען צייגען די ריכטונג וווּ דאָס וואַסער געהט אַריין אין און געהט אַרויס פון מושעל; צ, די ציהימוסקעלן, מיט וועלכע דער מאָלוסק האַלט פעסט די דעקלעך פון זיין מושעל. ז, די זשאַברעס; ה, דאָס האַרץ; מ, דאָס מויל; פ, די פּאַלפען (ליפען); פ, דער פּוס; ר, דאָס רעקטום (די הינטערלייב עפענונג); ב, דער מאַנטעל ברעג.

זעהר פיעל געגעסען פון דער אמעריקאנער באפעלקערונג. דאָס איינציגע וואס דארף בלויז צוגעגעבען ווערען צו דער אַלגעמינער באַשרייבונג איז, דאָס די דעקלעך פון דעם ווענוס־מושעל זיינען אַ ביסעל אויסגעקרימט און ממילא איז אויך אזוי זיין מאַנטעל.

ביי דעם ווענוס מושעל איז גאַנץ שווער צו געפינען שפורען פון אַ קאַפּ. מען קען ביי איהם אויך ניט געפינען וועלכע עס איז געפיהלס אָרגאַנען אין דער קאָפּ־געגער. אין זיין מויל איז ניט צו באַמערקען וועלכע עס איז באַשטימטע אָרגאַנען צום קויען. דאָס שפייז ווערט אריינגעבראַכט אין זיין מויל דורך אַזעלכע לאַנגע באַוועגליכע פלייש־הערעלעך, וועלכע געפינען זיך אויף זיי־נע גרויסע דרייעקיגע ליפען, וועלכע מען רופט „פּאַלפען“.

צווישען די צוויי דעקלעך פון דעם מושעל, אין דער געגער פון דער זאָוועסקע, געפינט זיך אַזאַ האָרנדיגע קישעלע, וועלכע

ווירקט ווי א פרוזשינע און זי האלט די דעקלעך אָפּען. די דעקלעך זיינען אָבער אויך פאראייניגט מיט צוויי ציהימוסקעלען, וועלכע געהען ארויס פון די צוויי זייטען פון דעם ווענוס־מושעל, מיט וועלכע ער פארשליסט די דעקלעך, ווען ער דערפיהלט א געפאהר. ווען די געפאהר איז פאָריבער לאָזט ער אָפּ די ציהימוסקולען און די דעקלעך עפענען זיך ווידער דורך דעם דרוק פון דעם פרוזשינע קישעלע. דער ווענוס־מושעל שטעקט דאָן ווידער ארויס זיין פוס דורך די עפענונג פון די דעקלעך און פויזעט זיך לאנגזאם ווייטער זיין וועג אין דער בלאָטע אָדער זאמד פון דעם וואסער, וואו ער געפינט זיך.

ווען דער מאָלוסק שטאַרבט און זיינע ציהימוסקעלען הערען אויף צו פונקציאָנירען, פאלען אָפּ די דעקלעך איינע פון די אַנ־דערע און אזוי געפינט מען זיי איינציגווייז אויפ'ן גרונט פון וואָסער אָדער ביים ברעג.

דורך די עפענונג פון די דעקלעך שטראָמט באשטענדיג דאָס וואסער אריין און ארויס, צוליבע דער באוועגונג פון די הערעלעך, וועלכע געפינען זיך אויף די זשאַברעס פון דעם ווענוס־מושעל. ווען מען טוט אריין עטוואס פארב אין דעם וואסער וואס שטראָמט אריין אין דער עפענונג פון די דעקלעך, קען מען דאָן לייכט נאָכשפירען דעם קורס פון דעם וואסער ווי עס פליסט דורך דעם קערפער פון דעם ווענוס־מושעל. דאָס וואסער געהט אריין צווישען דעם „מאַנטעל" און פוס און פליסט צו דער קאָפּ־געגענד. דערביי טיילען זיך פון הויפּט־שטראָם אָפּ קליינע זייטען־שטראָם־מען, וועלכע געהען אריין אין די קליינע עפנונגען פון די זשאַברעס, וואו זיי ווערען געפיהרט דורך קליינע רעהרעלעך אין יעדע זשאַברע ביז זיי קומען צו צו א גרויסען קאנאַל, וואָס געפינט זיך אין דעם באַזיס פון די זשאַברעס, און פון דאָרטען געהט דאָס וואסער צוריק נאָך אויסען. אין דעם דאָזיגען פראצעס ווערט דער זויער־שטאָף, פון דער לופט, וואָס געפינט זיך אין וואסער, איינגעזויגען פון די בלוט־אָדערלעך, וועלכע געפינען זיך אין די זשאַברעס און באַזארגט דעם ווענוס־מושעל מיט דעם נויטיגען זויער־שטאָף, וואָס ער דארף פאר זיין עקזיסטענץ. אין דערזעלביגער צייט בריינגט דער באשטענדיגער וואסער־שטראם מיט זיך אן אנצאָהל פון קליינע אָרגאַניזמען און שטיקלעך פון אַרגאַנישע שטאָף־פען, וועלכע ווערען אַריינגעצויגען אין דעם שטראָם, וואָס ווערט

געשאפען פון די באוועגליכע הערעלעך, וועלכע געפינען זיך אויף די ליפען פון דעם ווענוס־מושעל און ווערען אריינגעקעהרט אין זיין מויל און פארשלונגען. דאָס מויל פון דעם ווענוס־מושעל איז קליין און דער שלונד, וואָס פארבינדט זיין מויל מיט'ן מאָגען איז א קורצער, אָבער דער מאָגען זיינער איז א גאנץ גרויסער און פון זיין הינטערשטען ענד ציהט זיך אַ לאַנגע געדערם קישקע, וועלכע דרעהט זיך דורך צווישען די אַנדערע אינערליכע אָרגאַנען פון קערפער. איבער דעם מאָגען געפינט זיך אַ גרויסע דונקלע לעבער, פון וועלכען עס טיילט זיך אויס אַ פליסיגקייט, וואָס קומט אַריין אין מאָגען און העלפט איהם פאַרדייען די שפייז, וועלכע געהט נאָכדעם פון מאָגען אין געדערם קישקע, דורך וועלכער די נאַרהאַפטע שטאָפען ווערען אַרויסגעזויגען און פאַרטיילט אין קערפער.

דער אָפּפיהרונגס־אַפּאַראַט (די אָרגאַנען אפּצופיהרען דעם אָנפאַל פון קערפער), באַשטעהט פון צוויי נייערען, וועלכע האָבען די פאָרם פון אויסגעבויענע רעהרלעך, וואָס איין ענד זייערער געהט אַריין אין דעם רויס, וואו דאָס האַרץ־בייטעל געפינט זיך און זייער צווייטער ענד געהט אַרויס צו דער הינטער עפענונג פון קערפער. די ווענטלעך פון די נייערען זיינען כסדר טעטיג אַרויסצו־שטויסען די אבפאַל שטאָפען פון קערפער.

דאָס האַרץ פון דעם מושעל געפינט זיך אין דער רוקען־זייט, אין א באזונדערען רויס, און עס באַשטעהט פון צוויי פאַרקאָמע־רען און פון איין אינוועניגסטען קאַמער. דאָס בלוט וואָס דאָס האַרץ פאַרטיילט איז אזא מיכל־ווייסליכע פליסיגקייט. פון האַרץ צירקולירט דאָס בלוט דורך אַרטעריען צו די פאַרשיעדענע אָרגאַנען און דורכגעהענדיג די זשאַכרעס ווערט דאָס בלוט גערייניגט און, מיטנעמענדיג זייער־שטאָף פון זיי, קעהרט זיך אום צוריק אין די פאַרקאָמערען פון דעם האַרצען, פון דאָרט צום אינוועניגסטען קאַמער, פון דאָרט צירקולירט זי ווידער אין די אַרטעריען א. א.וו.

דער נערווען־סיסטעם פון דעם ווענוס־מושעל באַשטעהט פון דריי פאָר נערווען־קניפלעך אָדער נערווען צענטרען. — איין פאָר איבער'ן מויל, איין פאָר איבער'ן פוס און איין פאָר אונטער דעם הינטערסטען ציה־מוסקול. די נערווען־קניפלעך זיינען פאַרבונדן דען דורך נערווען־פּעדיס, וועלכע ציהען זיך צו די פאַרשיעדענע

אָרגאַנען. די דאָזיגע נערווען־צענטערען שיקען כסדר אַרויס די אימפּולסען צו די אָרגאַנען און רעגולירען אויף אַזאַ אופן די טע־טיגקייט פון קערפּער און נעהמען אויף איינדריקע פון דרויסען. די איינדריקע פון דרויסען קומען צו דעם מושעל דורך זיין טאַפּונגס־געפיהל (חוש המשוש), ווייל די אַנדערע חושים זיינען ביי איהם זעהר שוואַך ענטוויקעלט אדער זיי פעהלען איהם אין גאַנצען.


די פּרוכפּערונג פון די ווענוס־מושלען, וועלכע לעבען אין פּריש וואַסער, קומט פאַר אויף זעהר אַן אינטערעסאַנטען אופן. די פּרוכפּערונגס־אָרגאַנען געפינען זיך ביים ווענוס־מושלען אין זיין פּוּם. ווען דער מושעל לעגט אויס זיינע אייעלעך, באַהאַלט ער זיי אין דער אויסערער פלאַטע פון זיין זשאַברע, און זייענדיג דאָרטען גוט געשיצט, מאַכען זיי דורך די ערשטע שטופּע פון זייער ענטוויקלונג. עס בילדען זיך קליינצינקע מאַלוסקען, וועלכע זיי־נען איינגעשלאָסען אין צוויי קליינינקע מולטערלעך וואָס זיינען פון אויבען באַדעקט מיט צייהנדעלעך. ווען די דאָזיגע שטופּע פון ענטוויקלונג איז ערריכט, ווערען די יונגע מושלען באַהעפּט צו די פלוס־פּעדערען אדער זשאַברעס פון א פאַרביישווימענדען פּיש. אין א קורצער צייט פּרעסט זיך דער יונגער מושעל איין אין דעם קערפּער פון דעם פּיש און ער ציהט פון איהם זיין נאָה־רונג, ער לעבט אַלס א פאַראַזיט פון א פּרעמדען קערפּער. געפּי־נענדיג זיך אייניגע וואַכען אין דעם קערפּער פון פּיש, מאַכט דער יונגער מושעל דורך אַ גאַנצע רייה ענדערונגען, ביז ער באַקומט דאָס אויסזעהן פון אַ ווענוס־מושלען. דאָן ברעכט ער זיך דורך אַ וועג דורך די הויט פון פּיש, פאַרלאָזט זיין קערפּער און פאַלט אַראַפּ אויפ'ן גרונט פון וואַסער, וואו עס פאַנגט אָן צו פּיהרען אַ זעלבסטשטענדיגען, פּרייען לעבען אויף דעם שניט פון זיינע על־טערען.

די אויסטערס. — אַ שטאַרק פאַרשפּרייטער און עסבאַרער צוויי שאַליגער מאַלוסק איז דער אויסטער. אין אַלגעמיין זיינען די אויסטערס אין זייער אינערליכען אָרגאַניזם עהנליך צו די ווענוס־מושלען, אָבער זיי אונטערשיידען זיך פון זיי אין זייער אַרט לע־בען און אין זייער געבוי. אין זייער פּריהער יונגענד זיינען די אויסטערס גאַנץ לעבאָפטע באוועגליכע באשעפּענישען, וועלכע שווימען אַרום אין וואַסער. ווען זיי ווערען אָבער עלטער באַזע־צען זיי זיך אויפ'ן גרונט פון אַ ריינעם וואַסער, אין אַ שטילען



פלאַץ, וואו עס איז פאראן גענוג שפייז, און לעבען דאָרטען אָפּ זייערע יאָהרען, ווען מען לאָזט זיי.

דער אויסטער האָט די טבע צו לינגען אויף דער לינקער זייט און דער לינקער מולטערל זיינער ווערט דעריבער פיעל טיעפער ווי דער רעכטער. די שאַלכלעך פון דעם אויסטער האָבען דעם אויסזעהן ווי א טיעפער מולטערעל מיט א דעקעל. ווען דער אויסטער לעגט זיך אוועק אין דעם אָרט, וואס ער האָט זיך אויסגעקליבען, ווערט אין א קורצער צייט ארום זיין לינקער מולטערעל, דער טיעפער, אָנגעוואקסען צו א שטיין אדער צו וועלכער עס איז מולטערעל פון א מאָלוסק, און ווען מען רייסט איהם ניט אָפּ מיט



צייכונג 58. — אן אויסטער פון וועלכען דער לינקער מושעל-דעקעל איז אראפגענומען. ה, דאס האַרץ; כ, מויל.

געוואלט בלייבט ער אזוי לענגען פאר דער גאנצער צייט פון זיין עקזיסטענץ.

דער אויסטער האָט בלויז איין ציהמוסקעל, מיט וועלכען ער פארמאכט זיינע מולטערלעך. קיין פוס האָט ער גאָר ניט, ער האָט עס ניט נויטיג, ווייל ער לעגט אלע מאָל אויף אן ארט און קריכט ניט ארום ווי זיין קרוב דער ווענוס-מושעל.

די ענטוויקלונג פון די אויסטערס איז א פיעל איינפאכערע ווי פון די ווענוס-מושעלען. דער אויסטער האָט זיינע פרוכפערונגס אָרגאנען אין זיין ציה-מושעל. זיינע אייעלעך לעגט ער דירעקט אין וואסער, וואו זיי ענטוויקלען זיך. און אזוי ווי זיי זיינען אין אזעלכע אומשמענדען אונטערווארפען פארשיעדענע געפאהרען פון


פארניכטונג, ווי פארצעהרט צו ווערען פון די פארשיעדענארטיגן טיגע ים-באשעפענישען, צושלאָגען ווערען פון כוואַליעס, זיינען זייערע שאַנסען פון ענטוויקלונג זעהר קליינע. צוליב דעם דאָר זיגען גרונד לעגען די אויסטערס זייערע אייער אין ריעזיג גרוי סע צאָהלען. עס ווערט געשאצט, אז איין אויסטער לעגט אויס אין א סעזאן פון 2 מיליאן ביז 40 מיליאן אייער. פון אזא ריע זיג גרויסער צאָהל האָבען שוין אייניגע א שאַנס זיך צו ענטוויקלען און אויסצואוואקסען. עס נעהמט פון 4 ביז 5 יאָהר איידער די אויסטערס ווערען ריף, אז זיי זאָלען זיין גוט צום עסען.

עס זיינען פאראן א גאנצע רייה פארשיעדענע ספעציעס פון אויסטערס, די באזונדערס אינטערעסאנטע זיינען די פערל אוי-סטערס. אין די דאָזיגע אויסטערס ווערען אפט געפונען פערל. עס ווערט אָנגענומען, אז דער פערל ווערט געשאפען פון קערנר-לעך זאמד אדער אנדערע שטיקלעך הארטע שטאָפען, וועלכע פאָלען אריין צווישען דעם „מאנטעל“ פון דעם אויסטער און זיינע שאָלען. די קערנרלעך רייבען זעהר שטארק די מאנטעל-הויט פון דעם אויסטער און ער פאָנגט אן ארויסצוגעבען פון זיך אזא זאפט פון א פערלדיגען קאָליר, וואָס ווערט פאָרגליווערט און וועלכער לעגט זיך ארום דעם פרעמדען קערנדעל און באַדעקט איהם פון אלע זייטען. דער גלאַנץ פון דעם פערל הענגט אָפּ פון דעם זאפט, וואס דער „מאנטעל“ פון אויסטער גיט פון זיך צורויס.

עס זיינען פאראן אזעלכע ארטען ווענס-מושלען, וועלכע מאַכען זיך זייער לעבען זיכערער דורך זייער פעהיגקייט זיך אייני צוגראָבען אין פעלזען. דער פידאָק מושעל, צום ביישפּיעל, האָט שאָלען וועלכע זיינען פול מיט צייהנדלעך ווי א ריב-אייזען און מיט די דאָזיגע שאָלען זיינע רייבט ער אויס לעכער אין די האַרטע פעלזען, וואו ער מאַכט זיך זיין וואָהנונג. ער גראָבט זיך איין, ווען ער איז נאָך קליין און יונג, און ווען זיין קערפער ווערט גרעסער, פאָרגרעסערט ער דאָס לאָך אינוועניג אין דעם פעלזען, וועהר רענר פון אויבען בלייבט די קליינע עפענונג וואָס דאָס לאָך האָט אין אָנפאנג געהאט. ווען ער איז אין גאנצען אויסגעוואקסען געפינט זיך זיין קערפער איינגעשלאָסען אין דעם אויסגעבויער טען לאָך פון פעלזען און ער זיצט דארטען ווי א געפאנגענער, אָפגעשלאָסען פון דער אויסערער וועלט. בלויז זיין לאַנגע רעהר פערמיגע האַלז, וואָס האָט אן עפענונג ביים ענד אלס מויל, נעהט

ארויס פריי פון דער שמאַלער עפענונג פון דעם פעלזען-לאָך, כדי צו פאַנגען שפּייז.

אונגעפּעהר דאָס זעלבע קומט פאַר מיט דעם טערעדאָ מור שעל, וועלכער גראַבט זיך איין אין האַלץ. דער טערעדא מושעל איז אין זיינע יונגע יאָהרען אַ וואַנדערער, ער שווימט ארום פריי אין וואַסער און פיהרט אַ פרייען לעבען. ער איז דאן נאָך גאָר אַ פּיצעל, ניט גרעסער ווי אַ שפּילקע-קעפעל. אבער נאָך קלייַ נערהייט וואַרפט ער אוועק זיין וואַנדער לעבען און באַזעצט זיך אין אַ באַלקען אָדער ברעט פון אַ האַפען אָדער אין דעם דעק אָדער די זייטען פון אַ האַלצערנע שיף, וועלכע איז ניט באַדעקט מיט שטאַל. גלייך ווי ער האָט זיך באַזעצט אויף אַן ארט, פאַנגט ער




צייכנונג 54. — די בויערער מושלען.


אָן צו בויערען אַ טונעל, וואו זיך צו מאַכען אַ זיכערע וואוינונג. ער בלייבט אָבער ניט זיצען רוהיג ווען ער האָט זיך שוין ארייַנגעבויערט רעכט טיעף אין האַלץ, נאָר ער בויערט אַלץ ווייטער. עס טרעפט אָפּט, אז ער בויערט אויס אַ טונעל פון צוויי ביז דריי פוס די לענג. פון דעם לאָך, וואו זיין קערפּער געפינט זיך אין פולער זיכערהייט, שטעקט ער ארויס זיין לאַנגען דינעם האַלד-רעהר, כדי צו פאַנגען שפּייז. עס טרעפט זיך אָפּט, אז עטליכע הונדערט אַזעלכע מושעל-חיות קריכען אָן אין איין שטיק האַלץ און זיי לעכערען עס אזוי דורך, אז דאָס האַלץ ברעכט צוזאַמען.

פון אויסוועניג קען מען ניט באמערקען, אז דאָס האַלץ איז אינ-  
וועניג צולעכערט, ווייל אויסוועניג זיינען די לעכעלעך זעהר קליין,  
אז מען קען זיי וועניג באמערקען. די דאָזיגע מושלען פאַרשאַפען  
גרויסע שאַרען אין די האַלץ-ווערק פון די האַפענס און אין שיר  
פען. עס ווערען אָנגענומען פאַרשיעדענע מיטלען געגען זיי, אבער  
מען האָט זיי נאָך ביז היינט ניט באזיענט.

עס זיינען פאַראַן פאַרשיעדענע אַנדערע מושלען, וואס אין  
זייער פריהער יוגענד, ווען זיי זיינען נאָך גאַנץ קליין, שווימען  
זיי אַרום פריי אין וואסער, נאָר ווען זיי ווערען גרעסער, באזעצען  
זיי זיך אויף איין ארט און ריהרען זיך ניט. אין א געוויסער  
צייט אַרום אבער פאַרלאזען זיי זייער אַלטען פלאַץ און כאזע-




צייכנונג 56. — אַ שטאַרק  
פאַרגרעסערטער טייל. פון די  
זשאַברעס פון אַ מאַלוסק, וואו  
מען קען זעהן די הערעלעך.



צייכנונג 55. — דער מיטל-  
לום מושלעל, וואס שפינט זיך  
אַן מיט שטאַרקע פעדים צו אַ  
שטיין אָדער האַלץ אונטער'ן  
וואַסער.

צען זיך אין אַ נייעם. פון די עסבארע מושעל-חיות קען געבראכט  
ווערען אַלס ביישפיעל די מיטילום מושלען, וועלכע געפינען זיך  
אין גרויסע מאַסען אויף די פעלזען פון די אַמעריקאַנער ים ברע-  
גען. ווען דער מיטילום מושעל איז נאָך גאַנץ קליין שווימט ער  
אַרום אַ געוויסע צייט אין וואסער. נאָכדעם באזעצט ער זיך  
אויפ'ן גרונד פון וואַסער און פאַנגט אָן וואַקסען. שנעלער ווי אַלץ  
וואַקסט ביי איהם אַ לאַנגער און דינער פוס, מיט וועלכען  
ער קען דערנרייכען אַ רעכט שטיק פון דעם פלאַץ, וואו ער ליגענט.  
ער פאַנגט דאָן אַן שפינען מיט'ן פוס פעדים, וועלכע ער באַ-  
העפט צו וועלכען עס איז געגענשטאַנד, וואס ער קען דערנרייכען.  
די פעדים זיינען זעהר שטאַרק און ווען דער מיטילום מושעל איז  
באהעפט מיט עטליכע אזעלכע פעדים צו אַ פעלזען, איז גאַנץ


שווער איהם אוועקצורייסען. נאָכדעם ווי דער מיטילום מושעל בלייבט פארזאָנקערט מיט זיינע פעדים אויף איין אָרט אַ געוויסע צייט, באַפרייט ער זיך אַליין און קריכט אוועק מיט גרויס האַרע-וואניע אין אַן אַנדער פּלאַץ, וואו ער פאַראַנקערט זיך וויעדער מיט זיינע פעדים. עס זיינען פאַראַן אַזעלכע מושעל-חיות, וועל-כע זיינען גאַנץ עהנליך צו דעם מיטילום מושעל אין אלע אַנדערע הינזיכטען, אָבער זיי אונטערשיידען זיך פון איהם דערמיט, וואָס זיי בלייבען אויף אימער אויף דעמזעלביגען אָרט, וואו זיי האָבען זיך צום ערשטען מאָל פאַראַנקערט. אַזעלכע זיינען די „קאַמער-מושעל“, די „פעכער-מושעל“, וועלכע לעבען ביי די ברעגעס פון ים און אייניגע אַנדערע, וועלכע לעבען אין פּריש-וואסער.



צייכונג 57. — אַ גאַרמען-שנעק.

די גאַסטעראַפּאָדען. — צו דעם קלאַס גאַסטעראַפּאָדען, וואָס דאָס מיינט בויך-פיסיגע, באַלאַנגען אַ גאַנץ גרויסע צאָהל ספעציעס פון מאָלוסקען, וועלכע ווערען געזעהלט ביו צוואַנציג טויענד. זייער פום פארנעהמט די גאַנצע בויך-זייט פון זייער קערפער. צו דעם דאָזיגען קלאַס באַלאַנגען די לאַנד-שנעקען, די ים-שנעקען, די טעלער-מושעלען, די ים-לימאָנען, די נאַקעמע פעלד-שנעקען א. א. וו. די אלע פארשיעדענע מאָלוסקען לעבען אונטער פארשיעדענע באדינגונגען. אַנדערע לעבען אין טייכען און אַזערעס, וועהרענד אַנדערע אויף דער יבשה אין פייכטע געגענדען. פיעלע ספעציעס לעבען ביי די ברעגעס פון די ימים און פיעלע לע-

בען אין די טיעפע וואסערען פון ים, מאנכע זאגאר דריי מייל טיעף. צוליעב דער פארשיעדענהייט פון זייער ארט לעבען עק-זיסטירען אויך געוויסען פארשיעדענהייטען אין דעם אָרגאַניזם, אין דעם בוי פון זייער קערפער און אין דער פארם פון זייערע מוש-לען, אָבער זיי זיינען דאָך זעהר עהנליך איינע צו די אנדערע אין זייערע פונדאמענטאלע אייגענשאפטען און אָרגאַנען. אין זייער פונדאמענטאלער כאַראַקטעריסטיק זיינען זיי זאָגאר זעהר עהנליך צו די לאַמעליבראַנכען, וועלכע זיינען פריהער באשריבען געוואָרן רען און מיט וועלכע זיי זיינען גאַנץ נאָהנטע קרובים.



צייכנונג 58. — די ענטוויקלונג פון אַ העלק שנעק. א, די אייערקאָפּסולס, וואָס דער שנעק לעגט; ב, אַן עמבריאָ מושעל (אַ גאַנץ יונגער מושעל); ג, דער אויסגעוואַקסענער שנעק, ווי ער באַוועגט זיך מיט זײַן מושעל אויפ'ן רוקען.

די גאַסטעראַפּאָדען אונטערשיידען זיך צו אלער ערשט פון די לאַמעליבראַנכען דערמיט, וואָס זייער מושעל באַשטעהט ניט פון צוויי דעקלעך אדער מולטערלעך, נאָר געוועהנליך פון איין שטיק. מען רופט זיי דעריבער אָפט מיט דעם נאָמען „איין-שאַך ליגע" מאָלוסקען. דער דאָזיגער נאָמען איז אָבער ניט אין גאַנץ צען ריכטיג צוגעפאַסט. עס איז אמת, אז די מייסטע מאָלוסקען, וועלכע באלאנגען צו דעם קלאַס גאַסטעראַפּאָדען האָבען אַן איין-שאַך מושעל, און קיינער פון זיי האָט אַ צוויי-שאַליגען מושעל, אָבער עס זיינען פאַראַן אייניגע, וואָס זייער מושעל באַשטעהט פון עטליכע טיילען. ביי די פּאַנצער-שנעקען, למשל, באַשטעהט דער


מושעל פון אכט טיילען. אזעלכע שנעקען רופט מען מיט דעם נאָמען „פיעל־שאַליגע“. עס זיינען אויך פאראן מאָלוסקען, וועל־כע באַלאַנגען צו דעם קלאַס גאסטעראַפּאָדען, וועלכע האָבען גאר ניט קיין מושעל, ווי די נודיבראַנכען, למשל, וועלכע זיינען אין נאַנצען נאקעט. דער נאָמען „איינ־שאַליג“ איז דעריבער צוגע־פאסט נאָר צו דעם גרויסען טייל פון די גאסטעראַפּאָדען מאָלו־סקען אָבער ניט צו דעם גאַנצען קלאַס.

די מייסטע מאָלוסקען פון דעם גאסטעראַפּאָדען קלאַס צייען כענען זיך אויך אויס דערמיט, וואס דער פוס איז ביי זיי פיעל מעהר ענטוויקעלט ווי ביי די לאמעליבראַנכען מאָלוסקען. דער פוס פון דעם שנעק ווערט אָנגערופען דער טייל, וואס שטעקט ארויס פון דעם מושעל. ער האָט די פאָרם פֿון אַ ברייטע, פלאַכע פלאַטע און איז פון די זייטען באדעקט מיט די ברעגען פון „מאַג־טעל“ פון דעם שנעק. ביי מאַנכע איז אבער דער פוס אזוי אויס־געבילדעט, אז זיי זאלען מיט איהם קענען ניט בלויז קריכען נאָר אויך שווימען. אנדערע מאָלוסקען האָבען אויף זייער הינטערשטען ענד פון פוס אזא הארטע פלאַטע, מיט וועלכער זיי פארמאכען דעם מושעל זייערען, ווען זיי קריכען אין איהם אריין.

ביי די מייסטע גאסטעראַפּאָדען איז דער קאָפּ גוט קענטיג. זיי האָבען אויך א גוט ענטוויקעלטען מויל מיט אַ קייראַפּאַראַט. אין דעם פאָדערשטען טייל פון קאָפּ זיינען ביי פיעלע פון זיי פאַ־ראַן צוויי פאָר הערענדלעך. איין פאָר אַ לענגערע, אין וועל־כער עס געפינען זיך די אויגען. פון דער רעכטער זייט פון דער באשעפעניש, ניט ווייט פון קאָפּ, איז פאָראַן אַן עפענונג אין „מאַנטעל“, וואו ער בילדעט אזא זאַק־הענליכען רוים, אין וועלכען עס געפינען זיך די אַטעמונגס־אָרגאַנען און וואו די געדערים און די ניערען לעדיגען אויס דעם אָבפאַל פון קערפער. אין זייער אינערליכען אָרגאַניזם זיינען די מייסטע גאסטעראַפּאָדען עהנליך צו די לאמעליבראַנכען. פון מויל געהט אַ שלונד צום מאָגען און פון מאָגען געהט ארויס אַ לאַנגע קישקע, אונגעפעהר ווי ביי די ווענסדמושלען. דער לעבער און דאָס האַרץ האָט אויך אַ געווי־סע עהנליכקייט צו די, וואָס ביי די ווענוס מושלען.

די אַטעמונגס־אָרגאַנען זיינען ביי פארשיידענע שנעקען פון דער גאסטעראַפּאָדען גרופע פארשידען. ביי אנדערע קומט פאָר דער אַטעמונגס־פּראָצעס דורך וואסער, וועהרענד אנדערע

אָטעמען דירעקט מיט לופט. די אָטעמונגס־אָרגאַנען זיינען צו־נעפאסט צו דעם אַרט לעבען פון די באשעפענישען. דורך דעם אויסדרוק „אָטעמען“ ווערט אימער פארשטאַנען דאָס אַריינדריינגען פון זויער־שטאָף פון דער לופט אין די בלוטען פון קערפער. ווען מען זאָגט, אז די העכערע מינים באשעפענישען אָטעמען מיט די לונגען, מיינט עס, אז זיי בריינגען אַרײן אין די בלוטען פון זייער קערפער דעם זויער־שטאָף פון דער לופט, דורכ־דעם וואס זיי ציהען אַרײן די לופט אין זייערע לונגען. ווען פיש אָטעמען מיט זייערע זשאַברעס, מיינט עס, אז זיי ציהען אַרײם די לופט, וואָס געפינט זיך אין וואסער, כדי צו קריגען די נויטיגע מאָס זויער־שטאָף וואָס איז נויטיג פאַר זייער בלוט. פיעלע פון די נידעריגערע באשעפענישען, וועלכע זיינען פריהער באַשריבען געווארען, „אָטעמען“ מיט דעם גאַנצען קערפער זייערען. דאָס



צייכנונג 50. — אַ נאַקעטער מאָלוסק, ביי וועמען מען קען זעהן די זשאַברעס (אָטעמונגס־אָרגאַנען) צו דער רעכטער זייט.

הייסט, אז דער זויער־שטאָף פון דער לופט ווערט אַריינגעזויגען דורך דער אויבערפלעכע פון זייער גאַנצען קערפער, ניט האָבענ־דיג קיין ספעציעלע אָטעמונגס־אָרגאַנען. ביי די מאָלוסקען עקזיסטירען אלע דריי פאַרמען פון אָטע־מען. אַ באַדרייטענדע מאָס זויער־שטאָף ווערט פון אלע מאָלוסקען, אָהן אַן אונטערשיעד, אַיינגעזויגען דורך זייער הויט, אָבער דערצו האָבען זיי אויך ספעציעלע אָטעמונגס־אָרגאַנען. די שנעקען, וועל־כע לעבען אין וואסער האָבען זשאַברעס צו אָטעמען. ביי די מייסטע פון זיי זיינען די זשאַברעס עהנליך צו פערדערען און זיי געפינען זיך, ווי אויבען איז שוין דערמאָנט, אין דעם זאַק־עהנלי־כען רוים פון „מאַנטעל“. מאַנכע האָבען בלוז איין זשאַברע, אַנדערע צוויי און אַנדערע פיעל מעהר ווי צוויי. צווישען די פאַנד־צער־שנעקען אָדער די ים־שנעקען זיינען פאַראַן אַזעלכע ספעציעס, וואָס די צאָהל פון זייערע זשאַברעס דערגרייכט ביז איבער הונד־דערט. עס זיינען וויעדער פאַראַן מאַנכע ספעציעס פון שנע־



קען, וועלכע האָבען גאָר ניט קיין זשאַברעס. אנשטאט זיי האָט דער שנעק אזעלכע פּעדערדיגע ארויסשטאַרצונגען פון זיין הויט אויפ'ן רוקען, דורך וועלכע ער אָטעמט. דאָס איז דער פּאַל ביי די נאַקעטע ים שנעקען, „נודיבראַנכען“, ווי זיי ווערען אָנגערופען. אויף די שנעקען, וועלכע לעבען אויף דער יבשה, קען מען זאָגען, אז זיי אָטעמען מיט לונגען, דאָס הייסט זיי נעהמען אריין זויער-שטאָף אין זיך דורך די ווענטלעך פון זייער זאַקע-הנליכען מאַנטעל-רוים.

פיעל פון די גאסטעראַפאָדען, וועלכע לעבען אויף די פעל-זען ביים ברעג ים, און געפינען זיך אונטער'ן וואסער בלויז אין דער צייט פון פלוט (ווען דאָס וואסער פון ים איז הויך), זאַמלען אָן וואסער אין דעם רוים, וואו זייערע זשאַברעס געפינען זיך, פון וואָנען זיי ציהען אַרויס דעם זויער-שטאָף, פאַר דער צייט פון עבע (ווען דאָס וואסער פון ים איז אָפגעפאַלען). אַנדערע שנעקען אָטעמען מיט זייערע זשאַברעס בלויז ווען זיי זיינען אין וואַסער, פאַר דער צייט אָבער וואָס זיי געפינען זיך אויסער'ן וואסער, אָטעמען זיי דורך דער אויבערפלעכע פון זייער קערפער און דורך די פייכטע ווענטלעך פון זייער זאַקע-הנליכען מאַנטעל-רוים. מאַנכע ספעציעס פון די דאָזיגע שנעקען, וועלכע האָבען צווייערליי מעטאָדען צו אָטעמען, ליעבען בעסער צו לעבען אויסער'ן וואסער ווי אין איהם. זיי לעבען געוועהנליך א רעכט שטיק אפגערוקט פון ברעג ים, און בלויז ווען די פלוט פונ'ם ים איז זעהר הויך דערגרייכט דאָס וואסער ביז זיי. מען קען זיך לייכט פאַרשטעלען, אז מאַנכע פון די דאָזיגע ספעציעס זאָלען אין גאַנצען ווייט אוועק וואַנדערען פון ברעג ים און צופאַסענדיג זיך צו דעם לע-בען אויף דער יבשה, זאָלען זיי אין גאַנצען פאַרלירען זייערע זשאַברעס. מען גלויבט, אז דאָס האָט אין די פאַרגאַנגענע צייטן טען אויך אזוי פאַסירט, און אז אונזערע לאַנד-שנעקען שטאַמען אָפ פון וואַסער-שנעקען. ביי מאַנכע ספעציעס פון די לאַנד-שנעקען קען מען טאקע נאָך געפינען שפורען פון זשאַברעס, וואָס צייגט אָן אויף זייער אָפּשטאַמונג.

די שפייז פון די שנעקען איז ביי פאַרשיעדענע ספעציעס פאַרשיעדען. פיעלע פון די שנעקען שפייזען זיך מיט ים-גראַזען. די שנעקען, וועלכע לעבען אויף דער יבשה שפייזען זיך צום גרעסטען טען טייל מיט גאַרטען-גרינס אָדער מיט געוויסע סאַרטען מאַך.

פיעלע פון זיי אָבער עסען אויך לעבעדיגע אָרגאניזמען, וועלכע זיי פאנגען. דאָס זעלכע טוען אויך פארשיעדענע ים־שנעקען. ווי עס איז שוין פריהער באַמערקט געווארען האָבען די שנעקען אַ גוט ענטוויקעלטען מויל מיט אַ קיי־אָפּאַראַט, וואָס באַשטעהט פון קינבאַקען און עטוואָס אַזעלכעס, וואָס מען קען אָנרופען צונג, וועלכע איז באַרעקט מיט אַ גרויסער צאָהל קליינע צייהנדלעך, וואָס ביי די לאַנד־שנעקען קען מען זיי אָפּצעהלען פון 8 ביז 40 טויזענד, וועהרענד ביי די ים־שנעקען איז זייער צאָהל אזוי גרויס, אז מען קען זיי ניט אויסצעהלען. די דאָזיגע צונג איז ווי אַ ריב־אייזען, מיט וועלכען די שנעקען צורייבען זייער שפייז. מאַנכע ספעציעס קענען מיט זייער צונג זאָגאַר דורכרייבען די מושלען פון אַנדערע מאָלוסקען, וועלכע זיי באַפּאַלען און עסען אויף. אַנדערע שנעקען האָבען אויך קליינע צייהנדלעך אין זייער מאָגלעך, וועלכע העלפען צורייבען דאָס שפייז און זי לייכטער צו מאַגלעך קען צו פארדייען.

די אויגען פון די שנעקען, ווי אויך ביי אַנדערע מאָלוסקען, זיינען ניט ביי אלע ספעציעס גלייך. די געוועהנליכע לאַנד־שנעקען און פיעלע פון די ים־שנעקען האָבען אין זייער קאָפּ צוויי פּאַר הערענדלעך, די אויבערשטע פּאַר לענגערע און די אונטערשטע פּאַר קירצערע. אין די ענדען פון דער לענגערער פּאַר געפינען זיך די אויגען, וועלכע זעהען אויס ווי קליינע שוואַרצע פּונקטען, וועהרענד די קירצערע דענען אלס פיהל־הערענדלעך. פיעלע ספעציעס פון די מאָלוסקען האָבען אָבער מעהר ווי צוויי אויגען און זיי געפינען זיך אין פארשיעדענע טיילען פון קערפער. ביי די טעלע־מושלען, צום ביישפּיעל, געפינען זיך אַ רייה אויגען אויף דעם זוים פון זייער „מאַנטעל“. ביי די קאַמער־מושלען איז דער זוים פון „מאַנטעל“ באַזעצט מיט צוויי רייען גלענצענדע קאָלירטע אויגען, וועלכע שיינען ווי דימענטען. ביי אַנדערע מאָלוסקען וויעדער, ווי די פאַנצער־שנעקען, צום ביישפּיעל, פאַר־שווינדען די אויגען פון זייער קאָפּ, ווען זיי (די מאָלוסקען) וואַקסען אויס און ווערען רייה, און אַנשטאַט זיי באַקומען זיי אַ גרוי־סע צאָהל אַנדערע אויגען, מאַנכע זאָגאַר ביז טויזענד שטיק, אָבער די אויגען געפינען זיך ניט אין קאָפּ, נאָר אין די מושעל־פלאַטען (די פאַנצער שנעקען האָבען מושלען, וועלכע באַשטעהען פון 8 פלאַטען). עס זיינען אויך פאַראַן שנעקען, ווי אויך אַנדערע מאָגלעך

לוסקען, וועלכע האָבען גאָר ניט קיין אויגען. די שנעקען, וועלכע לעבען אין די גרויסע טיעפענישען פון ים, האָבען גאָר ניט קיין אויגען. מען האָט אויך ניט געקענט אויסגעפינען קיין אויגען ביי די ווענוס־מושלען, וועלכע לעבען אין טייכען און אָזערעס. באַמערקענסווערט איז אָבער, וואָס געוויסע ספעציעס פון די מאָר־לוסקען, וועלכע האָבען ניט קיין אויגען, האָבען דאָך אַ געוויסען חוש פאר ליכט. ווען עס ווערט אויף זיי געווארפען אַ שאַטען פארמאכען זיי זייערע מושל־דעקלעך. מען נעהמט אָן, אַז ביי די דאָזיגע מאָלוסקען איז די הויט זעהר עמפּינדליך פאַר ליכט, דאָס הייסט, אַז זיי פיהלען מיט זייער הויט די ענדערונגען פון ליכט און פינסטערניש. אין אלגעמיין זיינען די אויגען ביי אלע מאָלוסקען, וועלכען זיינען איצט באשריבען געווארען, שוואַך ענט־וויקעלט.

דער חוש הריח און חוש המשוש (דאָס פיהלען דורך טאפּען אדער באַריהרען) זיינען ביי פיעלע מאָלוסקען שטאַרק ענטוויקעלט. די דאָזיגע צוויי חושים העלפען זיי הויפטזעכליך אין געפינען שפּיז און אין היטען זיך פון פיינד. דורך די פיהל־הערענדלעך אויפ'ן קאָפּ אדער אויף אנדערע טיילען פון קערפּער און דורך די הויט זייערע וועלכע איז באַזאָרגט מיט נערווען, פיהלען זיי און עמפּינדען וואס ארום זיי טוט זיך. ביי פיעלע פון די מאָר־לוסקען איז דער חוש הריח באַזונדערס שטאַרק ענטוויקעלט. פיעלע עקספּערימענטען האָבען באוויזען, אַז לאַנד־שנעקען, ווי אויך געוויסע ים־שנעקען, דערשמעקען פון ווייטען פאַרדאָרבענע פלייש, פון וועלכע עס הערט זיך אַ שטאַרקער ריח, אָדער שטאַרק ריכענ־דע גרינסען. דער חוש הריח געפינט זיך ביי די דאָזיגע שנע־קען אין זייערע פיהל־הערענדלעך. מען גלויבט אָבער, אַז זיי מוזען האָבען נאָך אנדערע אָרגאַנען אין זייער קערפּער, וועלכע פאַרשטאַרקען זייער חוש הריח.

אויב די מאָלוסקען האָבען אויך אַ חוש השמיעה (געהערס־געפיהל) איז שווער צו באַשטימען. אין דעם פּוס פון די פאַר־ש'יעדענע מאָלוסקען האָט מען אויסגעפונען אזעלכע אָרגאַנען, וועלכע האָבען אַן עהנליכקייט צו אויערען, אָבער מען קען ניט באַ־וויזען, אַז זיי זיינען ווירקליך הער־אָרגאַנען. מען איז אויך ניט זיכער מיט דעם חוש הטעם (געשמאַק־געפיהל) ביי די מאָלוס־קען. פיעלע אַרטען מאָלוסקען עסען אַלעס און די, דאַרף מען

אָננעהמען, האָבען געוויס ניט קיין חוש הטעם. עס זיינען אָבער פאראן אזעלכע, וועלכע זיינען אויסקלייבער אין עסען און מען דארף דעריבער דענקען, אז זיי באזיצען וועלכען עס איז חוש הטעם. מען האָט אויך אויסגעפונען געוויסע נערווען אין זייער מויל, וועלכע קענען אפשר זיין פאר דעם צוועק פון געשמאק, אָבער עס איז שווער צו באווייזען, אז דאָס איז אזוי.

די פרוכפערונג פון די שנעקען קומט פאָר דורך לעגען אייער. מאַנכע פון זיי לעגען זייערע אייער דריי אדער פיער מאָל אין א סעזאן. די שנעקען, וועלכע לעבען אויף דער יבשה לעגען בערך ניט פיעל אייער, אונגעפעהר דרייסיג אדער פערציג אין איין מאָל. זיי דארפען ניט זיין צופיעל פארשווענדעריש אין לעגען פיעל אייער, ווייל די וועניג אייער, וואס זיי לעגען, האָבען גוטע שאַנסען אויסגעבריהט צו ווערען און צו בריינגען א נייעם דור שנעקען אויף דער וועלט. די גרויס פון די אייער זיינען פארשידענע, לויט דער גרויס פון די שנעקען, וואָס לעגען זיי. אַנדערע זיי נען בלויז אזוי גרויס ווי שראָט, וועהרענד אַנדערע זיינען אזוי גרויס ווי די אייער פון טויבען. די שנעקען באהאלטען זייערע אייער אין לעכער פון דער ערד, אדער אונטער שטיינער און שטיקער האַלץ, און נאָכדעם ווי זיי ליגען דאָרטען עטליכע וואַכען קומען פון זיי ארויס יונגע שנעקען, וועלכע האָבען די פאָרם פון זייערע עלטערען. אונגעפעהר דאָס זעלבע קומט פאָר ביי די שנעקען, וועלכע לעבען אין טייכען און אָזערעס. די דאָזיגע שנעקען באדעקען זייערע אייער מיט אזא זשעלאַטין מאַסע און באהעפטען זיי צו שטיקער האַלץ אָדער בלעטער, וואו זיי ווערען אויסגעבריהט און עס קומט פון זיי ארויס פארטיגע יונגע שנע-קען. פיעלע ים-שנעקען באדעקען זייערע אייעלעך מיט קאפס-לען פון פארשיעדענע מוסטערען און באהעפטען זיי צו שטיינער, שטיקער האַלץ, בלעטער א. ד. ג. אַנדערע שנעקען וויעדער לעגען זייערע אייער דירעקט אין וואַסער. דאָס איז דער פאל ביי די מעלער-שנעקען און ביי מאַנכע ספעציעס פון די פאַנצער-שנעקען. זיי לעגען אויס דירעקט אין וואַסער טויזענדער אייער. דער גרעסטער טייל פון זיי אָבער-געהט פארלאָרען, אָהן אַרויסצובריינגען א נייעם דור. די אייעלעך, וועלכע ווערען נצול פון פאַרניכט-טונג, ענטוויקלען זיך אין אַ קורצער צייט אין קליינע באשעפער-נישען, וועלכע שווימען אַרום פריי אין וואַסער. די דאָזיגע בא-

שעפענישען האָבען אָבער ניט קיין עהנליכקייט צו זייערע עלטער-  
רען אין אויסזעהן. ערשט ווען זיי באזעצן זיך שפעטער אויפ'ן  
גרויט פון וואסער פאנגען זיי אָן ביסלעכווייז צו באקומען די גע-  
שמאלט פון זייערע עלטערען ביז זיי וואקסען אויס גרויס און ווע-  
רען אין גאנצען עהנליך צו זיי.

עס איז אין אַלגעמיין נאָך ניט גענוג באשטימט וויפיעל צייט  
עס נעהמט ביי די פאַרשיעדענע מאָלוסקען אויסצואוואקסען און  
ווי לאנג זיי לעבען. מען רעכענט, אז אויסטערס דערגרייכען זייער  
פולע גרויס אין פינף יאָהר צייט, און זיי לעבען אַן ערך פון צעהן  
יאָהר; די ווענוס-מושלען, וועלכע לעבען אין טייכען און אָזע-  
רעס, האָבען נויטיג פאַר זייער פולער ענטוויקלונג פינף יאָהר צייט,  
און מאַכע ספעציעס לעבען פון צוועלף ביז דרייסיג יאָהר; די  
דורכשניטליכע לעבענס-צייט פון שנעקען שיינט צו זיין פון צוויי  
ביז פינף יאָהר. די צאָהלען זיינען, אָבער, ניט אין גאנצען זי-  
כער. די מאָלוסקען האָבען צופיעל פינף, וואָס דערלאָזען זיי ניט  
אויסלעבען זייערע יאָהרען. פויגלען, פיש, פּרעש, שמערן-פיש און  
זאָגאַר זייערע אייגענע קרובים-מאָלוסקען לוייערען כסדר אויף זייער  
לעבען. מאַסען פון זיי קומען אום פון פאַרשיעדענע פאַראַזיטען,  
וועלכע דרינגען אַרײַן אין זייער קערפער. און צו אלעמען קומט  
נאָך צו דער מענש, וועלכער מאַכט אַן דעם גרעסטען חורבן צוויי-  
שען זיי, באַזונדערס צווישען די, וועלכע טויגען צום עסען.

די הויפט-שוין מיטעל ביי די מאָלוסקען געגען זייערע  
שונאים איז זייער מושעל. די מאָלוסקען, וועלכע האָבען צוויי  
דעקעלדיגע מושלען, ציהען צונײַף די דעקלעך, ווען זיי דערפיהלען  
א געפאָהר. די שנעקען קריכען אַרײַן אין זייער מושעל, וועלכע  
זיי טראָגען אויף זייער רוקען און מאַכע ספעציעס פון זיי האָבען  
אזא פלאַטע אויף דעם הינטערשטען ענד פון זייער פּוס, מיט וועל-  
כער זיי פאַרמאָכען די עפענונג פון זייער מושעל. די יעניגע  
מאָלוסקען, וועלכע האָבען ניט קיין מושלען האָבען אַנדערע שוין-  
מיטלען. מאַנכע לאָזען אַרויס פון זייער הויט אזא פליסיגקייט,  
וואָס שיצט זיי געגען שונאים, אַנדערע האָבען אזעלכע שטעכעדיגע  
צעלען אויף זייער קערפער, וואָס שיצט זיי געגען אָנגרייפער.  
ענדליך האָבען פיעלע מאָלוסקען זעהר אַ גוטען שוין אין זייערע  
קאָלירען וועלכע האַרמאָנירען אזוי גוט מיט דער אומגעבונג אין

וועלכער זיי געפינען זיך, דאָס זייערע שונאים קענען זיי ניט באַ-  
מערקען.


אין די זעהר קאלטע צייטען פון יאָהר, ווי אויך אין די זעהר  
טרוקענע צייטען פון יאָהר, קריכען די לאַנד־שנעקען אריין אין  
זייער מושעל און פאַרמאכען די עפענונג מיט אַ הייטעל. די קלע-  
פּיגע פליסיגקייט, וואָס דער שנעק לאָזט ארויס פון זיין שליימיגער  
הויט, ווערט רונד אויסגעבלאָזען איבער דער עפענונג פון מושעל,  
אזוי ווי עס ווערט אויסגעבלאָזען אַ האַלבער זייער־בלאָז אויף  
דער עפענונג פון אַ ראָהר. דער שנעק פארדעקט אָפט די עפענונג  
פון זיין מושעל מיט אַזעלכע פינג אדער זעקס הייטעלעך, כדי זיך  
צו שיצען פון קעלט.

די לאַנד־שנעקען מאַכען געווענהליך זייערע דורות אונטער  
בלעטער, אונטער קלעצער, שטיינער, ארום די וואַרצלען פון בוי-  
מער און אין פאַרפויטע שטיקער האַלץ. מאַנכעס מאַל גראָבען  
זיי זיך איין אין דער ערד, אַ מאַל זאָגאר אַ פּוס טיעף. אין אַל-  
געמיין ליעבען זיי אמבעסטען צו לעבען אין ערטער, וועלכע  
זיינען באוואקסען מיט וואלד, אדער אויף די באוואקסענע, שאַ-  
טענדיגע ברעגעס פון טייכען. מען געפינט זיי אָבער אויך גאַנץ  
אָפט אין אָפענע פעלדער און אין פעלזען־פלעצער. אין פריהלינג,  
ווען די זון פאַנגט אָן צו וואַרעמען, קומען זיי ארויס זיך אָנוואַרע-  
מען און זוכען שפייז.

די מושלען פון די גאסטער־אָפּאָדען זיינען זעהר פאַרשיידען  
אין זייער גרויס, פאַרם און קאָליר. די געווענהליכע פאַרם פון  
דעם מושעל פון אַ לאַנד־שנעק איז ווי פון אַ ספּיראַלע, וועלכע  
פאַנגט זיך אויבען אָן מיט אַ שפיץ און ווערט שטופענווייז בריי-  
טער. מאַנכע מושלען פון שנעקען זיינען גאַנץ טיעפע און האַבען  
דאָס אויסזעהן פון אַ קאָנוס, אנדערע, וויעדער זיינען גאַנץ פלאַך-  
כע און האַבען דאָס אויסזעהן פון אַ טעלערעל. דער מושעל ווערט  
פון די שנעקען געטראַגען אויף זייער רוקען. אינוועניג איז דער  
מושעל באַדעקט מיט אזא הייטעל, וואס ווערט געשפייזט פון דער  
פליסיגקייט, וואס דער שנעק גיט ארויס פון זיין הויט. דער קאָ-  
ליר פון דעם מושעל ווערט געשאפען אָט פון דעם הייטעל, מיט  
וועלכען ער איז פון אינוועניג באַדעקט. דער מושעל וואַקסט צו-  
זאַמען מיט'ן מאָלוסק, ווען דער מאָלוסק וואַקסט און ווערט גרע-  
סער, וואַקסט אויך זיין מושעל.

די שליימיגע פליסיגקייט וואָס די שנעקען גיבען ארויס פון זייער הויט דורך געוויסע דריזען (גילען) איז ביי אנדערע פון זיי, ווי, למשל, ביי די נאָקעטע פעלד־שנעקען, אזוי פעסט, דאָס זיי קענען שפינען פון איהם שטארקע פעדים און אָנהענגען זיך אויף זיי. די קלעפיגע פליסיגקייט ווערט פארהארטעוועט, ווען זי ציהט זיך אויס אין אַ פּאָדים און דער פּאָדים איז דאן שטארק גענוג אויסצוהאַלטען די געוויכט פון דעם שנעק'ס קערפער.

די סעפּאַלאַפּאַדען. — צווישען די מאַלוסקען זיינען די סעפּאַלאַפּאַדען די העכסט ענטוויקעלטע באשעפענישען. זיי זיי גען שטארק געבויט, קענען זיך שנעל באוועגען און מאַכע פון




צייכנונג 60. — אַ געווענליכער מינטיש.

זיי זיינען גאנץ גרויסע ים־חיות. אַלע פון זיי זיינען רויב־חיות. די סעפּאַלאַפּאַדען האָבען אַ גוט סענטיגען קאָפּ אין וועלכען עס זיצען אַ פּאָר גרויסע, רונדע, זעהר גוט־ענטוויקעלטע אויגען. פון זייער קאָפּ, ארום מויל, געהט ארויס אַ בינטעל ארעמס אדער פיס, מיט וועלכע זיי קענען זיך שנעל באוועגען אויפ'ן גרונד פון ים. פון דעם געהמט זיך דער נאָמען „סעפּאַלאַפּאַדען“, וואס מיינט „קאָפּ־פּיס־גע“. די פיס אדער אָרעמס באזיצען זויג־אָרגאַנען, וועלכע העלפען זיי אין פאַנגען זייער רויב. זייער קערפער האָט די פארמע פון אַ זעקעל.

די מייסטע סעפּאַלאַפּאַדען האָבען ניט קיין מושעל, וואָס זאָל באַדעקען זייער קערפער. מען געפינט אָבער אין זיי שפורען, וועל־כע צייגען, אז זיי שטאַמען אָפּ פון מאַלוסקען, וועלכען זיינען גע־ווען באַדעקט מיט מושלען. אין דעם קערפער פון דעם „מינטי־

שנעק" אדער ווי מען רופט איהם געוועהנליך, "טינט־פיש", גע-  
פינט מען אין זיין רוקען־זייט א הארטען מושעל־שיכט, וואָס איז  
עטוואָס אויסגעהוילט און איז אָנגעפילט מיט א קריידיגען  
שטאָף. מען רופט דעם דאָזיגען מושעל־שיכט, "טינטען־פיש ביון".  
אָבער עס איז ניט קיין ביון, נאָר מושעל. ווי עס שיינט איז דער  
דאָזיגער מושעל־שיכט ביי דעם טינטען־פיש א ירושה פון זיינע  
אור־עלטערען, וועמעס קערפערס עס זיינען געווען באדעקט מיט  
מושעלען, נאָר אין א פארלויה פון לאַנגע דורות איז דער מושעל  
ביסלעכווייז פארשוואונדען און עס איז פון איהם געבליבען בלויז  
אן אָנדענקען. דער טינט־פיש איז צווישען די מאלוסקען א



צייכונג 61. — די אָנאָמאָמיע פון א טינט־פיש. מ, מויל;  
נ, געהירען; ל, לעבער; ז, זשאַברעס; ט, טינט־זעקעל;  
ס, שפּייז־קישקע; א, אויער־נעסט; ד, דער ליוקע־עהנליכער  
קאַנאַל; ע, דער סקעלעט אָדער "ביון" פון טינט־פיש.

ציעמליך גרויסע באשעפעניש, אן ערך פון א האלבען פוס ביד  
אנדערטהאלבען פוס די לענג. זיין קערפער, אויסער דעם קאָפּ,  
איז באדעקט מיט א "מאנטעל", וועלכער איז באהעפט צו זיין  
רוקען. אויף זיין קאָפּ, ארום זיין מויל, געפינען זיך צעהן לאַנגע  
אַרעמס אָדער פיס, וואָס אַכט פון זיי זיינען פאַר זייער גאַנצער  
לענג באדעקט מיט זויג־אַרגאַנען, וועהרענדר די איבריגע צוויי, וועל־  
כע זיינען עטוואָס לענגער, האָבען זויג־אַרגאַנען בלויז ביי זיי-  
ערע ענדען. ווען דער טינט־פיש גרויפט אָן זיין רויב מיט זיינע  
אַרעמס וועט ער זיך שוין פון איהם ניט אַרויסרייסען. די זויג־  
אַרגאַנען פון די אַרעמס, וועלכע ארבייטען ווי זויג־פומפען, האַל־  
טען זייער רויב אזוי פעסט, אז עס קען ניט אַנטרונען ווערען.




דער טינט־פּיִש לעבט אין די טיעפערע ערטער פון ים. ער אָטעמט מיט זשאַברעם, וועלכע געפינען זיך אין דעם רוים פון זיין מאַנטעל. דער ענד פון מאַנטעל ביי זיין האַלז איז אָפּען, כדי דאָס וואַסער זאָל קענען פריי צוקומען צו די זשאַברעס.

דער טינט־פּיִש קריכט ארום אויפ'ן גרונט פון ים מיט דער הילף פון זיינע ארעמס, וואס געהען ארום פון זיין קאָפּ, ער קען אבער אויך שנעל שווימען אין וואסער, נאָר ער שווימט ריקווערטס און ניט פארווערטס. דורך די באוועגונג פון זיינע מוסקולען ווערט דאָס וואַסער אריינגעצויגען אין דעם הלל פון זיין מאַנטעל און אין זיין קערפער און דורך א צונויפציהונג פון די ווענטלעך פון זיין קערפער ווערט דאָס וואַסער ארויסגעדריקט דורך אַ שמאָלע עפענונג פון אזא רעהרעל אין זיין קערפער, וואס איז עהנליך צו אַ לייקע, און דער שטראָם וואָס ווערט דערביי געשאפּען טרייבט דעם קערפער פון טינט־פּיִש ריקווערטס. ער שווימט, אלזאָ, הינט טערוויילעך. אויף אזא אופן אנטלויפט דער טינט־פּיִש פון דעם שונא, וואס יאנט זיך נאָך איהם. דער טינט־פּיִש האָט אָבער נאָך אַ בעסערען מיטעל ווי זיך צו ראטעווען פון זיינע שונאים. ער האָט נעמליך אין זיין קערפער אזא זעקעלע, וואו עס געפינט זיך אַ טינט־שוואַרצע פליסיגקייט. ווען עס יאנען זיך נאָך איהם שונאים, עפענט ער דאָס זעקעלע און די שוואַרצע פליסיגקייט גיסט זיך ארום און מאכט טונקעל דאָס וואַסער. די פיש, וואס יאָנען זיך נאָך איהם קענען איהם מעהר ניט זעהן און ער ווערט אנטרונען מיט'ן לעבען. צוליב דער דאָזיגער אייגענשאַפּט זיינער האָט ער אויך טאַקע געקראָנען דעם נאָמען „טינט־פּיִש“.

פיעלע פון די סעפאלאפאָדען האָבען אַן אנדער מיטעל ווי זיך צו שיצען געגען שונאים. זיי באַזיצען נעמליך די אייגענשאַפּט צו בייטען זייערע קאָלירען לויט דער אומגעבונג, וואו זיי געפינען זיך. די דאָזיגע סעפאלאפאָדען האָבען אין זייער הויט אַן אומגעהייער גרויסע צאָהל קליינע רונדע זעקעלעך אָנגעפילט מיט פאַרב פון פאַרשידענע קאָלירען, באַזאַנדערס די פאַרשידענע שאַטירונגען פון רויט, ברוין און בלו. יעדעס פון די קליינציקע פאַרב־זעקעלעך איז פאַרבונדען מיט אַ נערוו און מיט אַ רייע גאַנץ איידעלע מוס־קולען. ווען דאָס באַשעפעניש זעצט זיך אוועק, למשל, אויף אַ געגענטשאַנד פון אַ רויטען קאָליר, ווערט פון איהר נערווען־צענטער געשיקט אַ נערווען־אימפּולס צו די אַלע פאַרב־זעקעלעך פון רויטען

קאליר, די דינע מוסקולען, וואָס זיינען מיט די זעקעלעך פאַרכונדיגן דען ציהען זיך צונויף און די קיילעכדיגע זעקעלעך ווערען פלאַך און פאַרנעהמען אַ גרעסערען שטח (פלעכע) ווי פריהער אין זייער קיילעכדיגען צושטאַנד. דער קערפער פון דער באַשעפעניס ווערט אויף אַזאַ אופן באַדעקט מיט אַ רויטען־קאליר. אין איין אויגענבליק אָבער קען דער סעפּאלאָפּאָד ענדערען זיין רויטען קאליר אויף אַן אַנדערען, אויף ברוין, בלוי, א. ז. וו. אַנדערע סעפּאלאָפּאָדען האָבען זאָגאַר די פעהיגקייט צו ענדערען דאָס אויסזעהן פון זייער הויט דורך פאַרשידענע קנייטשען און אַרויסשטאַרצונגען, אַז עס זאָל זיך דאַכטען, דאָס זיי זיינען אַ טייל פון דעם פעלזען, אויף וועלכען זיי געפינען זיך. די דאָזיגע אייגענשאַפטען גיבען די סעפּאלאָפּאָדען די מעגליכקייט ניט בלויז אויסצובאַהאַלטען זיך פון זייערע




צייכנונג 62. — דער פּייל־פּיש.

שנאים, נאָר עס גיט זיי אויך אַ ליכטערע מעגליכקייט צו באַפּאלען אַנדערע ים־באַשעפענישען, וועלכע זיי פּאָנגען אַלס זייער שפּייז. אַ נאָהענטער קרוב צו דעם טינט־פּיש איז דער „פּייל־פּיש“. ער ווערט אַזוי גערופּען ווייל זיין קערפער האָט די עהנליכקייט צו אַ פּייל, ער איז לאַנג און שמאַל און ענדיגט זיך מיט אַ פּייל־עהנליכען שפּיץ. דער פּייל־פּיש האָט אַ מין פּלוס־פּעדערען מיט וועלכע ער קען זעהר גוט שווימען. די פּייל־פּיש זיינען אָפט געסט אויף די ברעגעס פון אונזערע ימים. זיי קומען אָפט אַריין גאַנצע מחנות אין אונזערע האַפענס און אָפט נאָך אַ שטורם אויפ'ן ים, געפינט מען זיי אין מאַסען אַרויסגעוואָרפען אויפ'ן ברעג. אין מאַנכע געגענדען ווערט זייער פּלייש זאָגאַר באַנוצט אַלס שפּייז. אויך דער פּייל־פּיש האָט ניט קיין מושעל־אויף זיין קערפער, נאָר עהנליך צו דעם טינט־פּיש האָט ער איינגעוואַקסען אַ מושעל־שיכט אין זיין קערפער. די פּייל־פּיש זיינען פאַרשידען אין זייער גרויס. געוועהנליך זיינען זיי פון אַ האַלבען פּוס ביז צוויי פּוס די לענג. עס זיינען

אָבער פאַראַן אַזעלכע וואָס זייער לענג דערנרייכט ביז פּערציג אָדער פּופּציג פּוס.

אַ נאָהענטער קרוב צו די טינט־פּיש און צו די פּייל־פּיש איז דער „טייוועל־פּיש“, אָדער „אַקטאָפּוס“ (אַכט פּיסלער). אויך דער טייוועל־פּיש האָט ניט קיין מושעל. פּון זיין קאָפּ געהען אַרויס אַכט לאַנגע פּיס אָדער אָרעמס, וועלכע זיינען באַדעקט מיט זוּיג־אָרגאַנען. ער קריכט געוועהנליך אַרום אויף דעם גרונד פּון ים,




צייכונג 63 — דער אַקטאָפּוס אָדער טייוועל־פּיש.

מייסטענס ניט ווייט פּון ברעג. ער לעבט אָבער ניט אין געזעל־שאַפּט, ווי די פּייל־פּיש, נאָר אליין און אָפּגעזונדערט. זיין גע־וועהנליכע גרויס איז פּון אַ האַלבען פּוס ביז צוויי, אָבער עס זיי־נען אויך פאַראַן אַזעלכע וואָס זיינען ביז פּופּציג אָדער זעכציג פּוס די גרויס. זיי זיינען זעהר שטאַרק און זיי מאַכען אָן פאַרוויס־טונגען צווישען די פּיש פּון ים.

עס זיינען אויך פאַראַן אייניגע ספּעציעס פּון די ספּאַלאַפּאָדען וועלכע האָבען מושעלען. דער „שיפּעל־מאָלוסק“, אָדער נאוטילוס, ווי מען רופּט איהם געוועהנליך, האָט זעהר אַן אינטערעסאַנטען פּערלמוטערדיגען מושעל, וועלכער איז עהנליך צו אַ שיפּעל און איז געדעהט ווי אַ ספּיראַלע און באַשטעהט פּון אַ רייע קעמערלעך. דער מאָלוסק לעבט אין דעם אויסערען קעמערעל, אָבער ער איז פאַר־

בונדען מיט די איבריגע דורך אַ פֿליישרעהרעל, וואָס געהט דורך אַלע קעמערלעך און ענדיגט זיך אין דעם לעצטען פון זיי. אַ צווייטער מאָלוסק פון דעם סעפּאַלאַפּאַדען קלאַס, וואָס האָט אַ מושעל, איז דער „אַרגאַנאַוט“ („מאַטראָזען פּיש“ אָדער „זענעל פּיש“). דער מושעל פון אַרגאַנאַוט איז ניט צוגעוואקסען צו זיין קערפּער, נאָר ער קען פּריי אַראָפּגענומען ווערען פון איהם. די דאָזיגע באַשעפעניש האָט אַכט לאַנגע אַרעמס, וואָס ביי דעם ווייב־




צייכנונג 64. — דער נאַומילוס אָדער שיפּעל־מאַלוסק.

ליכען געשלעכט זיינען צוויי פון די ברייטע, עהנליך צו אויסגע־שפּרייטע זענלעך, וועלכע קענען זיך אויפהויבען און אַראָפּלאָזען און ווערען פון זיי באַנוצט צו באַשיצען זייערע אייער און די יונג־גע־באָרענע. בלויז די ווייבליכע מאָלוסקען פון די אַרגאַנאַוטען האָבען מושלען, די מענליכע אָבער האָבען ניט.

אין אַלגעמיין האָבען די סעפּאַלאַפּאַדען אין זייער אויסערליכע פאָרם און אַרגאַניזם גאנץ וועניג עהנליכקייט צו די מאָלוסקען פון די ערשטע צוויי קלאַסען — די לאַמעליבראַנכען און די גאַסטעראָ־פּאַדען. אויך אין זייער אינערליכען אַרגאַניזם שיינען זיי זיך זעהר פיעל אונטער פון די דערמאַנטע צוויי קלאַסען, דאָך געהערען זיי צו דער מאָלוסקען פאַמיליע, ווייל זיי האָבען די אַלגעמיינע כאַראַק־טעריסטיק פון מאָלוסקען. זייער קערפּער באַשטעהט פון אַ ווייכע, ניט־געגליעדערטע מאַסע, זייער בלוט איז ווייס, זייער קערפּער איז

באדעקט מיט א מאנטעל און זיי האָבען פיעלע אנדערע פונדאמענטאַלע כאראקטעריסטישע אייגענשאפטען, וועלכע זיינען געמיינליך שאפטליך פאַר די מאַלוסקען.




צייכנונג 65. — די נקבה פון די ארגאנאָמיט פיש מיט איהר מושעל.

די סעפאלאפאָדען אַטעמען מיט זשאַברעס. די מייסטע פון זיי האָבען בלווי צוויי זשאַברעס, נאָר אַנדערע, ווי די נאוטעלען, האָבען פיער. אָבער אַחוץ די זשאַברעס אַטעמען זיי טיילווייז אויך דורך די אויבערפלעכע פון זייער הויט. זיי האָבען אַ גוט ענטוויקעלטען בלוט-צירקולאָציאָנס-סיסטעם, וואָס באַשטעהט פון אַ גאַנצען נעץ פון אַרטעריעס און אָדערען, וועלכע פיהרען דאָס בלוט פון האַרצען איבער דעם גאַנצען קערפער. זיי האָבען אויך ביז אַ הויכער מאָס אַ גוט ענטוויקעלטען נערווען-סיסטעם. דער צענטער פון זייער נערווען-סיסטעם, דער מאַרד, געפינט זיך אין זייער קאָפּ, וואו ער איז באַשיצט מיט אזא כראַמשקעדיגען שאַרבען, וועלכער איז זעהר קונציג אויסגעבויט. פון דעם מאַרד ציהען זיך נערווען צו אַלע טיילען פון קערפער און קאָנטראָלירען די טעטיגקייט פון אַלע זיינע אָרגאַנען.


דער פרוכפערונגס-פראָצעס קומט ביי די סעפאלאפאָדען פאַר אויף פאַרשידענע אופנים. ביי די טינט-פיש, למשל, ווערט די זרע פון דעם מענליכען טינט-פיש איבערגעגעבען צו דעם ווייבליכען

דורך איינעם פון זיינע אָרעמס, וואָס איז ספּעציעל אויסגעבילדעט פאַר דעם צוועק. באַזאָנדערס כאַראַקטעריסטיש איז דער פּרוכט־פּערונגס־פּראָצעס ביי די אַרגאַנאוטען. די מעגליכע אַרגאַנאוטען זיינען קליין געוואַקסען, געוועהנליך איין צאָל (אינטש) אָדער צוויי די גרויס, וועהרענד די ווייבליכע אַרגאַנאוטען זיינען באַדייטענדיג גרעסער. די ווייבליכע האָבען אַ מושעל־אויף זייער קערפּער, וועהר־רענד די מעגליכע זיינען נאָקעט. די פּרוכפּערונג ביי די אַרגאַנאוט־



צייכונג 66. — א, דער אַרגאַנאוט אָדער מאַטראָזען פּיש (דער זכר); ב, זיין פּרוכפּערונגס־אָרעם, וועלכער טיילט זיך אָפּ פון זיין קערפּער.

טען קומט פאַר אויף דעם פּאָלגענדען אופן: דער דריטער לינקער אָרעם פון דעם מעגליכען אַרגאַנאוט פּאנגט זיך אָן ענדערען און באַקומט אַ גאַנץ אַנדער פּאָרם ווי אַלע איבריגע. דאָן באַדעקט ער זיך מיט אַ הייטעל, טיילט זיך אָפּ פון זיין קערפּער און ווערט אַוועקגעלעגט אין דעם מאַנטעל־רוים פון דעם ווייבליכען אַרגאַנאוט, אויף אזא אופן ווערט איבערגעטראָגען די זרע פון דעם זכר צו דער נקבה. ביי אַנדערע ספּעציעס לאָזען די מעגליכע סעפּאַלאַפּאָדען אַרויס זייער זרע אין וואַסער און פון וואַסער דרינגט עס אַריין אין די געשלעכטס אַרגאַנען פון די נקבות. מאַנכע פון די ווייבליכע סעפּאַלאַפּאָדען, ווי די אַרגאַנאוטען, האַלטען זייערע אייער ביי זיך וועהרענד אַנדערע ספּעציעס קלעפען אָן זייערע אייער אָן פעלזען, בלעטער, א. ז. וו. און דאָרטען ענטוויקלען זיי זיך.



צױכנונג .67 — פארשױדענע מושלען.

## עלפטר קאפיטעל.

די איינטיילונג פון די ארטהראפאָדען. — די אפשטאַמונג פון אַרטהראַפּאָדען. — דער פּערופּאַטום. — די מיריאַפּאָדען.

## די אַרטהראַפּאָדען.

די אַרטהראַפּאָדען-גרופּען. — מיט דעם נאָמען „אַר-  
טהראַפּאָדען“ ווערען באַצייכענט אַ גאַנצע רייע פון פאַרשידענע  
זאָרטען באַשעפענישען, וואָס ווי ווייט זיי זאָלען ניט זיין פאַרשידען  
איינע פון די אַנדערע אין זייער אויסזעהן און אין זייער אַרט לע-  
בען, האָבען זיי דאָך אַ געמיינשאַפטליכע כאַראַקטעריסטיק, וועל-  
כע צייגט אָן אויף דער פאַרוואַנדשאַפט פון זייער אָפשטאַמונג. צו  
די אַרטהראַפּאָדען באַלאַנגען די פאַרשידענע זאָרטען ראַקעס  
(קרעבסען), שפינען און אינועקטען. דאָס וואָרט „אַרטהראַפּאָד“  
מיינט „געגלידערטע פיס“, אָדער פיס מיט געלענקען. די פיס פון  
די אַלע באַשעפעניסען וועגען וועלכע דאָ האַנדעלט זיך באַשטעהט  
פון מעהרערע גליעדער אָדער געלענקען און זיי ווערען דאַריבער אַלע  
באַצייכענט מיט דעם אַלגעמיינעם נאָמען „אַרטהראַפּאָדען“.

די אַלגעמיינע כאַראַקטעריסטיק פון די אַרטהראַפּאָדען איז, וואָס  
זייער קערפּער באַשטעהט פון רינגעלעך, צונויפגעשטעלט אין ריי-  
ען, ווי ביי די ערד-ווערם, לַמשל; די ביידע זייטען פון זייער  
קערפּער זיינען סימעטריש, דאָס הייסט, די רעכטע זייט פון קער-  
פּער און די לינקע זייט זעהען אויס גלייך; אַ האַרענדיגע הייטעל  
אָדער שאַלאַכץ באַדעקט די אויסערליכע זייט פון זייער קערפּער און  
זייערע פיס, ווי שוין דערמאָנט, באַשטעהן פון גליעדער אָדער גע-  
לענקען.

די צאָהל פון די פאַרשידענע ספּעציעס, וועלכע באַלאַנגען צו  
דער אַרטהראַפּאָדען גרופּע איז אַן אונגעהייער גרויסע. זי נעמט  
אַריין אין זיך פאַרשידענע זאָרטען באַשעפעניסען, וועלכע לעבען  
אין ימים און טייכען, מאַסען ספּעציעס, וועלכע לעבען אויף דער  
יבשה און אַ גאַנץ גרויסע צאָהל, וועלכע פליהען אַרום אין דער  
לופט. צוליב די גרויסע פאַרשידענהייטען אין זייער קערפּער-  
געבוי און אין זייער אַרט לעבען, טיילט מען די אַרטהראַפּאָדען איין






אין פינף קלאַסען, ווי פּאָלגט : 1. קרוסטאָצעען, אָדער קרעכס-טיערע, צו וועלכע עס באַלאַנגען די אַלע פאַרשידענע סאָרטען ראַ-קעס (קרעבסען) ; 2. אניכאָפּאָרען, צו וועלכע עס באַלאַנגט די וואָרם-עהנליכע באַשעפעניס פּעריפּאטום, וואָס ווערט גערעכענט אַלס אַן איבערגאנגס-שטופּע פון די רינגעל-ווערס צו די ארטהראפּאָ-דען ; 3. מיריאָפּאָדען (פיעל-פּיסטיגע), צו וועלכע עס באַלאַנגען די הונדערט-פּיסטיגע און טויזענד-פּיסטיגע ווערס ; 4. אינזעקטען ; 5. אַרכאַנידען, צו וועלכע עס באַלאַנגען סקאַרפּיאַנען, שפּינען און מילכען.

די אָפּשטאַמונג פון די אַרטהראָפּאָדען. — עס ווערט אָנגע-נומען, אַז די אַרטהראָפּאָדען, דאָס הייסט, די קרעבס-חיות, די אינ-זעקטען, שפּינען מיט זייערע אונזעהליגע פאַרוואַנדטע באַשעפעני-סען, שטאַמען אָפּ פון אַ מין ברואים, וועלכע זיינען געווען עהנליך צו די רינגעל-ווערס. די אַלטע פּאָרמען פון די דאָזיגע ברואים, די אור-אור-עלטערן פון וועלכע די אַרטהראָפּאָדען שטאַמען אָפּ, זיינען שוין לאַנג פאַרשוואַונדען, אָבער דאָ און דאָרט באַגעגענט מען נאָך אויף דעם ערדיקונגעל אַזעלכע ברואים, וועלכע זיינען, ווי מען נעמט אָן, גאַנץ נאָהענט צו די טיפּען, פון וועלכע די אַרטהראָפּאָדען האָ-בען זיך ענטוויקעלט. דער פּעריפּאטום, וועלכער באַ-לאַנגט צו דעם קלאַס אניכאָפּאָרען, איז איינער פון זיי.

דער פּעריפּאטום האָט פון איין זייט סאַי מיט זיין אויסערלי-כען אויסזעהן סאַי מיט זיין אינערליכען אָרגאַניזם אַ נאָהענטע עהנליכקייט צו די רינגעל-ווערס, וועהרענד פון דער אַנדערער זייט באַזיצט ער די וויכטיגסטע כאַראַקטעריסטישע שטריכען פון די אַרטהראָפּאָדען. ער האָט אַן אנצאָהל געגלידערטע פּיס, וואָס אַ פּאָר פון זיי האָבען זיך ענטוויקעלט אין קיי-אַרגאַנען. זיינע אָטע-מונגס-אַרגאַנען האָבען פיעל עהנליכקייט צו די, וועלכע געפינען זיך ביי אינזעקטען. דער פּעריפּאטום קען, אַלזאָ, אָנגענומען ווערען אַלס פאַרבּינדונגס-רינג צווישען די ווערס און די אַרטהראָפּאָדען און ער ניט אונז אַ פאַרשטעלונג וועגען די איינפאַכע, פּרימיטיווע ברואים פון וועלכע די קרוסטאָצעען, די אינזעקטען און די שפּינען שטאַמען אָפּ.

דער פּעריפּאטום לעבט געוועהנליך אין וואַרעמע לענדער אונט-טער פעלזען און אונטער פאַרפּוילטע האַלי. ביי נאכט קריכט ער אַרויס פון זיין באַהעלטעניס צו זוכען שפּייז. ער נעהרט זיך מיט

אינזעקטען, וועלכע ער פאנגט דורך דעם, וואָס ער לאָזט אַרויס אויף זיי אַזאַ קלעפּיגען שליים פון זיין אונטערשטער זייט פון קאָפּ. די מיריאַפּאָדען. — אַלס נאָהענטע קרובים צו די טיפּען פון וועלכע די אַרטהראָפּאָדען שטאַמען אָפּ, ווערען אויך גערעכענט די „מיריאַפּאָדען“ (פּיעל־פּיסיע ווערם), צו וועלכע עס געהערען די הונדערט־פּיסיע ווערם און די טויזענד־פּיסיע. די דאָזיגע ווערם געפינט מען געוועהנליך אונטער שטיינער אָדער קלעצער אין פּאַר־שידענע געגענדען. די הונדערט־פּיסיע געהערען זיך מיט אינזעקטען און מיט אַנדערע קליינע באַשעפּעניסען, וועלכע זיי פּאָנגען דורך דעם, וואָס זיי שטעכען זיי מיט זייערע גיפּט־נאָדלען, וועלכע זיי



צייכונג 68. — 1 אַ סענטיפּעד (הונדערט־פּיסלער); 2 אַ מיליפּעד (טויזענד־פּיסלער); 3 אַ פּעריפּאַטום.

האַבען אויף די שפיצען פון זייערע פּאָדערשטע פּאַר פּיס. זיי פּאַר־טיידיגען זיך געגען שונאים מיט די גיפּט־נאָדלען פון זייערע פּאָדער־שטע פּיס און מיט זייער מויל. דער ביס פון אַ גרויסען הונדערט־פּיסלער, באַזאָנדרעס פון די ספּעציעס, וועלכע געפינען זיך אין די טראָפּישע (הייסע) געגענדען, איז גאַנץ שמערצליך זאָגאַר פּאַר אַ מענשען.

די טויזענד־פּיסיע געהערען זיך מיט גרינסען. זיי קריכען לאַנג

זאס און גרייפען קיינעם ניט אן. ווען זיי ווערען באפאלען פון א שונא, מאכען זיי וועניג אנשטרענגונגען צו אנטלויפען, נאָר זיי דרעהען זיך צונויף אין א ספיראלע און לאָזען פון זיך ארויס א פלייסיגקייט מיט אזא שארפען שלעכטען ריח, אז ביי זייערע אָנגרייפער פארנעהט דער אפּעטיט זיך אַנצוריהרען אָן זיי.

לויט זייער אויסערליכען אויסזעהן זיינען די מיריאפאדען (די פיעל־פיסיגע ווערם) שטארק עהנליך צו די רינגעל־ווערם און זיי ווערען רען דארט אויך גערופען מיט דעם נאָמען „ווערם“. זיי האָבען אַבער אין זייער אָרגאניזם פיעלעס, וואָס צייגט אָן אויף א נאָהענ־טער קרובה־שאפט צו די אינזעקטען. זייער קערפער באשטעהט פון רינגעלעך, וועלכע זיינען גוט קאָנטיני, פון די רינגעלעך וואַקסען אַרויס גלידערדיגע פיס, ווי ביי אַלע ארטהראפאדען. זיי האָבען א דיטליך קענטיגען קאָפּ פון וועלכען עס שטארצט אַרויס א פאָר האַנטענען (פיל־הערענדלעך) ווי ביי די אינזעקטען.

די נקבות זיינען צווישען די מיריאפאדען געוועהנליך גרעסער ווי די זכרים. מאַנכע פון די הונדערט־פיסיגע לעגען זייערע אייער אין ערד־גריבלעך און פארלאָזען זיי. אַנדערע ווידער לעגען זיך אַרויף אויף זיי מיט זייער קערפער און באַשיצען זיי אַזוי לאַנג ביז זיי ווערען אויסגעבריהט. מאַנכע פון די טויזענד־פיסיגע באַדעקען יעדע פון זייערע אייער מיט א שיכט פון בלאַטע, כדי זיי צו באַשיצען. אין א פארלוף פון עטליכע וואָכען ווערען די אייער אויס־געבריהט און עס קומט אַרויס פון זיי קליינע ווערימלעך, וועלכע זיינען עהנליך צו זייערע עלטערן. עס זיינען אַבער אויך פאַראַן אַזעלכע ספעציעס, וואָס די יונגגעבאָרענע זיינען ניט עהנליך צו זייערע עלטערן, ערשט נאָכדעם, ווי זיי מאַכען דורך א נאַנצע רייהע פון ענטוויקלונגען באַקומען זיי זייער פולע עהנליכקייט.

דער נאָמען „הונדערט־פיסיגע“ אָדער „טויזענד־פיסיגע“ גיט ניט אָן די ווירקליכע צאָהל פיס, וועלכע די דאָזיגע ווערם האָבען. די הונדערט־פיסלער האָבען אין דער ווירקליכקייט ניט מעהר ווי 40 פיס, אַנדערע נאָך וועניגער. די טויזענד־פיסלער האָבען ווירקליך א גרויסע צאָהל פיס, וועלכע זיינען קורץ און דין און זעהען אויס ווי פעדימלעך.

די מיריאפאדען, וועלכע געפינען זיך אין די אייראָפּעאישע לענדער זיינען קליין געוואַקסען. זיי זיינען פון צוויי ביז דריי צאָל (אינטשעס) די לענג.

## צוועלפטער קאפיטעל


נידעריגע קרוסטאצעען פארמען. — פענקרעכסען. — ציקלאפען. —  
ענטעל-מושלען. — העכערע קרוסטאצעען פארמען. — גארנעלען. —  
טייך און ים ראקעס. — איזאפאדען און אמפּיפּאדען.

### די קרוסטאצעען (קרעבס-חיות)

די פארשידענארטיגקייט פון די קרוסטאצעען. — די צאָהל פון די פארשידענע גאטונגען אָדער ספעציעס ראקעס (קרעכסען) און ראקעס-עהנליכע באשעפעניסען, וועלכע באלאנגען צו דעם קלאס קרוסטאצעען, איז אַ נאָנץ גרויסע. מען שאַצט די צאָהל ביז אַרום צעהן טויזענד. דער גרעסטער טייל פון די פארשידענע קרוסטא-צעען ספעציעס לעבען אין ים, עס זיינען אָבער אויך פאַראַן פיעל וועלכע לעבען אין פרישוואַסער, ד. ה., אין טייכען און אין אָנער דעם. עס זיינען אויך פאַראַן אייניגע, וועלכע לעבען אויף דער יבשה. זייער גרויס איז פאַרשידען. אנדערע ספעציעס זיינען אַזוי קליין, דאָס מען קען זיי כמעט ניט זעהן מיט'ן נאַקעטען אויג, וועהר רענד אנדערע זיינען עטליכע פוס די גרויס. זיי זיינען אויך פאַר-שידען אין זייער אויסזעהן. דאָך עקזיסטירט אין דער גאַנצער גרופע פון די קרוסטאצעען אַ באַשטימטע עהנליכקייט צווישען די פאַרשידענארטיגע ספעציעס און עס איז לייכט צו זעהן זייער נאָ-הענטע פאַרוואַנדשאַפט. די אַלע באַשעפעניסען, וועלכע באלאנגען צו דער קרוסטאצעען גרופע זיינען באַדעקט פון אויבען מיט אַ האַר-טע קרוסטע אָדער שאַלאַכץ. פון דעם נעמט זיך זייער נאָמען. די דאָזיגע האַרטע קרוסטע אָדער שאַלאַכץ ווערט גערופען דער אויסער-ליכער סקעלעט פון די קרוסטאצעען.


נידעריגע קרוסטאצעען פארמען. — פון די איינפאַכסטע פאַרמען פון די קרוסטאצעען, וועלכע געפינען זיך אין גרויסע מאַסען אין סאַזשעלעקעס אָדער פרודען, זיינען ווערט צו באַמערקען די „פענקרעכסען“ אָדער „צויבער גארנעלען“. מעהרערע זאָלאָאָגען דענקען, אַז די „צויבער-גארנעלען“ זיינען זעהר נאָהענט צו די איינ-פאַכסטע אַמאָליגע פאַרמען פון קרוסטאצעען, פון וועלכע עס זיינען שפעטער אַרויסגעקומען די מעהרער ענטוויקעלטע פאַרמען. די

„צויבער־גארנעלען“ אָדער „פעע־קרעבסען“ זיינען קליינע באַשעפֿע־ ניסען אָבער זיי ציהען יעדענס אויפֿמערקזאָמקייט מיט דער באַ־ צויבערנדע שענקייט פֿון זייערע קאָלירען. זייער קערפֿער איז לאַנג און זייערע פֿיס האָבען די פֿאָרם פֿון בלעטער.



צייכונג 69. — א צויבער־גארנעלע (פעע־קרעבס).

צו די איינפֿאכסטע פֿאַרמען פֿון די קרוסטאצעען געהערען אויך די וואַסער־פֿליי, וועלכע געפינען זיך אָפֿט אין מיליאָנען אויף דעם גרונד פֿון סאָזשעלקעס און פֿרודען.



צייכונג 70. — וואַסער פֿליי און ציקלאָפֿען. א און ב, וואַסער־פֿליי; ג, א ציקלאָפֿען.


אויך די „ציקלאָפֿען“ באַלאַנגען צו די איינפֿאכע און נידעריגע פֿאַרמען פֿון די קרוסטאצעען. די ציקלאָפֿען זיינען קליינע קרעבס־ טיערע, וועלכע לעבען אין טייכען און סאָזשעלקעס. זיי האָבען אין צענטער פֿון דעם פֿאָדערשטען טייל פֿון זייער קאָפּ אַן אויג, און דער־ פֿון נעמט זיך זייער נאָמען (מיט דעם נאָמען ציקלאָפֿען ווערען גע־ רופֿען די לעגענדאַרע ריעזען, וועלכע — לויט דער אַל־ט־גריכישער לעגענדע — האָבען געהאט איין אויג אין מיטען שטערען). עהנליכע קליינע קרעבס־טיערע פֿון איינפֿאכע נידעריגע פֿאַר־ מען געפינען זיך אין גרויסע מאַסען אויך אין די ימים. אָפֿט שוויי־

מען זיי ארום אין אזעלכע גרויסע מאסען אויף דער אויבערפלעכע פון ים, אז דאָס וואַסער פון ים באַקומט אַ רויטליכען קאָליר פאַר אַ גרויסען ברייטען שטח, און אָפּט זיינען זיי אויך טיילווייז די אורזאָר-כע פאַר דעם פּאָספּאָר-שיין פון ים ביי נאַכט. פיעלע ספּעציעס פון די נידעריגע קרוסטאַצען זיינען פאַראַזיטען, וועלכע באַזעצען זיך אין די קערפער פון פיש און ציהען זייער חיונה פון זיי. דער-פאַר אָבער פאַרשלינגען די פיש מאַסען פון די קליינע קרעבס-חיות, די קרובים פון די פאַראַזיטען, וועלכע שווימען אַרום פריי אין ים אָדער אין טייכען. פיעל ים-פיש און טייך-פיש זיינען כמעט אינגאַנצען אָפּהענגיג מיט זייער שפייז פון די קליינע קרעבס-חיות, וואָס זיי פאַנגען.

די יעניגע ספּעציעס פון די קרעבס-חיות, וועלכע זיינען גע-וואָרען פאַראַזיטען האָבען זיך שטאַרק געענדערט אין זייער אויס-זעהן און אין זייער גאַנצען אָרגאַניזם, זיי האָבען אויך פאַרלאָרען זייער באַוועגונגס-פּערהינגקייט. זייער אַרט לעבען איז אזעלכער, אז זיי דאַרפען ניט אַרומקריכען אָדער אַרומשווימען צו זוכען זייער שפייז. זיי לעבען אין אַ פרעמדען קערפער אויף אלעם פאַרטיגען. די גאַנצמושלען און די ענטעל-מושלען (באַרנעקל אויף ענגליש), וועלכע מען האָט אַ מאָל דורך אַ טעות גערעכענט צווישען די מאַל-לוםקען, זיינען אין דער ווירקליכקייט קרעבס-חיות. זייער אומ-באַוועגליכער לעבען האָט זיי אַזוי געענדערט, אז מען קען זיי שווער דערקענען, אַז זיי באַלאַנגען צו די קרוסטאַצען.

די גאַנצמושלען, וועלכע האָבען געקראָגען זייער נאַמען צוליב אַן אַלמען גלויבען, אז פון זיי ווערען געבאָרען די ווילדע גענו, קלע-פען זיך אָן מיט אַ פלייש-שטענגעל, וואָס געהט אַרויס פון זייער קערפער, צו שטיקער האַליץ, צו שיפען, שטיינער, א. ז. וו. דער קערפער זייערער איז באַדעקט מיט אַ פעסטען שאַלאַכץ, וועלכער איז אָפּען פון איין זייט פאַר דער לענג, דורך וואַנען עס שטעקען אַרויס די פּעדער-עהנליכע פיס פון דער באַשעפּעניס, מיט וועלכע זי מאַכט אַ שטראָם אַרום זיך אין וואַסער, וואָס קען בריינגען שפייז געהנטער צו איהר. מאַנכע ספּעציעס פון די ענטעל-מושלען אָדער גאַנצמושלען זעצען זיך אָן אויף די קערפערס פון וואַל-פיש אָדער האַר-פיש (שאַרק). זיי זיינען אָבער ניט קיין פאַראַזיטען, זיי ציהען ניט זייער חיונה פון די קערפער, אויף וועלכע זיי האָבען זיך באַ-זעצט, זיי זיצען בלויז אויף זיי און פאַרשפּאַרען זיך צו באַוועגען.

עס איז זיי אויך לייכטער צו פאנגען זייער שפייז זיצענדיג אויף דעם רוקען אדער אויף דער זייט פון אן ארומשווימענדען וואל־פיש אָדער האַר־פיש. עס זיינען אָבער אויך פאַראַן אייניגע ספּעציעס וועלכע זיינען פאַראַזיטען. זיי זויגען זיך איין אין דעם בויך פון אַ קרעבס און ציהען זייער חיונה פון איהם. די דאָזיגע פאַראַזיטען האָבען פאַרלאָרען די וויכטיגסטע סמנים פון זייער אַמאָליגער אָפֿ־שטאַמונג. זיי האָבען פאַרלאָרען זייערע פיס און אויך די שפּורען פון די קערפּער־רינגלעך, וואָס איז געוועהנליך קענטיג ביי אַלע קרוסטאצעען.



צייכנונג 72. — א גאנז אָדער ענטפּעל־מושעל, ש, דער פּלויש־שטענגעל מיט וועלכען דער ענל־מושעל באהעפט זיך אן אַ שטיון, א האַלץ א. אז. וו.; ק, דער קערפּער פון מושעל.

צייכנונג 71. — אַן אויכעל גאַנז מושעל, וועלכער האַט ניט קיין פּלויש־שטענגעל. א, דער מושעל געזעהן פון אויבען; ב, דער מושעל, ווען דער אויבערשטער לעקעל איז אַראַפּגענומען; ג, דער מושעל באַדייטענד פאַרגרעסערט, מיט זיינע פּיהל־הערנער אַרויסגעשטעקט.

דער אינערליכער אָרגאַניזם פון די קליינע און נידעריגע פאַר־מען פון די קרוסטאצעען איז אין אַלגעמיין אַ גאַנץ איינפאַכער. די געדערים זייערע באַשטעהט געוועהנליך פון אַ גראַדען קאַנאַל אָדער קישקע וואָס געהט דורך דעם גאַנצען קערפּער. זיי האָבען אַ בייטעל־ענהליכען מאָגען און אַ מעהר וועניגער באַשטימטען לע־בער. ביי אַלע, אַ חוץ ביי די פאַראַזיטען, העלפּען די פאַדערשטע פּיסלעך ביים מויל צוקויען די שפייז, וועלכע ווערט פאַרדייהט אין מאָגען מיט דער הילף פון דער פאַרדייאונגס פּליסיגקייט, וואָס דער


מאַגען און דער לעבער גיט פון זיך ארויס. די פארדייטע שפייז ווערט דאן איינגעזויגען אין קערפער דורך די בלוט-צירקולאציע. דאָס בלוט-צירקולאציען סיסטעם איז ניט ביי אלע ספעציעס גלייך. ביי אנדערע ווערט דאָס בלוט געטריבען פון הארצען דורך אַרטע-ריעס און אָדערען איבער אלע טיילען פון קערפער. ביי אנדערע פעהלען אַרטעריעס און אָדערען און דאָס בלוט ווערט געטריבען פון הארצען דורך די הללים (עפּונגען), וועלכע געפינען זיך צווישען די פארשידענע אָרגאַנען. ביי אנדערע פעהלט אויך אַ האַרץ, און דאָס בלוט צירקולירט דורך דער צונויפציהונג און פאַנאַנדערציהונג פון די געדערעס. דאָס איז דער פאַל ביי די ציקלאפען. מייסטע פון די נידעריגע פאָרמען פון די קרוסטאַצען אָטעמען הויפטזעכליך דורך דעם, וואָס די ווענטלעך פון זייער קערפער זייגען אַריין אין זיך דעם זייער-רשטאַף, וואָס איז נויטיג אויפצוהאַלטען זייער עק-זיסטענץ; מאַנכע אָבער האָבען זשאַברעס צו אָטעמען, ווי דאָס איז דער פאַל ביי די פעטן-קרעבסען.

אַפילו די גאַנץ נידעריגע קרוסטאַצען זיינען איינגעטיילט אין צוויי געשלעכטען. די מענליכע זיינען קלענער ווי די ווייבליכע. אין די מייסטע ספעציעס האָט דער ווייבליכער געשלעכט אַזעלכע זעקעלעך אָדער בייטעלעך אין וועלכע די אייעלעך ווערען געשיצט. פון די אייעלעך ענטוויקלען זיך לאַרווען וועלכע זיינען באַזאָרגט מיט דריי פאָר פיסלעך, מיט אַ מיטעלסטע אויג און אַ שאַלאַכץ (לאַרווע ווערט גערופען די ערשטע פאָרם פון אַ ניי-געבאָרענעם באַשעפעניס אין דעם צושטאַנד ווען עס איז ניט עהנליך צו זיינע עלטערען). דער מיט-געבאָרענער שאַלאַכץ פאַלט ביסלעכווייז אַראָפּ פון דער לאַרווע, ווען זי פאַנגט אָן וואַקסען, און אַ נייער שאַלאַכץ פאַנגט זיך אָן צו ענטוויקלען. אין דערזעלבער צייט ענטוויקלען זיך אויך נייע פיסלעך און אַזוי ביסלעכווייז באַקומט די יונגע באַשעפעניס אַלץ מעהר עהנליכקייט צו איהרע עלטערען. די לאַרווען פון די ענטעל-מושלען אָדער גאַנזמושלען באַהעפטען זיך מיט זייערע פיהל-הערנדלעך צו אַ שווימענדיגען שטיק האַלץ אָדער אַ שיף וואָס זיי טרע-פען אין זייער וועג און דאַרטען פערענדיגען זיי זייער ענטוויקלונג. די לאַרווען פון די פאַראַזיטישע ענטעל-מושלען באַהעפטען זיך צו אַ קרעבס, זיי וואַרפען דאן אַוועק זייערע פיסלען און נאָך אַ גאַנצע רייע ענדערונגען, וואָס עס קומט אין זיי פאָר, דרינגען זיי אַריין אין די געדערעס פון קרעבס און באַזעצען זיך אין זיי.



העכערע קרוסטאצעען פאַרמען. — די גרעסער און די אלגעמיין מעהר באקאנטע קרעבס-חיות באלאנגען צו די העכערע פאַרמען קרוסטאצעען, דאָס זיינען די טייך-קרעבסען, די ים-קרעבסען, די קראבען און פארשידענע אנדערע פאַרמען קרעבסען. איינער פון די הויפט סמנים פון די דאָזיגע קרוסטאצעען איז די צאָהל רינגען אָדער סעגמענטען פון וועלכע זייער קערפער איז צונויפגעשטעלט. דער קאָפּ זייערער באשטעהט פון פינף רינגען אָדער סעגמענטען, די ברוסט פון אכט און דער בויך פון זיבען. אין פיעלע פעלע זיינען די רינגען פון קאָפּ און ברוסט צונויפגעגאַסען ווי אין איין שטיק. עס בלייבען בלויז גוט קענטיג די זיבען רינגען פון בויך.

אַלס אַן איבערגאַנג פון די נידריגע פאַרמען קרוסטאצעען צו די העכערע פאַרמען קענען באַטראַכט ווערען די „גאַרנעל-קרעבסען“ („שרימפּ“ אין ענגליש). זיי זיינען קליינע ים-באַשעפעניסען, וועלכע מען געפינט צווישען די ים-גראַז ביי די ברעגעס פון ים. אין



צייכונג 78. — אַ גאַרנעל-קרעבס (שרימפּ).


אַלגעמיין איז זייער אויסזעהן פיעל עהנליך צו די טייך-ראַקעס (פלוס-קרעבסען), אָבער מען קען זיי לייכט אונטערשיידען דורך זייערע צוויי-צווייגיגע פיס, וואָס געהען אַרויס פון זייער ברוסט. די צוויי-צווייגיגע אָדער „געשפאַלטענע“ פיס באַגעגענט מען מייס-טענס ביי די נידריגע פאַרמען פון די קרוסטאצעען, ביי די העכערע פאַרמען באַמערקט מען זיי שוין ניט. די גאַרנעלען זיינען אויך אין אייניגע אנדערע הינזיכטען נאָהנט צו די נידריגע פאַרמען קרוסטאצעען, וועלכע זיינען פריהער באַשריבען געוואָרען און מען נעמט זיי דאָריבער אַן אַלס איבערגאַנגס-שטופע פון די נידריגע פאַרמען קרעבס-טייערע צו די העכערע. פון די העכערע פאַרמען קרוסטאצעען זיינען די מייסט באַ-

קאנטע און די מייסט פארשפרייטע די טייך־ראקעס אָדער פלוס־קרעבסען (קריי־פיש אין ענגליש). מען באַגעגענט זיי כמעט אין אלע גרויסע טייכען פון אייראָפּא און אמעריקא. זיי באַהאַלטען זיך געוועהנליך אין די שפּאַלטען פון פעלזען אָדער אין גריבער, וואָס זיי גראָבען פאַר זיך אויס, פון וועלכע זיי קריכען אַרויס צו באַפאַלען קליינע פישלעך, וועלכע זיי געברויכען אַלס זייער שפּייז. גאַנץ אָפט אָבער ווערען זיי אין אַזאַ מאָמענט אַליין געפּאָנגען פון געוויסע פּויגלען און חיות וואָס לוייערן אויף זיי כדי אָפּצורייכטען אַ מאָלצייט פון זיי. זיי ווערען אויך אין מאַנכע ערטער גאַנץ גערען געגעסען פון מענשען.

זעהר עהנליך צו די טייך־ראקעס זיינען די ים־ראקעס (לאַבסטער אין ענגליש). די ים־ראקעס זיינען בלויו עטוואס אנדערש געבויט ווי די טייך־ראקעס, אָבער אין אַלגעמיין זיינען זיי זעהר עהנליך איינע צו די אנדערע. די ים־ראקעס ווערען פיעל מעהר געברויכט אַלס שפּייז ווי די טייך־ראקעס. זיי ווערען אין מאַנכע ימים גע־פּאָנגען אין די מיליאָנען יעדעס יאָהר. אין אנדערע ערטער האָט מען זיי געפּאָנגען אין אַזעלכע גרויסע מאַסען, אַז מען האָט זיי דאָרטען כמעט אין גאַנצען פאַרניכטעט.

דער קערפּער פון די טייך־ראקעס און ים־ראקעס באַשטעהט פון צוויי הויפּט־טיילען. דער פּאָדערשטער טייל באַשטעהט פון דעם קאָפּ מיט דער ברוסט, וועלכע זיינען צונויפגעוואַקסען אין איין שטיק און באַדעקט מיט אַ פּאַנצער, און דער הינטערשטער טייל באַשטעהט פון דעם בויך. דער פּאָדערשטער טייל ווערט אָנגערױ־פען „סעפּאַלאָטהאַראַקס“ (קאָפּ־ברוסט), און דער הינטערשטער טייל „אַבדאָמען“ (הינטער־לייב, בויך). פון זייער ברוסט וואַקסען אַרויס צעהן פיס, און מען רופט דאָריבער די דאָזיגע ספּעציעס „דע־קאַפּאָדען“, וואָס דאָס מיינט „צעהן־פיסיגע“. די פּאָדערשטע דריי פּאַר פיס האָבען שערען־עהנליכע אָדער צוואַנגען־עהנליכע ענדען. די ערשטע פּאָדערשטע פּאַר פיס זיינען באַדייטענר גרעסער און דיקער ווי די איבריגע און די צוואַנגען ביי זייער ענד זיינען גאַנץ שטאַרקע. פון דעם בויך פון די דאָזיגע ראַקעס וואַקסען אַרויס פינף פּאַר קליינע רודער־עהנליכע פּיסלעך, וועלכע ווערען אָנגערױ־פען „שווימערס“. יעדער רינג פון בויך האָט, אַלזאָ, אַ פּאַר שווי־מערס, אויסער דער ערשטער און דער לעצטער. אין דעם ערשטען רינג פון קאָפּ געפינען זיך אַ פּאַר אויגען, וועלכע זיצען אויף צוויי


באוועגליכע אויגען־שטענגלעך. הינטער די אויגען געפינען זיך צוויי פאָר געגלידערטע פיהל־הערענדלעך, וועלכע מען רופט „אַני־טענטען“. די פאָדערשטע פאָר איז פיעל קלענער אַלס די הינטער־סטע. מען רופט די פאָדערשטע פאָר די „קליינע אנטענטען“ און די הינטערשטע — די „גרויסע אנטענטען“. דאָס מויל גע־פינט זיך אין דער אונטערשטער זייט פון קאָפּ און איז אין דער ריכ־טונג פון דער לענג פון קערפער, דאָס הייסט, אַז דער מויל־שפּאַלט איז אין דער לענג פון קאָפּ און ניט אין דער ברייט. דאָס מויל האָט אַ גאַנצע רייהע קיי־אַרגאַנען. די דאָזיגע קיי־אַרגאַנען אָבער זיינען



צייכנונג 74. — 1) אַ מיי־קרעפּס, געזעהן פון זיין בויך זייט. א, די קינבאַקען; ב, דאָס ערשטע פאָר „פּיס־יאַסלעס“; ג, דאָס צווייטע פאָר „פּיס־יאַסלעס“; ד, געהער־אַרגאַן; ה, די לעצטע פאָר „פּיס־יאַסלעס“ (מויל); ו, די ערשטע פאָר צוואַנגען־פּיס; ז, די פינפטע פאָר פּיס; ח, די שווימערס; ט, די לעצטע פאָר שווימער; כ, די עפּנונג פון הינ־טער־לויב (רעקטום). 2) טוילען פון די קיי־אַרגאַנען פון קרעבס. א, די קינבאַקען; ב, דאָס ערשטע פאָר יאַסלעס; ג, דאָס צווייטע פאָר יאַסלעס; ד, דאָס ערשטע פאָר „פּיס־יאַסלעס“; ה, דאָס צווייטע פאָר „פּיס־יאַסלעס“; ו, דאָס דריטע פאָר „פּיס־יאַסלעס“.

עהנליכער צו פיס, ווי צו קינבאזען אָדער יאָסלעס. מען רופט זיי דאָריבער „פיס־יאָסלעס“.


פון מויל געהט די שפייז דורך אַ קורצען שלונד אין אַ רונדען מאָגען, וועלכער איז באַזאָרגט מיט אַ גאַנצע רייע ציינדלעך, וועל־כע צורייבען די שפייז, וואָס קומט אין איהם אַריין. פון מאָגען ציהט זיך אַ קישקע וועלכע ענדיגט זיך אין דער עפנונג פון הינטער־לייב. ביים מאָגען געפינט זיך אַ גוט ענטוויקעלטער לעבער. דאָס האַרץ געפינט זיך אין דער רוקען־זייט פון קערפער און דורך אַר־טעריען צירקולירט דאָס בלוט אין די פארשיידענע טיילען און גליי־



צייכנונג 75. — אַ ים־קרעבס.

דער פון קערפער. די אַטעמונגס־אָרגאַנען, די זשאַברעס, געפינען זיך פון ביידע זייטען פון קערפער וואו די פיס וואַסען אַרויס, אין אזאַ קאָמער־עהנליכען רוים אונטער דעם פאַנצער, וואס באַדעקט דעם קאָפּ און די ברוסט פון ראַק. צוליעב דער באַוועגונג פון די פיס פון ראַק בייט זיך כסדר דאָס וואַסער אין די זשאַברעס־קאָמע־רען און די זשאַברעס זיינען שטענדיג באַזאָרגט מיט פריש וואַסער, פון וועלכע זיי זויגען אַרויס די לופט. אויסער די פיהל־הערענדלעך (אנטענען) און אויגען האָבען די ראַקעס אויך צוויי הער־אָרגאַנען, וועלכע געפינען זיך אויף דער אויבערשטער זייט פון די צוויי „קליינע אנטענען“ (פיהל־הערענדלעך). די דאָזיגע הער־אָרגאַנען

באשטעהען פון קליינע בייטעלעך, אויסגעפוטערט מיט דינע הערע-  
לעך, וועלכע ענטהאלטען עטליכע קלייניקע זאמד-קרענדלעך. די  
וויבראציאָנען (ציטערונגען), וואָס קומען פאַר אין וואַסער, גיבען אַ  
לייכטען טרייסעל די זאמד-קרענדלעך, וועלכע שלאָגען זיך דאָן אָן  
אָן די דינע הערעלעך פון בייטעלע און דער גערויש ווערט אויף אזא  
אופן פון די הערעלעך איבערגעגעבען צום נערווען-סיסטעם.  
דאָס נערווען-סיסטעם פון די ראַקעס באַשטעהט פון איין גרע-  
סערען נערווען-קניפעל, וואָס געפינט זיך אין קאָפּ, און קען אָנגערוד-  
פען ווערען דער מאַרד, און פון אַ גאַנצע רייהע קלענערע נערווען



צייכונג 76. — די ענטוויקלונג פון אַ ים-קרעבס. א, אַן  
ערשט געבארענער קרעבס געזעהן פון דער זייט (זעהר שטאַרק  
פאַרגרעסערט); ב, דערזעלביגער קרעבס געזעהן פון רוקען זייט;  
ג, זיינע אַנטענען; ד, איינער פון זיינע פיס.

קניפלעך, וועלכע זיינען פארטיילט איבער'ן קערפער און פון וועלכע  
דינע נערווען-פּעדיס ציהען זיך צו די פאַרשידענע אָרגאַנען און  
קערפער-טיילען. דאָס נערווען-סיסטעם געפינט זיך אויף דער בויך-  
זייט פון קערפער.

עס איז ניט באַשטימט אויב די ראַקעס באַזיצען אויך אַ חוש  
המעם, אָבער אַ חוש הריח האָבען זיי אַ גאַנץ שטאַרקען. זיי  
האָבען אויך אַ זעהר גוטען חוש המשוש. ניט קוקענדיג  
אויף דעם, וואָס זיי זיינען באַדעקט מיט אַ דיקען האַרטען


שאַלאַכץ, פיהלט דאָך זייער קערפער יעדע באַריהרונג. אין פיעלע טיילען פון זייער קערפער געפינען זיך דינע הערעלעך און גריבע-לעך, וועלכע זיינען פאַרבונדען מיט דעם נערווען-סיסטעם און דורך זיי פיהלט זייער קערפער יעדע באַריהרונג און ענדערונג וואָס קומט פאַר אין זייער אומגעבונג.

די שאַרפקייט פון זייער הוש הראיה איז ניט באַשטימט גענוי. די אויגען פון די טייך-ראַקעס זיינען צונויפגעזעצט פון עטליכע „לינזען“, ווי מען רופט עס, און זיינען אריינגעזעצט אין אַזעלכע באַוועגליכע שטענגלעך. אויף וויפיעל אַזעלכע אויגען קענען גוט און קלאַר זעהן איז אומבאַשטימט. עס איז מעגליך, אַז די ראַקעס קענען מיט זייערע אויגען בלוז אונטערשיידען צווישען ליכט און פינסטערניס, אָבער קענען מיט זיי ניט זעהן דעם געשטאַלט פון אַ געגענטשאַנד. וואָס איז שייך צו פאנגען שפייז אָדער אויסצומיי-דען שונאים קען זיי פאר דעם צוועק דינען די איבעריגע חושים, וואָס זיי באַזיצען.

די טייך-ראַקעס, די ים-ראַקעס און אַלע איבריגע קרוסטאַצען פון די העכערע פאַרמען פאַרמעהרען זיך דורך לעגען אייער. די יונג-גע-ראַקעס, וועלכע קומען אַרויס פון די אייער זיינען אין זייער אויס-זעהן עהנליך צו זייערע עלטערען. ווען דער יונגער ראַק קומט אַרויס פון איי איז ער אומגעפעהר אַ דריטעל צאָל (אינטש) די גרויס. ער שווימט דאן ארום פריי אין וואַסער און אין אַ פארלויה פון אַ מאָד-נאַט בייט ער פיער אָדער פינף מאָל איבער זיין שאַלעכץ. נאָכ-דעם קאָזט ער זיך אַראָפּ אויפ'ן גרונד פון וואַסער און באַזעצט זיך אין אַ שפאַלט פון אַ פעלז. זיין גרויס איז דאן אונגעפעהר צוויי דריטעל פון אַ צאָל און ער איז שוין דאן אין גאנצען עהנליך מיט זיין אויסזעהן צו זיינע עלטערען. ווען ער ווערט גרעסער וואַרפט ער ווידער אַראָפּ פון זיך זיין שאַלאַכץ און באַקומט אַ נייעם, אַ גרע-סערען. אין די אינגערע יאָהרען, ווען דער ראַק וואַקסט שנעלער בייט ער זיין שאַלאַכץ עטליכע מאָל אין יאָהר. ער וואַרפט אַראָפּ דעם אלטען שאַלאַכץ, וואס איז איהם צו קליין געווארען און ער באַקומט אַ נייעם, אַ גרעסערען, אַ האַרטערען, אַ דיקערען, און אַ שטאַרקערען. ווען ער ווערט אָבער עלטער, בייט ער זיין שאַלאַכץ שוין זעלטענער. מאַנכע זאָלאָגען באַהויפטען, אַז ער בייט זיין שאַלאַכץ איין מאָל אַ יאָהר, אָבער דאָס איז ניט באַשטימט.

אַן אינטערעסאַנטער טיפּ איז דער „איינזיעלער-קרעבס“


„הוירמיט קרעב“ אין ענגליש). אין זיין פריהען יוגענד זוכט זיך דער איינזידלער־קרעבס אויס א לעדיגען מושעל פון א מאָלוסק און באזעצט זיך אין איהם. זיין הינטערשטער טייל פון קערפער בלייבט נאָקעט, ניט באדעקט מיט קיין שאַלאַכץ. עס פארשווינדען ביי איהם אויך כמעט אין גאנצען די שוויס־פיסלעך פון בויך. זיין פאָדערשטער טייל פון קערפער, אָבער, ענטוויקעלט זיך גאנץ שטאַרק און איז באדעקט מיט א פעסטען שאַלאַכץ, און איז זעהר גוט צוגע־פאסט פאר די מלחמות וואָס איהם קומט אויס צו פיהרען אין זיין לעבען. ווען ער ווערט גרעסער און דער מושעל אין וועלכען ער האָט זיך אנפאנגס באזעצט איז פאר איהם שוין צו קליין, קריכט



צייכונג 77. — דער איינזידלער קרעבס, ווי ער ליגט אין א פרעמדען מושעל, מיט זיינע פיהליהערנער און צוואנגען־פיס ארויסגעשטעקט.


ער ארויס פון איהם און לאָזט זיך אוועק זוכען א נייע דירה. געפינט ער א לעדיגע מושעל, וואָס פאסט פאר זיין גרויס, איז געוויס גוט, איז אָבער די מושעל א באזעצטע פון א מאָלוסק אָדער פון זיין איי־גענעם מין, דאָן פרוכירט ער ארויסטרייבען דעם באלעבאָס און פארנעמען זיין אָרט. ווען דאָס איז א מאָלוסק קומט ער איהם לייכט ביי, אָבער ווען אין מושעל זיצט אן אנדער איינזידלער־קרעבס, דאָן לאָזט ער זיך אזוי לייכט ניט נעמען, עס פאנגט זיך אָן א מלחמה און עס זיענט ווער עס איז שטאַרקער.

די העכסט ענטוויקעלטע קרוסטאצעען זיינען די קראכען. זיי אונטערשיידען זיך אין זייער אויסזעהן פון די ים־ראַקעס הויפט־



צייכנונג 78. — א קראב.

זעכליך דערמיט, וואָס זייער בויך און עק איז פיעל קירצער ווי ביי די ערשטע, און זייער סעפאלאָטהאַראַקס (קאָפּ און ברוסט) איז אָפּט ברייטער ווי לענגער. זייער קורצער בויך איז דערצו נאָך אַרונט'ערטערגעבויגען אונטער זייער ברוסט. ביי די קראַבען זיינען הויפט'



צייכנונג 79. — די ענטוויקלונג פון א קראַב. א, ערשט פון איי; ב, זיין צווייטער ענטוויקלונגס־צושטאַנד; ג, זיין דריטער ענטוויקלונגס־צושטאַנד; ד, זיין פאַלשמענדיג ענטוויקעלטער צושטאַנד.



זעכליך ענטוויקעלט די פיס, וועלכע וואקסען ארויס פון זייער ברוסט, וועהרענר די פיס פון זייער בויד זיינען וועניג באמערקבאר. די פאָרם פון קערפער און ענטוויקלונג פון די פיס איז ניט גלייך ביי די פארשידענע ספעציעס פון די קראבען, ביי אנדערע זיינען די פיס קירצער און שטארקער און ביי אנדערע זיינען זיי לענגער און שוואַכער, אָפהענגיג פון דעם ארט לעבען וואָס זיי פיהרען און פאר וועלכע צוועקען זייערע פיס ווערען באנוצט. די שפיין־קראַבן




צייכנונג 80. — א שפיין־קראַב.

זייער אויסזעהן איז עהנליך צו א שפיין האָבען גאנץ לאנגע פיס אין פאָרגלייך מיט זייער קערפער. דער יאָפּאָנעזישער ריזען־קראַב, וועלכער איז א שפיין־קראַב, האָלט 20 פוס די לענג פון פאָדערשטען שפיץ פוס ביז דעם הינטערשטען שפיץ פוס.

צווישען די פארשיידענארטיגע קרעבס־חיות ווילען מיר דאָ נאָך דערמאָנען אין קורצען די „איזאפאָדען“, וואָס דאָס מיינט, „גלייך־פיס־גע“, צוליבע זייערע זעבען פאָר פיס, וועלכע זיינען גלייך איינע

צו די אנדערע, און די „אמפיפאדען“, וואָס מיינט ביידערליי פּיס, צוליעב דעם וואָס איין טייל פון זייערע פּיס בויגען זיך אין דער פּאַרווערטס-ריכטונג און איין טייל אין דער ריקווערטס-ריכטונג. די איזאפאדען זיינען, געוועהנליך, קליינע באשעפעניסען און זייער קערפער איז פלאך, ווי צונויפגעפרעסט. די רינגעלעך פון דער רוקען זייט פון זייער קערפער זיינען גוט קאָנטיג. די זיעבען פּאַר פּיס וועלכע וואַקסען אַרויס פון זייער ברוסט זיינען אלע גלייך. ביי די נקבות האָט יעדער פּוס, ביי דעם וואָרצעל פון וואַנען ער




צייכונג 81. — פארשיידענע איזאפאדען. א, די קליינע פּיהל־הערנער (אַנטענען); ב, די גרויסע פּיהל־הערנער.

וואַקסט אַרויס אזאָ דין הייטעל אין דער פּאַרם פון אַ קליינע אויס־נעבויגענע פּלאַטע. אָט די דאָזיגע דינע הייטעלעך בילדען אויף דעם בויך זייט פון דער נקבה זעקעלעך אין וועלכע עס ווערען אויסגע־בריהט איהרע אייער פון וועלכע אַ נייער דור ענטוויקעלט זיך. אויסער די זיבען פּאַר פּיס, וואָס די איזאפאדען פּאַרמאָגען, האָבען זיי נאָך אנדערע פּיס־הנליכע אַרויסשטאַרצונגען פון זייער קערפער מיט וועלכע זיי אָטעמען אָדער שווימען.

מאַנכע פון די איזאפאדען לעבען אין וואַסער און מאַנכע פון זיי אויף דער יבשה. ד וואָס לעבען אין וואַסער מאַכען זיך זייערע

נעסטען אין זאמד, אונטער פעלזען אָדער אין ים־גראַז. פיעלע פון זיי זיינען פאראזיטען און מאכען זיך זייערע נעסטען אין דער הויט אָדער מויל פון פארשידענע פישען. די וואָס לעבען אויף דער יבשה, מאכען זיך זייערע נעסטען אונטער פארפולטע קלעצער און



צייכנונג 82. — זאמד־שפרינגער אָדער פליי קרעכטען (פון דער אמפיפאָדען גרופע).

אין קעלערען. זיי נעהרען זיך הויפטזעכליך פון גרינסען. די אמפיפאָדען זיינען קליינע באשעפענישען, וועלכע האָבען אַ שמאַלען צונויפגעדריקטען קערפער, וועלכער איז צונויפגעשטעלט פון רינגעלעך. די פיס פון די אמפיפאָדען, ווי שוין אויבען באַמערקט, זיינען איין טייל געבויגען אין דער פאָרווערטס־ריכטונג און איין טייל אין דער ריקווערטס־ריכטונג. די הינטערשטע דריי פיס, וועלכע זיינען געבויגען ריקווערטס זיינען אויסגעבילדעט צום שפרינגען. די מעהר באַקאנטע ספעציעס פון די אמפיפאָדען זיינען די זאמד־שפרינגער, אָדער פלייה־קרעכטען. זיי לעבען געוועהנליך ביי די ברעגען פון ים, מאַנכע ספעציעס אויך אין סאזשעלקעס.

## דריצענמער קאפימעל

אראכנידען אָדער שפינען חיות. — זייער עהנליכקייט צו די קרעכס-  
טהיערע. — סקארפֿיאָנען. — שפינען. — דער גארמען-שפּין. —  
די דעקעל-שפינען. — די מילבען. — דער קעניג-קראב.

## שפינען, סקארפֿיאָנען און מילבען


דער אראכנידען קלאַס. — צו די אָרטראָפּאָדען באַלאַנגען  
אויך די שפינען, סקארפֿיאָנען און מילבען, וועלכע ווערען באַצײ-  
כענט מיט דעם אַלגעמיינעם נאָמען אַראַכנידען, וואָס  
דאָס מיינט, שפינען-חיות.

די אראכנידען האָבען מיט זייער אויסערליכען אויסזעהן אַ  
נאָהענטע עהנליכקייט צו די קרוסטאַצען (קרעכס-חיות), אָבער זיי  
געהערען דאָך ניט צו דעם קלאַס פון די קרוסטאַצען, נאָר שטעלען  
מיט זיך פֿאַר אַ באַזונדערען קלאַס. די אראכנידען זיינען צוגע-  
פּאַסט צו דעם לעבען אויף דער יבשה, וועהרענר די קרוסטאַצען  
זיינען צוגעפּאַסט צו דעם לעבען אין וואַסער. די אראכנידען אונ-  
טערשיידען זיך פון די קרוסטאַצען אין דעם געבוי פון זייער אָר-  
גאַניזם און אין זייער אַרט לעבען.

דער קערפּער פון די אראכנידען באַשטעהט, ווי ביי די קרוס-  
טאַצען, פון דריי הויפּט-טיילען: פון אַ קאָפּ, פון אַ טהאַראַקס  
(ברוסט-טייל) און בויך. דער קאָפּ און דער טהאַראַקס זיינען ביי  
די מייסטע פון זיי צונויפגעוואקסען אין איין שטיק און עס איז  
ניט קאָנטיג וואו זיי טיילען זיך אָפּ. דער קערפּער געבוי און דער  
אָרגאַניזם פון די פארשידענע ספּעציעס אראכנידען אונטערשיידעט  
זיך אין פּיעלע איינצעלהייטען לויט דעם אַרט לעבען, וואָס זיי  
פיהרען. זיי האָבען אָבער אַ גאַנצע רייע געמיינשאַפּטליכע סמנים  
און אייגענשאַפּטען, וועלכע צייגען אָן אויף זייער נאָהנטער קרובּה-  
שאַפּט און וועלכע פאַרבינדען זיי אין איין קלאַס.

די מייסטע אראכנידען האָבען פּיער פּאָר פּיס, וועלכע וואַקסען  
ביי זיי אַרויס פון זייער ברוסט-טייל. זיי אַטעמען דורך לופּט-רעה-  
רען אָדער לונגען, וועלכע באַשטעהען פון בייטעלעך וועלכע ענט-  
האַלטען אין זיך אַ רייע בלעטלעך, צונויפגעלעגט איינע אויף די

אָנדערע, ווי אַ בוך אָדער אַ פעכער. זיי ווערען דאָריבער אָנגע-  
רופען „בוך-לונגען“ אָדער „פעכער-לונגען“.  
די מייסטע אַראַכנידען לעגען אייער פון וועלכע עס ווערען  
אויסגעבריהט זייערע קינדער, אָבער מאַנכע פון זיי, ווי די סקאר-  
פיאָנען און אייניגע ספעציעס מילכען ענטוויקלען זייערע קינדער  
ביי זיך אין קערפער, און ווען די קינדער ווערען געבאָרען איז זייער  
עהנליכקייט צו זייערע עלטערען גוט קאָנטיג.  
כמעט אלע אַראַכנידען לעבען פון רויב אָדער אַלס פאַראַזיטען.  
די וואָס לעבען פון רויב האָבען אַ זעהר גוט ענטוויקעלטען שפּירענ-  
דען חוש אויסצוגעפינען זייער רויב און זיינען דערביי באַזאָרגט  
מיט אַ גיפטיגען שמעך-אַרגאָן זייער רויב צו באַטויבען אָדער צו  
טויטען.



צייכונג 88. — אַ סקארפיאָן.

די סקארפיאָנען. — מיט דעם פּאַנצער שאַלאַכץ מיט וועל-  
כען די סקארפיאָנען זיינען באַדעקט און מיט זייער פּאַר שטאַרקע  
צוואַנגען, וואָס זיי האָבען אין זייער קאָפּ, האָבען זיי אַ גרויסע  
עהנליכקייט צו די קרעפּסען (ראַקעס) און מען קען זיי אָננעמען פאַר  
זייערע נאָהענטע קרובים, אָבער, ווי עס איז שוין פריהער באַמערקט  
געוואָרען איז זייער קרובה'שאַפט אַ ציעמליך ווייטע.  
דער קאָפּ און דער ברוסט-טייל איז ביי דעם סקארפיאָן צונויפ-  
געוואַקסען אין איין שטיק. ער האָט פיער פּאַר פיס, וועלכע וואַקסען  
ביי איהם אַרויס פון ברוסט-טייל. זיין בויך, וואָס באַשטעהט פון  
אַ רייע ברײטע רינגען, איז איינגעטיילט אין צוויי טיילען. דער  
אויבערשטער טייל איז דיקער און דער אונטערשטער טייל איז דינער  
און זעהט אויס ווי אַן עק. ביים ענד פון בויך אָדער „עק“ נעפינט

זיך אן אויסגעבויענער שמעכער, אין וועלכען עס געפינען זיך גיפטרדיזען.

אויף דעם אויבערשטען טייל פון קאָפּ און ברוסט־טייל האָט דער סקארפיאָן עטליכע פּאָר אויגען, וועהרענד אין דעם אונטערשטען טייל פון זיין ברוסט־טייל האָט ער עטליכע שפּאַלטען־ענהלליכע עפּנונגען, דורך וועלכע עס קומט אַרײַן לופּט אין די חללים, וואו זײַנע „לונגען־ביכער“ געפינען זיך.

די סקארפיאנען לעבען אין וואַרימע לענדער. מען קען זיי דאַרטען געפינען אונטער שטיקער האַלץ אָדער שטיינער, וואו זיי ליגען באַהאַלטען ביי טאָג. ווען עס קומט אָן די נאכט פאַרלאָזען זיי זייערע נעסטען צו זוכען שפייז, וואָס באַשטעהט הױפּטזעכליך פון אינועקטען און שפינען. זיי פאַנגען זיי מיט זייערע צוואַנגען און לאָזען שנעל אַרײַן אין זייער לײב זייער גיפּטיגען שמעכער און טויטען זיי.

עס זיינען פאַראַן אייניגע ספּעציעס סקארפיאנען, וועלכע זײַנען ביז אַ האַלב פּוס די לענג און זייער גיפּט קען שוין אין מאַנכע פעלע ווערען געפּעהרליך זאָנאַר פאַר אַ מענשען.

די שפינען. — פון אַלע אַראַכנידען זיינען די שפינען די באַדאָנטעסטע און די פאַרשפּרייטעסטע אין די פאַרשידענע טײלען פון דער ערד. זיי זיינען אין אַלגעמיין זעהר אינטערעסאַנטע, הגם זעהר ניט באַליעבטע, באַשעפּעניסען.

די צאָהל פון די פאַרשידענע ספּעציעס שפינען איז אַ גאַנץ גרויסע, אָבער עס וועט זיין גענוג צו באַשרײַבען מאַנכע פון זיי, אום צו באַקומען אַ פּאָרשטעלונג וועגען אַלע אנדערע.

דער גאָרטען־שפּין איז מעהר באַקאַנט ווי אַלע אנדערע שפינען און מיר וועלען איהם נעמען אַלס בײַשפּיעל. דער גארטען־שפּין האָט פיער פּאָר פּיס און אַכט אויגען. זיין מויל איז גוט ענטוויקעלט צום עסען און צום זויגען. ער האָט אַ פּאָר לונגען, וועלכע ליגען אין דעם פּאָדערשטען טײל פון זיין בויך, די לופּט קומט אַרײַן אין זיי דורך צוויי עפּנונגען, וועלכע געפינען זיך אין דער אונטער־שמער זײַט פון זיין קערפּער.


ביים ענד פון זיין בויך האָט דער שפּין זיינע שפּין־אַרגאַנען. זיי באַשטעהן פון אינערליכע דריזען, וועלכע ליגען איבער דריי פּאָר קליינע אַרויסשטאַרצונגען אָדער וואַרצלעך, וועלכע זיינען באַדעקט מיט דינע האַרר־הרעלעך. (אַנדערע שפינען האָבען

בלויז צוויי פאָר אזעלכע וואָרצלעך). ווען דער שפּין וויל אָנ-  
פּאַנגען שפּינען זיין שפּינוועבס, גיט ער אַ דריק זיינע שפּין-אַרגאַ-  
נען צו וועלכען עס איז געגענשטאַנד און פון די דריזען ווערט דאָן  
דורך די האָהר-רעהרעלעך אַרויסגעדריקט אַזאַ פּליסיגקייט, וואָס  
ווערט אין דער לופט פאַרהאַרטעוועט אין אַ דינעם פּאַדים. ביים  
שפּינען די פעדים באַנוצט דער שפּין זיינע הינטערשטע פּיס, וועל-  
כע פּיהרען די פעדים און ציהען זיי אויס.

דער נאָרטען-שפּין שפּינט מייסטענס זיין שפּינוועבס וואו עס  
איז אין אַ ווינקעל פון אַ פאַרקען אָדער וואו עס איז ביי אַ שפּאַלט,




צייכנונג 85. — דער ענד  
פון אַ שפּינ'ס פּיס (זעהר  
שטאַרק פאַרגרעסערט).



צייכנונג 84. — דער גאָר-  
מען-שפּין.

וואו ער זאָל זיך קענען באַהאַלטען. ווען ער געפּינט אויס אַ פּאַר-  
סענדען פּלאַץ, וואו אָנצופאַנגען וועבען זיין נעץ, שפּינט ער צור-  
ערשט אויס אַ פּאַדים, וואָס שטעלט מיט זיך פּאַר די מיטעל-ליניע  
פון דעם נעץ. ער פאַנגט אָן שפּינען דעם פּאַדים פון אַ געוויסער  
הויך, וואו ער באַפעסטיגט זיין אויבערשטען ענד און ער לאָזט זיך  
אַראָפּ, שפּינענדיג דעם פּאַדים ביז צו דעם שטייף-פונקט וואו ער  
וויל באַפעסטיגען זיין אונטערשטען ענד. ווען ער איז דערמיט  
פאַרטיג, ציהט ער אָן דעם פּאַדים שטייפער, באַפעסטיגט איהם  
שטאַרקער, און ווען ער איז מיט איהם פּאַלשטענדיג זיכער, פאַנגט

ער אָן פון מיטעל־פונקט פון דעם פּאָדים צו שפינען ראַדיאַלע פעדים אין אַלע ריכטונגען, ווי די שפייכען פון אַ ראָד. ווען דער שפין איז דערמיט פּאַרטיג, פּאַנגט ער אָן צו שפינען פון מיטעל־פונקט אַ ספּיראַל־פּערמיגען פּאָדים, וועלכער ווערט פון איהם באַפעסטיגט אין יעדען פונקט, וואו ער קרייצט זיך מיט די ראַדיאַלע פעדים. דאָס שפינגעוועב ווערט אויף דעם אופן איינגעטיילט אין קעסטעלעך.



צייכונג 86. — א, אַ געווענליכע הויז־שפין, שטאַרק פאַר־גרעסערט. ב, דער פּאָדערשטער מויל פון קאַפּ, נאָך מעהר פאַר־גרעסערט, וואו ע צייגט די 8 אויגען, און ק — די קינבאַקען. ג, די אונטערשטע זייט פון קאַפּ, שטאַרק פאַרגרעסערט, וואו מ צייגט דאָס מויל מיט די קינבאַקען, ל — די אונטערשטע לופ און ה די האַרן־פּלאַטע, צו וועלכער די פיס זיינען אָנגעוואַקסען. ד, די אַטעמונגס־אָרגאַנען; ה, די שפּין־אָרגאַנען (זעהר שטאַרק פאַרגרעסערט); ו, אַ האַררעהרעל פון די שפּין־אָרגאַנען (נאָך מעהר פאַרגרעסערט).

ווען ער ענדיגט שפינען דעם ערשטען ספיראל־פּאָדים, פּאַנגט ער אָן פון דעם אויסערען ראַנד פון דעם שפינגעוועב צו שפינען אַ צוויי־טען ספיראל־פּאָדים, קומענדיג פון אויסערען ראַנד אַלץ נעהנטער צום צענטער. דער דאָזיגער צווייטער ספיראל־פּאָדים ווערט פון דעם שפין באַדעקט מיט אַזאַ קלעפיגען שטאַף, וואָס קומט פון זיינע שפינוועבס־דרייען. אין דער צייט וואָס דער שפין שפינט אַט דעם



צווייטען ספיראל פאָדים, צורייסט ער דעם ערשטען ספיראל־פאָדים און נעמט איהם אוועק פון דעם געוועב. דער ערשטער ספיראל־פאָדים, הייסט עס, איז בלוז געווען אַ מין סטריגעוואַנע אַנצוהאַל־טען דאָס געוועב ביז די אַרבייט וועט פאַרטיג ווערען. ווען דער נאַנצער נעץ איז פאַרטיג, שפינט דער שפּין אויס אַן איינצלענעם פאָדים, וואָס זיין איין ענד איז באַפעסטיגט אין צענטער פון נעץ און זיין צווייטער ענד צו זיין קערפער. מיט דער הילף פון דעם דאָזיגען פאָדעם קען דער שפּין פּיהלען יעדע באַוועגונג אָדער באַריהרונג וואָס ווערט געמאַכט אין דעם נעץ. ווען אַן אינזעקט פאַרשטעפּט זיך אין דעם נעץ, דערפּיהלעט עס גלייך דער שפּין און ער לאָזט זיך אַרויס פון זיין ווינקעל אָדער שפּאַלט, וואו ער האָט זיך זיין נעסט געמאַכט, צו באַפאַלען דעם קרבן, וואָס איז געפאַנגען געוואָרען אין זיין נעץ. ער דערנעהנטערט זיך צו זיין קרבן פאַרזיכטיג און פאַנגט איהם אָן אַרומשפּינען מיט פּעדים ביז ער איז געבונדען פון אַלע זייטען און קען זיך קוים אַ ריהר טאָן. דאן לאָזט דער שפּין אַריין אין איהם זיין גיפּט, וואָס געפינט זיך אין די וואָרצלען פון זיינע קינבאַקען, און ווען דער קרבן איז שוין טויט, זויגט ער אויס פון איהם זיין זאַפּט, עסט אויף זיינע ווייכע טיילען און לאָזט איבער בלוז זיין סקעלעט.


די נאָרטען־שפינען לעגען זייערע אייער אין קליינע זייד־ביי־טעלעך, וואָס זיי וועבען אויס. די אייער זעהען אויס ווי קליינע טראַפּענס זשעלאַטין. די יונגע שפינען, וואָס קומען פון די אייער אַרויס, זעהען אויס ווי זייערע עלטערען, זיי זיינען בלוז קליין. איידער זיי וואַקסען אויס, בייטען זיי מעהרערע מאָל זייער הויט. ווי לאַנג זיי זיינען קליין לעבען די יונגע שפינען צוזאַמען און ווען זיי זיינען הונגעריג און קענען קיין שפּייז ניט קריגען, עסען זיי איינע די אַנדערע.

אַנדערע ספּעציעס שפינען וועבען אויס אַ שפינוועבס נעץ מיט אַ רעהרעל פון דער זייט. אין דעם רעהרעל ליגט דער שפּין באַ־האַלטען און לויטערט אויף זיין רויב.

אין די הייסע געגענדען געפינען זיך שפינען, וועלכע זיינען איבער צוויי צאָל (אינטשעס) די לענג. דאָס זיינען די „פּויגעל־שפינען“. זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אין דער ערד, וואו זיי גראַבען אויס לעכער, וועלכע זיי בעמען אויס מיט שפינוועבס. זיי שפינען ניט קיין נעצען, נאָר זיי לויטערען אויף זייער רויב פון זייער

נעסט און באפאלען זיי. זיי פאנגען פארשירדענע אינזעקטען און זאגאר קליינע פויגעלעך, וועלכע זיי טוימען מיט זייער גיפט און זויגען אויס זייער זאפט.


מאכע שפינען, וועלכע וועבען ניט קיין נעצען, מאכען זיך זייערע נעסטען אונטער שטיינער אָדער שטיקער האַלץ. אנדערע גראָבען אויס טונעלען אין דער ערד און פוטערען זיי אויס מיט



צייכונג 87. — 1) דער דעקעל־שפּין און זיין נעסט; 2) דער שפּרינג־שפּין (ער שפּרינגט אַרויף אויף זיין רויב, ווען ער קומט נאָהענט צו איהם); 3) אַן אייער־נעסט פון דעם „וואַזען־מאַכער“ שפּין (זיין אייער־נעסט, וואָס ער מאַכט, זעהט אויס ווי אַ וואַזע).

שפינוועבס. וואָס זעהט אויס ווי זייד. דער „דעקעל־שפּין“, למשל, גראָבט אויס אַ טיפען רונדען טונעל אין דער ערד, וועלכען ער באַ־דעקט פון אויבען מיט אַ דעקעל וואָס ער מאַכט אויס פון ערד און באַפעסטיגט איהם פון איין זייט מיט זייד־פּעדים, וועלכע דינען אלס זאָויעסעס. דער דעקעל עפענט זיך און פאַרמאכט זיך ווי אַ טירעל. דער דעקעל־שפּין פוטערט אויס זיין נעסט מיט אַ זיידען־

געוועב און ליגט אין איהם באהאלטען. ווען ער פארלאזט זיין נעסט צו געהן זוכען שפיון, לאזט ער דעם דעקעל פון זיין נעסט אפען. אין א מאמענט פון געפאהר לויפט ער צוריק צו זיין נעסט, פארמאכט דעם דעקעל און האלט איהם פעסט פארמאכט, דאס זיין פארפאלגער דארף אנווענדען קראפט איהם צו עפענען. נאך ווען דער דעקעל ווערט אפילו געעפענט קען מען נאך דעם שפיון אלץ ניט אזוי לייכט פאנגען. ער האט אין זיין נעסט אויסגעגראבענע זייטערטונגעלעך, וועלכע פארמאכען זיך מיט דעקלעך, און וואו ער באהאלט זיך, ווען ער ווערט פארפאלגט.



צייכנונג 88. — דער גרויסער אמעריקאנער הארשפיון.

די טאראנטולא שפינען באלאנגען צו די דעקעל שפינען. די טאראנטולא איז א גרויסער שפיון, באדעקט מיט געדיכטע האָר און מיט לאנגע הינטערשטע פיס. דער בים פון א טאראנטולא איז זאגאר שמערצליך פאר א מענשען, אבער ניט געפעהרליך. איינער פון די מעהר באקאנטע שפינען, איז דער „הערבסט-שפיון“, אָדער „לאַנפּיסלער“. ער האָט א קורצען קערפער און לאַנגע דינע פיס. ער איז א גיפּטלאָזער שפיון, שפינט ניט קיין נעצען און ליגט ביי טאָג מייסטענס באהאלטען אין א שפאלט אָדער דונקעלען ווינקעל. ווען עס קומט אָן די נאכט לאָזט ער זיך ארויס

זוכען רויב. ער פאנגט קליינע אינזעקטען פון וועלכע ער זייגט אויס דעם זאפט.

די זכרים פון די שפינען זיינען פיעל קלענער פון די נקבות. אין מאנכע ספעציעס זיינען די נקבות פופצעהן מאָל אזוי גרויס ווי די זכרים. אין די מייסטע ספעציעס האָבען די זכרים פיעל שענערע קאָלירען ווי די נקבות און זיינען אויך פיעל לעבהאפטער און זייערע באַוועגונגען. זיי שפינען אָבער זעלטען זייערע אייגענע נעצען און זוכען אויך זעלטען שפייז פאַר זיך. זיי לעבען מייסטענס אויף דעם חשבון פון די נקבות. ווען עס קומט ביי די שפינען דער פאַר רונגס-סעזאָן, שפיעלען זיך אָפּ ביי מאַנכע ספעציעס שפינען גאַנץ אינטערעסאַנטע סצענען. עס פאַרזאַמלען זיך זכרים פון פאַרשידענע קאָלירען, ווי אויף אַן אויסשטעלונג און מאַכען פאַרשידענע גראַציעזע באַוועגונגען, ראַנגלען זיך איינע מיט די אַנדערע און מאַכען פאַרשידענע קונצען, ווי זיי וואָלטען וועלען אויסנעמען ביי די נקבות, וועלכע שטעהען פון ווייטען און קוקען אויף זיי. נאָך דער אויסשטעלונג קלייבען זיך די נקבות אויס די זכרים, וועלכע האָבען מעהר אויסגענומען ביי זיי און האָבען מיט זיי חתונה. אין פיעלע פעלע זיינען די חתונות גאָר ניט קיין גליקליכע. שוין ביי דער פּאָרונג פאַרלירט דער זכר זיין לעבען. די נקבה, וועלכע איז פיעל גרעסער און שטאַרקער פון איהם, דער'הרג'עט איהם. ביי מאַנכע ספעציעס פרעסט די נקבה אויף דעם זכר גלייך נאָך דער פּאָרונג. אין פיעלע פעלע אָבער איז די הייראַט אַ מעהר גליקליכע. דער זכר מיט דער נקבה לעבען אָפט פרידליך צוזאַמען אין איינע נעסט און אין איין שפינוועכס נעץ.


אין אַ גאַנץ קורצער צייט נאָך דער פּאָרונג פאנגט די נקבה אָן לעגען איהרע אייער אין שפינוועכס בייטעלעך, וועלכע זי וועבט אויס פאַר זיי, און וועלכע זי טראָגט אָפט מיט זיך ביז די אייער ווערען אויסגעבריהט און עס קומען אַרויס פון זיי קליינע שפינען. אין מאַנכע פעלע לאָזט די נקבה די בייטעלעך מיט די אייער אין איהר נעסט און זאָרנט מעהר ניט פאַר זיי. די יונגע שפינען בלייבען אָפט אין די בייטעלעך איבער ווינטער און ווען עס קומט אָן דער פרייהלינג קריכען זיי אַרויס זוכען שפייז. אין אַנדערע ספעציעס זאָרנט די מוטער פאַר איהרע קינדער, ווי לאַנג זיי זיינען קליין. זי האַלט זיי ביי זיך אין איהר שפינוועכס-נעץ ביז זיי לערנען זיך אַליין אויס שפינען און מאַכען נעצען פאַר זיך.

די שפינען באזיצען א שטארקע לעבענס־קראפט. זיי קענען לעבען מעהרערע חדשים אָהן שפייז. זיי האָבען אויך די פעהיגקייט צו רעפראָדוצירען פארלאָרענע גליעדער. ווען אַ שפּין פארלירט אַ פּוס, דויערט עס ניט לאַנג און עס וואַקסט איהם אָפּ אַן אַנדער פּוס. מאַנכע פּון זיי, ווען מען וויל זיי פּאָנגען און מען קלעמט זיי איין אַ פּוס, לאָזען זיי איבער דעם פּוס אין די הענד פּון פּאָנגער און אַנטלויפען.

עס זיינען אויך פאראן שפינען, וועלכע לעבען אין וואַסער. מען רופט זיי וואַסער־שפינען. זיי ווערען אָבער אריינגערעכענט צווישען די קרוסטאַצען און ניט צווישען די אַראַכנידען.

אייניגע ספּעציעס שפינען פּראָדוצירען גאַנץ שטאַרקע זיידענע־פּערס, באַזאַנדערס פאַר די אייער בייטעלעך וואָס זיי וועבען. מען געברויכט זיי אין מאַנכע לענדער פאַר דער זיידען אינדוסטריע, וואו די שפינען ווערען געהאָדעוועט, כדי צו באַנוצען זיך מיט זייער שפינוועבס פאַר דער פּאַבריקאַציע פּון זייד.

די מילבען. — צו דער אַראַכנידען גרופּע געהערען אויך די מילבען. זיי זיינען די קלענסטע באַשעפעניסען אין דער דאָזיגער גרופּע, אָבער זיי האָבען זעהר אַ גרויסע פּאַרשפּרייטונג. זיי מאַך כּען זיך זייערע נעסטען אין פּאַרשידענע פּלעצער און שפּייזען זיך



צייכונג 89. — אַ קרעץ־מילב (זעהר שטאַרק פּאַרגרעסערט).

אויף פּאַרשידענע אופנים. אַנדערע לעבען אויף פּלאַנצען, מאַנכע מאַכען זיך זייערע נעסטען אין קעז, אין צוגעפּוילטע גרינסען און קאַרטאָפּעל, אַנדערע אין טוכלע מעהל אָדער גרויפּען, א. ז. וו. פּיעלע פּון זיי לעבען אין טייכען און אייניגע אין ים.

אַ גרויסע טייל פּון די מילבען ספּעציעס זיינען פּאַראַזיטען. זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אויף אָדער אין די קערפּערס פּון פּאַרר שידענע חיות, עופּות און אינזעקטען, פאַר וועלכע זיי ווערען אָפט

געפערליך. מאַנכע פון זיי פרעסען זיך אויך איין אין דעם קער-  
פער פון מענשען און בריינגען איהם פארשידענע קראנקהייטען.  
דער קרעץ-מילב איז איינער פון זיי. ער איז א גאנץ קליינע פא-  
ראזיטישע באשעפעניס, וואָס גראַבט זיך אַריין אין דער הויט פון  
חיות און מענשען און פאראורזאכט בייסענדע קרעץ. די נקבות  
פון די מילכען-קרעץ גראַבען זיך איין טיעפער אין הויט און לעגען  
דאָרט זייערע אייער. די זכרים, וועלכע זיינען פיעל קלענער, בליי-  
בען מעהר אויף דער אויבערפלעכע פון דער הויט.


דאָס מויל פון די מייסטע מילכען איז איינגעארדענט צום ביי-  
סען און צום זויגען. אין דעם קערפער פון די מייסטע מילכען איז  
ניט קענטיג קיין איינטיילונג צווישען קאָפּ, ברוסט-טייל און בויך.  
ביי אנדערע פון זיי איז אָבער די איינטלונג צווישען סעפאלאָ-  
טהאָראַקס (קאָפּ און ברוסט-טייל) און בויך גוט קענטיג. די ענטוויק-  
לונג פון אָרגאַניזם ביי די פארשידענע ספעציעס מילכען איז פאר-  
שידען, לויט דעם אַרט לעבען וואָס זיי פיהרען. ביי די מילכען,  
וועלכע פיהרען א פאראזיטען לעבען פעהלען פיעלע וויכטיגע אָר-  
גאַנען אינגאַנצען. זיי האָבען ניט קיין אַטעמונגס-סיסטעם (זיי  
אַטעמען דורך זייער הויט), האָבען ניט קיין בלוט-צירקולאַציאָנס  
סיסטעם און מאַנכע האָבען אויך ניט קיין אויגען. זיי האָבען די  
אַלע אָרגאַנען ניט נויטיג פאַר דעם אַרט לעבען וואָס זיי פיהרען.

ביי די מייסטע ספעציעס מילכען קומט די פרוכפערונג פאָר  
דורך לעגען אייער, פון וועלכע עס ווערען אויסגעברייט קליינע  
ווערימלעך, לאַרווען, וועלכע ענטוויקלען זיך ביסלעכווייז, בייטענדיג  
מעהרערע מאָל זייער הויט, אין דעם געשטאַלט פון זייערע עלטערען.  
די לאַרווען האָבען בלויז דריי פאָר פיס, אין דער צייט פון זייער  
ענטוויקלונג אָבער וואַקסט זיי אויס נאָך א פאָר פיס. די מייסטע  
מילכען האָבען פיער פאָר פיס. ביי פיעלע פון די פאראזיטען מיל-  
כען אָבער זיינען די פיס וועניג ענטוויקעלט. מאַנכע ספעציעס פון  
די מילכען לעגען ניט קיין אייער, נאָר געבערען לעבעדיגע קינדער.

דער קעניג קראַב. — צו די אַראַכנידען ווערט אויך צוגע-  
רעכענט דער קעניג-קראַב, אַזא קרעבס-עהנליכע באשעפעניס, וואָס  
האַלט זיך אויף ביי די ברעגעס פון די שטילע ים בוכטעס. דער  
גרויסער קאָפּ און דער ברוסט-טייל פון דער דאָזיגער באשעפעניס  
זיינען פאראייניגט אין איין שטיק און האָבען דאָס אויסזעהן פון  
א פערדישע פאָדקאָווע. דאָס בויך פון דעם קראַב ענדיגט זיך

מיט אַ לאַנגען שווערד־עהנליכען עק. אויף זיין בויך־זייט האָט ער זעקס פּאַר פיס, מיט וועלכע ער פּאַנגט און צורייכט זיין רויב, און וועלכע ער באַנוצט אויך צו באַוועגען זיך. אויף זיין בויך־זייט האָט ער אויך אַן אַנצאַהל פּלאַטען־עהנליכע קלאַפּען, וועלכע דיגענען איהם צו אַטעמען און ביז אַ געוויסער מאָס אויך אַלס שוויים־אָרגאַנען.

די דאָזיגע אומגעלומפּערטע באַשעפעניס איז אַן איבערבליי־בעכץ פון אַן אַנצאַהל ברואים, וועלכע האָבען געלעבט אויף דער ערד אין פּריהעריגע צייטען און וועלכע זיינען היינט מעהר ניטאַ.



צייכנונג 90. — דער פּאַדקאָוע קראַב אָדער קעניג־קראַב.

מאַנכע זאָאָלאָגען רעכענען דעם קעניג־קראַב אריין צווישען די קרוסטאַצעען (קרעבס־חיות), ער איז אָבער לויט זיין אָרגאַניזם און זיין ענטוויקלונג נעהנטער צו די סקארפיאָנען. עס ווערט זאָגאַר פון מאַנכע אָנגענומען, אז דער קעניג־קראַב איז איינער פון די באַשעפעניסען פון וועלכע עס האָבען זיך ענטוויקעלט אונזערע איצטיגע אראכינדרען (שפינען־חיות).

## פיערצעהנמער קאפימעל.

אלגעמיינע כאראקטעריסטיק. — פרויסען. — זשוקעס אָדער באַבעלעס. — גרוילען און היישעריקען. — דראַכען־פליגען — וואַסער־מאַטען. — מוראַשקעס. — דאָס געזעלשאַפּטליכע לעבען פון די מוראַשקעס. — ביענען. — דאָס געזעלשאַפּטליכע לעבען פון די ביענען. — וואַנצען־אינזעקטען — פליגען. — מוקען אָדער קאַמאַרעס. — פּלוי. — שמעטערלינגען און מאַטען.

## אינזעקטען.

אלגעמיינע כאַראַקטערסטישע סמנים. — די צאָהל פון די פאַרשיידענע ספּעציעס אָדער אַרטען פון אינזעקטען איז אזוי גרויס, דאָס ביז היינט האָט בלוז אַ קליינער טייל פון זיי געקענט אויס־געפאַרשט ווערען. עס ווערט געשאַצט, אז אַן ערך דריי הונדערט טויזענד אַרטען פון אינזעקטען זיינען באַקאַנט צו די זאָאָלאָגען, אָבער די דאָזיגע צאָהל איז בלוז אַ פינפטעל אָדער אפשר בלוז אַ צעהנטעל פון די אַלע פאַרשיידענאַרטיגע אינזעקטען, וועלכע לעבען אויף דער וועלט.

דער שווערער קאמפף פאַר עקזיסטענץ, וואָס די אינזעקטען דאַרפֿען פיהרען, האָט זיי געצוואונגען אויסצואַרבייטען אין זיך אַ באַזונדערס גרויסע צופאַסונג־פּעהיגקייט צו די באַדינגונגען, אין וועלכע זיי קומט אויס צו לעבען. די דאָזיגע צופאַסונג־פּעהיגקייט האָט צווישען די אינזעקטען געשאַפֿען אזוי פיעל פאַר־שיידענאַרטיגע פאַרמען און גאַטונגען. מאַנכע אינזעקטען זיינען צוגעפאַסט צו פליהען אין דער לופט, מאַנכע צו לויפֿען און צו שפּרינגען, מאַנכע צו פיהרען אַן אונטעראַירדישען לעבען און מאַנכע צו לעבען אין וואַסער. דאָך ווי פאַרשיידענאַרטיג די אינזעקטען זאָלען ניט זיין, ווי גרויס עס זאָל ניט זיין די צאָהל פון זייערע אַרטען און פאַרמען, האָבען זיי דאָך געוויסע אַלגעמיינע כאַראַקטער־ריסטישע סמנים, וועלכע זיינען געמיינשאַפּטליך פאַר זיי אַלעמען און וועלכע צייגען אַן אויף זייער נאָהענטער קרובּהשאַפּט.

דער קערפּער פון אַן אינזעקט באַשטעהט, געוועהנליך, פון דריי טיילען: אַ קאָפּ, אַ ברוסט און אַ בויך. דער נאַנצער קערפּער




איז צונויפגעשטעלט פון א געוויסער צאָהל רינגעלעך, ווי דאָס אין דער פאל ביי די קרעבס-חיות און די רינגעל-ווערס. אין דעם בויך-טייל זיינען די רינגעלעך קלאָר קענטיג, זיי זיינען אָבער פיעל וועניגער קענטיג אין דעם ברוסט-טייל און נאָך וועניגער אין דעם קאָפּ-טייל. אין די דאָזיגע צוויי קערפער-טיילען האָבען זיך די רינגעלעך צונויפגעגאָסען אין איין שטיק.

דער קאָפּ פון אַן אינועקט האָט געוועהנליך צוויי אויגען, צוויי פיהל-הערעדלעך (אַנטענען) און דריי מויל-טיילען, וועלכע קענען פאָרמירט ווערען אין אַ לאַנגען דינעם רעהרעלע און באַנוצט ווערען צו זויגען, אָדער צו שטעכען, אָדער צו בייסען. פון דעם ברוסט-טייל פון קערפער וואַקסען אַרויס דריי פאָר פיס און (ביי די פליה-אינועקטען) איין פאָר אָדער צוויי פאָר פליגלען.

מאַנכע פון די אינועקטען זיינען זעהר שטאַרק אין פאַרהעלט-ניס צו זייער גרויס. מוראַשקעס און פאַרשיידענע זשוקעס אָדער באַבעלקעס קענען טראָגען אַ משא, וואָס איז פיעל מאָל שווערער ווי זייער אייגענע געוויכט (אַ דורכשניטליך קרעפטיגער מענש קען הויבען אַ משא, וואָס איז צוויי מאָל, אָדער העכסטענס דריי מאָל שווערער פון זיין אייגענער געוויכט). מאַנכע אינועקטען קענען שפּרינגען שטרעקען, וועלכע זיינען מעהרערע מאָל גרעסער פון זייער אייגענער לענג. ווען אַ מענש וואָלט געקענט אַזוי הויך אָדער אַזוי ווייט שפּרינגען לויט זיין גרויס, אין פאַרגלייך מיט אַ קליינעם גוט שפּרינגענדען אינועקט, וואָלט ער געקענט אַ שפרונג טאָן אַן ערך אַ פערטעל מייל ווייט אָדער הויך. פיעלע פון די קליינע אינועקטען קענען אָפּטאָן אַזוי פיעל פאַרשיידענע ארבייטען מיט אַזאַ שנעלקייט און מיט אַזוי פיעל ענערגיע און קראַפט, וואָס קיין באַשעפעניש (פאַרגלייכענדיג די גרויס) קען עס ניט באַווייזען. דאָס מוסקול-סיסטעם איז ביי די אינועקטען זעהר גוט ענט-זויקעלט. מאַנכע פון זיי באַזיצען אַ באַזונדערס וואַונדערליכען ענטוויקעלטען מוסקול-סיסטעם. דער מענשליכער קערפער האָט איבער פינף הונדערט מוסקולען דורכצופיהרען אַלע זיינע באַוועגונג-גען און פונקציאָנען, מאַנכע אינועקטען, אָבער, האָבען מעהר ווי דריי און אַ האַלב טויזענד מוסקולען. אויפצוהאַלטען אַזאַ גרויסען מוסקול-סיסטעם דאַרפען די אינועקטען פאַרזעהרען אַ גרויסע מאַס שפייז אין פאַרגלייך מיט זייער גרויס. מאַנכע אינועקטען פאַר-זעהרען אין אַ טאָג פיעל מאָל מעהר שפייז ווי זייער אייגענער גע-

וויכט. ווען א מענש זאָל, לויט זיין גרויס, פארצעהרען אזוי פיעל שפייו ווי אן אינועקט, וואָלט ער דארפֿען האָבען אַרום טויזענד פונט שפייו אַ מאָג.

די שפייו פון אינועקטען איז פארשידען. מאַנכע פון זיי נעהר רען זיך מיט דעם זאפט פון פרוכט און פלאַנצען, מאַנכע מיט דעם זאפט פון לעבעדיגע באַשעפענישען, וואָס זיי זויגען, מאַנכע מיט דעם געוועב פון גרינסען, פרוכט און האַלץ וואָס זיי צונאָגען אָדער צובייסען, און מאַנכע עסען אַלץ, זאָגאַר זייער אייגענעם מין. דאָס מויל פון יעדער אינועקט איז צוגעפאַסט צו דעם אַרט לעבען, וואָס



צייכונג 91. — אן אויפגעשניטענער פרויס, וואו ש. צייגט דעם שפייו־קאנאַל.

ער פיהרט און אזוי איז אויך זיין אינערליכער אָרגאַניזם, זיין פאר־דייאָננס־אפּאַראַט און זיינע געדערים אין אַלגעמיין. צוליב דעם דאָזיגען גרונד איז ביי פארשידענע אינועקטען דער שפייו־קאנאַל פארשידען אויסגעבילדעט.

אַלס כאַראַקטעריסטיש פאַר פיעלע אינועקטען קענען גענומען ווערען די געדערים פון דעם גוט באקאנטען אינועקט — דער פרויס (קאַקראָוטש אין ענגליש). ביי דעם דאָזיגען אינועקט געהט די שפייו פון מויל אין שלונד, פון דאָרטען אין קראָפּ (וואַליאַ), וואו די שפייו ווערט אויף אַ קורצער צייט אָפּגעלאַגערט ביז זי איז פארטיג אריינצוגעהן אין מאָגען.

ביי די פרויסען איז דער מאָגען ניט קיין גרויסער, ביי אנדערע אינועקטען אָבער פארינעהמט דער מאָגען כמעט דעם גאַנצען קערפער. הינטער דעם מאָגען געפינען זיך אייניגע אַזעלכע דינע אויסוואק־

סען, ווי פינגערלעך, וועלכע, ווי מען דענקט, ערפילען די אויפגאבע פון ניערען. הינטער די דאָזיגע אויסוואקסען געפינט זיך די שפייז־קישקע, וועלכע געהט ביז צו דער הינטערשטער עפנונג פון קערפער. די דאָזיגע קישקע האָט ביי די פארשידענע אינועקטען אן אנדער פאָרם.

די פארדייטע שפייז ווערט איינגעזויגען אין מאָגען און אין דער קישקע און פון זיי פארשפרייטען זיך די נאָהרונגס־שטאָפען איבער דעם גאנצען קערפער דורך אַ בלוט צירקולאציע־סיסטעם, עהנליך ווי ביי די קרוסטאצעען. דאָס האַרץ געפינט זיך איבער דעם מאָגען. פון האַרצען געהען אַרויס מעהרערע אַרטעריעס, וועל־כע פארשפרייטען זיך איבער פאַרשידענע טיילען פון קערפער. דאָס בלוט געהט אַרויס פון די אַרטעריעס און גיסט זיך דירעקט פאַנאַנ־דער אין די חללים, וועלכע געפינען זיך צווישען די אינעוועניגסטע אָרגאַנען פון וואָנען דאָס בלוט קעהרט זיך אום צוריק צום האַרצען. די בלוט צירקולאציע האָט, אַלזאָ, ביי די אינועקטען די הויפט אויפ־גאַבע צום פאַרטיילען די פאַרדייטע שפייז איבער די פאַרשידענע טיילען פון קערפער. ביי די קרוסטאצעען אָבער האָט די בלוט־צירקולאציע אן אנדער אויפגאבע. דאָס בלוט ביי די קרוסטאצעען צירקולירט דורך די זשאַבעס (אַטעמונגס אָרגאַנען) וואו עס זויגט אין זיך אַרײַן פרישע זויער־שטאָף און טראָגט עס פאַנאַדער אַי־בער'ן קערפער. ביי די קרוסטאצעען איז דאָס בלוט־סיסטעם איינ־געאָרדענט צו פאַרטיילען זויער־שטאָף איבער דעם קערפער, וועה־רענר ביי די אינועקטען איז דאָס בלוט סיסטעם איינגעאָרדענט צו פאַרטיילען שפייז איבער'ן קערפער.

זויערע אייער לעגען די פרייסען אין אַזעלכע לענגליכע קאַפ־סעלס. די דאָזיגע קאַפסעל טראָגט מיט זיך די נקבה ביז די אייער ווערען אויסגעבריהט. ווען די יונגע פרייסען קומען אַרויס פון איי, זיינען זיי פאַלשטענדיג וויים.

די פרייסען זיינען נאַכט־אינועקטען. ביי טאָג ליגען זיי פאַר־שטעקט אין שפאַלמען אָדער לעכער, וואו עס געפינט זיך פייכטקייט. ווען עס קומט אָבער די נאַכט קריכען זיי אַרויס פון זויערע שפאַל־מען זוכען שפייז. זויער באַליעבטעסטער פלאַץ איז אין קיכען. דאָרטען האָבען זיי גענוג פייכטע פלעצער צו ליגען בייטאָג און קע־נען געפינען שפייז, ווען זיי קריכען אַרויס פון זויערע שפאַלמען ביי־נאַכט. ווען זיי כאַפען זיך אַרײַן אין אַ ביכער שראַנק צופרעסען

זיי די איינבאנדען פון די ביכער. זיי עסען אלעס וואָס זיי געפינען. דאָס אָטעמונגס סיסטעם איז ביי די אינזעקטען זעהר כאַראַקטעריסטיש. ווען מען אונטערזוכט, למשל, דעם פעלד־גריל, געפינט מען פון ביידע זייטען פון זיין בויך אַ געוויסע צאָהל קליינע ברוינע פלעקען. ווען מען באַטראַכט די דאָזיגע פלעקען מיט אַ פאַרגרעסערונגס־גלאַז באַמערקט מען ווי יעדער פלעק איז דורכגעשניטען מיט אַ קליינעם, שטאַלען שפאַלט. ווען דער קערפער פון גריל ווערט אויפגעשניטען באַמערקט מען ווי יעדער פון די קליינע שפאַלטען איז פאַרבונדען מיט אַ קליינעם ווייסען שימערנדען רעהעל, וואָס פאַרצווייגט זיך אין די פאַרשידענע טיילען פון גרילס קערפער. אַט דורך די דאָזיגע רעהעלעך קומט אַריין די לופט אין דעם קערפער פון דעם אינזעקט אין פאַרטוילט זיך מיט גרויס געשווינדקייט אין אַלע זיינע טיילען. ביי פיעלע פליהענדע אינזעקטען זיינען די לופט־רעהעלעך פאַרבונדען מיט קליינע לופט־זעקעלעך, וועלכע, ווי מען דענקט, העלפען די אינזעקטען זיך בעסער האַלטען אין דער לופט, ווען זיי פליהען.

די זשוקעס. — צווישען די מעהר באַקאַנטע אינזעקטען, וועלכע זיינען פאַרשפּרייט אין די פאַרשידענע טיילען פון דער וועלט, זיינען די זשוקעס אָדער באַבעלעס (קעפער).

די זשוקעס אָדער באַבעלעס האָבען צוויי פּאַר פליגלען, די אוי־בערשטע עפענען זיך אונטער אַ רעכטען ווינקעל צום קערפער פון זשוק, ווען ער וויל פריי מאַכען זיינע אונטערשטע פליגלען צום פליהען. ווען ער פליהט ניט, ליגען זיינע פליה־פליגלען אונטער די שויד־דעקלעך צונויפגעלעגט אין פאַלבען, ווי אַ פעכער. די זשוקעס געהערען צו דער אינזעקטען גרופע ק אַ ל ע אַ פ ט ע ר ע ז, וואָס דאָס מיינט „שויד־דעקל־פליגעל־דיגע“.

פאַר דער באַשרייבונג פון דער אַלגעמיינער כאַראַקטעריסטיק פון די זשוקעס וועלען מיר נעהמען אַלס ביישפיעל דעם גוט באַקאַנטען דונקעל ברוינעם מאַי־זשוק (מאַי קעפער). ער האָט אין פּאַר דערשטען טייל פון זיין קאָפּ אַ פּאַר פיהל־הערענדלעך (אַנטענען) און צוויי אויגען. אַ לאַנגע אויבער־ליפּ הענגט אַריבער איבער זיין מויל, וואָס באַשטעהט פון הויפט־קינבאַקען, געהילפס־קינבאַקען און אַ דאָפעל־ליפּ. צו די געהילפס־קינבאַקען און צו דעם דאָפעל ליפּ זיינען באַהעפט צוויי פּאַר פיהל־אַרגאַנען (פאַלפען). אין מויל גע-

פינט זיך א הויטיג, שאַרסטיג צינגעל, וואָס איז א טייל פון דער דאַפּעל-ליפּ.

דער ברוסט-טייל (טהאַראַקס) פון זשוק ווערט איינגעטיילט אין דריי טיילען: דער פּאָדערשטער טייל ווערט גערופען „פּראָ-טהאַראַקס“, דער מיטעלסטער טייל — „מעזאַטהאַראַקס“ און דער הינטערשטער טייל — „מעטאַטהאַראַקס“. דער ערשטער טייל האָט א פּאָר געגלידערטע פיס; דער צווייטער טייל האָט א צוויי-טע פּאָר פיס און די שווינדעקלעך וואָס באַדעקען די פליהפליגלען פון אינועקט; דער דריטער טייל האָט א דריטע פּאָר פיס און די פליהפליגלען.

דער שפיין און פארדייאונגס-אפּאַראַט פון דעם זשוק באַ-שטעהט פון א שמאַלען שלונד, פון א קראַפּ (וואָליאַ), אן אויבער-מאַגען, אן אונטער-מאַגען, וועלכער איז באַוואַפענט מיט א מאַסע האַריגע צייהנדלעך, און א קישקע.



צייכונג 92. — דאָס פארדייאונגס סיסטעם פון א זשוק.  
א, דער שלונד (ושט); ב, דער קראַפּ (וואָליאַ); ג, דער פּאָר-מאַגען; ד, דער אונטער-מאַגען; ה, די קישקע.


דער זשוק אָטהעמט דורך לופט-רעהרלעך, וועלכע געפינען זיך אין אלע טיילען פון זיין קערפּער, זאָגאר אין זיינע פיס און פליגלען. די לופט צום אָטהעמען געהט ניט אַרײַן דורכ'ן מויל פון זשוק, נאָר דורך א רייה עפענונגען, וועלכע געפינען זיך אין די זייטען פון זיין ברוסט-טייל און פון בויך.

דאָס האַרץ פון זשוק האָט א לענגליכע פּאָרם און באַשטעהט פון מעהרערע קאמערען. דאָס האַרץ טרייבט דאָס בלוט דורך א פולס-אַדער צום קאָפּ. דאָס בלוט צירקולירט ניט אין דעם קערפּער פון זשוק דורך אַרטעריען און אַדערען, נאָר עס פליסט דירעקט דורך דעם געוועב פון קערפּער און קעהרט זיך אום צוריק צום האַרצען דורך צוויי אַדערען, וועלכע געהען אַרויס פון דעם הינטערשטען האַרץ-טייל.

דאָס גערווען-סיסטעם פון זשוק באַשטעהט פון ניין גערווען-

קניפלעך אין דער בויד זייט פון קערפער און פון איין נערווען-  
קניפעל אין רוקען-זייט, וואָס שטעלט מיט זיך פאַר דעם מאַרד  
פון אינזעקט.

די חושים זיינען ביים זשוק גוט ענטוויקעלט. זיינע צוויי  
אויגען זיינען צונויפגעשטעלט פון מעהרערע לינזען אָדער קריס-  
טאָליקלעך. אַ חוץ דעם האָט ער נאָך דריי איינפאַכע אויגען.  
זיינע פיהל-הערענדרלעך (אַנטענען) דיענען איהם ניט בלויז צום  
טאַפּען, נאָר אויך צו זוכען. זיין חוש הריח איז זעהר אַ שאַרפּער.



ציכונג 98. — אַ מאַי-זשוק און זיינע מעטאַמאָרפּאָזען.  
א, די לאַרווע; ב, די פּופּע; ג, אַ פּול ענטוויקעלטער זשוק  
געזעהן פון דער זייט; ד, דערזעלבער זשוק, געזעהן פון אויבען.


ער האָט אויך אַ חוש השמיעה, אָבער קיין באַשטימטע אויערען  
האָט מען ביי איהם ניט געקענט אויסגעפינען.  
דער זשוק ענטוויקעלט זיך פון אַן איי, וועלכע האָט אַ דינעם  
שליימוגען שאַלעכץ. ווען ער קומט אַרויס פון איי, ווען ער איז  
אין דעם צושטאַנד פון אַ לאַרוואַ, האָט ער דאָס אויסזעהן פון  
אַ קליין ווייס ווערימעל, וואָס האָט קיין עהנליכקייט ניט אויף  
אַ זשוק. די לאַרוואַ אָבער האָט שוין אַ גוט קענטיגען קאָפּ מיט  
אויגען און אַ מויל צום עסען. זי האָט אויך דריי פּאַר פיס. זי  
לעבט אין דער ערד און שפייזט זיך מיט די וואַרצלען פון פּלאַנצען.  
נאָכדעם ווי די לאַרוואַ האָט אָפּגעלעבט צוויי יאָהר צייט און

האָט געביטען עמליכע מאָל איהר הויט, ווען זי איז איהר ענג געוואָרען פאַר איהר וואַקסענדען קערפער, געהט זי איבער צו דעם צווייטען צושטאַנד פון איהר ענטוויקלונג. זי באַדעקט זיך דאָן מיט אַ האַרטע הויט, בלייבט באַוועגלאָז און צייגט ניט אַרויס קיין שפור פון לעבען. דאָס איז דער צושטאַנד וואָס ווערט אָנגערופען „פופע“ (קוקלע). שפעטער פלאַצט די הויט פון דער פופע און עס קומט אַרויס אַ פול ענטוויקעלטער זשוק, וועלכער געהרט זיך מיט בלעטער און די פרוכט פון בוימער, באַזונדערס פון עפעל און קארשען בוימער.

די דאָזיגע פאַרמען-ענדערונגען, וועלכע דער זשוק מאַכט דורך אין זיין ענטוויקלונג, ווערט אָנגערופען די מעטאַמאָרפּאָזע (אומענדערונג אָדער אומבייטונג פון געשטאַלט) פון דעם אינ-זעקט. די מייסטע זשוקעס און אַנדערע אינוקטען מאַכען דורך די עהנליכע מעטאַמאָרפּאָזע, וואָס דער מאַי-זשוק.

די צאָהל פון די פאַרשיידענע ספעציעס פון זשוקעס איז זעהר אַ גרויסע. מען רעכענט, אַז עס עקזיסטירען איבער הונד-דערט טויזענד ספעציעס. פיעלע פון זיי פאַרשאַפען גרויסען שאַדען אין די פעלדער און אין גערטנער. דער „קאַרטאַפּעל-זשוק“, למשל, אין קאָלאָראַדאָ, אַמעריקא, טוט אָן אַזעלכע גרויסע שאַדען אין די קאַרטאַפּעל פעלדער, אַז פאַרשיידענע קאָסטבאַרע מיטעל ווערען אָנגעווענדעט איהם צו פאַרניכטען. דער „קאַר-טאַפּעל זשוק“ געהרט זיך הויפטזעכליך מיט קאַרטאַפּעל פלאַנצן, ער פאַרמעהרט זיך שנעל און איז זעהר פּרעסעריש. די נקבה פון אַ „קאַרטאַפּעל זשוק“ לעגט אַוויס אין פאַרלויף פון זומער אַרום טויזענד אייער. זי לעגט זיי ביסלעכווייז און באַהעפט זיי אויף דער אונטערשטער זייט פון די בלעטער פון די קאַרטאַפּעל פלאַנצען. אין אַ וואַך צייט קומען פון די אייער אַרויס לאַרווען, וועלכע פאַנגען אָן גלייך פּרעסען די קאַרטאַפּעל פלאַנצען. זיי פּרעסען אַזוי צוויי וואַכען צייט און נאכדעם פאַרבאָרגען זיי זיך אין דער ערד און פאַרוואַנדלען זיך אין פּופען. נאָך צעהן טעג קומען אַרויס פון די פּופען פּול-ענטוויקעלטע זשוקען, וועלכע פאַנגען אָן מיט נאָך מעהר אַפעטיט אַפּצופּרעסען די קאַרטאַפּעל פלאַנצען. און אַזוי ווי אין אַ זומער סעזאָן קענען אַרויסקומען פיער דורות פון אַזעלכע זשוקעס, איז זייער פאַרמעהרונגס-פּראָ-צעס זעהר אַ שנעלעווי און ווען מען זאָל ניט אָננעהמען קיין מיטעל

זיי צו פארניכטען, וואָלטען זיי אָפּגעפרעסען גאַנצע קארטאָפּעל-  
פעלדער.




צייכנונג 94. — דער קארטאָפּעל זשוק און זיינע מעמאַ-  
מארפאַזען. א, זיינע אייעלעך; ב, די לאַרווען; ג, די פּופּע;  
ד, דער פּויל ענטוויקעלשער זשוק; ה, זיין רעכטער פּלוגעל-  
דעקעל (פּאָרגרעסערט); ו, איינער פּון זיינע פּיס (פּאָרגרעסערט).

דער „פּיל-זשוק“, איינער פּון די מיסט-זשוקעס, באַשיצט  
זיינע אייער, אריינלעגענדיג זיי אין אַ קייקעל אָדער פּויל ערד  
אָדער מיסט, פּון דעם קומט זיין נאָמען „פּיל-זשוק“. דעם פּויל,  
אין וועלכען דאָס אייעלע געפינט זיך, באַהאַלט דער זשוק אין אַ  
גריבעל אין דער ערד, וואָס ער האָט פּון פּריהער אָנגעגרייט.  
דעם פּויל צום גריבעל בריינגען צוזאַמען דער זכר מיט דער נקבה.  
דער זכר שטופּט דעם פּויל און די נקבה שלעפּט איהם. די פּאָדער-  
שטע פּיס פּון דער נקבה און פּון דעם זכר זיינען דעריבער פּאַר-  
שיידען ענטוויקעלט, כדי זיי זאָלען זיין צוגעפּאַסט צו דער ארד-  
בייט וואָס זיי דאַרפּען טאָן. ווען די לאַרוואַ קומט אַרויס פּון  
איי שפּייזט זי זיך מיט די אָרגאַנישע שטאָפּען, וואָס זי געפינט  
אין דעם ערד-קייקעל אָדער מיסט-קייקעל אין וועלכען זי גע-  
פינט זיך.

צווישען די גרויסע זשוקעס איז מעהר באַקאַנט דער „שפּרינג-  
זשוק“. ער איז אַן ערך אַנדערטהאַלבען צאָל (אינטשעס) די לענג.



זיין קאליר איז געמישט פון שווארץ און ווייס. אויף זיין פאך-  
 דערשטען ברוסט-טייל (פראַטהאַראַקס) געפינען זיך צוויי סאַמעט  
 פלעקען, וועלכע זיינען אַרומגעזוימט מיט צוויי ווייסע ראַנדען.  
 די דאָזיגע סאַמעט-פלעקען מיט די ווייסע ראַנדען זעהען אויס ווי  
 צוויי גרויסע אויגען (זיי זיינען אָבער ניט קיין אויגען). ווען  
 מען לעגט איהם אַוועק אויפ'ן רוקען, ניט ער אַ שפרונג אין דער  
 לופט און שטעלט זיך צוריק אַוועק אויף זיינע פיס. פון דעם  
 קומט זיין נאָמען „שפּרינג-זשוק“.




צייכנונג 96.  
 דער לאַנגהאַרן זשוק.

צייכנונג 95.  
 דער שפּרינג-זשוק.

אַ צווייטער גרויסער זשוק איז דער „וואַסער-זשוק“. אויך  
 ער איז אומגעפעהר אַנדערטהאַלבען צאָל די לענג. ער איז שוואַרץ  
 און גלאַנציג. ער לעבט געוועהנליך אין וואַסער, זיינע פיס זיינען  
 פלאַך, צוגעפאַסט צום שווימען. די לאַרווען פון דעם וואַסער-זשוק  
 געהרען זיך מיט אינועקטען און שנעקען און ווען עס פעהלט זיי  
 אויס שפייז עסען זיי זייערע אייגענע ברידער און שוועסטער.  
 זיי זיינען קאניבאלען.

אַן אינטערעסאַנטער אינועקט איז דער „פּיער-פּליעג“, וועל-  
 כער איז אין דער ווירקליכקייט אַ קליינער זשוק. דער „פּיער-  
 פּליעג“ לאָזט אַרויס ליכטיגע שטראַהלען פון זיין בויך. ער האָט  
 אַ באַזונדערען אָרגאַן וואָס לאָזט אַרויס פון זיך אזאַ שטאַף,  
 וואָס, ווען ער קומט אין באַריהרונג מיט דעם זויער-שטאַף פון  
 דער לופט, פאַנגט ער אָן צו לייכטען. דער דאָזיגער לייכט-  
 אָרגאַן ווערט קאָנטראַלירט פון דעם נערווען סיסטעם פון אינועקט.  
 די זונען-באַבעלעקע (משה רבינו'ס קיהעלע, „ליידי בוירד“ אין  
 ענגליש), אַ קליין רויט זשוקעל מיט שוואַרצע פינטעלעך, איז

פון א מענשליכען שטאנדפונקט א ניצליכער אינזעקט. סאי די באבעלקע, סאי איהרע לארווען נעהרען זיך מיט די אייער און לארווען פון אנדערע אינזעקטען און זיי ראַטען דעריבער אויס פיעלע שעדליכע אינזעקטען.




צייכונג 97. — (1) דער ריעזען וואַסער־זשוק; (2) „משה רבינו'ס קיהעלע“.

צווישען די ניצליכע זשוקעס דארף אויך אריינגערעכענט ווערען די „שפּאַנישע פּליעג“, וועלכע ווערט באַנוצט פאַר מע דיצינישע צוועקען צו מאַכען פּלאַסטערס אויף אַנציהען בלאַטערען. די דאָזיגע שפּאַנישע פּליעג, וועלכע איז אייגענטליך אַ זשוק, האָט זעהר אַ שעהנעם אויסזעהן און געפינט זיך אין גרעסערע מאַסען אין שפּאַניען, איטאַליען און פּראַנקרייך.

היישעריקען און גרילען. — צווישען די אינזעקטען זיי נען די פעלד־גרילען, הויז גרילען און היישעריקען די העכער ענטוויקעלטע פּאַרכען. זיי האָבען צוויי פּאַר פּליגלען, אַן אויבער־שטע פּאַר און אַן אונטערשטע. די אויבערשטע פּליגלען זיינען דיקער און זיי באַדעקען די אונטערשטע דינערע פּליגלען, וועלכע זיינען געפּאַלכט אין דער לענג, ווי אַ פעכער. די פּאַרשיידענאַר טיגע גרילען, היישעריקען און די אינזעקטען, וועלכע זיינען מיט זיי נאָהענט פּאַרוואַנדט, ווי פּרייסען, קאַטידידען (אַזאַ אַמערי־קאַנער גריל) א. א. וו., טראַגען דעם נאָמען אַרטהאַפּטערען, וואָס מיינט גראַד־פּליגלענדיגע. די דאָזיגע גרופּע אינזעקטען זיי נען פּאַרשפּרייט איבער אלע טיילען פון דער וועלט, נאָר אין באַזונדער גרויסע מאַסען געפינען זיי זיך אין די וואַרמע לענדער. זיי זיינען אומגעווער גרויסע פרעסער און האָבען שטאַרקע מויל־טיילען צום בייסען און קייען. אין די געגענדען וואו זיי געפינען

זיך אין גרויסע מאסען, זיינען זיי די געפערליכסטע אָנשיקע־  
נישען פאר לאַנד־אַרבייט, באַזונדערס געפעהרליך זיינען די היי־  
שעריקען. עס טרעפט פעלע ווען אַ מחנה היישעריקען באַפאַלט  
אַ געגענד און פרעסען אָפּ אַלעס, וואָס אויף די פעלדער געפינט  
זיך, פון גראָז און תבואה ביז די בלעטער און גרינע צווייגען פון  
די בוימער. אָפט איז די מחנה אזא גרויסע און געדיכטע, אַז  
זי פאַרשטעלט די שיין פון דער זון, ווי אַ שוואַרצער וואָלקען.  
די גרילען, היישעריקען און קאַטידידען האָבען אַ לאַנגליכען  
רונדען קערפער און ביי די מייסטע ספּעציעס זיינען די הינטערשטע  
פּיס לענגער ווי די פּאָדערשטע, כדי זיי זאָלען קענען שפּרינגען.  
די הויז־גרילען און די קאַטידידען זיינען נאַכט־אינועקטען. די  
ערשטע ליעגען ביי טאָג באַהאַלטען אין ערד־לעכער, וועלכע זיי  
גראַבען זיך אויס, אָפט מאַכען זיי זיך זייערע נעסטען אין הייזער;



צײכנונג 98. — די ענטוויקלונג פון אַ היישעריק. א, די  
לאַרוואַ; ב, די פּופּע; ג, אַ פּול ענטוויקעלטער היישעריק;  
ד, דער מאַנטיס (דער דאווען־אינועקט).

די צווייטע ליגען באהאַלטען אין בוימער. ווען עס קומט אָן די נאַכט לאָזען זיי זיך אַרויס זוכען שפּייז. זיי נעהרען זיך הויפּט־זעכליך מיט גרינסען. עס זיינען אָבער אויך פאַראַן מאַנכע ספּעציעס, וועלכע פּאַנגען אינזעקטען און אַנדערע קליינע באַשע־פּענישען פאַר זייער שפּייז.

די מייסטע אַרטען גרילען און היישעריקען לעגען זייערע אייער אין דער ערד, וואו זיי בלייבען אָפּט איבער ווינטער. ווען די אייער ווערען אַניסגעבריהט, זיינען די יונגע אינזעקטען, וואָס קומען אַרויס פון זיי, עהנליך צו זייערע עלטערען, און נאָך אייניגע קליינע ענדערונגען, וועלכע קומען אין זיי פאַר, נעהמען זיי אָן אינגאַנצען די געשטאַלט פון ערוואַקסענע.

עהנליך צו דעם היישעריק מיט זיין אויסזעהן איז דער „רויב־אינזעקט“, וועלכער ווערט גערופּען „מאַנטיס“. מען רופּט איהם אויך „דאַווען־אינזעקט“, ווייל, ווען ער וואַרט אויף זיין רויב האַלט ער זיינע פּאָדערשע פּיס אויסגעשטעלט, ווי איינער האַלט זיינע הענט ביים דאַוונען? אָדער גאָט בעמען. דער דאָזיגער אינזעקט איז זעהר אַ רויבערישער. ער עסט זאָגאַר זיין אייגענעם מין. ער איז אַן אמת'ער קאַניבאַל. ער האָט אַ דינעם קערפּער און נרויסע אויגען. זיינע פּאָדערשטע פּיס זיינען לאַנג און שטאַרק, זיי ווערען פון איהם וועניגער באַנוצט צום געהן, ווי צו פּאַנגען זיין רויב.

עס זיינען פאַראַן אַ גאַנצע רייה אינזעקטען, וועלכע האָבען אַ נאָעהנטע עהנליכקייט צו די היישעריקען. כאַראַקטעריסטישע אינזעקטען אין דעם פּרט זיינען די „געהענדע צווייגען“ און די „געהענדע בלעטער“. די ערשטע זיינען עהנליך צו צווייגען, וועהרענד די צווייטע — צו בלעטער. ביי די „געהענדע צווייגען“ זיינען די פּליגלען קוים באַמערקבאַר, אָדער זיי פּעהלען אינגאַנצען. די „געהענדע בלעטער“ האָבען פּליגלען. דאָס אינטערעסאַנטע אָבער איז, וואָס זיי פּאַסען זיך צו מיט זייער קאָליר צו די פּלאַנצן צען פון וועלכע זיי נעהרען זיך. די יונגע אינזעקטען, וועלכע ער־שייגען געווענליך אין מאַנאַט מאַי, זיינען גרין, נאָר, ווען זיי ווערען גרעסער, ענדערט זיך כּסדר זייער קאָליר מיט דער ענד־דערונג פון דעם קאָליר פון די פּלאַנצען־בלעטער, אויף וועלכע זיי לעבען. זייערע אייער זיינען עהנליך צו פּלאַנצען קערענדלעך. די דאָזיגע אינזעקטען און זייערע אייער ווערען דעריבער אַמ־

בעסטען געשיצט פון זייערע פיינד דורך זייער פעהיגקייט אָנ-  
צונעמען די פאָרם און דעם קאָליר פון פלאַנצען, אז מען זאָל זיי  
ניט קענען באַמערקען.



צייכנונג 100.  
א „געהענדעס בלאַט“.




צייכנונג 99.  
א „געהענדער צווייג“.

די קאטידירען, וועלכע זיינען פריהער דערמאָנט געוואָרען, זיי-  
נען די געהענטסטע קרובים פון די היישעריקען און גרילען. זיי  
זיינען כאַראַקטעריסטיש דערמיט, וואָס רייבענדיג זייערע פליגלען  
איינע אויף די אנדערע גיבען זיי אַרויס אַ שאַרפען קלאַנג.  
אויף דעם קלאַנג, וואָס דער זכר לאָזט אַרויס, רייבענדיג זיינע  
פליגלען, ענטפערט אָפּ די נקבה מיט אַ קירצערען קלאַנג. די  
קלאַנגען הערען זיך דעריבער איינע נאָך די אנדערע ווי אַ שפּיעל  
אין פּראַגע און אַנטוואָרט.

די קאטידירען לעגען געווענליך זייערע אייער איינע אויף די  
אַנדערע, פאַר דער לענג פון אַ שטאַם פון אַ פלאַנצע, וואָס איז

פריהער פון אויבען צוביסען געוואָרען פון דער קאטידידען־נקבה און געמאכט געוואָרען שאַלסקע. אַנדערלע ספעציעס וויעדער לעגען זייערע אייער אויף דעם ראַנד פון אַ בלאַט.




צייכנונג 101. — (1 אַ קאטיד; 2) אַ וויסער קלעטער־גריל; 3) אַ גראַב־גריל.

**דער דראַכען פליעג.** — דער ענטוויקעלטער דראַכען פליעג איז גאַנץ וועניג עהנליך מיט זיין אויסזעהען צו דער לאַרווע, פון וועלכער ער איז אַרויסגעקומען. דער דראַכען־פליעג האָט אַ לאַנגען דינעם קערפער, אַ גרויסען קאָפּ מיט גרויסע אויגען און צוויי פּאַר, ברייט אויסגעשפּרייטע, פליגלען, וועלכע זיינען דורכ־געוועבט, ווי מיט אַ נעץ פון דינע אַדערלעך אָדער נערווען. די פליעגלען זיינע האָבען אַפט אַ שעהנעם מעטאל־גלאַנץ, באַזונדערס איז עס דער פּאַל ביי די זכרים.

דער דראַכען־פליעג לעגט זיינע אייער אין וואַסער, וואו זיי ווערען אויסגעבריהט און עס קומען אַרויס פון זיי די לאַרווען, פון וועלכע עס ענטוויקלען זיך שפּעטער די דראַכען־פליעגען. די לאַרווען בלייבען לעבען אין וואַסער. זיי קומען אַרויס פון איי מיט גוט ענטוויקעלטע מויל־טיילען און מיט אַ האַקען־עהנליכען אָרגאַן צו פאַנגען אַינסעקטען, מיט וועלכע די לאַרווען ערנעהרען זיך. די לאַרווען פון די דראַכען־פליעגען זיינען גרויסע פרעסער

און פארניכטען מאַסען אינזעקטען. מען רופט זיי דעריבער גאַנץ אָפּט „וואַסער טייגער“. זיי האָבען אויך גוט ענטוויקעלטע דריי פּאָר פּיס, וועלכע וואַקסען זיי אַרויס פון דעם ברוסט טייל פון קערפּער, און זיי קענען מיט זיי גאַנץ גוט אַרומקריכען. אין אַ געוויסער צייט אַרום באַדעקט זיך די לאַרווע מיט אַ היימעל און ווערט וועניגער באַוועגליך — זי געהט איבער אין דעם פּופען צור שטאַנד.

אַז עס קומט די צייט, ווען דער אינזעקט דערגרייכט זיין לעצטע טע שטופע פון ענטוויקלונג, ווען ער דאַרף שוין ווערען אַ פּאָל-שמענדליגע דראַכען-פליעג, קריכט די פּופע אַרויף אויף וועלכער עס איז וואַסער פּלאַנצע און געזעגענט זיך אָפּ מיט'ן וואַסער. דאָס היימעל פון דער פּופע ווערט צושפּאַלטען איבער'ן רוקען און עס באַווייזט זיך אַן אינזעקט מיט פּליגלען. אין אַ שטונדע אַרום זיינען שוין די פּליגלען פון אינזעקס אויסגעשפּרייט און טרוקען, און ער גיט זיך אַ הויב אין דער לופט און פליהט אַוועק. דער דראַכען פליעג האָט דערמיט דערגרייכט זיין לעצטע שטופע פון ענטוויקלונג.



צייכונג 102. — אַ דראַכען-פליעג (רעכטס) און אַ מאַי פליעג.

עהנליך צו די דראַכען-פליעגען אין זייער ענטוויקלונג און אין זייער אָרגאַניזם, זיינען די מאַי-פליעגען, די וואַסער-מאַטען פליגען און אַ גאַנצע רייה אַנדערע אינזעקטען. צוליב דעם וואַס זייערע פּליגלען זיינען דורכגעוועבט מיט דיניסקע אַדערלעך אַדער נערווען, ווערען זיי אלע גערופען מיט דעם נאָמען ניראָפּטעראַן, וואַס דאָס מיינט „נערווען-פליגעלדיגע“. אין דער דאָזיגער גרופּע כע זיי פאַרכינדען מיט זדר-פּעדס, וואַס זיי שפּיגען פון זיך דאַשקעס.




אויך די מאי־פליעגען לעגען זייערע אייער אין וואסער. די נקבה ווארפט אריין איהרע אייער אין וואסער, ווען זי פליהט. די לארווען און די פופען פון די מאי־פליעגען מאכען דורך זייער ענטוויקלונג אין וואסער. זיי בלייבען אין וואסער אן ערך צוויי יאָהר צייט, ביז דאָס הייטעל פון דער פופע עפענט זיך און עס קומט ארויס א פאַלשטענדיג ענטוויקעלטער מאי־פליעג. דער מיט אָבער ענדיגט זיך אויך דאָס לעבען פון דעם דאָזיגען אינד זעקס. אַרויסקומענדיג פון דער פופע, האָט די נאַטור איבערנעם לאָזען פאר די מאי פליעגען נאָר איין אויפגאבע: ברוינגען אַ נייעם דור אויף דער וועלט און נישט מעהר. זיי בלייבען בלויז לעבען צוויי כעג, נאָכדעם ווי זיי האָבען זיך אויפגעהויבען פון וואסער. נאָך דער פאָרונג פאנגט די נקבה אָן לעגען אייער און ווען זי האָט איהר אַרבייט אָפגעטאָן איז איהר אויפגאבע אויף דער וועלט ערפילט און זי קען רוהיג שטאַרבען, ווייל די אייער וועלען זיך שוין אויסבריהען אין וואסער אַליין און די לארווען, וואָס וועלען אַרויסקומען פון זיי, וועלען אַליין זוכען זייער שפיז, ווי דאָס איז דער פאַל ביי די דראַכען־פליגען. אין די פאָר טעג וואָס די מאי־פליעגען לעבען, עסען זיי אפילו ניט.

די לארווען פון די וואסער־מאַטען־פליעגען באשיצען זיך דורך שטיינדלעך אדער העלצלעך, וועלכע זיי לעגען ארום זיך און וועל־כע זיי פארבינדען מיט זייד־פעדים, וואָס זיי שפינען פון זיך ארויס. אין אזא געשיצטען צושטאַנד לעגען זיי זיך אוועק אונטער א שטיין פון א פליסענדיגן וואסער און באהעפטען זיך צו איהם. די לארווען פון די דראַכען־פליגען און פון די מאי־פלי־גען, וועלכע זיינען באזאָרגט פון געבורט אָן מיט שטאַרקע קיי־אָרגאַנען, לאָזען זיך אוועק שווימען אין וואסער זוכען שפיז, און זיי זיינען גרויסע פרעסערס. אין א פארלויף פון א געוויסער צייט קריכען זיי ארויס פון דעם הייטעל, וואָס באדעקט זיי און פון דעם וואסער, וואו זיי זיינען געבאָרען געווארען און פארבראכט זייער יוגענד, און פאנגען אָן פיהרען א פליעגען־לעבען ווי זייערע עלטערען. אָפּלעבענדיג א קורצע צייט א פרייען פליעגען־לעבען, לעגען זיי אויס א געוויסע צאָהל אייער, און זייער אויפגאבע אויף דער וועלט איז ערפילט. זיי שטאַרבען אוועק און זעהען אפילו ניט דעם נייעם דור, וואס זיי האָבען געבראכט אויף דער וועלט. די לייבען־מוראשקעס, וועלכע האָבען ביז א געוויסער מאָס



דאס אויסזעהן פון קליינע דראכען-פליעגען, לעגען זייערע אייער אין זאמדיגע ערד. די לארווען, וועלכע קומען ארויס פון זיי, גראָד-בען אויס אין דער זאמדיגער ערד לייקע-עהנליכע גריבלעך און באהאלטען זיך אין זיי. ווען א מוראשקע אדער אן אנדער קליי-נער אינזעקט פארבלאָנדזשעט אין דעם געגענד, וואו די לייבען מוראשקעס האָבען זייער נעסט, האָט ער וועניג שאַנסען זיך ארויס-צוראטעווען מיט'ן לעבען. ווי די לייבען-מוראשקע באמערקט נאָר דעם אינזעקס, גיט זי גלייך מיט איהר קעפעל א שאַט אויף איהם אביסעל זאמד און ער קייקעלט זיך אריין אין איינעם פון די לייקע-עהנליכע גריבלעך, וואו ער ווערט אויפגעפרעסען פון די יונגע מוראשקעס, וועלכע ליעגען דאָרטען באהאלטען.

די לייבען-מוראשקעס טראָגען בלויז דעם נאָמען „מוראשקע“, אָבער באמת זיינען זיי ניט קיין מוראשקעס און ווערען ניט אריינגערעכענט צווישען די מוראשקעס ספעציעס.




צייכונג 108. — (1) די לייב-מוראשקע; (2) די לארווע פון א לייב-מוראשקע; (3) דאָס לייקע-עהנליכע גריבעל, וואָס די לייב-מוראשקע גראָבט אויס צו פאָגען אינזעקטען.

די מוראשקעס. — די מוראשקעס שטעלען מיט זיך פאָר א העכסט אינטערעסאנטע גרופע צווישען די אינזעקטען מיט זייער ארט לעבען. מען רעכענט, אז עס זיינען פאראן איבער צוויי טויזענד פארשיעדענע סארטען מוראשקעס, אלע פון זיי לעבען אין קאָלאָניעס און פיהרען א געזעלשאפטליכע לעבען. דאָס געזעלשאפטליכע לעבען איז ניט ביי אלע ארטען מוראשקעס גלייך

אָרגאַניזירט, אבער עס עקזיסטירט דאָך צווישען זיי אַלע אַ גע-  
וויסע עהנליכקייט.

אין אַ קאָלאָניע פון מוראַשקעס איז די „באפעלקערונג“ אייני-  
געטיילט אין דריי קלאַסען: אין נקבות, זכרים און אַרבייטער,  
וועלכע זיינען טומטום'ס (ניט קיין זכרים און ניט קיין נקבות),  
אדער אונפרוכטבארע נקבות. אין מאַנכע ספעציעס זיינען די  
אַרבייטער גופא איינגעטיילט אין צוויי קלאַסען: אין איינפאכע  
אַרבייטער, און אין סאָלדאַטען. יעדער קלאַס האָט אַן אַנדער  
אויסזעהן. די נקבות מיט די זכרים האָבען פליגלען. די אַרביי-  
טער אָבער האָבען אין גאַנצען ניט קיין פליגלען. צווישען די  
נקבות איז פאַראַן מייסטענס איינע, וועלכע איז די קעניגין פון  
דער קאָלאָניע. אין אַנדערע קאָלאָניעס זיינען פאַראַן עטליכע  
קעניגיןס.

די נקבות און די אַרבייטער פון די מייסטע ספעציעס האָבען  
אין זייער הינטערלייב אַ גיפּט-דרויזע, וועלכע איז ביי מאַנכע



צייכנונג 104. — א, אַ מוראַשקע נקבה (מיט פליגלען);  
ב, אַן אַרבייטער מוראַשקע (אַהן פליגלען); ג, די פּופע פון אַ  
מוראַשקע; ד, די לאַרוואַ פון אַ מוראַשקע (פאַרגרעסערט).

ספעציעס פאַרבונדען מיט אַ שטעכערעל, דורך וועלכען זיי לאָזען  
אריין דעם גיפּט אין שונא. די וואס האָבען ניט קיין שטעכער  
מאַכען צוערשט דעם שונא אַ וואונד דורך אַ ביס און נאָכדעם לאָז-  
זען זיי אין דער וואונד אריין זייער גיפּט.

די נעסטען, אין וועלכע די מוראַשקעס לעבען, זיינען ביי  
די פאַרשיעדענע ספעציעס פאַרשיעדען געבויט, נאָר ביי די מייס-  
טע פון זיי שטעלען זיי מיט זיך פאָר קונציג געבויטע אונטער-  
אירדישע קאָלאָניעס מיט גאַסען און מיט מעהר עטאזשיגע קאָ-  
מערען און גאַלערעען. אַנדערע קאַמערען ווערען באַנוצט אַלס  
שפייו מאַנאָזינען, אַנדערע אַלס „קינדער-צימערען“, וואו עס ווערט  
געהאַלטען און געהאַדעוועט דאָס יונגיוואַרג, אַנדערע וויעדער ווע-  
רען געברויכט אַלס „שטאַהלען“ פאַר די „מילך קיה“ פון די מו-

ראשקעס. דאָס זיינען אזעלכע פלאַנצען-לייז, וועלכע די מוראַש-קעס פאַנגען און בריינגען זיי אין זייערע נעסמען, כדי צו טרייבן קען די זיסע פליסיגקייט, וואָס זייער קערפער ניט אַרויס. די שפייז פון די מוראַשקעס באשטעהט געוועהנליך פון פארשיעדענע גרינסען, אינזעקטען, ווערים און אַנדערע קליינע באשעפענישען, אָבער זייער ליבעלינגס-שפייז איז דער זיסער זאַפט, וואָס געוויסע פלאַנצען-לייז, די „אַפירען“ גיבען אַרויס פון זייער קערפער. די מוראַשקעס זיינען איבערהויפט גרויסע ליבעלינג-אַבער פון זיסיקייטען.

די פלאַנצען-לייז זיינען קליינע, שוואַכע און שוואַכע באשעפענישען. די אַרבייטער מוראַשקעס, וועלכע דארפן, אויסער בויען נעסמען, ניאָנטשען די קינדער און טאָן אלע אַנדערע „הויז-אַרבייט“, אויך באזארגען די קאָלאָניע מיט שפייז, האָבען אַ רעכט ביסעל אַרבייט אַרום אָט די שוואַכע, שוואַכע פלאַנצען-לייז. זיי פאַסען אויף זיי אויף ווי מענשען אויף הויז-במות. זיי פיטערן זיי און היטען זיי אָפּ, אז קיין בייז זאָל זיי ניט געשעהן. ווען די פלאַנצע, אויף וועלכע די פלאַנצען-לייז פיטערן זיך ווערט פאַרטריקענט, טראָגען די אַרבייטער-מוראַשקעס זיי אַריבער אויף אַ פרישע, זאַפטיגע פלאַנצע. די פלאַנצען-לייז האָבען אַ סך שונאים וואָס לוייערן אויף זייער לעבען. פילע אינזעקטען האָבען גרויס אַפּעטיט צו פאַרשלינגען זייערע ווייכע קערפערלעך און לוייערן אויף זיי. די אַרבייטער-מוראַשקעס זיינען אבער זייערע באשיצער. ווען די פלאַנצען-לייז פיטערן זיך שטעהען די אַרבייטער מוראַשקעס אויף דער וואַך און טרייבען אוועק יעדען אינזעקט, וואָס וויל מאַכען אַן אַנגריף אויף זיי.

אין דעם מיסיסיפי טאַל, אין די פאַראייניגטע שטאַטען פון אמעריקא, איז פאַראַן אַ געוויסער סאָרט פלאַנצען-לייז, וועלכע לעבען אין די וואַרצלען פון קוקורוזע. זיי לעגען זייערע אייעלעך אין דער ערד אין הערבסט צייט און זיי ווערן אויסגעברייט אין פרייהינג, איידער די קוקורוזע איז נאָך פאַרזעט. די נייגעבאָ-רענע פלאַנצען-לייז וואַלטען אויף אזא אופן אומגעקומען פון הונט-גער, אָבער די ברוינע מוראַשקעס, וועלכע געפינען זיך דאָרטען אין גרויסע מאַסען און וועלכע זיינען גרויסע ליבעלינג-אַבער פון דעם זיסען זאַפט, וואָס די פלאַנצען-לייז גיבען אַרויס פון זיך, ווען זיי וואַסען אויס, זאָרגען פאַר זיי, אז זיי זאָלען בלייבען לעבען

און אויסוואקסען. די מוראשקעס נעהמען די נייגעבאָרענע פלאַנצענלייז און טראָגען זיי פארזיכטיג אוועק צו א געוויסען סארט גראַז, וואס וואקסט דארטען אין די פעלדער, כדי זיי זאָלען זיך קענען פארלויפן פֿיטערען ביז די קוקרווע וועט פארזעט ווערען און אַרויסוואקסען. די גאַנצע צייט, וואָס די יונג גע פלאַנצענלייז געפינען זיך אויף דעם גראַז, ווערען זיי באוואכט פון די מוראשקעס, אז קיין בייז זאָל זיי ניט געשעהן, און ווען עס באווייזט זיך די קוקרווע אויפ'ן פעלד נעהמען די מוראשקעס זייערע, "בהמה'לעך" און טראָגען זיי אוועק צו א קוקרווע וואָרצעל, וואו זיי קריגען זייער באליעבטע פֿיטערניש.

אַנדערע גאַטונגען מוראשקעס בריינגען די פלאַנצענלייז ביי זיך אין די נעסטען. שטעלען זיי דאָרטען אוועק אין א "שטאהל" און קאַרמענען זיי, ווי מענשען טוען עס מיט זייערע הויז בהמות. ווען די מוראשקעס ווילען געניסען פון דעם זיסען זאַפט, וואָס די פלאַנצענלייז באַזיצען, געהען זיי צו צו זיי, גיבען זיי איידעל א בושקע מיט זייערע פיהל-הערענדלעך (אַנטענען), די פלאַנצענלייז לאָזען דאָן ארויס פון זייער קערפער קליינע טראָפענדלעך זיסע פליסיגקייט, וועלכע די מוראשקעס טרינקען מיט גרויס אָפּטייט.

ווי שוין באַמערקט, ווערט די גאַנצע ארבייטע אין דער קאָלאָניע געטאָן פון די ארבייטער מוראשקעס, די זכרים מיט די נקבות זיינען פאָלשטענדיגע לעדיגגעהער, דיהרען זיך ניט צו צו קיין ארבייט. זיי לעבען פון פארטיגען אויף דעם חשבון פון די ארבייטער. זייער איינציגע עוברא איז בריינגען א נייעם דור אויף דער וועלט און נישט מעהר. אפילו האָדעווען די קינדער איז ניט זייער עסק, אויך דאָס דארפן טאָן די ארבייטער, וועלכע זיינען אַליין בעזדיענטניקעס.

די זכרים מיט די נקבות פון די מוראשקעס, וועלכע האָבען פלינגלען, זעהט מען גאַנץ זעלטען. זיי באווייזען זיך קיינמאָל ניט אויף דער ווייסער וועלט, אויסער ווען עס קומט זייער פאָרונגסט צייט. די מוראשקעס, וועלכע מיר זעהן אָפט אַרומלויפענדיג אזוי פאָרהאוועט, זיינען עס די ארבייטער. זיי זיינען נאַקעטע, אָהן פלינגלען, מאָגער, קליין געוויקסיג, און זיינען בְּסדר באַשעפטיגט.

די צאָהל פון זכרים און נקבות אין אַ מוראשקע קאָלאָניע

ניע איז פיעל קלענער פון דער צאָהל אַרבייטער. זיי שטעלען מיט זיך פאָר די אַריסטאָקראַטיע, די קעניגליכע פאַמיליע פון דער קאָל־לאַַניע. שפעט אין זומער פאַרלאַזען די זכרים און די נקבות ערב זונען־אונטערגאַנג די קאָלאָניע און פליהען אוועק הויך אין דער לופט אויף אַ האַכצייטס־דרייע. נאָך דער פאָרונג לאַזען זיי זיך צוריק אַראַפּ אויף דער ערד. די זכרים קעהרען זיך אבער שוין מעהר ניט צוריק אין דער קאָלאָניע. נאָך דער פאָרונג איז זייער לעבען געענדיגט און זיי בלייבען ליגען טויטע אויף דעם פלאַץ, וואו זיי האָבען זיך אַראַפגעלאַזען פון דער לופט נאָך זייער האַכ־צייטס־דרייע. די נקבות אָבער ווערען אויפגעזוכט פון די אַרביי־טער מוראַשקעס, זיי רייסען אַראַפּ פון זיי זייערע פליעגלען און פיהרען זיי אוועק צוריק אין דער קאָלאָניע, וואו זיי פאנגען אַן לעגען אייער. ביי מאַנכע ספעציעס ווארפען די זכרים און די נקבות אַליין אַראַפּ זייערע פליגלען נאָך דער פאָרונג.

די מוראַשקעס האָבען אַ באַזונדערען אינסטינקט צו דער־קענען די מיטגלידער פון זייער קאָלאָניע, וואו זיי זאָלען זיך ניט טרעפען, און ווי לאַנג זיי זאָלען ניט זיין געשיידט איינע פון די אַנדערע. ווען זיי באַגעגענען זיך, באַרירען זיי זיך מיט זייערע קער־פערס, ווי זיי וואָלטען זיך באַגריסען און זיי העלפען זיך איינע די אַנדערע אין דער אַרבייט, ווי זיי וואָלטען זיך צונויפערען.

די נקבות, וועלכע זיינען ניט אויפגעזוכט געווארען נאָך זייער האַכצייטס־דרייע פון די אַרבייטער־מוראַשקעס און וועלכע האָבען זיך ניט אומגעקעהרט צוריק צו זייער אַלטער היים, זוכען אויס אַ פאַסענדען פלאַץ, וואו צו גרינדען אַ נייע קאָלאָניע. ווען עס קומט פאָר אזא פאל מיט אַ נקבה פון די האַלץ־מוראַשקעס, לעגט זי צוערשט אויס אונטער אַ שטיין 10 אָדער 12 אייער, פון וועלכע עס ענטוויקלען זיך אַרבייטער־מוראַשקעס. די לאַרווען וואָס קור מען ארויס פון די אייער זיינען ווייבליכע, אָבער צוליב דער שלעכטער אויפפאַסונג און די מאַנגעלהאַפטע נאַהרונג, וואָס זיי באַקומען, ווערען זיי טומטום'ס און ענטוויקלען זיך אין אַרביי־טער מוראַשקעס. דער אַנפאַנג פון דער קאָלאָניע איז דערמיט אָבער שוין געשאפּען געווארען. עס זיינען שוין פאַראַן אַרביי־טער, וועלכע קענען אַנפאַנגען בויען נעסטען, זאַמלען שפּיז און האַדעווען די גרויכע צאָהל קינדער, וואָס זייער מוטער וועט ברענגען אויף דער וועלט. די מוטער־מוראַשקע אָדער די קעניגין,

ווי מען רופט זי, פאנגט דאן אן לעגען אייער אין א גרויסע צאָהל און עם ווערט אין א קורצער צייט אויפגעבויט א גרויסע נייע מוראשקעס קאָלאָניע.

די נייגעבאָרענע מוראשקע, וועלכע קומט ארויס פון איי, די לאַרווע, ווי זי ווערט גערופען, איז א קליין הילפלאָז ווערימעל. די אַרבייטער מוראשקעס נעהמען די לאַרווען אונטער זייער אויפ־זיכט, ניאָנטשען זיי, האַדעווען זיי, ביז זיי ענטוויקלען זיך אין מור־ראשקעס און דארפֿען מעהר קיינעמס הילף. ווען מען טרעפט אן א מוראשניק זעהט מען, ווי עם לויפען ארום מוראשקעס טראָד־גענדיג אין זייער מויל לענגליכע ווייסע קייקעלעך, וועלכע זעהען אויס ווי אייער. מען רופט די דאָזיגע ווייסע קייקעלעך „מוראש־קעס אייער“. אין דער ווירקליכקייט אָבער זיינען עם ניט קיין אייער, נאָר נאָך ניט ענטוויקעלטע מוראשקעס. דאָס זיינען די פופען, אדער קוקלעס, ווי מען רופט זיי. אין דעם ערשטען צור־שטאַנד, ווי די נייגעבאָרענע מוראשקע קומט ארויס פון איי, ווערט זי גערופען „לאַרווע“. נאָך אונגעפֿעהר 14 טעג ווערט די לאַרווע באשפונען ארום און ארום ווי מיט א שפינוועבס פון ווייס־ליכען אדער ברוינליכען קאָליר און זעהט אויס ווי א לעבענס־לאָזע שטיקעל מאַסע. אין דעם צושטאַנד ווערט די נייגעבאָרענע באשעפעניש אָנגערופען „פופע“. אָט די דאָזיגע פופען, וועלכע זעהען אויס ווי אייעלעך, ווערען עם געטראַגען פון די אַרבייטער־מוראשקעס. זיי נעהמען זיי ארויס פון די פינסטערע אונטער־ערדישע נעסטען און טראַגען זיי ארויס וואַרימען זיך אויף דער זון. ווען אן אָנגריה ווערט געמאכט אויף א מוראשניק, לויפען גלייך די מוראשקעס ראַטעווען די פופען און זיי אוועקטראַגען ווייט פון דעם אָנגריפֿס־פּלאַץ. נאָך 2, אָדער מאַנכעס מאָל נאָך 4 וואָכען, צורייסען די אַרבייטער־מוראשקעס די שפינוועבס פון די פופען און עם קומען ארויס קליינע מוראשקעס, וועלכע מען דארף קאָרמען אייניגע טעג ביז זיי ווערען זעלבסטשטענדיג. דער נייער דור איז פונקט אזוי איינגעטיילט אין קלאסען ווי דער אַל־טער דור.

פון די פופען, וועלכע האָבען באקומען א בעסערע אויפפאַ־סונג און א בעסער האַדעוואַניע קומען ארויס די באפֿליענעלטע אַריסטאָקראַטען, די קעניגען און די קעניגליכע פאַמיליע, וועהר־רענדר פון די איבריגע, וועלכע האָבען געקראָגען אן ערגערע האָ־


דעוואניע קומען ארויס די ארבייטער. עס שיינט, אז א געוויסע צאָהל אייער ווערען פון אָנפאנג אָן פון די מוראשקעס בעסער אויפגעפאסט און פון זיי קומט עס ארויס די אריסטאָקראטיע פון דער קאָלאָניע. עס ווערט אויך אָנגענומען, אז פון די אייער, וואס ווערען געלעגט ענדע זומער קומען מייסטענס ארויס די אַריסטאָקראטיע פון דער קאָלאָניע. מעגליך, אז דאָס איז צוליעב דעם, וואָס די ארבייטער מוראשקעס קענען זיי אין יענער צייט באַזאָר גען מיט בעסערע שפייז.

ביי פיעלע ספעציעס פון די מוראשקעס זיינען אויסער די ארבייטער, וועלכע דארפען בויען די נעסטען, זאַמלען שפייז, האָר דעווען די קינדער, אויפפאסען אויף די „בהמות“ — די פלאַנצענ־לייז, אויך פאראן א באַזונדער קלאַס וואָס ערפילען די אויפגאבע פון סאָלדאַטען אין דער קאָלאָניע. די סאָלדאַטען האָבען אויך ניט קיין פליעגלען אזוי ווי די ארבייטער און זיינען אויך ווי זיי כומט טום'ס, ניט קיין זכרים און ניט קיין נקבות אָדער אומפּרוכט באַרע נקבות. די אויפגאבע פון די סאָלדאַטען איז צו קעמפען.

די מוראשקעס זיינען קריגערישע אינווקטען. מאַנכע פון זייערע גאַטונגען פיהרען צווישען זיך אונאוויפהערליכע מלחמות. די סאָלדאַטען פון איין גאַטונג מוראשקעס באַפאלען אָפט א קאָלָאָניע פון אַן אנדער גאַטונג און עס פאנגט זיך אָן אַ בלוטיגע מלחמה. ווען די אָנגרייפער זיינען זיעגרייך, דרינגען זיי אַרײַן אין די שפייזקאַמערען פון די באַזיעגטע, פארנעהמען די גאַנצע אָנגעזאַמעלטע שפייז, וואָס זיי געפינען, און טראָגען עס אוועק אין זייער קאָלאָניע. דאָס זאַמלען און אָנגרייטען שפייז איז אַן אַלגעמיינע באַראַקטעריסטיק פון די מוראשקעס. נאָר אויסער וואָס די זיעגער נעהמען מיט די שפייז פון די באַזיעגטע, נעהמען זיי אויך געפאַנגען די באַזיעגטע און מאַכען זיי פאר זייערע שקלאַפּען. עס זיינען פאראן פיעלע ספעציעס פון די מוראשקעס, וועלכע לעבען בלויז פון דער ארבייט פון זייערע שקלאַפּען. ווען זיי באַפאלען א קאָלאָניע פון אנדערע מוראשקעס און באַזיעגען זיי, נעהמען זיי מיט אַלע אייער, לאַרווען און פופען, וועלכע זיי געפינען אין דער באַזיעגטער קאָלאָניע און די מוראשקעס, וואָס וואַקסען ארויס פון זיי, ווערען געמאַכט פאַר שקלאַפּען, וועלכע דארפען טאָן אַלע ארבייטען פאר די שקלאַפּען־טרייבער אין דער קאָלאָניע. די „רויבער־מוראשקעס“ פון זיד אמעריקא האָבען פון

זיך אליין אין גאנצען ניט קיין ארבייטער. זיי באשטעהען בלויז פון סאָלדאַטען און פון אַריסטאָקראַטיע, באַפֿליעגעלטע זכרים און נקבות. די דאָזיגע מוראַשקעס לעבען בלויז פון רויב און פון די אַרבייט פון אַנדערע ספּעציעס מוראַשקעס, וועלכע זיי פאַנגען און מאַכען פאַר זייערע שקלאַפּען.

די סאָלדאַטען פון די רויבער־מוראַשקעס זיינען איינגעטיילט אין צוויי קלאַסען: אין קליין־געוויקסיגע סאָלדאַטען און אין גרויס־געוויקסיגע. די צאָהל פון די קליין־געוויקסיגע איז א פיעל גרעסערע, ווי פון די גרויס־געוויקסיגע. מען נעהמט אָן, אז די קליין־



צייכונג 105. — רויבער מוראַשקעס. (1) די קעניגין; (2) אַ סאָלדאַט.

געוויקסיגע זיינען די איינפאַכע סאָלדאַטען, וועהרענדר גרויס־געוויקסיגע זיינען די אָפיציערען, די פיהרער פון דער אַרמעע. די „אָפיציערען“ צייכענען זיך אויס ניט בלויז מיט דער גרויס פון זייער קערפּער, נאָר גאַנץ באַזונדערס מיט דער גרויס פון זייער קאַפּ. ווען די רויבער־מוראַשקעס לאָזען זיך אַרויס אויף מלחמה, מאַרשירען די קליינע סאָלדאַטען אין אַ לאַנגער, שמאַלער רייה, וועהרענדר די גרויסע געהען פון ביידע זייטען פון דער רייה, און עס זעהט אויס, אז זיי זיינען די פיהרער פון דער אַרמעע.



עס זיינען אבער אויך פאראן גאסט־פריינדליכע מוראשקעס, וועלכע לאָזען אריין גיין זייערע נעסטען געוויסע גאטונגען פון קליינע מוראשקעס, וועלכע קענען וואהרשיינליך ניט אויסבויען קיין קאלאָניעס פאר זיך און מוזען לעבען אויף אפּלעגער אין דער פרעמד.

פיעל פון די מוראשקעס גאטונגען, ווען עס קומט אָן דער ווינטער, קריכען זיי אריין אין די טיעפע קאמערען פון זייערע אונטערערדישע נעסטען און ווערען דאָרטען פארגליווערט. די נקבות אבער לעבען אריבער דעם ווינטער, און ווען עס קומט אָן דער פרייהלינג פאנגען זיי אָן לעגען אייער און א נייער דור ווערט באשאפען. אנדערע גאטונגען אבער בלייבען אויך לעבען אין ווינטער. זיי זאמלען אָן גענוג שפייז אין זומער, באהאלטען די אָני־נעזאמעלטע שפייז אין די שפייז־קאמערען פון זייערע נעסטען און האָבען זיך מיט וואס צו נעהרען איבער ווינטער.

די נעסטען פון די פארשיעדענע מוראשקעס גאטונגען זיינען, ווי שוין אויבען דערמאָהנט, זעהר פארשיעדענארטיג. מאַכע פון זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אין די שטאַמען פון בוימער. אַנדערע בויען אויס קונציגע וואַזען־עהנליכע נעסטען צווישען די צווייגען פון בוימער. אין אינדיען זיינען פאראן אזעלכע מוראש־קעס, וועלכע לעגען ארום זייערע נעסטען מיט בלעטער פון בוי־מער, וועלכע זיי בינדען צוזאַמען מיט שפּיץ־פּעדריס, וואָס די לאַר־ווען לאָזען פון זיך ארויס. די ארבייטער־מוראשקעס נעהמען די לאַרווען אין זייערע מיילער און טראגען זיי ארום די בלעטער, וועל־כע זיי ווילען צונגיפּינדען מיט די שפּיץ־פּעדריס וואָס די לאַרווען לאָזען פון זיך ארויס. די מייסטע מוראשקעס גאטונגען, אָבער, מאַכען זייערע נעסטען אין דער ערד, וואו זיי גראָבען, בויען און מויערען אויס פארשיעדענע געוועלכען, דורכגאַנגען, גאַסען, גאַ־לערעען און קאַמערען. מאַכע פון זיי מאַכען זייערע נעסטען אונט־טער שטיינער. די געוועהנליכע וואַלד־מוראשקעס טראגען אָן אויף זייערע נעסטען אַ שפּיצ־גע קופּע פון נאָרלען פון טאַנען־בוימער, שטיקלעך האַלץ און בלעטער.


עס זיינען פאראן מאַכע גאטונגען מוראשקעס, וועלכע זיי־נען גאַנץ געפּעהרליכע באשעפענישען. זיי געפינען זיך הויפטזעכ־ליך אין די הייסע לענדער. די וואַנדער־מוראשקעס, אין וועסט־אַפריקא, זיינען געפּעהרליך אפילו פאר גרויסע חיות. ווען אַ

גרויסע מחנה וואנדער־מוראשקעס טרעפען אָן אין וועג אַ חיה באַד פאלען זיי איהר פון אלע זייטען, קריכען איהר אָן אין די אויגען און מאכען זי בלינד און מאַכען נאָכדעם אַ סוף פון איהר לעבען. ווען זיי דרינגען ביי נאכט אריין אין אַ הויז מוזען אלע פון דארט טען ענטלויפען. די דאָזיגע מוראשקעס געהען געווענהליך ארויס אויף זייער רויב ביי נאכט אדער פארטאָג.

אַן אינטערעסאנטער טיפ זיינען די אקערבוי־מוראשקעס, וועל־כע געפינען זיך אין טעקסאס, אין די פאראייניגטע שטאַטען פון אמעריקא. זייער נעסט איז ארומגערינגעלט מיט אַ רונדער פעס־טונג פון אַ האלב מעטער די הויך. פון אונטען איז די פעסטונג ברייט און ווערט וואָס העכער אלץ שמעלער. פון אויבען האָט די פעסטונג אַ שמאַלע עפנונג. דאָס לאַנד ארום דער פעסטונג, ביז אַ מעטער ווייט, איז דאָס אקער־פעלד פון די דאָזיגע מוראשקעס. דאָס פעלד איז אָפגערייניגט און אויסגעלייכט דורך די באשטענ־דיגע מיהזאמע ארבייט פון די אקערבוי מוראשקעס. דאָרטען גע־פינט זיך ניט קיין אנדער פלאַנצע און קיין אנדער גראָז, אויסער דער גראָז „אריסטירא סטריקטא“, וועלכער ווערט פון די אקער־בוי מוראשקעס געהאָדעוועט און אויפגעפאסט. די מוראשקעס זאַמלען די קערנער פון דעם דאָזיגען גראָז, בריינגען זיי אין אַ באַזונדערע אָפטיילונג פון זייער נעסט, וואו זיי רייניגען אפ די קערנער פון זייער שאַלעכץ און פארפאַקען זיי אין זייערע שפייד־קאַמערען. ווען די קערנער ווערען פארנעצט פון אַ רעגען, טראָג גען זיי די מוראשקעס ארויס אין אַ זוניגען טאָג אין דער פרייער לופט און לאָזען זיי אויסטריקענען.

די ווייסע מוראשקעס. — אין דער ווירקליכקייט געהערען ניט די ווייסע מוראשקעס צו דער מוראשקעס פאַמיליע. זיי זיי־נען גאָר קיין מוראשקעס ניט, זיי האָבען אָבער אזא גרויסע עהנ־ליכקייט צו מוראשקעס מיט זייער אויסזעהן און מיט זייער אַרט לעבען, אז מען האָט זיי אַ נאָמען געגעבען „מוראשקעס“. די ווייסע מוראשקעס לעבען אין קאָלאָניעס און זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען מייסטענס אין די שטאַמען פון אָפגעטריקענ־טע בוימער אדער אין דער ערד. די קאָלאָניע באַשטעהט פון זעקס אַרטען: זכרים מיט פלינגלען, נקבות מיט פלינגלען, זכרים אָהן פלינגלען, נקבות אָהן פלינגלען און אַרבייטער און סאָלדאַטען אָהן פלינגלען. די סאָלדאַטען, וועלכע זיינען פון ברויגליכען קאָליר,

האָבען גרויסע קעפּ און שטאַרקע מויל אָרגאַנען. די אַרבייטער זיינען קלענער ווי די סאָלדאַטען און זיינען ווייס. די באַפלינגעל־טע זכרים און נקבות האָבען ברוינע קערפערס און ווייסע פליגלען. די אייער־לעגענדע קעניגין פון דער קאָלאָניע וואַקסט אָפּט אויס ביי אַ האַלבען פּוס דער לענג, ווערענר די אַנדערע מיט־גליעדער פון דער קאָלאָניע זיינען בלויו אַ האַלב אדער דריי פיער־



צייכונג 106. — די ווייסע מוראַשקעס. א, די קעניגין, איידער זי פאַרלירט איהרע פליגלען; ב, די קעניגין, נאַכדעם ווי זי האָט פאַרלאָרען איהרע פליגלען און איהר בויך איז געוואָרען זעהר גרויס און אַנגעפילט מיט אייער; ג, אַ סאָלדאַט. בייטער מוראַשקע; ד, אַ פּאַנגסט; ה, די קעניגין, נאַכדעם ווי זי האָט פאַרלאָרען איהרע פליגלען און איהר בויך איז געוואָרען זעהר גרויס און אַנגעפילט מיט אייער.

טעל צאָל (אינטש) די לענג. די גרויס פון דער קעניגין נעהמט זיך דערפון, וואס אין איהר קערפער געפינט זיך אַן אונגעווער גרויסע צאָהל אייער.

אין פרייהלינג פליהען פיעל פון די זכרים און די נקבות אוועק פון דער קאָלאָניע אויף אַ האַכצייטס־דייזע. נאָך דער פּאַרונג וואַרפען זיי אַראַפּ פון זיך די פליגלען און לאָזען זיך אַראַפּ אויף דער ערד, וואו זיי פאַנגען אַן אָרגאַניזירען אַ נייע קאָלאָניע. די קעניגין פאַנגט אַן לעגען אייער און זי פאַנגט אַן וואַקסען אין גרויס פון טאָג, זי צוואַוואַקסט זיך אזוי גרויס, אז זי קען זיך קוים

ריהרען. זי לענט איהרע אייער זעהר שנעל אן ערך 60 אין א מי-  
נוט אדער 80 טויזענד אין א טאָג.

די פארשיעדענע גאטונגען מוראשקעס (אויסער די לייבען-  
מוראשקעס און די ווייסע מוראשקעס) געהערען צו דער גרופע  
אינסעקטען, וועלכע ווערען גערופען מיט דעם נאָמען הימענאָפּ-  
טערען, וואָס דאָס מיינט „הויט־פליגעלדיגע“. די פליגלען פון  
די זכרים און נקבות פון די מוראשקעס זיינען זעהר דין און זעהען  
אויס, ווי זיי וואלטען באשטעהן פון הויט. צו דער זעלביגער גרופע  
פּע, צו די הימענאָפטערען, געהערען אויך אלע גאטונגען ביענען  
און וועספען.

די מוראשקעס זיינען פון פארשיעדענע פארבען. מאנכע  
ספעציעס זיינען רויטע, מאנכע ברוינע, מאנכע שווארצע און מאַנ-  
כע גרויע.

דער קערפער פון די מוראשקעס איז איינגעטיילט אין דריי  
דייטליכע טיילען: אין א קאָפּ, ברוסט און בויך. דער קאָפּ איז  
אין פארהעלטניס מיט די איבריגע טיילען פון קערפער, גאנץ גרויס.  
אין דעם קאָפּ זיינען פאראן צוויי גרויסע צוזאמענגעזעצטע אוי-  
גען (וועלכע באשטעהען פון מעהרערע לינזען אָדער קריסטאליקלעך).  
פון פאדערשטען טייל פון קאָפּ געהען ארויס צוויי לאנגע, דינע  
פיהל־הערענדלעך (אַנטענען). מען נעהמט אָן אז אין די פיהל־  
הערענדלעך געפינט זיך דער חוש הריח און דער חוש השמיעה  
פון די מוראשקעס.


עס איז ניט גענוי באשטימט ווי לאנג עס איז דאָס לעבען  
פון א מוראשקע. דער נאַטור־פאָרשער דזשאהן לאָבאָך באהויב־  
טעט, אז ער האָט געהאט צוויי קעניגין מוראשקעס, וועלכע האָ-  
בען געלעבט איבער זיעבען יאהר און אייניגע ארבייטער מוראש-  
קעס, וועלכע האָבען געלעבט איבער זעקס יאהר.

די ביענען. — נאָך אינטערעסאַנטער ווי דאָס לעבען פון די  
מוראשקעס, איז דאָס לעבען פון די ביענען. עס זיינען פאראן  
פארשיידענע גאטונגען ביענען, די מעהר באקאנטעסטע פון זיי  
זיינען אָבער די האַניג־ביענען, און די דאָזיגע ביענען זיינען אויך די  
אינטערעסאַנטעסטע אינזעקטען מיט דעם אַרט לעבען, וואָס זיי  
פיהרען.

די האַניג־ביענען זיינען מיט דעם כּווי פון זייער קערפער פיעל  
עהנליך צו די מוראשקעס, אויסער וואָס זייער קערפער איז האַריג

און וואָס אויף די פיס פון די ארבייטער־ביענען געפינען זיך אַזעלכע קערבעלעך, אין וועלכע זיי טראָגען דעם בלומען־שטויב וואָס זיי זאַמלען.

די האַניג־ביענען פיהרען אַ העכסט ענטוויקעלטען געזעל־שאַפטיכען לעבען. זיי לעבען אין קאָלאָניעס און עס הערשט ביי זיי אַ שטרענגע ארבייטס־צוטילונג.



צייכונג 107. — האַניג־ביענען. 1) אַן ארבייטער־ביען; 2) אַ דראָן (זכר); 3) די קעניגין; 4) די זעקס־קאַנטיגע ביענען־קעמערלעך, וואו אַ צייגט די אייער קעמערלעך; ב, לאָר־ווען־קעמערלעך; ג, פופען־קעמערלעך; ד, דאַס קעמערלעך, וואו עס ווערט אויסגעבריהט אַ קעניגין.

אַ קאָלאָניע פון האַניג־ביענען ענטהאַלט דריי אַרטען בינען, נעמליך: איין קעניגין, מעהרערע זכרים אָדער דראָנען, ווי זיי ווערען גערופען, און ארבייטער. די ארבייטער זיינען פון ווייב־ליכען געשלעכט, אָבער זיי זיינען בעזודיעטניצעס, זיי לעגען ניט קיין אייער. יעדער פון די אַרטען האָט אַ באַזונדערען אויסזעהן. די ארבייטער זיינען קליין געוואַקסען. די דראָנען זיינען גרעסער

פון זיי און די קעניגין, אויסער וואָס זי איז גרעסער פון די דראָנען, האָט זי אַ לענגערען און דינערען בויך פון זיי.

אין נאטירליכען צושטאַנד מאַכען זיך די האָניג־ביענען זייער נעסט אין אַ לאָך פון אַן אָפגעטריקענטען בוים, זיי פיהרען דאָר טען זייער לעבען פונקט ווי אין די ביען־שטאַקען, מיט וועלכע דער מענש האָט זיי באַזאָרגט, כדי צו קריגען זייער האָניג.

אין אַ ביענען־קאָלאָניע איז פאַראַן, ווי שוין געזאָגט, איין קעניגין, עטליכע הונדערט דראָנען (זכרים) און פון צעהן ביז דרייסיג טויזענד ארבייטער. זיי זאַמלען שפּיז, זיי ניאַנטשען און האַדעווען די קינדער, זיי מאַכען דעם האָניג, זיי מאַכען די וואַסקע־מערען, זיי פאַרריכטען די ביען־שטאַקען און זיי טוען אַלע אַנדערע ארבייט, וועלכע פאַדערען זיך פאַר דער קאָלאָניע. די קעניגין האָט די אויפנאַבע צו לעגען אייער, און די דראָנען, אָדער די זכרים, באַפּרוכטען די אייער. קיין אַנדער ארבייט האָבען זיי נישט, אויסער וואָס זיי בילדען די קעניגליכע סוויטע, די „קאָמער־הערען“ פון דער קעניגין און לעבען אויף דעם חשבון פון די ארבייטער.

דער ביענשטאַק איז אויסגעפילט מיט וואַסקע־מערלעך, וועלכע זיינען זעקס־קאַנטיג און סימעטריש אויסגעשטעלט. די „אַזיגע סימעטרישע זעקס־קאַנטיגע קאַמערלעך ווערען געמאַכט פון די ארבייטער־ביענען מיט זייערע קינבאַקען, וועלכע האָבען די פאַרמע פון שמאַלע לאַפעטקעס. די וואַסק, פון וועלכע די קע־מערלעך ווערען געמאַכט, קומט פון דעם קערפּער פון דעם אַר־בייטער־ביען, אין דער פאַרם פון קליינע פליסיגע טראָפּענס, וועלכע געהען אַרויס פון הויט פון דער אונטערשטער זייט פון זיין בויך. די דאָזיגע קליינע טראָפּענס גיסען זיך צונויף, ווערען פאַרגליווערט און באַדעקען דעם אונטערשטען זייט פון ביען'ס בויך ווי מיט אַ הייטעל, וואָס ווערט שפּעטער פון דעם ביען אראָפּגענומען מיט דער הילף פון זיינע הינטערשטע פיס, וועלכע האָבען אַזעלכע שערען־עהנליכע ענדען.

אַ געוויסע צאָהל פון די וואַסקע־מערלעך זיינען אָנגעפילט מיט בלומען־שטויב און האָניג, וואָס דיענט אַלס שפּיז פאַר די איינוואוינער פון דער קאָלאָניע, וועהרענד אין די איבעריגע קע־מערלעך געפינען זיך די אייער אָדער די לאַרווען, וועלכע זיינען אויסגעבריהט געוואָרען פון די אייער.

דעם בלומען-שטויב זאמלען די ארבייטער-ביענען פון פאר-  
שיידענע סאָרטען בלומען, וועלכע זיינען באַליעבט ביי די ביענען.  
דער געזאמעלטער בלומען-שטויב ווערט געבראכט אין ביענשטאָק  
אין די „שטויב-קערבלעך“ אָדער „האַניג קערבלעך“, ווי זיי  
ווערען אויך גערופען, וואָס די ארבייטער-ביענען האָבען אויף  
זייערע הינטערשטע פיס. דאָס זיינען אַזעלכע פלאַכע גריבעלעך,  
וועלכע זייערע ראַנדען זיינען אָפגעזוימט מיט אַ רוייה געבויגענע  
שטייפּע הערעלעך, וועלכע שיצען דעם בלומען-שטויב, אַז ער זאָל  
ניט אַרויספאַלען. ווען דער ארבייטער-ביען האָט אָנגעזאמעלט  
גענוג בלומען-שטויב, פליהט ער צוריק אַהיים, אין ביענשטאָק.  
אָפט פליהען די ביענען אַוועק עטליכע מייל ווייט פון ביענשטאָק  
זאמלען בלומען-שטויב. זיי פליהען אימער אין אַ גראַדער ריכטונג.

אויסער די בלומען-שטויב, וואָס די ארבייטער-ביענען זאמלען  
אַלס שפייז פאַר דער קאָלאָניע, פאַבריצירען זיי אויך האָניג פון  
דעם זאפט פון די בלומען. דער ארבייטער-ביען זויגט אויס דעם  
זיסען זאפט פון געוויסע בלומען און שלינגט איהם אַראָפּ אין  
זיין קראָפּ אָדער אויבערשטען מאָגען. ווען זיין קראָפּ איז פול  
מיט בלומען-זאפט, פליהט ער צוריק צום ביענשטאָק און ניסט  
אַריין דעם בלומען-זאפט פון זיין קראָפּ אין די וואַסקעמערלעך.  
דער בלומען-זאפט ענטהאַלט אָבער נאָך צופיעל וואַסער, אַז ער  
זאָל קענען געברויכט ווערען אַלס האָניג. ערשט ווען אַ טייל  
פון דעם וואַסער טריקענט זיך אויס, איז דער האָניג פאַרטיג.  
כדי דאָס וואַסער זאָל גיכער פאַרדאַמפּען, פאַרזאַמלען זיך מעה-  
רערע פון די ארבייטער-ביענען איבער די וואַסקעמערלעך, וואו  
דער בלומען-זאפט געפינט זיך, און פאַנגען אָן העפטיג צו באַוועגען  
זייערע פליגלען. דורך דער דאָזיגער באַוועגונג ווערט געשאַפּען  
אַ ווינט, וואָס פאַרשנעלערט די אויסדאַמפּונג פון דעם וואַסער,  
וואָס געפינט זיך אין דעם בלומען-זאפט.

אויסער בלומען-שטויב און האָניג דאַרפען די ארבייטער-  
ביענען מאַנכעסמאָל באַזאָרגען דעם ביענשטאָק מיט אַזאַ פעכטיגען  
מאַטעריאַל צו פאַרמאַכען די שפאַלטען און די לעכער פון ביענ-  
שטאָק, ווען זיי באַווייזען זיך אין איהם. זיי זאמלען דאָס דאָזיגע  
מאַטעריאַל, וואָס האָט אַ רויטליכען אויסזעהן, פון דעם פעכטיגען  
זאפט פון פאַרשיידענע בוימער קנאָספען.  
ווי שוין פריהער באַמערקט, איז בלוז אַ טייל פון די וואַסער-

קעמערלעך פארנומען מיט האָניג און מיט בלומען־שטויב, דער איבעריגער טייל איז פארנומען מיט די אייער פון דער קעניגין אָדער מיט די לאַרווען, וואָס קומען פון זיי אַרויס.

ווען די קעניגין פאנגט אָן לעגען איהרע אייער, פליהט זי איבער דעם ביענשטאָק און לענט אין אַ געוויסער צאָהל וואַקס־קעמערלעך צו איין איי אין אַ קעמערעל. אין דריי טעג אַרום ווערען די אייער אויסגעבריהט און עס קומט פון זיי אַרויס ווייכע, קליינע, ווייסע, הילפלאָזע ווערימלעך, וועלכע ווערען גערופען לאַרווען. אויפצופאַסען אויף די דאָזיגע קליינע הילפלאָזע באַ־שטפּענישען, זייגען אין דעם ביענשטאָק פאַראַן ספּעציעלע „ניאַנ־קעס“, זיי זייגען אַ טייל פון די אַרבייטער ביענען, וואָס זייער עובדה איז צו ניאַנטשען און צו האָדעווען די נייגעבאַרענע ביענען. זיי פליהען ניט אַרום זאַמלען קיין שפייז, זיי מאַכען אויך ניט קיין האָניג, נאָר זייער עובדה איז ניאַנטשען און האָדעווען די קינד־דער פון דער קאָלאָניע. געוועהנליך ווערט די דאָזיגע אַרבייט ערפילט פון די אינגערע ביענען פון דער קאָלאָניע. ערשט ווען זיי האָבען אָפּגעדיענט אַלס ניאַנקעס אַ וואָך צייט אָדער מעהר, טרע־טען זיי אַריין אין די רייהען פון די שפייז־זאַמלענדע און האָניג־מאַכענדע אַרבייטער־ביענען, און אינגערע ביענען פון ביענשטאָק פאַרנעהמען זייער פּלאַץ אַלס ניאַנקעס. די לאַרווען ווערען גע־קאָרמעט פון די ניאַנקעס מיט אַ ספּעציעלער זעהר נאַרהאַפּטער שפייז, וואָס ווערט גערופען „ביענען־זאַפט“ אָדער „ביענען־זשעלי“, וועלכע די ניאַנקעס מאַכען אין זייער מאָגען און בריינגען עס אַרויס דורך זייער מויל אַלס שפייז פאַר די לאַרווען. נאכדעם, ווי די לאַרווען ווערען צוויי אָדער דריי טעג אַלט, פאַנגען די ניאַנ־קעס זיי אָן קאָרמענען מיט בלומען־שטויב און מיט האָניג. ענדליך לעגען די ניאַנקעס אַריין אַביסעל שפייז פון דעם וואַקס־קעמערעל, וואו די לאַרווע געפינט זיך און פאַרמאַכט דאָס קעמערעל פון אוי־בען מיט וואַקס. די לאַרווע, פאַלשטענדיג איינגעשלאָסען אין איהר קעמערעל, עסט אויף דאָס ביסעל שפייז, וואָס די ניאַנקע האָט איהר געלאָזען, און פאַנגט אָן זיך אַרומשפּינען מיט אַ שפינ־וועבס הילע. אין פאַרלויף פון דריי טעג פאַרוואַנדעלט זי זיך אין אַ פופע, וועלכע ליגעט אומבאַוועגליך און אָהן עסען דרייצעהן טעג, ווען זי פאַרוואַנדעלט זיך אין אַ פאַלשטענדיגען ביען. דער יונגער ביען ברעכט דאָן אויף דעם וואַקס־דעקעל פון זיין קעמערעל




און קומט ארויס אין ביענשטאָק גרייט צו פארנעמען זיין פלאץ אין דער געזעלשאפט, לויט דעם קלאס צו וועלכען ער באַלאַנגט. נאָר ניט אלע לאַרווען ווערען גלייך ערצויגען און געהאָדער-וועט. פאר מאַנכע לאַרווען מאַכען די ניאַנקעס ספעציעלע קאָ-מערען. זיי ברעכען פאַנאָדער די ווענטלעך פון עטליכע קעמער-לעך און מאַכען איין גרויסען קאמער. די לאַרווע, וועלכע געפינט זיך אין דעם גרויסען קאמער ווערט געשפּיזט בלויז מיט דער נאָר-האפטער „ביענען-זשעלי“, קיין איינפאכע שפּיז, ווי בלומענ-שטויב און האָניג, וואָס עס ווערט געגעבען צו די אנדערע לאַרווען, ווען זיי זיינען צוויי אָדער דריי טעג אַלט, ווערט איהר ניט געגע-בען. פון אזא לאַרווע קומט ארויס א קעניגען.

די איי, פון וועלכער א קעניגען קומט ארויס, איז גלייך מיט אלע אנדערע אייער, פון וועלכע עס קומען ארויס אַרבייטער און דראָנען, זי באַקומט אָבער א געראמען גרויסען קאמער און די לאַר-ווע וואָס קומט ארויס פון איהר באַקומט בעסערע שפּיז, און אַט די בעסערע האָדעוואַניע מאַכע עס, אז פון אַן איינפאכער איי זאָל אַרבייטער א קעניגען.

די דראָנען (זכרים) קומען ארויס פון אונבאפּרוכטע אייער, וועלכע ווערען געלעגט אין גרעסערע קעמערלעך. די קעניגען, וועלכע לעגט די אייער, האָט די פעהיגקייט צו לעגען באַפּרוכטע טע אייער און אונבאפּרוכטע. פון די באַפּרוכטע אייער קו-מען ארויס די אַרבייטער און די קעניגענס, און פון די אונבאפּרוכ-טע — די דראָנען.

ווען אין אַ ביענשטאָק ווערען געבאָרען צוויי אָדער עטליכע קעניגענס, ווערט אין דער ביענען-קאָלאָניע אַ גרויסער גערודער. יעדע ביענען-קאָלאָניע ווערט רעגיערט בלויז פון איין קעניגען, צוויי קעניגענס קענען ניט לעבען אין איין מחיצה. ווען עס באַ-ווייזט זיך בלויז איין נייע קעניגען, פאַרלאָזט געוועהנליך די אַל-טע קעניגען, די מוטער, דעם ביענשטאָק און לאָזט איבער אָהן קאמף די מלוכה צו דער טאַכטער. ווען אָבער עטליכע נייע קע-ניגענען ווערען געבאָרען, דאָן ברעכט אויס צווישען זיי אַ קאמף אויף טויט און אויף לעבען, ביז בלויז איינע פון זיי בלייבט אַ לעבעדיגע. ווען די מלחמה איז געענדיגט, פאַרלאָזט די אַלטע קעניגען דעם ביענשטאָק אין דער באַגלייטונג פון אַ טייל ביענען-אַרבייטער, וועלכע שליסען זיך אָן אָן איהר און פליהען אוועק.

נאך א לענגערע ריזע שטעלען זיי זיך אָפּ אויף א צווייג פון בוים און זאמלען זיך צונויף אין א געדיכטע מאסע, אין א שווארם ווי מען רופט עס. דער ביענען-שווארם לאָזט זיך דאן אַוועק זי-כען א נייע נעסט. געוועהנליך ווערען די דאָזיגע ביענען אויפ-געפאנגען אין א נייעם ביענענשטאָק, וואס ווערט שוין פאר זיי פון פריהער אָנגעגרייט פון די, וואס באשעפטיגען זיך מיט דער האָדעוואניע פון ביענען. ווען קיין ביענשטאָק איז ניט אָנגעגרייט, זוכט זיך דער ביענען-שווארם אויס א לאַך אין א שטאַם פון א טרוקענעם בוים און באַזעצט זיך דאָרטען.



צייכונג 108. — (1) דער קאָפּ פון אַ ביען געזעהען פון פראָנט (זעהר שמאַרק פאַרגרעסערט); (2) דער שטעכער פון ביען (זעהר שמאַרק פאַרגרעסערט). (3) דער שפיץ פון שטעכער (נאָך מעהר פאַרגרעסערט).

ווען דער ביענען-שווארם קומט אַריין אין דעם נייעם ביע-נענשטאָק אדער נעסט, פאנגט זיך גלייך אָן א ריהרעוודיגע אַר-בייט צו גרינדען אַ נייע קאָלאָניע. די אַרבייטער לאָזען זיך גלייך ארויס זאמלען שפיז, זיי פאנגען אָן בויען וואַסקעמערלעך, טאָן אַלע אנדרע נויטיגע אַרבייט, און די קעניגין פאנגט אָן לעגען אייער. אין אַ פאַרלויף פון אַ קורצער צייט ענטוויקעלט זיך אַ גרויסע קאָלאָניע.

ווען עס קומט אָן דער ווינטער און עס ווערט אַ מאַנעל אין

שפייו, באפאלען די ארבייטער־ביענען די דראָנען, די אומזיסטי גע עסער, די ליידיג־געהער און הרג'ענען זיי אויס. עס טרעפט, אז זיי טוען דאָסזעלבע ניט בלוז, ווען דער ווינטער קומט אָן, נאָר אין יעדער צייט, ווען עס ווערט א מאנגעל אין שפייו. דער וואָס ארבייט ניט און וויל עסען פון פרעמדע האָרעוואניע, האָט קיין רעכט ניט צו לעבען — אזוי איז דער יושר פון די ארבייט־טער־ביענען. ווען דער מאנגעל אין שפייו איז זעהר גרויס, ווער רען אויך אויס'נע'הרג'עט די לאַרווען, וועלכע זיינען גרויסע עסערס, אבער זיינען אין זייער אונענטוויקעלטען צושטאַנד ניט פעהיג אויף קיין ארבייט.


די איינציגע קאמפס־וואפע וואס א ביען באזיצט איז א שטער כער אין הינטער־לייב, וועלכער איז פארבונדען מיט א גיפטר־דריי זע. ער שמעקט אריין דעם שטעכער זיינעם אין פלייש פון זיין שונא און לאָזט איהם דאָרטען צוזאמען מיט דעם גיפט. דער שטאָך פון א ביען איז גאנץ שמערצליך. ווען א סך ביענען באַפאלען א מענשען קענען זיי שמעלען זיין לעבען אין געפאהר. דער שטאָך אבער וואס א ביען ניט זיין שונא, קאָסט איהם זיין אייגענער לעבען. אין א טאָג אדער צוויי געזעגענט זיך דער ביען מיט זיין לעבען. שטעכער האָבען בלוז די ארבייטער ביענען און די קענינינס, די דראָנען טויגען אפילו ניט צו שטעכען, ווייל זיי האָבען קיין שטעכער ניט.

די ארבייטער ביענען לעבען ניט לאַנג. די, וועלכע ווערען אויסגעבריהט אין פריהלינג, לעבען בלוז פון צוויי ביז דריי מאָנאט, און די וועלכע קומען אַרויס אין הערבסט, לעבען פון זעקס ביז אכט מאָנאט. דאָס געזעלשאפטליכע לעבען אין דער קאָלאָניע, אָבער, ווערט פאָרטגעזעצט. ווען דער אַלטער דור שטאַרבט, קומט נאָך איהם גלייך א נייער דור. די ארבייט און דאָס לעבען אין דער קאָלאָניע ווערט ניט אָבגעשטעלט. די קענינין לעבט אריבער מעהרערע דורות. ווי לאַנג עס איז דאָס לעבען פון א ביענען־קענינין איז נאָך גענוי ניט באַשטימט. עס ווערט גערעכענט, אז דורכשניטליך לעבען די ביענען־קענינינס פינף יאָהר, עס איז אָבער שוין בעאָבאַכטעט געוואָרען א פאל, ווען א ביענען־קענינין האָט געלעבט פופצעהן יאָהר. א ביענען־קענינין לעגט אויס אין א משך פון א יאָהר אן ערך פון א מיליאָן אייער.

פון די אַנדערע ספעציעס ביענען וועלכע זיינען מעהר באַ-

פאנט, זיינען די „ברום־ביענען“, אָדער „באַמבוס“, ווי זיי ווערען גערופען מיט זייער וויסענשאפטליכען נאָמען, מעהר אָדער וועניגער עהנליך מיט זייער אַרט לעבען צו די האַניג־ביענען. די ברום־ביענען זיינען גרעסער פון די האַניג־ביענען און זיינען באַוואַקסען מיט לענגערע און געדיכטערע האָר פון זיי. ווען זיי פליהען הערט זיך פון זיי א שטארקער ברומען אדער זשווען. קיין האַניג מאַכען זיי ניט, אָבער זיי פיהרען אַ געזעלשאַפטליכען לעבען. דאָס געזעלשאַפטליכע לעבען איז ביי די ברום־ביענען וועגניגער ענטוויקעלט ווי ביי די האַניג־ביענען. זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אין לעכער פון אויסגעפּוילטע בוימער אָדער קלעצער, אין דער ערד אָדער אין אַ פאַרלאָזענע לאַך פון אַ פעלד־מויז. אין ווינטער בלייבט בלויז לעבען די קעניגין, אַלע אַנדערע מיטגלידער פון דער קאָלאָניע שטאַרבן אויס, ווען עס קומט אָן דער הערבסט. אין פריהלינג לאָזט זיך די קעניגין אַרויס זאַמלען בלום־מען־שטויב און בלומען־זאַפט, וועלכע זי קענט צוזאַמען אין איין מאַסע און לעגט אַוועק אין איהר נעסט. ווען זי האָט אָנגעקליבען אַ רעכט ביסעל שפייז, לעגט זי אויס עטליכע אייער. זי לעגט זיי אויף דער אָנגעזאַמעלטער שפייז, און ווען פון די אייער קומען אַרויס לאַרווען, האָבען זיי גלייך זייער נאַהרונג ביי זיך. די לאַרווען וואַקסען אויס, שפיינען זיך שפּעטער אַרום מיט אַ קנויל זיידענע פעדים, פאַרוואַנדלען זיך אין פּופען, פון וועלכע עס קומען אַרויס ביענען. די אַרויסגעקומענע ביענען זיינען אַרבייטער, וועלכע זיינען אין וואַקס עטוואָס קלענער פון דער קעניגין. די אַרבייט פון זאַמלען שפייז געהט דאָן אַריבער צו די אַרבייטער־ביענען. ווען די אַרבייטער זאַמלען אָן אַ געוויסע מאַסע בלומען־שטויב, וועלכע זיי קענען צונויף, מאַכען זיי אין דער צונופּענע קנאַטענער מאַסע קעמערלעך, אין וועלכע די קעניגין פאַנגט אָן לעגען אייער, פון וועלכע עס קומען אַרויס נייע אַרבייטער. ווען דער נעסט איז צו קליין, פאַרגרעסערען איהם די אַרבייטער און אויף אַזאַ אופן ווערט אויסגעבויט אַ גאַנצע קאָלאָניע. אין זומער לעגט די קעניגין אויס אייער, פון וועלכע עס קומען אַרויס זכרים און נקבות. ווען עס קומט אָן דער ווינטער שטאַרבן אַלע אַרבייטער און זכרים אויס, עס בלייבען בלויז די נקבות, די קעניגין, וועלכע לעבען איבער דעם ווינטער, און ווען עס קומט אָן דער

פריהלינג לאָזט זיך יעדע פון זיי אוועק זוכען א נעסט, צו גרינדען א נייע קאָלאָניע.  
 עם זיינען אויך פאראן ביענען וועלכע פיהרען אן איינוואמען, אָפגעזונדרערטען לעבען. דער קליינער, גרינער, "בוי־ביען", למשל, וועלכער בויט זיין נעסט אין מאלינעס בוימלעך, פיהרט ניט קיין געזעלשאפטליכען לעבען, נאָר אן אָפגעזונדרערטען. די נקבה בוי־



צייכונג 110.  
 א נעסט פון א בוי־ער־ביען.




צייכונג 109.  
 א נעסט פון א בוי־ביען.

ערט אויס דאָס האַרץ פון א דיקערען צווייג פון א מאלינעס בור מעל פאר דער לענג פון אן ערך א האלבען פוס און צוטיילט דעם חלל אין עטליכע קעמערלעך, אין וועלכע זי לענט צו איין איי אין יעדען. דאן זאמעלט זי אָן בלומען־שטויב און לענט אריין אין יעדען קעמערעל אזוי פיעל, אז עס זאל זיין נענוג פאר דער לאַר ווע, וואָס וועט ארויסקומען פון איי, גענוג שפייז, ביז זי וועט זיך ענטוויקלען אין אַ ביען און קענען זיך אַליין באַזאָרגען מיט עסען. ווען די נקבה האָט אָפגעטאָן איהר אַרבייט, באזעצט זי זיך אין דעם אויבערשטען קעמערעל פון דעם נעסט און וואַרט ביז די יונגע ביענען וועלען זיך ענטוויקלען און ארויסקומען פון זייער ערע קעמערלעך, דאן פיהרט זי זיי ארויס אין דער ברייטער, פרייער וועלט און יעדער פון זיי פאנגט אן פיהרען א זעלבסטשטענדיגען לעבען אויף זיין אייגענע אהריות.

אינטערעסאנט איז אויך דער „מויערע־ביען“, אָדער דער לייס־גרעבער ביען וועלכער מויערט אָדער גראָבט אויס זיין נעסט אין ליימיגע ערד. די דאָזיגע ביענען לעבען אין גרויסע קאָלאָניעס, אָבער יעדער ביען האָט זיך זיין אייגענעם קעמערעל פאר זיך. יעדע נקבה גראָבט זיך אויס אָדער מויערט זיך אויס אַ קעמערעל פאר זיך, וואָס איז אָפגעטיילט פון אַלע אנדערע, און לענט דאָרטען איהרע אייער און גרייט אָן שפייז, וואָס באַשטעהט פון בלומען־שטויב און בלומען־זאַפט, פאר די לאַרווען, וואָס וועלען פון זיי ארויסקומען. ווייטער זאָרגט זי פאר זיי ניט. און הגם אין איין פלאַץ געפינען זיך אַ סך אזעלכע קעמערלעך ניט ווייט איינע פון די אנדערע, אַ גאנצע קאָלאָניע, דאָך לעבט זיך יעדער פאר זיך און איינער דאנה'ט ניט פאר'ן צווייטען. עס זיינען אָבער פאראן אזעלכע „מויערע־ביענען“, זיי זיינען קלענער געוואַקסען, וועל־כע האָבען שוין יאָ עטוואָס געמיינשאַפטליכעם צווישען זיך. עס פאראייניגען זיך ביי זיי עטליכע נקבות און גראָבען געמיינשאַפט־ליך אויס אַ גרוב, פון וועלכער יעדע פון זיי גראָבט אויס אין דער זייט אַ באַזונדערען קאמער פאר זיך, וואו זי מאַכט זיך איהר היים און לענט איהרע אייער.

די ביענען באלאנגען צו דער זעלביגער גרופע, וואָס די מו־ראשקעס — צו די הימענאָפּטערען, „הויט־פליעגעלדיגע“, ווייל אַויך זייערע פליגלען האָבען דעם אויסזעהן פון אַ דין הייטעל. די וועספּען. — צו די געזעלשאַפטליכע אינזעקטען דאַרפּען


אויך צוגערעכענט ווערען די וועספען אָדער האַרן־ביענען. די וועספען לעבען צוזאַמען אין קאָלאָניעס, וועלכע זיינען איינגע־טיילט אין זכרים, נקבות און אַרבייטער. די וועספען עסען אלעס — פּרוכט, גרינס, אינזעקטען א. א. וו. זייערע נעסטען, אָפּט פאַרשיעדען געבויט, אָבער אלע זיינען געמאַכט פון אַ גרויען שטאַף, וואָס איז אין דער ווירקליכקייט אַ מין פּאַפּיער. מען רופט עס „וועספען פּאַפּיער“. די וועספען קראַצען אָפּ מיט זייערע שטאַרקע קינבאַקען פון אלטע פאַרקאַנס אָדער קלעצער שטיקלעך האַלץ, וועלכע זיי צוקויען און מאַכען אויס דערפון אַ מין פּאַפּיער, וואָס איז עהנליך צו גרויען־פּאַק־פּאַפּיער.



צייכנונג 111. — אַ וועספען־נעסט.

בלויז די נקבות אָדער די קעניגיןס לעבען דורך דעם ווינטער. די זכרים און די אַרבייטער שטאַרבען אויס, ווי דער ווינטער קומט נאָר אָן. ווען עס ווערט פּריהלינג בױט זיך יעדע קעניגין אויס אַ קליינעם רונדליכען נעסט פון „וועספען־פּאַפּיער“, וועלכען זי הענגט אָן אויף אַ צווייג פון אַ בױם, מיט דער עפענונג פון נעסט נאָך אונטען. אין דעם נעסט זיינען אויסגעמאַכט עטליכע זעסס־קאַנטיגע קעמערלעך, ווי אין די נעסטען פון די האַניג־ביענען. ווען די קעניגין איז פאַרטיג מיט איהר נעסט, לעגט זי אויס אין יעד־

דען קעמערעל צו איין איי און לעגט דערביי אוועק אין יעדען קער מערעל אביסעל שפייו, וואָס באַשטעהט פון צוקייטע אינזעקטען אָדער שפינען. די לאַרווען, וועלכע קומען אַרויס פון די אייער, נעהרען זיך מיט דעם שפייו, וואָס זייער מוטער האָט פאַר זיי אָנגעגרייט, וואַקסען אויס, פאַרוואַנדלען זיך אין פופען און ענט- וויקלען זיך אין אַרבייטער-ביענען, וועלכע זיינען עטוואָס קלענער ווי די קעניגין. די אַרבייטער פאַרגרעסערען דעם נעסט און מאַכען אין איהם מעהר קעמערלעך. די קעניגין לעגט צו איין איי אין יעדען ניי אויסגעבויעטען קעמערל, אָבער זי באַזאָרגט זיי שוין מעהר ניט מיט שפייו, דאָס טוען שוין איצט די אַרבייטער. זיי לעגען



צייכנונג 112. — אַ גרעכער וועספע מיט איהר נעסט, וועלכע זי מאַכט אויס פון ערד.

אַריין אין יעדען קעמערעל צוקייטע אינזעקטען אָדער שפינען, כדי די לאַרווען וואָס וועלען אַרויסקומען פון די אייער זאָלען האָבן בען וואָס צו עסען. עס דויערט ניט לאַנג און עס קומט אַרויס אַ ניייער דור אַרבייטער. די קאָלאָניע וואַקסט אין צאָהל און דער נעסט ווערט אַלץ גרעסער, ביז ער באַקומט די פאַרם פון אַ גרויסער לענגליכער פּילקע. דאָס איז דער גוט באַקאַנטער וועספען נעסט, צו וועלכען מען דאַרף זיך ניט אָנריהרען. אויפּרודערען אַ וועספען נעסט איז אַ גאַנץ נעפּעהרליכע זאַך. די וועספען לאָזען זיך אַרויס פון זייער נעסט מיט גרויס צאָרן, באַפּאַלען דעם אָנגרייפּער פון אַלע זייטען און לאָזען אין איהם אַריין זייערע גיפּטיגע שטעכער, וועלכע זיי האָבען אין זייער הינטערלייב.



נאכדעם ווי די קאלאָניע איז אויסגעבויט, לעגט די קעניגין אויס א געוויסע צאָהל אייער, פון וועלכע עס קומען אַרויס זכרים און נקבות. צום סוף פון הערבסט שטאַרבען אַלע זכרים און אַר-בייטער אויס און עס בלייבען בלויז די יונגע קעניגיןס, וועלכע לעבען דורך דעם ווינטער. און ביי דעם אָנקומען פון פרייהלינג פאָנגט אָן יעדע קעניגין בויען אַ נייעם נעסט און פאַרפיהרען אַ נייע קאלאָניע.

עס זיינען אויך פאַראַן גאַטונגען פון וועספען, וועלכע פיהרען אַן אָפגעזונדערטען לעבען. זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אין דער ערד אָדער אין אָפגעטריקענטע בוימער. דאָס זיינען די גרע-בער-וועספען, וועלכע נאָמען אויס טונעלען אין דער ערד אָדער אין בוימער. די נקבה לעגט אויס ביי דעם אינעוועניגסטען ענד פון טונעל אַן איי און באַזאָרגט זי מיט שפייז. אין מאַנכע האָדעוועט די מוטער די לאַרווען, בריינגענדיג פאַר זיי יעדען טאָג פרישע שפייז. אין אנדערע אָבער, זעהט די מוטער קיין מאָל ניט איהר קינד, זי שטאַרבט, אָדער פאַרלאָזט דעם פלאַץ איידער די לאַרווע קומט אַרויס פון איי. אָבער זי באַזאָרגט איהר פאַר'ן שוידען זיך מיט גענוג שפייז, וואָס באַשמעהט פון אינזעקטען און שפיינען.

עס ווערט פון די נאַטור-פאַרשער אָנגענומען, אַז די געזעל-שאַפטליכע אינזעקטען, ווי די מוראַשקעס און די ביענען האָבען דורכגעמאַכט אַ רייהע ענטוויקלונגען ביז זיי זיינען געקומען צו דער שטופע פון אַ געזעלשאַפטליכען לעבען. עס איז אָנצוגעהמען, אַז אַ מאָל האָבען די מוראַשקעס און די ביענען געפיהרט אַ „וויל-דען“ אָפגעזונדערטען לעבען, יעדע מוראַשקע און יעדע ביען האָט געלעבט פאַר זיך. די באַדינגונגען פון זייער לעבען און די אומ-שמענדען אין וועלכע זיי האָבען געלעבט האָט זיי אבער געטריבען דערצו, אַז זיי זאָלען זיך פאַראייניגען אין קאָמונעס און אָנפאַנגען פיהרען אַ געזעלשאַפטליכען, קאָמונאַלען לעבען. ביי אַנ-דערע גאַטונגען איז דאָס דאָזיגע אַרט לעבען שוין זעהר הויך ענטוויקעלט, ביי אַנדערע נאָך וועניג און ביי אַנדערע נאָך גאָר ניט. מען קאָן אין פיעל פרטים פאַרגלייבען די ענטוויקלונג פון געזעל-שאַפטליכען לעבען ביי די מוראַשקעס און ביענען מיט דער ענט-וויקלונג פון געזעלשאַפטליכען לעבען ביי מענשען, אָנפאַנגענדיג פון דעם ווילדען וואַלד-מענש, וועלכער האָט געלעבט אַליין, אָפגע-זונדערט און ענדיגענדיג מיט דעם ענטוויקעלטען געזעלשאַפטליכען

לעבען פון דער ציוויליזירטער מענשהייט, וועלכע מעג נאך א סך לערנען פון די מוראשקעס און פון די ביענען.

די וואַנצען־אינזעקטען. — ניט אלע אינזעקטען, וועלכע באַלאַנגען צו דער וואַנצען משפחה זיינען אזעלכע אַפּשטויסענדע באַשעפעניסען ווי די בעט־וואַנצען, פון וועלכע עס קומט אויס אַפּט אזוי פיעל צו ליידען. א סך פון די פארשידענע אַרטען וואַנצען אינזעקטען זיינען זעהר מיאוסע און עקעלדיגע באַשעפעניסען, אָבער עס זיינען אויך פאַראַן צווישען זיי מאַנכע גאַנץ אינטערעסאַנטע און זאָגאַר העכסט ניצליכע באַשעפעניסען.

די וואַנצען־אינזעקטען באַלאַנגען צו דער אינזעקטען־גרופע העמיערען (האַלב־פּליגעלדיגע). די דאָזיגע גרופע ענטהאַלט אין זיך איבער צוועלף טויזענד פאַרשידענע ספּעציעס אינזעקטען. אַ גרויסער טייל פון זיי באַזיצט צוויי פּאַר פּליגעלען. ביי פיעלע פון זיי זיינען די פּליגעלען ביי זייערע וואַרצלען (וואו זיי וואַקסען אַרויס פון קערפּער) פיעל דיקער, ווי ביי זייערע ענדען. פון דעם קומט דער נאָמען „העמיפּטערען“ — האַלב־פּליגעלדיגע. פיעלע אָבער האָבען אין גאַנצען ניט קיין פּליגעל, זיי געהערען אָבער צו דער העמיפּטערען גרופע צוליב דער קאָנסטרוקציע פון זייער אָרגאַניזם, וואָס איז געמיינשאַפּטליך פאַר אלע אינזעקטען פון דער דאָזיגער גרופע.

צווישען די העמיפּטערען געפינען זיך מעהרערע ספּעציעס, וועלכע זיינען האַלב־וואַסער אינזעקטען, דאָס הייסט, אַזעלכע, וועלכע קענען שווימען אין וואַסער און זוכען דאָרטען מיססענס זייער שפייז. דער אינזעקט, וועלכען מען האָט אַ נאָמען געגעבען דער „שיפּער“, שיפּט זיך אויף דער אויבערפּלעכע פון וואַסער מיט דער הילף פון אַ פּאַר פון זיינע פיס, וועלכע האָבען די פּאַרמע פון רודערס, כדי צו פאַנגען אינזעקטען, וועלכע ער געברויכט פאַר זיין שפייז. מען קען דעם דאָזיגען אינזעקט אַפּט זעהן אויף סאַ־זשעלעס און פּרודען. עטוואַס עהנליך צו דעם דאָזיגען אינזעקט איז דער „ריקווערטס־שווימער“, אויך ער שיפּט זיך אויפֿן וואַסער מיט זיינע רודער־עהנליכע פיס, אָבער ער שיפּט זיך אימער ריקווערטס. ביידע אינזעקטען קענען זיך אונטערטונקען אין וואַסער און בליבען דאָרטען אַ לענגערע צייט אויף זייער געיעג אויף פאַרשידענע וואַסער־אינזעקטען. איידער זיי טונקען זיך אונטער געהמען זיי זיך אָן מיט גענוג לופט, אַז עס זאָל זיי זיין גענוג צו

אָטעמען פאַר דער צייט, וואָס זיי זיינען אונטער'ן וואַסער. אַ נאָהענטער קרוב צו זיי איז דער „וואַסער-וואַנז ריעז“, וועלכער פליהט אַרום ביי נאכט פון איין סאַזשעלעקע צו דער צווייטער. דער דאָזיגער אינזעקט ווערט אויך גערופען „ליכט-וואַנז“, צוליב דעם, וואָס ער ווערט צוגעצויגען פון אַ ליכט-שיין.


צווישען די העמיפטערען זיינען די בויס-גרילען אָדער „ציי-קאדען“, ווי מען רופט זיי, פון די גרעסערע און אויך פון די איינ-טערעסאַנטעדע אינזעקטען. די ציקאדען האָבען מיט זייער אויס-זעהן אַ געוויסע עהנליכקייט צו היישעריקען און מען נעהמט זיי דאָריבער אָפט על פי טעות אָן פאַר היישעריקען, וואָס זיי זיינען ניט. אין די הייסע זומער-טעג הערט מען אָפט אין די פעלדער אַזאַ גרילצענדען געשריי, דאָס לאָזען זיך עס די בויס-גרילען אָדער ציקאדען הערען.

דער בויס-גריל האָט אַ דיקען קערפער, אַ פלאַכען קאָפּ און אויסגעשטאַרצטע אויגען. זיין מויל באַשטעהט פון אַ קאָנוס-פער-מיגען שמעכער, וואָס האָט דאָס אויסזעהן פון אַ דינעם שפיציגען שנאָבעל. מיט דעם דאָזיגען שמעכער זייגט דער אינזעקט די זאפט פון פלאַנצען, מיט וואָס ער שפייזט זיך. די פאָדערשטע פליגלען פון דעם בויס-גריל זיינען עליפטיש (איי-רונד) און זיינען לענגער פון זיין קערפער. זיי זיינען דורכגעוועבט מיט אַן איי-גענטימליכען מוסטער פון דינע אָדערלעך און זיינען גאנץ שטאַרק, גיט קוקענדיג אויף דעם וואָס זיי זיינען זעהר דין און דורכזיכטיג. די הינטערשטע פליגלען זיינען קירצער, עטוואַס דיקער און מעהר הויט-פערמיגער. דער קאָליעו פון די ציקאדען אָדער בויס-גרילען איז געוועהנליך גרין און שוואַרץ פון אויבען און ווייס געפּוּדערט פון אונטען.

די נקבות פון די ציקאדען לעגען זייערע אייער אין די שמעננ-לעך פון ווייכע פלאַנצען. זיי שמעכען אויס לעכעלאך אין די שמעננלעך און שמעקען אַריין אין זייערע עפּנונגען זייערע אויס-געלעגטע אייער. אין אַ פאַרלויף פון זעקס וואָכען ווערען פון די אייער אויסגעבריהט לאַרווען, וועלכע פאַלען אַראָפּ אויף דער ערד, וואו זיי גראָבען זיך איין און נעהרען זיך מיט דעם זאפט פון די וואַרצלען פון בוימער אונגעפעהר אַנדערטהאַלבען יאָהר. דאָן פאַרוואַנדלען זיך די לאַרווען אין פּופען, וועלכע קריכען אין אַנפאַנג זומער אַרויס פון דער ערד אין דער פאַרם פון אומגעלומפערטע

אינזעקטען פון ברוינליכען קאליר און אָהן פליגלען. דאן קריכען זיי ארויף אויף אַ פארקען אָדער אַ שטאַם פון אַ בויס, וואו זיי האַלטען זיך פעסט, ביז עס פלאצט ביי זיי דאָס פופע־הייטעל פאר לענג פון רוקען און א פול ענטוויקעלטער בויס־גריף קומט ארויס. אין אַ משך פון עטליכע שטונדען ווערען די פליגלען פון אינזעקט טרוקען און ער פליהט אַוועק.

ווי עס איז צו באַמערקען איז ביי די ציקאדען די פופע אַ באַ-




צייכונג 118. — די 17־יעהריגע ציקאדא (בויס־גריף) און איהר ענטוויקלונג. א און ב, דער פופען צושטאנד פון דער ציקאדא; ג, די אייער פון דער ציקאדא; ד, די פלאנצע, וועלכע די ציקאדא בויערט אויס פאר איהרע אייער; ה, א פול־ענטוויקעלטע ציקאדא.

וועגליכע און צייגט אַרויס לעבען. עס הייסט, אַז די מעטאמאר־פאָזע (די פאָרם ענדערונג) ביי די ציקאדען איז ניט קיין פאָל־שטענדיגע, זי באַשטעהט ניט פון דריי פאָלשטענדיגע שטופען, ווי ביי די מייסע אינזעקטען. דער פופע צושטאנד איז ביי די צי־קאדען ניט קיין פאָלשטענדיגער.


עס איז פאָראַן אַן אַרט ציקאדען, וואָס די ענטוויקלונג זייערע דויערט זיבעצעהן יאָהר. אנדערע זיינען פאָראַן, וואָס זייער ענט־וויקלונג דויערט דרייצעהן יאָהר.

צו די העמיפטערען, ווי שוין פריהער באַמערקט, געהערען די

פארשידענע וואנצען-אינועקטען און פארשידענע ארטען לייז. די בעט-וואנצען זיינען נאָהנטע קרובים מיט די לייז, וועלכע ציהען זייער חיונה פון דעם קערפער פון מענשען און פון חיות. די בעט-וואנצען און די לייז האָבען ניט קיין פליגלען, אָבער זיי האָבען אלע אנדערע וויכטיגע כאַראַקטעריסטישע אייגענשאַפטען פון די הע-מיפטערען. די לייז קלעפּען אָן זייערע אייער („ניסלעך“) אָן די



צייכנונג 115.  
א פליז (שטאַרק פאַרגרעסערט).



צייכנונג 114.  
א לויז (שטאַרק פאַרגרעסערט).


האָר פון מענשליכען קערפער, וואו זיי מאַכען זיך זייער נעסט, וואו זיי ווערען אין אַ משך פון אַכט טעג אויסגעבריהט. אין לויז קען אין אַ משך פון אַכט וואָכען ברענגען אַ דור פון פינף טויזענדר. די קאָפּ-לייז זיינען וועניגער פרוכטבאַר. דאָס מויל פון דער לויז באַשטעהט פון אַ שפיציגען רעהרעל, מיט וועלכען זי שטעכט דורך די הויט פון קערפער, אויף וועלכען זי לעבט, און זויגט דאָס בלוט. זי האָט אויף אַזעלכע האַקענדליך, מיט וועלכע זי גראָבט זיך אין אין הויט זיך צו האַלטען פעסט, ווען זי זויגט דאָס בלוט.

די בעט-וואנצען לעבען אויף די קערפער פון מענשען און פון פארשידענע חיות און עופות, באַזאָנדערס ביי פלעדערמיין, טויבען, שוואַלבען און היהנער, פון וועלכע זיי זויגען דאָס בלוט. זיי לע-גען זייערע אייער אין די חדשים מערץ, מאי, יולי און סעפטעמ-בער, יעדעס מאָל צו פופציג שטיק. זייערע אייער זיינען דין און לאַנג און זיי לעגען זיי אין די שפאַלטען פון ווענד אָדער פון מע-בעל, הינטער וואַנד-טאַפּעטען, א. ז. וו., אין אַ פאַרלויף פון עלף חדשים ענטוויקעלט זיך פון די אייער אַ נייער דור. די וואנצען קענען אַריבערטראַגען די שטאַרקע קעלט פון ווינטער און בליי-בען לעבען. זיי קענען אויף לאַנג הונגערען. נאָך אַ לאַנגער הונ-גער-צייט ווערען זיי דורכזיכטיג ווי גלאַז. אנדערע ספעציעס וואַנד-צען לעבען פון פלאַנצען. אַ גאַנצע רייהע ספעציעס לעבען אוי-

וואסער. די וואנצען ווערען דאריבער געטיילט אין לאנדוואנצען און וואסער-וואנצען.

די מייסטע פון זיי לאָזען אַרויס פון זיך אַזאַ פליסיגקייט, וואָס האָט זעהר אַ שלעכטען גערוך. דאָס איז וואהרשיינליך זייער שוין־מיטעל געגען פיינד.

עס זיינען אויך פאַראַן פאַרשידענע אַרטען פלאנצ־לייז. זיי לעבען אויף פלאנצען און זייגען אויס זייער זאפט. זייערע הויפט־פיינד איז די זונען־באַבעלקע (משה רבינו'ס קיהעלע). די דאָזיגע באַבעלקע לעגט איהרע אייעלעך אונטער דער הויט פון די פלאנצען־לייז און די לאַרווען, וואָס קומען פון די אייעלעך אַרויס, פּרעסען אויף די פלאנצען־לייז אונטער וועמענס הויט זיי זיינען געבאָרען.




צייכונג 116. — א, א פלאנצען־לייז, זעהר שטאַרק פארגרעסערט; ב, די לאַרווע פון א פלאנצען־לייז, שטאַרק פארגרעסערט; ג, די נאַטירליכע גרויס פון א פלאנצען־לייז; ד, קאָרע־לייז; 1 און 2 שטאַרק פארגרעסערט.

געוואָרען. אנדערע פלאנצען־לייז גיבען אַרויס פון זיך אַ זיסע פליסיגקייט און זיי ווערען געפאנגען פון מוראַשקעס, וועלכע זייגען זיי, ווי עס איז שוין פריהער באַשריבען געוואָרען.

די קאָרע־לייז, וועלכע געפינען זיך אין אינדיען, העלפען שאַ פּען דעם לאַק, וואָס ווערט באַנוצט צו פאַלירען מעבעל. די נקבות שטעכען דורך מיט זייער שנאָבעל די קאָרע פון געוויסע בוימער, פון וועלכע עס רינט אַרויס אַזאַ פעכיגער זאפט פון וועלכען עס ווערט געמאַכט לאַק אָדער וואַרניש.

פון אנדערע ספעציעס קאָרע־לייז ווערט געמאַכט רויטע פאַרב. זיי ווערען געטריקענט און נאַכהער דין צוריען און זיי גיבען אַ גלענצענדען רויטען פאַרב־שטאַף.


פארשידענע ארטען וואנצען און פלאנצען-לייז בריינגען גרוי-  
סע שארען פאר פלאנצען און בוימער. אנדערע פון זיי פארניכטען  
וויין-גערטנער, ווי די פֿי ל אָ ק ס ע ר ע ו, אנדערע פארניכ-  
טען פעלדער מיט תבואה און אנדערע פלאנצען.



צייכנונג 117. — א הויז-פליעג, א, נאטירליכע גרויס;  
ב, זעהר שמאק פארגרעסערט.

די פליעגען. — צווישען די מעהר באקאנטע אינזעקטען,  
וועלכע זיינען פארשפרייט איבער די פארשידענע טיילען פון דער  
וועלט, זיינען די פליעגען. די הויז-פליעג איז די באקאנטסטע  
פון זיי. די פליעגען געהערען צו דער גרופע אינזעקטען, וועלכע

ווערען באַצייכענט מיט דעם נאָמען **ד י פ ט ע ר ע ו**, דאָס מיינט, צוויי פליגעלדיגע. צו דער דיפטערען גרופע געהערען אויך די מוסקען אָדער קאמאַרעס (מאסקיטאָז אין ענגליש) און די פליי. דער קערפער פון דער געוועהנליכער הויז-פליעג באַשטעהט פון דריי הויפט-טיילען : פון אַ קאָפּ, ברוסט-טייל (טהאַראַקס) און בויך. דער קאָפּ פון פליעג איז פאַרבונדען מיט דעם טהאַראַקס דורך אַ קורצען דינעם האַלז. די פוס-טריט פון פליעג האָבען צוויי נעגעל-עהנליכע ענדען, צווישען וועלכע עס געפינען זיך אַזעלכע צוויי הויטע קישעלעך. די דאָזיגע קישעלעך זיינען באַדעקט




צייכונג 118. — א, די נאָטירליכע גרויס פון אַ פליג'ס קאָפּ; ב, אַ פליעג'ס קאָפּ 8 מאל פאַרגרעסערט; 1) די צונויפֿ-געשטעלטע (קאמפּאָנדירטע) אויגען פון אַ פליעג; 2) זיינע אויפצאָגע אויגען; ג, אַ טייל פון זיינע צונויפֿגעשטעלטע אויגען זעהר שטאַרק פאַרגרעסערט; ד, דער פוס-טריט פון אַ פליעג, זעהר שטאַרק פאַרגרעסערט.

מיט דינע האַר-רעהרעלעך, וועלכע גיבען אַרויס פון זיך אַ קלע-פיגע פליסיגקייט, דורך וועלכע די פיס פון פליעג קענען זיך האַל-טען פעסט אויף אַ גלאַטער פלעכע און גיבען דעם פליעג די מעג-ליכקייט אַרומצוגעהן מיט'ן רוקען אַראָפּ און מיט די פיס אַרויף. די פליגלען פון פליעג זיינען דיין און דורכזיכטיג און זיי מאַ-כען פון דריי ביז פיער הונדערט באַוועגונגען אין אַ סעקונדע, ווען דער פליעג האַלט אין פליהען. אונטער די פליגלען האָט דער פליעג צוויי קליינע דינע הויטעלעך, וועלכע עפענען זיך און שליס-סען זיך מיט דער באַוועגונג פון זיינע פליגלען. באַזאָנדערס אינטערעסאַנט זיינען די אויגען פון דעם פליעג,



ווען זיי ווערען באטראכט אונטער א פארגרעסערונגס-גלאז. יעדע פליעג איז צונויפגעשטעלט פון אכט טויזענד זעקס-קאנטיגע פאצעטען (פלעכען). די אויגען זיינען גרויס און פאר-נעהמען דעם גרעסטען טייל פון פליעגס קאפ. אויסער די צוויי גרויסע צונויפגעזעצטע אויגען האט דער פליעג דריי קליינע איינ-פאכע אויגען.

דאס מויל פון דעם פליעג באשטעהט פון א שנויץ-עהנליכען דעהרעל מיט א קנאפ-עהנליכען ענד, וואס איז צוטיילט אין צוויי פלאכע מוסקל-ארגאנען, וועלכע ווערען אנגערופען „לאבעלען“ (ליפען). די דאזיגע ליפען זיינען שארפטיג און פון דעם קומט




צייכונג 119. — די צונג פון א פליעג, זעהר שטארק פארגרעסערט.

דאס אונאנגענעמע געפיהל, ווען א פליעג פאנגט אן לעקען דעם שווייס פון אונזער הויט אין די הייסע זומער-טעג. ווען דער פליעג האט אפגעגעסען זיין מאַלצייט, פארבויגט ער דעם שנויץ זיינעם אונטער זיין קערפער און ער זעהט זיך ניט אָן. די פליעגען לעגען זייערע אייער אין שטאהלען, אין מיסט, אין פארפוילטע גרינסען און פרוכט, א. ז. וו. אין פיער-און-צוואנציג ציג שטונדען ווערען די אייער אויסגעבריהט און עס קומען ארויס פון זיי לארווען, וועלכע זיינען עהנליך צו געלב-ווייסע ווערמלעך אָהן פיס. נאָך פיערצעהן טעג פארוואנדלען זיך די לארווען אין

פופען, וועלכע זעהן אויס ווי ברוינליכע קערנער. אין א משך פון צעהן אָדער צוועלף טעג קומט פון דער פופע ארויס א פּאַלשטענ-דיגער פליעג.

די פליעגען לעבען געוועהנליך ניט מעהר ווי איין זומער, מאַן-כע אָבער פארשטעקען זיך אין שפּאַלטען און אין באַשיצטע פּלע-צער, ווען דער ווינטער קומט אָן און זיי לעבען אַריבער די קאַלטע צייט ביז דער זומער קומט אָן. פיעלע ספּעציעס פליעגען פארברענגען די ערשטע צייט פון



צייכונג 120. — פארשידענע אַרמען פליעגען (בא-  
דייטענד פארגרעסערט). א, דער זעג-פליעג; ב, דער איכניומאן  
פליעג (ווי ער לעגט זיינע אויער אין לעכער פון בוימער, וואו  
עס געפינען זיך די לאַרווען און פופען פון אַנדערע אינזעקטען);  
ג) דער גאַלעס-פליעג; ד, דער פּערד-פליעג.

זייער לעבען, ווען זיי זיינען לאַרווען, אין וואַסער אָדער אין זומפּען.  
די לאַרווען פון דער „רינדער-פליעג“ גראָבען זיך אין אונט-  
טער דער הויט פון פאַרשידענע בהמות און נעהרען זיך מיט דעם  
זאַפט פון זייערע קרבנות. די דאָזיגע לאַרווען מאַכען אייטערדיגע  
געשווירען אין דער הויט פון די בהמות, וואו זיי האָבען זיך באַ-  
זעצט און פאַרשאַפען זיי גרויסע שמערצען. אין אַ מאָנאַט אָדער  
צוויי פאַרלאָזען די לאַרווען זייער נעסט, פאַלען אַראָפּ אויף דער

ערד, וואו זיי גראָבען זיך איין ביז זיי מאַכען דורך דעם פּופּען צושטאנד.

מאָנכע ספּעציעס פליענען זיינען גרויסע בלוט־זויגער. עס ליידען באַזאָנדערס פון זיי חיות און בהמות, וועלכע קענען זיך פון זיי ניט אָפּוועהרען. צווישען די דאָזיגע בלוט־זויגער איז דער פּערד־פליעג אָדער בייס־פליעג איינער פון די באַקאנטעסטע, ער האָט אַ שאַרפּען שפיציגען שנאָבעל, מיט וועלכען ער שטעכט דורך די הויט פון זיין קרבן און זויגט זיין בלוט. ווען אַ גרויסע מחנה בייס־פליעגען באַפּאלען אַ פּערד אָדער אַ קוה קענען זיי אָפט מאַך כען אַ סוף פון דעם לעבען פון זייער קרבן.

געפּעהרליך זיינען בלויז די נקבות פון די דאָזיגע פליעגען. די זכרים בייסען ניט און זיינען ניט קיין בלוט־זויגערס. די זכרים נעהרען זיך מיט האָניג.

באַראַקטעריסטישע פליעגען זיינען די „איכנימאָן“ פליעגען. זיי לעגען זייערע אייער אין די לאַרווען און פּופּען פון אַנדערע אינוועקטען, און ווען די לאַוורע פון דער איכנימאָן פליעג קומט אַרויס פון איי, פּרעסט זי אויף די לאַרווע אָדער די פּופּע פון דעם אינוועקט אין וועלכען זי געפינט זיך.


אינטערעסאַנט זיינען אויך די „זעג־פליגען“. זיי האָבען אונ־טער זייער בויך אַ קרעפטיגען בויערער, מיט וועלכען זיי בויערען אויס לעכער אין בוימער, וואו זיי לעגען זייערע אייער.

אַ נוצליכער פליעג איז דער „גאַלעס פליעג“. ער פּראָדוצירט עס די „גאַלעס־נים“, פון וועלכע עס ווערט געמאַכט שוואַרצע טינט. די „גאַלעס־נים“ זיינען אין דער אמת ניט קיין נים, נאָר זיי ווערען פּראָדוצירט פון די בלעטער פון דעמבעס (אייכען בוימער) דורך די גאַלעס פליגען.

די מוקען אָדער קאַמאַרעס. — אַן אַנדער גוט באַקאנטער אינוועקט, וועלכער באַלאַנגט צו דער גרופּע דיפּטערען, איז דער מוק אָדער קאַמאַרע (מאַסקיטאָ). דער מוק איז מיט זיין שלאַנקען גראַציעזען קערפּער איינער פון די שענסטע אינוועקטען, אָבער ווען מען דערמאַנט זיך אָן זיין גיפטיגען דינעם שטעכענדען שנאָבעל, פאַרגעסט מען ווענען זיין גראַציעזען אויסזעהן. דער מוק האָט אַ רונדען קאָפּ מיט צוויי גרויסע צוזאַמענגעזעצטע אויגען, און מיט צוויי לאַנגע, דינע פיהל־הערנער (אַנטענען). ער האָט זעקס


לאנגע, דינע פיס און צוויי פליענגלען, וואָס זייערע ראַנדען זיינען באַזוימט מיט דינע זיידענע הערעלעך.

דער שנאַבעל אָדער דער שטעכער פון דעם מוק, מיט וועלכען ער שטעכט דורך די הויט און זויגט דאָס בלוט פון זיינע קרבנות, איז צונויפגעשטעלט פון עטליכע טיילען. ווען מען באַטראַכט דעם שנאַבעל פון מוק אונטער אַ גומען פאַרגרעסערונגס-גלאַז זעהט מען, אַז ער באַשטעהט פון דריי שטעכער און פון אַ דריי-טייליגען שייך, וועלכער באַדעקט זיי. ווען דער מוק פאַלט אָן אויף זיין קרבן, עפענט ער דעם שייך פון זיין שנאַבעל און לאָזט אַרײַן די דריי שטעכער אין זיין קרבן'ס הויט און פאַנגט אָן זיינען זיין בלוט. ווען ער האָט זיך אָנגעזויגען, פאַרמאַכט ער צוריק דעם שייך און באַהאַלט אין איהם זיינע שטעך-און זויג אינסטרומענטען.



צייכנונג 121. — דער שנאַבעל פון דעם מוק און זיינע טיילען. א, דער שנאַבעל איינגעשלאָסען אין זיין שייך, שטאַרק פאַרגרעסערט; ב, די נאַטירליכע גרויס פון שנאַבעל; ג, דער שנאַבעל פון מאַסקיטאַ, ווען זיין שייך איז אָפּען. (1 דער שייך; 2 די דריי לאַנצעטען (שנייד-מעסערלעך) פון שנאַבעל; 3 די שוידעקלעך פון די לאַנצעטען.)

די ענטוויקלונג אָדער די לעבענס-נעשיכטע פון אַ מוק איז אַ גאַנץ אינטערעסאַנטע. די נקבה לעגט איהרע אייער אין וואַסער. די אייער האַלטען זיך צוזאַמען און בילדען די פּאַרם פון אַ שיפעל, וועלכע שווימט אַרום אויפ'ן וואַסער. אין אַ פאַרלויף פון עטליכע טעג ווערען די אייער אויסגעבריהט און עס קומען אַרויס פון זיי לאַרווען, וועלכע זיינען גרויסע פרעסער. ווען די לאַרווען רוהען, האַלטען זיי זיך נאָהענט צו דער אויבערפלעכע פון וואַסער מיט די קעפלעך אויף אַרונטער. זיי אַטעמען דורך אַ רעהרעל, וואָס זיי האַבען אין דעם ענד פון זייער הינטערלייב, וואָס זיי האַל-טען אַרויסגעשטעקט פון וואַסער. נאכדעם ווי די לאַרווען בייטען



צייכונג 122. — די ענטוויקלונג פון אַ מוק (קאמאר). א, דער מוק לעגט זיינע אויער אין וואַסער; ב, די אויער פון דעם מוק (שטאַרק פאָרגרעסערט) באַהעפּט איינע צו די אַנדערע און דינט אַלס אַ פּלים צו שווימען אויפ'ן וואַסער; ג, די לאַרווע פון מוק אין וואַסער מיט'ן קאַפּ אַראָפּ; ד, די פּופּע פון מוק אין וואַסער; ה, דער יונגער מוק קריכט אַרויס פון זיין פּופּען צושטאַנד; ו, אַ פּאַלשמענדיג ענטוויקעלטער מוק (אַלע שטאַרק פּאָרגרעסערט).

זייער הויט צוויי אָדער דריי מאָל, פאנגען זיי זיך אָן צו פאר-  
וואנדלען אין פופען. דער קאָפּ און טהאָראַקס (ברוסט־טייל) פון  
דעם אינווקט ווערט דאָן גרעסער און פון דעם ענד פון זיין הינטער-  
לייב וואַקסען אַרויס צוויי בלעטער-עהנליכע עקלעך, וועלכע דיענען  
איהם אַלס שווימ־רודער, פאַר דער צייט, וואָס ער געפינט זיך אין  
פופען צושטאנד. אין עטליכע טעג אַרום פלאצט די פופען הויט  
און עס קומט אַרויס אַ פול ענטוויקעלטער מוק. דער נייגעבאָרע-  
נער מוק שטעלט זיך דאָן אוועק אויף דער פופען־הויט, וואָס ער  
האַט פון זיך אַראָפּגעוואָרפּען, און ווארט אָפּ ביז זיינע פליעגלען  
ווערען איהם טרוקען און ער געזעגענט זיך מיט'ן וואַסער און  
פליהט אוועק. נאנץ אָפט אָבער פאַרליערט דער מוק זיין לע-  
בען, איידער ער באַווייזט אוועקצופליהען. דאָס פופען־הייטעל  
אויף וועלכען דער מוק שטעלט זיך אוועק צו טריקענען זיינע  
פליגלען קען זיך איבערקעהרען ביי דער קלענסטער שטערונג און  
דער מוק פאלט דאָן אַריין אין וואַסער און ווערט דערטרונקען.  
די מוקען קענען זיך דאַריבער ענטוויקלען בלויז אין שטעהענדער,  
רוהיגע וואַסערען און אין זומפּען. אין פליסענדע און שטראָ-  
מענדע וואַסערען קענען זיי קיין תקומה ניט האָבען.

בלויז די נקבות זיינען עס די בייסענדע און בלוט־זויגענדע  
מוקען; די זכרים בייסען ניט, זיי ליגען באהאלטען אין די  
וועלדער און לעבען בלויז אַ קורצע צייט.

מאנכע ספעציעס פון די מוקען פאראורזאכען מיט זייער ביס  
די מאַלאַריע קראַנקהייט.

די פליי. — מאנכע זאָלאָגנען רעכענען צווישען די דיפּטערען  
אויך די פליי, הגם זיי האָבען קיין פליגלען. אנדערע ווידער רעכע-  
נען די פליי אַריין אין דער העמיפּטערען אָדער אַרטהאָפּטערען גרופּ-  
פּען, וועלכע זיינען פריהער באַשריבען געוואָרען. די נייערע  
זאָלאָגנען האָבען פאַר די פליי געשאַפּען אַ ספּעציעלע גרופּע מיט  
דעם נאמען ס י פ א נ א פ ט ע ר ע ן.

דער פליי איז אַ קליין באַשעפּעניש מיט אַ צונויפגעדריקטען  
קערפּער, אָבער אין פּערהעלטניס מיט זיין גרויס איז ער זעהר  
שטאַרק. די קראַפט פון אַ פליי קען מען באַגרייפּען פון זיין  
שפּרינגען. דער פליי קען מאַכען אַ שפּרונג וואָס איז פון צוויי  
ביז דריי הונדערט מאָל גרעסער ווי די הויף פון זיין קערפּער. ווען

א מענש זאָל האָבען אזא קראפט צו שפּרינגען, וואָלט ער געקענט מאַכען א שפּרונג פון אן ערך 15 הונדערט פּוס.


די פּליי לעבען געוועהנליך אין די פעלען פון חיות. א גוט זואַליגע פעל פון א הונד איז פאַר פּליי זעהר א באַקוועמע דירה. און פון די פעלען פון די חיות קלייבען זיי זיך איבער אין קליי-דער און בעטגעוואנד פון מענשען.

די פּליי לעגען זייערע אייער אין די וואָל אָדער האָר פון זייער רע קרבנות, ביי וועלכע זיי האָבען זיך אויסגעקליבען צו מאַכען זייער נעסט. די אייער פאַלען אַראָפּ אויף דער ערד און אין זעקס טעג ווערט פון זיי אויסגעבריהט לאַרווען, וועלכע נעהרען זיך מיט דעם שטאָפּ פון פאַרפּוילטע גרינסען אָדער פאַרפּוילטע חיות. אַם בעסטען ווערען די אייער אויסגעבריהט אין שטויביגע אָדער זאַמ-דיגע ערד. נאָך צוויי וואָכען פאַרוואַנדלען זיך די לאַרווען אין פּופּען. דער פּופּען-צושטאנד דויערט פון צעהן טעג ביז צוויי וואָכען ביז עס ענטוויקעלט זיך פון זיי פּאָלשטענדיגע פּליי, וועלכע באַזעצען זיך אין די האָר פון חיות אָדער פון מענשען און זייגען זייער בלוט.

עס איז דאָ ניט מעגליך צו באַשרייבען די אונגעהייער גרויסע צאָהל פאַרשיידענארטיגע אינועקטען. עס האָט דאָ בלויז געקענט אָנגעגעבען ווערען די אַלגעמיינע כאַראַקטעריסטיק פון די פאַר-שידענע אינועקטען און אויף זייער ענטוויקלונג, וועלכע האָט א גרויסע עהנליכקייט ביי אַלע פון זיי. די מייסטע אינועקטען, באַזאָנדערס פון די העכערע פּאַרמען, ווערען ניט געבאָרען אין דעם געשטאַלט פון זייערע עלטערען. די מייסטע אינועקטען מאַכען דורך דריי שטופּען פון ענטוויקלונג, אָדער מעטאמארפּאזען: דעם לאַרווען צושטאנד, דעם פּופּען צושטאנד און דעם אימאַגאָ צו-שטאנד (דער צושטאנד פון פּאָלשטענדיגער אויסבילדונג, ווען דער אינועקט באַקומט די געשטאַלט פון זיינע עלטערען). עס ווערט ניט געבאָרען אַ קליין פּליעגעלע פון וועלכער עס וואַקסט אויס א גרויסער פּליעג, נאָר עס ווערט פון איי געבאָרען אַ ווערימעל, אַ לאַרווע, פון וועלכער עס ענטוויקעלט זיך שפּעטער אַ פּאָלשטענדיג ערוואַקסענער פּליעג. דאָס וואַקסען פון דעם אינועקט קומט הויפּט-זעכליך פאַר אין זיין לאַרווען-צושטאנד אָבער ניט אין זיי! אימאַגאָ צושטאנד. די קליינע פּליעגעלעך, למשל, וואָס מיר זעהען, וואַקס-ען שפּעטער ניט אויס אין גרויסע פּליעגען. זיי זיינען אין דער

ווירגליכקייט פול ענטוויקעלטע פליענען, זיי זיינען א באזונדער ארט פליענען פון קליינעם וואוקס.

שמעטערלינגען און מאַמען. — די שענסטע און די אינערסטאנטעסעטע אינוועקטען זיינען די שמעטערלינגען און די מאַמען. זיי געהערען צו דער גרופע לעפידאפטרען. וואָס דאָס מיינט „שופען־פליגעלדיגע“, צוליב די שופען, וועלכע באַדעקען זייערע פליגעלען. מיט'ן נאָקעטען אויג קען מען די שור פען ניט זעהן, מיט אַ גוטען פאַרגרעסערונגס־גלאַז אָבער זעהט מען קלאַר, ווי דער מעהליגער שטויב וואָס באַדעקט די פליגעלען פון די שמעטערלינגען אָדער מאַמען באַשטעהט פון קליינע שופען. די צאָהל פון די פאַרשיעדענע ספּעציעס שמעטערלינגען און מאַמען איז אַ זעהר גרויסע. מען רעכענט, אַז עס זיינען פאַראַן



צייכנונג 123. — א, דער בערג־שמעטערלינג מיט צוויי פליגעלען; ב, אַ שטאַרק פאַרגרעסערטער טייל פון אַ שמעטערלינג פליגעל, וואו מען קען זעהן די שופען.

איבער 100 טויזענד שמעטערלינגען ספּעציעס. זיי זיינען פאַרשיעדען אין זייערע פאַרבען און אין זייער גרויס. עס זיינען פאַראַן שמעטערלינגען, וועלכע זיינען אזוי גרויס, דאָס פּינ דעם שפיץ פון איין פליגעל ביז דעם שפיץ פון צווייטען פליגעל איז מעהר ווי זעקס צאָל (אינטשעס), און עס זיינען פאַראַן אזעלכע קליינע שמעטערלינגען, וועלכע זיינען קלענער ווי פליגעלען. די שמעטערלינגען זעהט מען אַרומפליהען בייטאָג, אין זון־נען־שיין, וועהרענר די מאַמען באַווייזען זיך מייסטענס פאַרנאכט, בין־השמשות, אָדער ביינאכט. עס זיינען אָבער אויך פאַראַן אייניגע ספּעציעס מאַמען, וועלכע פליהען אַרום אויך בייטאָג, אין פולען זונען־שיין.



דאָס מויל פון די שמעטערלינגען און מאָטען איז איינגע-  
 אָרדענט צום זויגען. זיי האָבען אזא לאַנגען זויגטרייבעל, וואָס  
 דרעהט זיך צונויף ווי אַ ספּיראלע. זיי נעהרען זיך מיט דעם  
 זאָפט פון בלומען, וועלכען זיי זויגען אויס מיט זייער לאַנגען זויג-  
 אָרנאָן פון די בלומען-בעכערלאך.


די שמעטערלינגען און די מאָטען האָבען צוויי פּאָר פליגלען.  
 די שמעטערלינגען האַלטען זייערע פליגלען, ווען זיי פליהען ניט,  
 צונויפגעלעגט איינע צו די אנדערע און אויסגעשטעלט איבער  
 זייער רוקען. די מאָטען האַלטען זייערע פליגלען אויסגעשפּרייט,  
 ווען זיי רוהען.

די ענטוויקלונג פון די שמעטערלינגען און מאָטען איז אַ  
 פּאָלשטענדיג מעטאָמאָרפּאָזישע, דאָס הייסט, זיי מאַכען דורך אַלע  
 ענדערונגען פון דעם לאַרווען-צושטאַנד ביז דעם אימאַנאַ צושטאַנד  
 און זיינען אין יעדען צושטאַנד פּאָלשטענדיג פאַרשיעדען.

פון די אייער, וואָס די שמעטערלינג נקבה לעגט אויס אויף די  
 בלעטער פון בוימער אָדער פּלאַנצען, קומען אַרויס לאַרווען, אַזעל-  
 כע ווערם, פון פאַרשיעדענע קאָלירען מיט גרויסע קעפּ, וועלכע  
 האָבען קיין שום עהנליכקייט ניט צו שמעטערלינגען. די דאָזיגע  
 ווערם האָבען אַ גוט ענטוויקעלטען מויל צום עסען און זיי שפּיי-  
 זען זיך מיט די בלעטער פון די בוימער, וואו זיי זיינען געבאָרען  
 געוואָרען. זיי וואַקסען שנעל און בייטען עטליכע מאָל זייער הויט,  
 וועלכע ווערט זיי צו ענג, ווען זיי ווערען גרעסער. בייטענדיג  
 זייער הויט בייטען זיי אויך אָפט זייערע קאָלירען. די מייסטע  
 פון זיי זיינען באַוואַקסען מיט האָר, אנדערע האָבען הערנער און  
 פאַרשיעדענע אנדערע אַרויסשטאַרצונגען. ווען מען זעהט אַט  
 די דאָזיגע ווערם אין זייערע פאַרשיעדענע פּאָרמען און מען ווייס  
 ניט וועגען די מעטאָמאָרפּאָזען וואָס אינזעקטען מאַכען דורך אין  
 זייער ענטוויקלונג, קען עס אַפילו ניט איינפאַלען, אַז פון זיי וועלען  
 זיך ענטוויקלען אַזעלכע שענהע, פיעל-פאַרביגע, פראַכטפולע  
 שמעטערלינגען.

ענדע זומער, אונגעפעהר ענדע יולי אָדער אנפאַנג אויגוסט,  
 פאַנגען די לאַרווען אָן זיך צו פאַרוואַנדלען אין פּופען. דער לאַר-  
 ווען-וואָרם זוכט זיך אויס אַ געשיצטען פּלאַץ אויף אַ שטענגעל,  
 אַ שטאַם פון אַ בויס, אָדער אַ שטעהענדע ברעט, און שפּינט זיך  
 אַרום מיט עטליכע זייד-פּעדים, וועלכע ער באַפעסטיוגט צו דעם

געגענשטאנד, וואָס ער האָט אויסגעקליבען. צוערשט באַפעסטעט ער מיט די זייד-פּעדיס זיינע הינטערשטע פּיס, און נאָכדעם מאַכט ער אַ שלייף איבער דעם מיטען פּון זיין קערפּער און בלייבט אזוי הענגען מיט'ן קאָפּ אַרויף. דאַן וואַרפט ער אַראָפּ פּון זיך זיין הויט און פאַרוואַנדעלט זיך אין אַ פּופּע אָדער אין אַ קריסאָליס, ווי מען רופּט דעם פּופּען-צושטאַנד אין דער ענטוויקלונג פּון די שמעטערלינגען. די נייע פּאַרמע, וואָס דער אינזעקט האָט אָנגענומען, איז אין גאַנצען ניט עהנליך צו זיין פּריהערדיגען אויס-




צייכנונג 124. — די ענטוויקלונג פּון אַ שמעטערלינג. א, די לאַרווע אָדער שמעטערלינג וואָרם; ב, די פּופּע אָדער קריסאָליס (ווי זי האָט זיך צוגעבונדען מיט אַ זיידען-פּאַדים און אַ שטיק האַלץ); ג, די אימאַגאָ (דער פּאַלשטענדיג ענפּ-וויקלטער שמעטערלינג).

זעהן. ער זעהט אויס ווי אַ גאַנץ אַנדער באַשעפעניש. אין דעם קריסאָליס צושטאַנד זעהט אויס דער אינזעקט צו זיין אין גאַנצען לעבענסלאָז, ער צייגט ניט אַרויס קיין שפּורען פּון לעבען. ער בלייבט אזוי עטליכע וואָכען, אָפּט דעם גאַנצען ווינטער, ביז עס פּלאַצט דאָס הייטעל פּון דער פּופּע און עס קומט אַרויס אַ שמעטערלינג. זיין קערפּער איז אָבער נאָך שוואַך און זיינע פּליגלען זיינען קליין און צונויפגענייטשט. עס דויערט אָבער זעהר ווער ניג און זיינע פּליגלען שפּרייטען זיך אויס, באַקומען זייער פּולע גרויס און דער שמעטערלינג איז פּאַלשטענדיג ענטוויקעלט.

די זכרים פון די שמעטערלינגען האָבען מייסטענס שענהערע און בונטערע קאָלירען ווי די נקבות. דאָס לעבען פון די שמעטערלינגען איז קורץ. מייסטענס ענדיגט זיך זייער לעבען גלייך נאָך דער געשלעכטליכער פּאַרונג.

די מאַטען מאַכען דורך אַן עהנליכע ענטוויקלונג, ווי די שמעטערלינגען. זיי שיידען זיך בלויז אונטער פון די שמעטערלינגען אין זייער פופען-צושטאנד. די פופע אָדער קריסאליס פון אַ שמעטערלינג איז ווינקעלדיג און קאנטיג, וועהרענד די פופען פון די מאַטען זיינען לאנגדורנדליך און מייסטענס גלאט. ביי פיעלע ספעציעס פון די מאַטען שפינען זיך די לאַרווען אַרום מיט




צייכונג 125. — דער ריעזען-מאַט אָדער האַביכט-מאַט (דער גרעסטער מאַט, וואָס עקזיסטירט). א, די לאַרווע; ב, די פופע; ג, די אימאַגאָ (דער פול ענטוויקעלטער מאַט).

אַ קנויל זייד-פּעדים אָדער שפינוועבס איידער זיי פארוואנדלען זיך אין פופען. דער דאָזיגער זיידען-פּעדים אָדער שפינוועבס-קנויל ווערט אָנגערופען קאַקאָן. ווען דער מאַט איז שוין אין גאַנצען ענטוויקעלט מאכט ער אַן עפּונג אין דעם קאַקאָן און קריכט פון איהם אַרויס. אין אַ פּאַרלויף פון עטליכע שטונדען ווערען זיינע פליגלען טרוקען, זיי שפּרייטען זיך אויס און ער פליהט אַוועק.

די זיידען-ווערס זיינען די לאַרווען פון מאַטען, וועלכע לעגען זייערע אייער אויף די בלעטער פֿין מוילכער בוימער. די לאַרווען, וועלכע קומען אַרויס פון די דאָזיגע אייער וואקסען שנעל אויס אין

גרויסע ווערם און פרעסען מיט גרויס אפעטיט די מוילכער בלעך טער. נאכדעם שפינען זיי זיך ארום מיט א קנויל זיידען-פעדים, מיט א קאקאן, וואו זיי פארוואנדלען זיך אין פופען. די זיידען ווערם ווערען געהאדעוועט פאר דער פאבריקאציע פון זייד. די קאקאנען אָדער פעדים-קנוילען, מיט וועלכע זיי שפינען זיך ארום, ווערען אָפגעוויקעלט און בעארבייט און עס ווערט פון זיי געוועבט זיידען-שטאף.

די ענטוויקלונג פון א שמעטערלינג אָדער פון א מאַט אין לייכט נאָכצופאָלגען, ווען מען נעהמט איינעם פון די קרויט-ווערם




צייכונג 126. — די ענטוויקלונג פון א זיידען מאַט. א, אַ פּאַלשטענדיג ענטוויקעלטער זיידען-מאַט; ב, ג, ד, די לאַרווע (דער זיידען-וואַרם) אין פאַרשיידענע צושטענדען פון זיין ענטוויקלונג; ה, ז, דער זיידען-קאקאן און די פופע; ח, די אייער פון מאַט.

אָדער פּרוכט-ווערם, וועלכע זיינען די לאַרווען פון שמעטערלינגען אָדער מאַטען און מען לעגט זיי אַריין אין אַ גלאַז מיט עטליכע בלעטער פון די בוימער אָדער פון דער קרויט, פון וואָנען מען האָט דעם וואָרם גענומען. דאָס גלאַז באַדעקט מען פון אויבען מיט אַ פּאַפּיער, אין וועלכען מען מאכט עטליכע קליינע לעכער, כדי עס זאָל קענען אַריינקומען לופט אין גלאַז. מען קען דאָן נאכפּאָלגען די מעטאמארפּאָזען (די ענדערונגען), וועלכע דער וואָרם מאכט דורך ביז ער ענטוויקעלט זיך אין אַ שמעטערלינג אָדער אין אַ מאַט.

די לארווען, דאָס הייסט, די ווערם, פון די מייסטע שמעטער-לינגען און מאַטען בריינגען זעהר פיעל שאַדען אין די גרינס און פרוכט גערטנער.

די עפעל-ווערם, למשל, זיינען לאַרווען פון מאַטען, וועלכע לעגען זייערע אייער אין דעם „אויגעל“ אָדער אין דעם בעכערעל פון דעם אויבערשטען טייל פון עפעל, וואו די הויט פון עפעל איז ווייך. דאָס ווערימעל, וואָס ווערט אויסגעבריהט פון איי, בויערט דורך דעם עפעל ביז זיינע יאָדערס, וואו ער מאכט זיך זיין נעסט




צייכנונג 127. — דער שוואַלבערעק טיגער שמעטערלינג.

אין ענטוויקעלט זיך. ער בויערט דערביי דורך אַ קאנאל פון דעם האַרץ פון עפעל צו דער זייט פון עפעל דורך וועלכען ער שטויסט אַרויס די אַבפאַל פון זיין שפייז. ווען דער עפעל פאלט אַראָפּ פון בוים, קריכט דער וואָרם אַרויס דורך דער עפנונג פון קאנאל, פאַר-לאָזט דעם עפעל און פאַנגט זיך אָן פאַרוואַנדלען אין אַ פופען צושטאַנד. דער מאַט, וואָס ענטוויקעלט זיך פון איהם, איז אַ קליינער מיט בריווע פליגלען, פון וועלכע די פּאָדערסטע זיינען טונקעלער ווי די הינטערשטע.

דער קליידער-מאַט, וואָס צופרעסט און מאכט אזוי פיעל שא-דען אין קליידער, טעפּיכער און אין פעלצוואַרג, איז אַ קליינער

אינזעקט פון א זילבער-גראָהליכען אָדער העל-ברוינעם קאָליר. די נמכה לענט איהרע אייער אין וואָל, וואָלען-שטאָף, פעלץ, האָר און אין פערערען. אין א וואָך צייט קומען פון די אייער אַרויס די לאַרווען, וועלכע פאנגען אָן עסען די וואָל, פעלץ אָדער פערערען וואו זיי געפינען זיך. דערביי מאַכען זיי אויס אַרום זיך פון דעם שטאָף, וואָס זיי עסען, אַ שיידעל, וואָס האָט דאָס אויסזעהן פון אַ צילינדער, וועלכער איז פון ביידע זייטען אָפען. ווען די לאַרווע וואקסט אויס גרעסער און דער צילינדער-שיידעל ווערט פאַר איהר צו קליין, שפאלט זי איהם פונאנדער און שטעלט אין איהם אַרין אַ קליין פון דעם זעלבען שטאָף, פון וועלכען זי האָט דעם שיידעל געמאַכט. די לאַרווע טראָגט דעם צילינדער-שיידעל אימער מיט זיך און אין איהם קומט אויך פאַר איהר פאַרוואנדלונג אין אַ פופע און נאכדעם אין אַ מאַט.



צייכנונג 128. — דער ספינקס מאַט.

ווי עס איז שוין אויבען באַמערקט געוואָרען איז די צאָהל ספעציעס פון שמעטערלינגען און מאַטען אַ גאַנץ גרויסע, אָבער ווי גרויס עס זאָל ניט זיין דער אונטערשיעד אין זייער אויסזעהן, אין זייער גרויס און אין זייערע פראכטפולע קאָלירען זיינען זיי אַלע זעהר עהנליך אין דעם געבוי פון זייער אָרגאַניזם און אין זייער ענטוויקלונג. אַלע שמעטערלינגען און מאַטען מאַכען דורך אַ פאָלשטענדיגע מעטאמארפאָזע אין זייער ענטוויקלונג, אַלע פון זיי מאַכען דורך דעם לאַרווען-צושטאנד, דעם פופען-צושטאנד און דעם אימאַגא צושטאנד. אין די יאָזיגע דריי פעריאָדען פון ענט-וויקלונג קומען פאַר אין דעם אינזעקט אַ גאַנצע רייע ענדערונגען, אין זיין אויסערליכען אויסזעהן און אין זיין אָרגאַניזם. אין יעדען צושטאנד פאַסען זיך זיינע אָרגאַנען צו צו דעם ארט לעבען, וואָס ער דאַרף פיהרען.

## פופצעהנמער קאפיטעל.

די הויפט סמנים פון די ווירבעל־חיות. — ענטוויקלונגס־פארשועדעני־  
היימען. — די גלויכהייט פון אלע באשעפענישען אין דעם אָנפאנג  
פון זייער ענטוויקלונג. — די אָפּשטאַמונג פון די ווירבעל־חיות. —  
די טונקאמען אדער ים־שפּריצער.

## כאָרדאַטען אָדער ווערטעבראַטען (ווירבעל־חיות)

הויפט סמנים. — אַלע לעבעדיגע באשעפענישען ווערען  
איינגעטיילט אין צוויי גרויסע הויפט־גרופען: ווערטעבראַטען  
(חיות מיט אַ רוקענביין) און אינווערטעבראַטען (חיות אָהן אַ  
רוקענביין). די אַלע באשעפענישען, וועלכע זיינען ביז איצט  
באשריבען געוואָרען, געהערען צו די אינווערטעבראַטען, קיינע פון  
זיי האָט אַ רוקענביין אָדער חוט השרדה. די פאַרשיידענע מינים  
באשעפענישען, וועלכע וועלען דאָ ווייטער באשריבען ווערען, גע־  
הערען אַלע צו דער גרופע ווערטעבראַטען, אָדער ווירבעל־חיות.  
זייער הויפט־סמן איז, וואָס כמעט אַלע פון זיי האָבען אַ רוקענביין,  
אָדער ווירבעל־ביין.

דער מעהר וויסענשאפטליכער נאָמען פאַר דער דאָזיגער אָפּ־  
טיילונג איז „כאָרדאַטען“. דער נאָמען „כאָרדאַטען“ נעהמט אַריין  
אין זיך אויך יי ברואים, וועלכע האָבען נאָך ניט קיין פּאָלשטענ־  
דיגען ענטוויקעלטען רוקענ־ביין, זיי האָבען בלויז אַ כאָרדע, אַזאַ  
כראָמסקעדיגע כטרונע אַנשטאַט אַ רוקענ־ביין. די צאָהל פון די  
דאָזיגע באשעפענישען איז אָבער ניט קיין גרויסע און מיר וועלען  
זיך דעריבער מעהר באנוצען מיט דעם נאָמען ווערטעבראַטען פאַר  
דער דאָזיגער אָפּטיילונג.

די ווערטעבראַטען ווערען איינגעטיילט אין פינף גרויסע  
קלאַסען: פּישי, אַמפּיביען (באשעפענישען, וועלכע קענען לעבען  
אי אין וואַסער אי אויף דער יבשה, ווי פרעש, קראָקאָדילען א. א. וו.),  
רעפּטיילען, פּויגלען און זויג־חיות.

איינע פון די וויכטינסטע סמנים פון די ווערטעבראַטען איז,  
וואָס זייער הויפט נערווען־סיסטעם, דאָס הייסט דער קאָפּ־מאַרך  
און דער רוקענ־מאַרך איז פּאָלשטענדיג אָפּגעזונדערט און אָפּגע־

שלאסען פון דעם אלגעמיינעם חלל פון קערפער, וואו דער אינגעווייד געפינט זיך.

דער קערפער פון אלע אינווערטעבראטען (די באשעפענישען אהן רוקען-ביין) קען באטראכט ווערען אלס אן איינצעלנער ראָהר אָדער קאנאל, אין וועלכען עס געפינען זיך אלע אינערליכע אָר-גאנען, פון דעם שפייזקאנאל ביז דעם נערווען-סיסטעם. דער קערפער פון די ווערטעבראטען אָבער ענטהאלט צוויי חללים אָדער קאנאלען, וועלכע זיינען אָפגעטיילט איינער פון דעם אנדערען. אין איינעם געפינען זיך די וויכטיגסטע טיילען פון דעם נערווען-סיסטעם, וועהרענר אין דעם אנדערען געפינען זיך דאָס פאָר-דייאונגס-סיסטעם און די בלוט-צירקולאציע אָרגאנען. אין דעם חלל, וואו דער אינגעווייד געפינט זיך, זיינען, אמת, אויך פאָראַן טיילען פון נערווען-סיסטעם, אָבער דער וויכטיגסטער טייל, דער צענטער פון נערווען-סיסטעם איז אָפגעשלאָסען אין אַ באַ-זונדערען חלל.

אנאָדער אייגענטימליכקייט פון די ווירבעל-חיות איז, וואָס אין דעם אָנפאנגס פעריאָד פון זייער לעבען ענטוויקעלט זיך ביי זיי אין דעם אונטערשטען ווענטעל פון דעם חלל, וואו עס געפינט זיך דער רוקען-מאָרד, אַזאַ ווייכליכע סטרונע, וואָס פאָר-שפיצט זיך ביסלעכווייז פון ביידע ענדען. די דאָזיגע סטרונע ווערט אָנגערופען „נאָטאָכאָרד“ אָדער „כאָרדאָ דאָרסאָליס“ (רו-קען סטרונע). ביי מאַנכע פון די ווירבעל-חיות בלייבט דער נאָטאָכאָרד אין דעמוזעלביגען צושטאַנד ווען זיי ווערען אָפילו עלטער און ער פארנעהמט ביי זיי דעם פלאַץ פון אַ רוקען-ביין. פון דעם קומט דער נאָמען „כאָרדאָטען“, מיט וועלכע די ווירבעל-חיות ווערען באַצייכענט. אין די מייסטע פעלע אָבער ווערט דער נאָטאָכאָרד פארביטען דורך דעם רוקען-ביין, וואָס ענטווי-קעלט זיך, ווען די ווירבעל-חיות ווערען עלטער.

דער רוקען-ביין באַשטעהט מייסטענס פון אַ רייה בינדלעך, וואָס צווישען זייערע ענדען געפינט זיך, געווענהליך, קישעלעך פון כראַמשקע (קנאָרפעל). דער רוקען-ביין דיענט אלס שוץ און שטיצע פאָר דעם רוקען-מאָרד.

די ווירבעל-חיות האָבען אַן אינערליכען בייגער סקעלעט, וועלכער איז באַדעקט מיט מוסקולען. די באַשעפענישען, וועלכע זיינען ביז איצט באַשריבען געוואָרען, די אינווערטעבראטען, האָ-



בען ניט קיין אינערליכען סקעלעט. אויב זיי האָבען וועלכע עס איז סקעלעטען, זיינען זיי ביי זיי אויסוועניג, אויף דעם קערפער, אָבער ניט אין קערפער, ווי די קאַראַלען, די אַרטהאַפּאָדען און די עכינאָדערמען, למשל.


די פּאַרמעהרונג פון די ווירבעל-חיות קומט אימער פון געשלעכטליכע פּאַרונג. די מייסטע נידעריגערע פּאַרמען פון די ווירבעל-חיות לעגען אייער, פון וועלכע עס ענטוויקלען זיך זייערע קינדער. מאַנכע האַלטען זייערע אייער אין זייער קערפער אזוי לאַנג ביז זיי ווערען אויסגעבריהט. די העכערע מינים פון די ווירבעל-חיות געבערען לעבעדיגע קינדער.

ענטוויקלונגס פּאַרשיידענהייטען. — די אַלע באַשעפּע-נישען, וועלכע ווערען איינגעטיילט אין די צוויי גרויסע הויפט-גרופען — די אינווערטעבראַטען און די ווערטעבראַטען, ווי ווייט זיי זאָלען ניט זיין פּאַרשיידען איינע פון די אַנדערע, זיינען זיי דאָך אין זייער אָנפּאַנגס-ענטוויקלונג גלייך. אַ מאַלוסק, אַ זשוק, אַ הוהן, אַ לייב א. א. א. וו., זיינען אַלע גלייך אין דעם אָנפּאַנג פון זייער ענטוויקלונג. דער קערפער פון יעדען פון זיי באַשטעהט אין אָנפּאַנג פון אַן איינצעלנער צעלע. זיי זיינען זאָגאַר גלייך אָדער כמעט גלייך אין די שפּעטערדיגע שטופען פון זייער פריהער ענטוויקלונג. צוערשט איז די איינצעלנע צעלע, נאכדעם מעה דערע און פּאַרשיידענע צעלען, און נאָכדעם אַ פּוסטער בלאַז, וואָס זיין הויט באַשטעהט פון אַ שיכט פון גלייכע צעלען. באַלד אָבער, אין דעם פּאַרלויף פון דער ווייטערדיגער ענטוויקלונג פון דער עמבריאָ, פּאַנגען זיך אַן אַרויסצואווייזען די אונטערשייד-דען. און וואָס ווייטער די ענטוויקלונג ווערט פּאַרטגעזעצט, אַלץ גרעסער ווערט דער אונטערשייד. עס הייסט, אַז אַלע באַשעפּע-נישען פּאַנגען אַן זייער ענטוויקלונג גלייך. ביסלעכווייז, אָבער, אין דעם פּאַרלויף פון זייער ענטוויקלונג ווערען זיי פּאַרשיידען איינע פון די אַנדערע.

און כאַראַקטעריסטיש איז עס, וואָס די ערשטע פּאַרשיידענ-הייטען, וועלכע ווייזען זיך אַרויס ביי די פּאַרשיידענע באַשעפּע-נישען אין די ווייטערדיגע שטופען פון זייער ענטוויקלונג, ווערען באַמערקט פיעל שפּעטער ביי די יעניגע, וועלכע באַלאַנגען צו איין קלאַס אָדער צו איין גרופע, ווי ביי די, וועלכע באַלאַנגען צו פּאַרשיידענע קלאַסען אָדער גרופען. דאָס קען בעסער קלאַר

נעמאכט ווערען דורך א ביישפיעל. אלע שמעטערלינגען, זשור-קעס, פליעגען און היישעריקען באלאנגען צו דער גרופע אינוועק-טען. זיי זיינען אָבער פארשיידען איינע פון די אנדערע אין זייער אויסזעהן און אין זייער קערפער געבוי. זיי האָבען בלויז געוויסע כאַראַקטעריסטישע געמיינשאַפטליכע סמנים, צוליב וועלכע מען האָט זיי צוגנויפגעשטעלט אין איין גרופע, אין דער אינוועקטען גרופע. לאָמיר איצט נעמען אַ צווייטע גרויסע חיות-גרופע, די ווערטעבראַטען, צו וועלכע עס באַלאַנגען די פיש, אַמפּיבען, רעפּטילען, פּוּגלען און זויג-חיות, וועלכע זיינען איינע פון די אנדערע זעהר שטאַרק פאַרשיידען, נאָר זיי האָבען אַ געמיינשאַפטליכען סמן — דעם רוקען-ביין אָדער דעם נאָטאָד-כאָרד, וואָס בריינגט זיי אַלעמען אין איין גרופע. ווען מען באַד-טראַכט די ענטוויקלונג פון איינעם פון די אינוועקטען און פון איינעם פון די ווירבעל-חיות, וועט מען באַמערקען, אז די ערשטע פאַרשיידענהייטען צווישען זיי וועט זיך אַרויסווייזען אין אַ פריהערדיגער שטופע פון ענטוויקלונג, ווי צווישען צוויי אינ-זעקטען, לאָמיר זאָגען, אַ זשוק און אַ שמעטערלינג, אָדער ווי צוויי-שען צוויי ווירבעל-חיות, ווי אַ הוהן און אַ קראָליק, למשל.

ווען מען פאַרגלייכט די עמבריאָס פון אַ פיש, אַ סאַלאַמאַנדרע, אַ טשערעפּאַכע, אַ פּוּגל און אַ קראָליק, וועלכע שמעלען מיט זיך פאַר די פינף הויפט-קלאַסען פון די ווירבעל-חיות, וועט מען באַמערקען, אז אין דעם אָנפאַנג פון זייער ענטוויקלונג זיינען זיי כמעט אַלע גלייך. מען באַמערקט אין זיי ניט די כאַראַקטעריס-טישע סמנים פון אַ פיש, פון אַן עוף אָדער פון אַ זויג-חיה. מען קען אָבער דאָך יעדע פון זיי לייכט אונטערשיידען פון די עמבריאָס פון אַן אינזעקט, פון אַ וואָרם אָדער מאָלוסק, וועלכע געפינען זיך אין דערזעלביגער שטופע פון ענטוויקלונג. אין אַ ווייטערדיגע שטופע פון ענטוויקלונג קען מען שוין לייכט אונ-טערשיידען צווישען דער עמבריאָ פון אַ פיש און פון אַ פּוּגל, אָבער עס איז נאָך אַלץ שווער צו אונטערשיידען צווישען די עמבריאָס פון אַ הוהן און אַ טשערעפּאַכע און צווישען די עמבריאָס פון אַ פיש און פון אַ סאַלאַמאַנדרע. מען קען דערפון פאַרשטעהן, אז אַ טשערעפּאַכע שטעהט אין אַ נעהענטערע קרוב'ה-שאַפט מיט אַ פּוּגל ווי מיט אַ פיש, און אז אַ סאַלאַמאַנדרע שטעהט אין אַ נעהענטערער קרוב'ה-שאַפט מיט אַ פיש, ווי מיט אַ טשערעפּאַכע.



א קראָליק, א הוהו, א טשערעפאכע, א סאלאמאנדרע, א פיש.  
 צייכנונג 129. — פארשידענע ווירבעל חיות אין זייער עמבריאָ  
 לאַגישען צושטאַנד און ווייטערדיגער ענטוויקלונג. I, צויגט זייער  
 גרויסע עהנליכקייט אין זייער פריהען עמבריאָלאַגישען צושטאַנד;  
 II, אין אַ שפעטערען צושטאַנד; III, אין נאָך אַ שפעטערען צושטאַנד.

עם ווערט אָנגענומען פון די מייסטע נאַטור־פּאַרשער, אז די אַלע פּאַרשיידענע ווירבעל־חיות שטאַמען אָפּ פון געמיינשאַפּט ליכע עלטערען, פון דער ערשטער באַשעפעניש וואָס האָט געהאַט אַ רוקען־ביין. עס הייסט, אז אַלע מינים פּיש, אַמפּיביען, רעפּ־טילען, פּויגלען און זויג־חיות, וועלכע האָבען אַלע דעם געמיינ־שאַפּטליכען סימן, וואָס זיי באַזיצען אַ רוקען־ביין, קומען אַרויס פון איין באַשעפעניש, וועלכע איז געווען די ערשטע, ביי וועלכער עס האָט זיך ענטוויקעלט אַ רוקען־ביין. די קינד־קינדער פון דער דאָזיגער ערשטער ווירבעל־חיה האָבען אין אַ משך פון אַ סך דורות, לעבענדיג אונטער פּאַרשידענע אומשטענדען און באַדינ־גונגען, אָנגעפּאַנגען ביסלעכווייז אָפּווייכען פון זייער עלטערנס טיפּ, כדי זיך צוצופאַסען צו די באַדינגונגען פון זייער עקזיסטענץ. דורך די דאָזיגע שטופּענווייזע ענדערונגען אָבער זיינען מיט דער צייט געשאַפּען געוואָרען נייע טיפּען באַשעפעניסען, וועלכע אונ־טערשיידען זיך זעהר שטאַרק איינע פון די אַנדערע, ניט קוקענדיג אויף זייער געמיינשאַפּטליכער אָפּשטאַמונג.

מען קען איצט מאַכען נאָך אַ שריט ווייטער. אזוי ווי די אַלע פּאַרשיידענע ווירבעל־חיות שטאַמען אָפּ, ווי עס ווערט אָנגע־נומען, פון איין באַשעפעניש, וועלכע איז געווען די ערשטע צו קריגען אַ רוקען־ביין, דאַן קען מען אויך אָנגעמען, אז אַלע באַשע־פענישען איבערהויפּט האָבען זיך ענטוויקעלט פון איין אור־באַ־שעפעניש, וועלכע איז געווען די ערשטע לעבעדיגע באַשעפעניש אין דער וועלט. דאָס האָט געמוזט זיין די איינפאַכסטע איינ־צעליגע באַשעפעניש וואָס אין אַ משך פון מיליאָנען יאָהרען האָ־בען איהרע קינד־קינדער, אונטער די פּאַרשידענע אומשטענדען און באַדינגונגען, וואָס זיי איז אויסגעקומען צו לעבען, זיך ביסל לעכווייז געענדערט ביז עס האָבען זיך פון זיי ענטוויקעלט פּאַר־שידענע טיפּען באַשעפענישען, וועלכע האָבען איצט אַפּילו ניט קיין עהנליכקייט איינע צו די אַנדערע. די איינציגע גלייכקייט, יואָם ביי זיי איז געבליבען, איז דער אנפאַנג פון זייער ענטוויק־לונג. אַלע פּאַנגען זיך אז ענטוויקלען פון איין צעלע.

די פּאַרשידענהייטען אין געבוי און כאַראַקטער, וואָס אַ באַשעפעניש האָט געוואונען אין דער פּעריאָדע פון איהר ענט־וויקלונג, געהען איבער בירושה צו איהרע קינדער, און די ענדערונ־גען, וועלכע זיינען פּאַרגעקומען אין דעם געבוי און אין דעם כאַ־

ראקטער פון דעם נייעם דור אין זיין ענטוויקלונג געהען איבער בירושה צו די ווייטערדיגע דורות.

דער נירדינסטער קלאס באשעפענישען פון די כאַרדאטען זיי נען די „ים-שפּריצער“, אָדער טוניקאַמען, ווי זיי ווערען גערוד פּען מיט זייער וויסענשאַפטליכען זאָלאָגישען נאָמען, וועלכער קומט פון דעם לאַטיינישען וואָרט „טוניקא“ (א מאַנטעל-הילע), צוליב זייער צודעק, וואָס זיי האָבען אויף זיך. די ים-שפּריצער זיינען זעהר פאַרשפּרייט ביי די ברעגעס פון פאַרשיידענע ימים, און עס עקזיסטירען צווישען זיי אַ גאַנצע רייה פאַרשיידענע ספּעציעס, וועלכע האָבען פאַרשיידענע פאַרמען. אַנדערע זעהן אויס ווי באַרנעס און מען רופט זיי „ים-באַרנעס“, אַנדערע זעהן אויס ווי פּערסיקעס, און מען רופט זיי „ים-פּערסיקעס“ א. ז. ו. מאַנכע פון די טוניקאַמען לעבען אָפּגעזונדערט, איינציגווייז, וועהרענר אַנדערע לעבען אין קאָלאָניעס, צונויפגעוואַקסען איינע מיט די אַנדערע ווי מיט צווייגלעך. אַנדערע פון זיי האָבען ווידער דורכ זיכטיגע קערפּערס, אז מען קען זעהן פון אויסען זייער אינגווייז.

די „ים-שפּריצער“ זיינען כאַראַקטעריסטישע וואַסער באַשעפּענישען. זיי געפינען זיך אין גרויסע מאַסען ביי די אַמעריקאַנער ים ברעגען. זייער קערפּער איז עהנליך צו אַ זאק און איז מייסטענס מיט איין ענד זיינעם באַהעפט צו אַ פעלזען אָדער צו אַ גרויסען מושעל. אין דעם אַנדערען ענד פון זיין קערפּער געפינען זיך צוויי עפּנונגען, דורך וועלכע עס לויפט אַ באַשטענדיגער וואַסער-שטראָם. ווען זיי ווערען געשטערט אָדער אָנגעגריפען, פּאָנגען זיי אַן אַרויסצושטויסען דאָס וואַסער פון די דאָזיגע צוויי עפּנונגען מיט אַ באַדייטענדיגער קראַפט ווי פון אַ שפּריצער. דער פון קומט זייער נאָמען „ים שפּריצער“. ווען זיי ווערען אויסגעבריהט זיינען זיי עהנליך צו יונגע, נאָך ניט ענטוויקעלטע, פּרעשלעך, וועלכע האָבען אַ דיק בייכעל מיט אַן עקעל, און זיי שווימען אַרום עטליכע שטונדען פריי אין וואַסער. באַלד אָבער זוכען זיי זיך אויס אַ פּאַסענדיגן פּלאַץ, וואו זיי באַזעצען זיך און בלייבען דאָרטען זייער גאַנצען לעבען. ווי זיי באַזעצען זיך נאָר אויף זייער באַשטענדיגען פּלאַץ, פּאָנגט זיך אַן זייער דענע-נעראַציע, דאָס הייסט, זיי זינקען אַראָפּ אויף אַ נידריגערע שטופּע פון ענטוויקלונג. ווען זיי קומען אַרויס פון איי האָבען זיי אַן ענטוויקעלטען אָרגאַניזם. זיי האָבען אַ נאָטאָכאָרד (א רוקען

סטרונע), א פארצווייגטען נערווען סיסטעם, געפיהלס-אָרגאַנען, א. ז. ווי אָבער זיי באַזעצן זיך אויף אַ באַשטימטען פּלאַץ און באַהעפּטען זיך צו איהם, פּאַנגען זיי אָן צו פּאַרלירען זייערע וויכ-טיגסטע אָרגאַנען. עס פּאַרשווינדט ביי זיי דער עק, דער נאָמאָ-כאָרד, דער גרעסטער טייל פּון זייערע נערווען, זייערע געפיהלס-אָרגאַנען און עס ענטוויקעלט זיך ביי זיי אַן אונבאַוועגליכער זאַק פּערמיגער קערפּער אין וועלכען עס זיינען פּאַרשוואַנדען די וויכ-טיגסטע סמנים פּון די רוקען-ביין חיות.



צייכנונג 130. — אַ ים־שפּריצער.

ביי די מייסטע גאַטונגען פּון די ים־שפּריצער אָדער טוּניקאַ-טען געפינען זיך די מענשליכע און ווייבליכע געשלעכטס-אָרגאַנען אין איין אינדיוידום. די פּאַרמעהרונג קומט פּאַר ביי מאַנכע דורך אייער און ביי אַנדערע דורך קנאָספען-עהנליכע אַרויסוואַקסונגען, ווי דאָס איז דער פּאַל ביי מאַנכע מעטאַזאָען, וועלכע זיינען באַ-שריבען געוואָרען פּריהער. ביי אַנדערע ספּעציעס קומט פּאַר די פּאַרמעהרונג אויף דעם פּאָלגענדען אופן: דער נייער דור ווערט געבאָרען אין דער פּאַרמע פּון קנאָספען, אָבער ווען ער וואַקסט אויס און עס קומט זיין צייט פּון פּאַרמעהרונג, פּראָדוצירט ער אייער, פּון וועלכע עס קומט אַרויס אַ נייער דור. דער נייער אַרויסגעקומענער דור איז אָבער ניט עהנליך צו זיינע עלטערן, נאָר צו זיינע עלטערענס עלטערן, דאָס קינד, הייסט עס, איז ניט עהנליך צו דער מאַמען נאָר צו דער באַבען. און אזוי געהט עס כּסדר.

## זעכצעהנמער קאפיטעל.

די איינמייילונג פון פיש. — די לאַנצעט־פיש. — די לאמפרעטען. — דער בלינד־פיש. — די פאנצער־פיש. — די ביונער־פיש. — די כראַמשקע סקעלעטען פיש. — די לענג־פיש. — פארשידענע אר־טען פיש. — די חושים פון פיש. — די פרוכפערונג און ענטוויקלונג פון פיש. — שוץ און קאמפפסימיטלען.

### די פיש.

די איינמייילונג פון די פיש. — די פיש קענען איינגעטיילט ווערען אין פינף הויפט קלאסען: (1) די נידעריגע מינים, וועלכע האָבען נאָך ניט קיין פאָלשטענדיג ענטוויקעלטען רוקען־ביין, נאָר זיי האָבען בלוז אַ נאָטאָאָרד (א כראַמשקעדיגען פאָרם), אַנ־שטאָט אַן אמת'ען רוקען־ביין, ווי דאָס איז דער פאָל ביי די לאַנצעט־פיש, לאמפרעטען און בלינד־פיש; (2) די האַי־פיש, וועל־כע זיינען אין אַלגעמיין קערפערליך זעהר שטאַרק ענטוויקעלט, אָבער זייער סקעלעט איז ניט פאַרביינערט. זייער גאַנצער סקע־לעט באַשטעהט פון כראַמשקע, ווי דאָס איז דער פאָל ביי דעם געוועהנליכען האַי־פיש (שאַרק), הונד־פיש, זעג־פיש, ראַכען־פיש א. ז. וו. די דאָזיגע פיש האָבען אויך ניט קיין שופען אויף זייער קערפער; (3) די געפאַנצערטע פיש, אָדער גאַנאָאידען, זייער קערפער איז באַדעקט מיט האַרטע פאַנצער־שופען און וועלכע זיי־גען באַצויגען מיט אַ האַרטער עמאַליע, ווי די שטער־פיש (סטער־לאַדען, סטוירדזשען), אַמעריקאַנער האָרן־העכט א. ז. וו. מאַנ־כע פון זיי האָבען אַ כראַמשקעדיגען סקעלעט; (4) די ביינער־פיש, די אַלע פאַרשיידענע פיש, וועלכע האָבען אַ ביינער־סקעלעט, ווי אָקונס, העכט, לאַקס א. א. ז. וו.; (5) די לונגען־פיש, צו וועלכע עס באַלאַנגען אייניגע מינים פיש, ביי וועלכע דער פּענכער האָט זיך ענטוויקעלט אין אַ לונגענהליכען אָרגאַן און זיי קענען מיט איהם אַטעמען, ווען זיי זיינען ניט אין וואַסער.


די לאַנצעט־פיש. — דער נידריגסטער מין פיש זיינען די „לאַנצעטען“. זיי זיינען קליינע באַשעפענישען פון אַ האַלבען צאָל ביז פיער צאָל די לענג, זיי זיינען דורכזיכטיג און קאָלירלאָז און לע־בען אין דעם זאַמדיגען גרונד פון די וואַרימע ימים. אנשטאַט אַ

רוקען-ביין, האָט דער לאַנצעט-פּיזש א נאָטאַכאַרד, אַזאַ כראַמסקע דיגע סטרונע, וואָס ציהט זיך פון זיין קאָפּ ביז זיין עק. פאַר דעם לאַנצעט-פּיזש פּאַסט, אַלזאָ, דער נאַמען „כאַרדאַט“ אַנשטאַט „ווערטעבראַט“. אויף דעם נאָטאַכאַרד ליגט אַ נערווען-פּאַדיום, וואָס איז באַדעקט פון אַלע זייטען מיט אַ דין היימעל. דער נער-ווען-פּאַדיום ענדיגט זיך אָבער ניט מיט אַ מאַרדך קייקעלע אין קאָפּ, ווי ביי אַנדערע פּיזש. דער קאָפּ פון לאַנצעט-פּיזש האָט אויך ניט קיין שאַרבען און אויך ניט קיין אויגען. דאָס מויל פון לאַנצעט-פּיזש באַשטעהט פון אַ ווערטיקאַלען שפּאַלט אָהן קיהן-באַקען. ער האָט אויך ניט קיין שולטער-ביינער אָדער היפטען-ביינער, פון וועלכע עס וואַקסען אַרויס די אונטערשטע אָדער זייטיגע פּלוס-פּער-דערען ווי ביי די אַנדערע מינים פּיזש. ער האָט אויך ניט קיין שופּען אויף זיין קערפּער. זיין בלוט צירקולאַציע אַנס סיסטעם איז עהנליך ווי ביי אַלע אַנדערע פּיזש, אָבער ער האָט ניט קיין האַרץ. דאָס בלוט ווערט אין זיין קערפּער געטריבען דורך דער צונויפציהונג פון זיינע בלוט-געפעס אָדער אָדערען. אויף דעם שאַרף פון זיין רור קען און אויף זיין עק געפינען זיך אונגענוויקעלטע פּלוס-פּער-דערען. אין אַלגעמיין האָבען די לאַנצעטען מיט זייער נידעריגער ענטוויק-לונג ניט פאַרדיענט דעם נאָמען פּיזש, אָבער לויט דעם כאַראַקטער פון זייערע אָרגאַנען און לויט זייער איינאַרדנונג באַלאַנגען זיי דאָך צו דער פּיזש גרופּע.

לאַמפרעטען. — אויף אַ העכערע שטופּע פון ענטוויקלונג יוי די לאַנצעטען שטעהען די לאַמפרעטען, וויונעס אָדער ניין-אויגען, ווי זיי ווערען אויך גערופּען. אויך די לאַמפרעטען האָבען נאָך ניט קיין ענטוויקעלטען רוקען-ביין, זיי האָבען בלויז אַ נאָטאַ-כאַרד, אַ כראַמסקעדיגע סטרונע, וועלכע ענדיגט זיך מיט דעם כראַמסקעדיגען קאָפּ-שאַרבען, וועלכער ענטהאַלט אין זיך אַ שטי-קעל מאַרדך. זיי געהערען, אַלזאָ, צו די כאַרדאַטען. די לאַמפרע-טען האָבען אויך אויגען און אַ האַרץ, זיי האָבען אָבער ניט קיין זייטען פּלוס-פּער-דערען און אויך ניט קיין בויך-פּלוס-פּער-דערען, ווי צען זיך, זיי האָבען בלויז פּלוס-פּער-דערען אויפ'ן רוקען. זייער מויל איז רונדליך און האָט דאָס אויסזעהן ווי דער ענד פון אַ זויג-שליף. זיי האָבען ניט קיין ביינער אין זייער קערפּער און האָ-בען ניט קיין שופּען אויף זייער קערפּער.



עס זיינען פאראן אן ערך פינף און צוואנציג פארשידענע ספעציעס לאמפרעטען אָדער ווינעס. מאנכע פון זיי קומען אין פריהלינג פון די ימים און די טייכען, וואו זיי ווארפען ארויס זייער רע איקרע אָדער רויגען (די אייער פון די פיש). די יונגע פישלעך, וועלכע קומען ארויס פון די אייער, זיינען אנפאנגס בלינד און האָבען ניט קיין צייהנער. שפעטער אָבער ענטוויקלען זיך ביי זיי אויגען און צייהנער. זיי נעהרען זיך מיט דעם בלוט וואָס זיי זייגען ביי אַנדערע פיש, אין וועמעס קערפער זיי מאַכען פריהער אַ וואונד מיט זייערע פיל־עהנליכע ציינער. אַנדערע ספעציעס פּרעסען זיך איין אין דעם קערפער פון אַנדערע פיש און עסען זייער פלייש.



צייכנונג 181. — (1) אַ לאַנצעט פיש ; (2) אַ לאַמפרעט פיש.

דער בלינד־פיש. — אמאָל האָט מען דעם בלינד־פיש גערעכענט צווישען די ים־ווערם, אין דער ווירקליכקייט אָבער פאַרדינט ער מעהר דעם נאָמען „פיש“ ווי דער לאַנצעט־פיש. ער לעבט אויף דעם גרונד פון ים באַדעקט מיט שליים. אָפט פיהרט ער אַ פאַראַזיטישען לעבען, איינגראָבענדיג זיך אין דעם קערפער פון אַ פיש, און זייגט זיין בלוט און עסט זיין פלייש. ער איז אַן ערך אַ פוס לאַנג, כמעט רונד ווי אַ וואָרם און האָט אַ קליין מויל. ער האָט ניט קיין רוקען־ביין, נאָר אַ נאָטאַכאַרד. ער האָט אויך ניט קיין ביינער אין זיין קערפער און אויך ניט קיין קיהן־באַקען. ער האָט בלוז דריי קליינע, שוואַכע, וועניגע־ענטוויקעלטע ציינער אין זיין מויל. דעם נאָמען „בלינד־פיש“ האָט מען איהם אָבער געגעבן בען על פי טעות. ער איז ניט אינגאַנצען בלינד, ער האָט אַ פאָר קליינע אויגען, זיי זיינען אָבער באַהאַלטען אונטער זיין הויט. ער


האָט אויך אַ מאַרד אין קאַפּ און אויף זיין עק האָט ער אַ קליינעם פּלוס־פּערער.

עס ווערט אָנגענומען, אַז די דאָזיגע נידריגע מינים פּיש, ווי די לאַנצעטען און לאַמפּרעטען, האָבען עקזיסטירט איידער עס זיי נען נאָך געווען די העכער ענטוויקעלטע מינים פּיש. דאָס מיינט, אַז זיי זיינען אַן איבערבלייבעכץ פון די ערשטע פּאַרמען פּיש פון אַ פּריהעדריגער פּעריאָדע, ווי אונזערע. דאָס איז אָבער נאָך ניט זיכער, וואָרום עס קען אויך מעגליך זיין, אַז זייער איינפּאכער, וועניג ענטוויקעלטער אָרגאַניזם קומט דערפון, וואָס זיי פּיהרען אַ האַלב־פּאַראַזיטישען לעבען.

די ביינער־פּיש. — די ווירקליכע ביינער־פּיש שטעלען מיט זיך פאַר דעם גרעסטען קלאַס צווישען די פּיש. עס זיינען היינט באַקאַנט ווייט איבער 10 טויזענד ספּעציעס פון די ביינער־פּיש און וואָס ווייטער ווערען אַלץ נייע ספּעציעס ענטדעקט. די ביינער־פּיש זיינען פאַרשפּרייט אין ימים, טייכען און אָזערעס. זיי קענען זיך צופאַסען צו לעבען אין פאַרשיידענע וואַסערען און אין פאַרשיידענע געגענדען. אַ טייל פון זיי לעבען געהענטער צו דער אויבערפלעכע פון וואַסער, וועהרענד אַנדערע לעבען אויפ'ן גרונד פון וואַסער. די אָרגאַנען פון די פאַרשיידענע פּיש־אַרטען זיינען צוגעפאַסט צו דעם אַרט לעבען, וואָס זיי פּיהרען. דער שטאַק־פּיש, למשל, וועלכער זוכט זיין שפּייז מיסטענס אויפ'ן גרונד פון וואַסער, האָט אויף זיין מאַרדע אַזאַ לאַנגען וואַרצל, וואָס דינט איהם אַלס אַ ספּעציעלער פּיהל־אָרגאַן. שווימענדיג נאָהענט פון גרונד, דערטאַפט עס מיט דעם פּיהל־אָרגאַן זיין רויב, וואָס ליגט באַהאַלטען אין דעם זאַמד אָדער בלאַטע פון גרונד, ווי די שטערעך־פּיש, קראַבען, שנעקען און אַז. וו. דער אַנגעל־פּיש, וועלכער ליגט אַליין איינגעגראָבען אין דעם זאַמד אָדער בלאַטע פון דעם ים־גרונד, האָט ספּעציעלע פּיהל־אָרגאַנען אויפ'ן רוקען. זיי זעהען אויס ווי פּלאַנצען, און די ים־חיות, וועלכע דינען דעם אַנגעל־פּיש אַלס רויב, פאַרדעכטיגען אפילו ניט, אַז אָט די פּלאַנצען, וועלכע זיי זעהען, זיינען עס די פּיהל־אָרגאַנען פון זייער גרעסטען שונאָ און דינען איהם אַלס אַ מיטעל צו פּאַנגען זיין רויב. און אַזוי האָבען פּיעלע אַנדערע פּיש פאַרשיידענע אָרגאַנען, וועלכע זיינען צוגעפאַסט צו דעם אַרט לעבען, וואָס זיי פּיהרען.


די ביינער פּיש ווערען איינגעטיילט אין 2 הויפט אָרדנונגען

און 7 אונטער־ארדנונגען. אנדערע טיילען זיי איין אין מעהר אָרד־נונגען. די איינטיילונג ווערט הויפטזעכליך געמאכט לויט דער פֿארמע פון זייער קערפער און לויט זייערע פלוס־פֿעדערען. מיר וועלען דאָ אָבער באַשרייבען די מעהר כאַראַקטעריסטישע פון זיי.



צייכנונג 182. — אַן אַאל.

דער איינפאכסטער פיש צווישען די ביינער־פיש איז דער אַאל, וועלכער איז פֿארשפרייט אין פֿארשידענע ימים און טייכען אין דער אַלטער וועלט און אין דער נייער. ער האָט אַ לאַנגען, רונדען שלאַנגען־עהנליכען קערפער מיט איין פלוס־פֿעדער פון יעדער זייט, נאָהענט צום קאָפּ, און מיט אַ פלוס־פֿעדער אויפ'ן



צייכנונג 183. — אַ פעליקאן־פיש.

רוקען, וועלכער פֿאנגט זיך אָן אין מיטען פון זיין רוקען און ציהט זיך ביז'ן עק. אויפ'ן בויך האָט ער קיין פלוס־פֿעדערען ניט, ער האָט אויך ניט קיין שופען.

אַ כאַראַקטעריסטישער פיש איז דער „פעליקאן פיש“, וועלכער געפינט זיך אין מיטעל־מעער (ים־התכונ). ער איז אומגעפעהר

אָנדערהאַלבען פּוּס לאַנג, נאָר ער האָט אַ זעהר גרויסען קאָפּ מיט זעהר אַ גרויסען מויל. זיין קערפּער איז רונד און שלאַנגען-עהנ־ליך, קיין שופּען האָט ער ניט און אויך ניט קיין זייטען און בויך פּלוס־פּעדערען. זיין נאָמען „פּעליקאָן־פּיש“ האָט ער געקראָגען, צוליב דעם וואָס דער אונטערשטער טייל פּוּן זיין קאָפּ איז עהנ־ליך צו דעם אונטערשטען טייל קאָפּ פּוּן דעם פּעליקאָן פּויגעל. מען נעמט אָן, אַז דער פּעליקאָן־פּיש שטאַמט פּוּן די אַאל פּיש. אינטערעסאַנטע טיפּען געפינען זיך צווישען דער קאָפּ־פּיש פּאַמיליע. ביי די אַריום פּיש, לַמשל, וועלכע לעבען אין די ימים פּוּן די טראָפּישע (הייסע) געגענדען, קלייבען די זכּרים אויף די אייער, וואָס די נקבה האָט אויסגעלעגט, און טראָגען זיי אין זייער מויל ביז עס ווערען אויסגעברייט פּישלעך פּוּן זיי. די אייער זיינען גאַנץ גרויסע, מאַנכע פּוּן זיי זיינען אַ האַלב צאָל די גרויס.

אַנאָדער פּיש פּוּן דער קאָפּ־פּיש פּאַמיליע, דער אַספּערדאָ, ברייט אויס די אייער אויף אַ גאַנץ אַנדער אָפּן. די נקבה קלעפט אָן איהרע אויסגעלעגטע אייער, נאָך זייער באַפּרוכטונג, צו איהר בויך און צו איהרע פּלוס־פּעדערען און טראָגט זיי מיט זיך, ביז עס קומען אַריום פּוּן זיי פּישלעך. (זעה צייכנונג 141).

די בעסטע ענטוויקעלטע פּיש צווישען די ביינער־פּיש זיי־נען פּוּן דער אָרדנונג ערעל־פּיש (פּיואַסטאַמי), צו וועלכער עס באַלאַנגען די אָקונעס, העכט, קאַרפּען, לאַקסען, שלאַיען, מאַקערעלען, פּאַרעלען, קאַראַסען, הערינג־פּיש און די אַלע, וועלכע זיינען עהנ־ליך צו זיי.

אַלס אַ ביישפּיעל וועלען מיר נעהמען דעם גוט־באַקאַנטען אָקוּן אָדער באַרש (פּוירטש אין ענגליש), וועלכער איז פּאַרשפּרייט אין די טייכען פּוּן אייראָפּאַ און אַמעריקאַ און וועלכער ווערט גע־רעכענט אַלס אייער פּוּן די בעסטע שפּייז־פּיש.

דער קערפּער פּוּן דעם אָקוּן איז פּלאַטשיג און איז אין זיין אויסזעהן עהנליך צו אַ שפּינדעל — אין מיטען איז ער ברייטער און פּאַרלויפט אַלץ שמעלער צו זיינע ענדען. זיין קערפּער איז באַ־דעקט מיט אַ שופּען־פּאַנצער. די שופּען וואַקסען אַריום פּוּן דער הויט און זייערע פּרייע ענדען זיינען רונד. זיין רוקען־ביין באַ־שמעהט פּוּן פּערציג ביינדלעך. זיין שאַרבען באַשמעהט פּוּן עט־ליכע טיילען, וועלכע זיינען באַהעפּט איינע צו די אַנדערע ווי מיט

נעט. זיין מויל באשטעהט פון צוויי באוועגליכע קיהן-באקען אין וועלכע עס זיצען שארפע, שפיציגע צייהנער. זיין קאפ איז די רעקט צונויפגעוואקסען מיט זיין רומפ, קיין האלז האָט ער ניט. ער האָט צוויי פאָר פלוס-פּעדערען, איין פאָר פון די זייטען און איין פאָר אויפ'ן בויך. די דאָזיגע צוויי פאָר פלוס-פּעדערען קען נען פארנליכען ווערען צו די פאָדערשטע און הינטערשטע פאָר פיס פון די אנדערע ווירבעל-חיות. די דאָזיגע פלוס-פּעדערען זיינען באהעפט צו דעם רוקען-ביין פון אָקון דורך שולטער און היפטען בינער. פון דעם רוקען-ביין געהט אַרויס אַ גרויסע צאָהל ריפּען, אָבער זיי קומען זיך ניט צוזאַמען מיט זייערע ענדען אין אַ ברוסט-ביין, ווי ביי די העכער ענטוויקעלטע ווירבעל-חיות, נאָר זיי ענדיגען זיך פריי אין פלייש.


דער אָקון האָט אויך צוויי פלוס-פּעדערען אויפ'ן רוקען, זיי געפינען זיך אויף דער מיטעל-ליניע פון זיין קערפּער. זיי באַ-שטעהען פון אַ הויט-פּאַלכ, וואָס איז געמיילט אין צוויי טיילען און איז אונטערגעשטיצט פון כראָמאָסקעדיגע נאָדלען. ער האָט אויך איין פלוס-פּעדער אויף זיין בויך זייט נאָהנט צו זיין עק און אַ פלוס-פּעדער, וואָס בילדעט זיין עק. דער אויבערשטער טייל און דער אונטערשטער טייל פון דעם עק-פלוס-פּעדער זיינען ביי דעם אָקון ביידע גלייך, זיי זיינען סימעטריש, ביי מאַנכע אנדערע פיש זיינען זיי אונגלייך.

דער אָקון אָטעמט מיט דער הילף פון זשאַברעס (קיעמען), וועלכע זיינען געשיצט מיט אַ האַרטען דעקעל. דאָס מויל פון אָקון ברייטעט זיך אויס אין אַ שלונד (גלאָטקע). די זשאַברעס ליגען פון ביידע זייטען פון שלונד. דאָס וואַסער, וואָס ענטהאַלט אין זיך קליינע לופט-טיילכעלעך, קומט אַריין אין מויל פון אָקון, געהט דורך זיין שלונד און פליסט אַרויס צוריק פון די זשאַברעס. דאָס בלוט, וואָס צירקולירט אין די זשאַברעס, נעמט אַרויס דעם זויער-שטאָף פון די לופט-טיילכעלעך, וואָס געפינען זיך אין וואַסער, און ניט אָפּ פון זיך דעם אָפּפאַל שטאָף.

דאָס בלוט פון אָקון איז קאלט אָבער רויט. זיין האַרץ באַ-שטעהט פון צוויי קאַמערען און דאָס בלוט צירקולירט אין קער-פּער דורך אַדערען און אַרטעריען.

דער שפייז-אָפּפאַראַט פון דעם אָקון באַשטעהט פון אַ מויל מיט אַ סך צייהנער, פון אַ קורצען ושט, אַ מאָגען און אַ קורצע, וועניג

נעקרויזטע קישקע. דער לעבער, פון א העל ברוינעם קאליר, נע-  
פינט זיך איבער דעם מאָנען, צום לעבער איז צוגעוואקסען א נאָל-  
פענכער, אין וועלכען עס זאמעלט זיך די גאָלפליסיגקייט, וואָס



צייכנונג 134. — 1 א סקעלעט פון אן אָקון; 2 די זשאַברעס  
(אַטעמונגס־אָרגאַנען) פון אן אָקון. א, דער ערשטער פון די פיער געי-  
וועלכטע בייגער, צו וועלכע עס זיינען באַפעסטיגט די זשאַברעס; ב, די  
זשאַברעס; ג, די אונטערשטע ענדען פון די זשאַברעס; ד, דאָס האַרץ.  
3 אַ געוועהנליכער אָקון. 4 אַ דיאַגראַם, וואָס צייגט אַ קווער־דורכשניט  
פון דעם קערפער פון אַ העכערען אינווערטעבראַט (אַ חיה אַהן אַ רוקען־  
ביין). א, די וואַנד פון קערפער; ב, דער שפּייז־קאַנאַל; ג, דאָס בלוט־  
געפעס סיסטעם; ד, דאָס נערווען־סיסטעם. 5 אַ דיאַגראַם, וואָס צייגט  
דעם קווער־דורכשניט פון דעם קערפער פון אַ ווערטעבראַט (אַ חיה מוט  
אַ רוקען־ביין). א, די וואַנד פון קערפער; ב, דער שפּייז־קאַנאַל;  
ג, דאָס בלוט־געפעס־סיסטעם; ד, דאָס נערווען־סיסטעם; ה, דער רוקען־מאַרד.

דער לעבער גיט פון זיך ארויס און וואָס העלפט פארדייען די שפיין. ביים מאַגען געפינט זיך אויך דער מילץ פון פיש.

אין דעם ברוסט־קאסטען פון אַקון געפינט זיך אַ לופט־פענער כער, וואָס האָט, ווי עס שיינט, די אויפגאבע צו העלפֿען דעם פיש זיך צו האַלטען אין אַ געוויסער טיעפעניש פון וואַסער. דער קער־פער פון אַ פיש איז שווערער פון וואַסער. ווען אַ פיש וואַלט גיט געהאט קיין שוויים־אַרגאנען וואַלט ער אַראָפּפאלען צום גרונד. מיט דער הילף פון זיין לופט־פענכער אָבער קען ער באלאנסירען זיין געוויכט אין וואַסער. ווען דער פענכער בלאָזט זיך אויף, קען דער פיש זיך אויפהויבען און זיך האַלטען העכער אין וואַסער, און ווען דער פענכער ציהט זיך צינזיף, לאָזט זיך דער פיש אַראָפּ טיעפער אין וואַסער. ביי די פיש וועלכע לעבען אין די גרויסע טיעפענישען פון ים און זייער קערפער איז צוגעפאסט צו אַ גרוי־סען דרוק, צוליב דער גרויסער וואַסער־מאסע וואָס דריקט אויף זיי, ווערט דער לופט־פענכער אזוי שטאַרק אויפגעבלאָזען, ווען מען ברענגט זיי אַרויף אויף דער אויבערפלעכע פון וואַסער, וואו דער דרוק איז אַ פיעל קלענערער, דאָס זיי קענען זיך מעהר גיט אַראָפּ־לאָזען אין דער טיעפעניש, נאָר זיי בלייבען שווימען פון אויבען. מאַנכע פיש האָבען אין גאַנצען גיט קיין לופט־פענכער.


דאָס נערווען־סיסטעם פון דעם אַקון באַשטעהט פון אַ קאָפּ־מאַרק, וואָס געפינט זיך אין דעם חלל פון זיין שאַרבען, פון אַ רוקען־מאַרק אָדער חוט השדרה און פון נערווען־פּעדרים, וועלכע ציהען זיך פון דעם רוקען־מאַרק איבער די פאַרשידענע טיילען פון קערפער.

די אויגען פון דעם אַקון זיצען אין אויגען־לעכער, אָבער זיי האָבען גיט קיין אויגען־לעדלעך. זיינע נאָזלעכער האָבען גיט קיין פאַרבינדונג מיט זיין מויל און האַלז, זיי האָבען בלוז איין עפּנונג פון אויסען. זיין אויער ווידער האָט בלוז אַן עפּנונג פון אינע־וועניג אָבער גיט פון אויסען.

דער אַקון שווימט הויפטזעכליך מיט דער הילף פון די באַ־וועגונגען פון זיין עק. די צוויי פּאַר זייטען און בויך פּלוס־פּעדערען ווערען פון איהם באַנוצט זיך אַראָפּצולאָזען און זיך אַרויפצוהויעבן אין וואַסער, וועהרענד די איבריגע פּלוס־פּעדערען העלפֿען איהם אָנצוהאַלטען זיין גלייכגעוויכט.

די פאַרמעהרונג פון דעם אַקון קומט דורך אייער (איקרע,

רויגען), וועלכע ווערען געלעגט פון דער נקבה אין גרויסע מאַ-  
 סען אין די פלאַכע ניט טיעפע פלעצער פון טייכען. אין אַ משך  
 פון צוועלף טעג ווערען די אייער אויסגעבריהט און עס קומען  
 אַרויס פון זיי קליינע פישלעך, וועלכע זיינען עטוואַס פארשיעדען  
 אין זייער אויסזעהן פון ערוואַקסענע, באַזאָנדערס מיט דער פאַרם



צייכנונג 185. — די אַנאַטאָמיע פון אַ פיש. 1) די בלוטציר-  
 קולאַציע. די בלוט־געפעס, וועלכע ענטהאַלטען אַדערען־בלוט זיינען אויף  
 דער צייכנונג אָנגעגעבען מיט לאַנגע דונקלע שטריכען; די יעניגע,  
 וועלכע ענטהאַלטען אַרטעריען־בלוט, זיינען אָנגעגעבען מיט קורצע העלערע  
 שטריכען. א, דאַס פאַריקאַמער פון האַרץ; ב, דאַס אונטער־קאַמער;  
 ג, די האַרצען־אַרטרעיע; ד, די אַרטרעיע, וועלכע פיהרט דאַס בלוט  
 צו די זשאַברעס (אַטעמונגס־אָרגאַנען); ה, אַ צווייג פון דער אַרטרעיע,  
 וואָס פיהרט דאַס בלוט צו די זשאַברעס; ו, די שפייז־קישקע; ז, די  
 נערווען. 2) די נערווען און אינערליכע הויפט־אָרגאַנען פון פיש. נ, נאַז;  
 לאַך; מ, מאַרד פון קאַפ; ע, אויגען־נערוו; א, אויערען־נערוו;  
 ז, זשאַברעס; ה, האַרץ; ש, שלונד (ושמ); ק, מאַגען; צ, ניערען;  
 פ, די עפענונג, דורך וועלכע עס ווערט אויסגעשוידען דער שפייז־אַפפאַל;  
 ג, די רוקען־אַרטרעיע; ד, דער לופט־פּענכער; ב, דער רוקען־בייז;  
 ל, דער רוקען־מאַרד (חוט השדרה).



פון זייער עק, אָבער עס דויערט ניט לאנג און זיי באקומען דעם פולען אויסזעהן פון זייערע עלטערען.




די באשרייבונג פון דעם אָקון קען מיט קליינע אונבאדיי-טענדע ענדערונגען אָנגעווענדעט ווערען פאר אַ גאנצע רייהע אַנ-דערע פיש, וועלכע האָבען אַ ביינערדיגען סקעלעט, ווי פּאַרעלען, קארפען, קאראסען, ווימבען, העכט, שלאיען, א. ז. וו. מיר וועלען זיך דאריבער דאָ אָפּשטעלען אין קורצען בלוז אויף אייניגע מינים פיש, וועלכע באזיצען באַזונדערע אייגענטימליכקייטען.

הערינג. — דער באַקאנטעסטער און דער פארשרייטעסטער פיש איז דער הערינגפיש. ער געפינט זיך אין פאַרשידענע ימים און עס זיינען פאַראַן פון איהם פאַרשידענע ספעציעס.

דער הערינג איז אַ פלאַטישיגער קליינער פיש זעלטען גרעסער ווי 20 צאָל (אינטשעס), באַדעקט מיט דינע, לייכט אַראָפּפאַלענדע שופען. ער לעבט נאָהנט פון דער אויבערפלעכע פון וואַסער, זעל-טען טיעפער פון 70 אָדער 80 פוס. ער נעהרט זיך מיט קליינע פישלעך, ווערם און אָפט אויך מיט פיש-אייער. ווען עס קומט זייער פרוכטפערונגס-צייט קומען די הערינג נעהנטער צום ברעג, זיי קומען אין ריזיגע גרויסע געדיכטע מחנות, וועלכע זיינען מעה-רערע מילען די לענג און די ברייט. זיי שווימען אין אַזעלכע געדיכטע רייהען, דאָס קליינע פישער-שיפלעך, וועלכע קומען אַרײַן צווישען זיי, ווערען אָפט איבערגעקערט. די נקבות וואַרפען אַרויס פון זיך זייער איקרע אָדער רויגען (דאָס זיינען די אייער). איין נקבה קען אַרויסוואַרפען ביז 100 טויזענד אייער, וועלכע קלעפען זיך אָן צו פארשידענע וואַסער-פּזלאַנצען אָדער שטיינער, וואו זיי ווערען באַפּרוכטעט פון דעם „מילך“ וואָס די זכרים לאָזען אַרויס אין וואַסער. ביי אַ טעמפּעראַטור פון 10 אָדער 11 גראַד צעלזיוס ווערען די אייער אויסגעבריהט אין אַ משך פון 6 אָדער 8 טעג. ווען דאָס וואַסער איז קעלטער דויערט עס לענגער. ביי אַ טעמפּעראַטור פון 5 גראַד צעלזיוס דויערט עס ביז 40 טעג. ווען די יונגע הערינגלעך קומען אַרויס פון איי, זיינען זיי פון אַ פּערטעל ביז אַ דריטעל צאָל (אינטש) לאַנג. אין אַ יאָהר צייט וואַקסען זיי אויס ביז 7 אָדער 8 צאָל די לענג. ווען די יונגע הערינג ווערען אונגעפּעהר אַ יאָהר אַלט און זאָגאר נאָך פריהער, שווימען זיי אַוועק פון ברעג, וואו זיי זיינען געבאָרען געוואָרען, ווייטער אין ים אַרײַן. ווען זיי ווערען רייף און עס קומט זייער

פרוכפערונגס־צייט קומען זיי צוריק צו זייער געבורטס־ארט, וואו זיי לעגען זי ערע אייער.

די פרוכפערונגס־צייט איז ביי די פארשידענע ספעציעס הער־רינג פארשידען. ביי די שאַטישע הערינג, למשל, איז די פרוכ־



צייכונג 136. — (1 א הערינג; 2 א פלאַנדער; 3 א דאלפין) צייכענט זיך אויס מיט זיינע שעהנע קאלירען, וועלכע זיינען עהנליך צו די קאלירען פון רעגען־בויגען.

פערונגס־צייט פון אויגוסט ביז אקטאָבער, ביי די נאָרוועגישע פון פעברואַר ביז אפריל און ביי די סאַרטען הערינג, וואָס לעבען נאָהנט פון ברעג איז די פרוכפערונגס־צייט מייסטענס פון אפריל ביז מאי. די שטרעמלינג, אזא קליינער סאַרט הערינג, וועלכער גע־

פינט זיך אין באַלטישען ים, האָט איהר פרוכפערונגס-צייט אין די זומער חדשים.

מיט די גרויסע מחנות הערינג שווימען מיט וואַל-פיש און פארשידענע רויב-פיש, וועלכע נעהרען זיך אין יעדער צייט מיט הערינג. אויך די פארשידענע ים-פויגעל האָבען דאָן אַ גוטע צייט.

די „מאטיעס“ הערינג זיינען די יונגע הערינג, וועלכע זיין נען נאָך ניט געשלעכטס-רייף. די פול-הערינג זיינען געשלעכטס-רייף, אָבער זיי האָבען נאָך ניט אַרויסגעוואָרפען די איקרע אָדער די „מילך“ פון זיך, זיי האָבען זיך נאָך ניט געפרוכפערט. די פוסטע הערינג זיינען די, וועלכע ווערען געפאָנגען נאָך דער פרוכ-פערונג.

לאַקס. — צווישען די מעהר באַקאנטע פיש דאָרף אָהן צוויי פעל אַריינגערעכענט ווערען דער לאַקס, פון וועלכען עס זיינען פאראן מעהרערע פארשיידענע ספעציעס.




מאנכע לאַקסען דערנרייכען אָפט די לענג פון אַן ערך אַנד דערהאלבען ביז צוויי מעטער און אַ געוויכט פון איבער הונדערט פונט. געוועהנליך אָבער זיינען זיי באַדייטענד קלענער און לייכט טער. דער לאַקס לעבט אין די מייסטע ימים און טייכען פון די מעסיגע און קאלטע גענענדען פון אייראָפּא, אזיען און אַמעריקא. דער לאַקס איז אַן אויסגעצייכענטער שווימער און אַ נומער שפרינגער. אין די חדשים מערץ, אפריל און מאי קומען אַראָפּ די לאַקסען אין גרויסע מחנות פון ים צו די מינדונגען פון די טייכען (וואו די טייכען גיסען זיך אַריין אין ים), און נאָך אַ קורצען אויפהאַלט לאָזען זיי זיך אוועק שווימען שטראָם אַרויף אין טייך אַריין. קיין שטערונג האַלט זיי ניט אָפּ אין זייער וועג. גרויסע וואַסער-פעלע, ווירבעל-שטראָמען, דאַמבעס א. א. וו. ווערען פון זיי אַריבערגעשוואומען אָדער אַריבערגעשפּרונגען ביז זיי קומען צו זייער ציעל. ווען די לאַקסען קומען ניט ווייט פון דעם אויסגוס פון טייך (דער פּלאַץ, וואו ער פּאָנגט זיך אָן), שטעלען זיי זיך אָפּ און אין אַ קורצער צייט אַרום פּאָנגט זיך אָן ביי זיי די פרוכפערונג. די נקבה גראָבט אויס מיט איהר עק אַ פּלאַכע גרוב אין גרונד פון טייך און לעגט דאָרטען אויס איהרע אייער (איקרע), דאָן קומט דער זכר און באַפרוכטעט די אייער מיט זיין „מילך“. דערמיט איז די פרוכפערונגס-אַרבייט פון די

לאַקסען געענדיגט און זיי קעהרען זיך צוריק אום אין ים. אויף זייער ריזע פאַרלירען פיעלע פון זיי זייער לעבען דורך די גרויסע וואַסערפאַלען, ווירבעל-שטראָמען, שאַרפע שטיינער און דאַמבעס, וועלכע זיי טרעפען אין זייער וועג. אין אַ משך פון 4 חדשים קומען פון די אייער אַרויס קליינע פישלעך, וועלכע זיינען אומ-געפעהר אַ צענטימעטער אָדער אַ האַלבען צאָל די לענג. אין אַ פאַרלויף פון 16 חדשים וואַקסען זיי אויס ביז נאָהענט פון אַ האַלבען מעטער אָדער אַנדערהאַלבען פּוס די לענג און זיי פאַנגען אָן אוועקשווימען אין ים אַריין, וואו זיי ווערען אין אַ קורצער צייט באַדייטענדר גרעסער און שווערער. ווען זיי ווערען אַלט צוויי יאָהר, פאַרלאָזען זיי דעם ים און שווימען צוריק צו דעם טייך, וואו זיי זיינען געבאָרען געוואָרען, כדי צו בדיינגען אַ נייעם דור אויף דער וועלט. עס שיינט, אז פאַר די צוועקען פון פּרוכפּערונג מוזען זיך די לאַקסען אויפהאַלטען אַ געוויסע צייט אין טייך-וואַסער און דאָס איז, ווי עס שיינט, אויך די אורזאכע וואָרום זיי קומען פאַר זייער פּרוכפּערונג פון ים אין די טייכען. דער לאַקס איז אַ שלאַנקער, שענהער פיש, מיט אַ סונקעלען דונדען רוקען, מיט אַ פאַרהעלטניסמעסיג קליינעם קאָפּ און איז באַדעקט מיט קליינע זילבער-גלאַנציגע שופּען. ווען די לאַקסען שווימען אַרויס פון ים אין טייך אַריין זיינען זיי פעט און דיק און זייער פלייש איז העל-רויט. ווען עס קומט נאָהענט צו דער פּרוכפּערונגס-צייט ווערט זייער פלייש דונקעל-רויט און ביי די זכרים באַווייזען זיך רויטע פלעקען אויף די זייטען און אויף די זשאַברעס דעקלעך.

די אַלטע לאַקס זכרים צייכענען זיך באַזונדערס אויס מיט זייערע פאַרשידענע שענהע רויטע קאָלירען, וואָס זייער קערפּער באַקומט. מען רופט זיי צוליעב זייער קאָליר „קופּער לאַקס“. אין דערזעלביגער צייט ענטוויקעלט זיך אויך ביי די לאַקסען, ווען עס קומט זייער פּרוכפּערונגס-צייט, אזא האַרטער כראַמשקעדיגער האַקען אָדער קרוטשיק אויף דעם שפיץ פון זייער מאָרדע. אָבער די אַלע ענדערונגען פאַרשווינדען נאָך דער פּרוכפּערונג. ווען די לאַקסען שווימען צוריק פון די טייכען אין ים אַריין, זיינען זיי שטאַרק אָפּגעמאַגערט און זייער פלייש איז בלאַס. אין טייך האַבען זיי געקענט געפינען בלוז זעהר וועניג עסען. מען רופט זיי דאָן „גרוי-לאַקס“.

דער קאליפארניער לאקס לעבט אין דעם פאסיפישען ים און ער קומט אין זיין פרוכפערונגס-צייט אין סאקראמענטא, קאלומביא און ארענא, וואו ער ווערט געפאנגען אין אומגעהייער גרויסע מאסען.

עס זיינען אויך פאראן לאקסען, וועלכע לעבען בלויז אין טייך-וואסער און שווימען קיין מאל ניט אוועק אין ים. דער „דאנאיל-לאקס“, וועלכער איז ביז צוויי מעטער לאנג, לעבט אין דעם טייך דאנאיי און אין די טייכען פון די אלפען בערג, וועלכע



צייכנונג 187. — (1 א קאליפארניער לאקס; (2 א שטאק-פיש; (3 א לאקס.


פאלען אין איהם אריין. זיין קערפער איז רונדליך, זיין רוקען איז גרינליך ברוין אָדער בלוי-ברוין, זיין בויך איז זילבער-זוייס און אויף זיינע זייטען האָט ער שוואַרצליכע פלעקען. ער לעבט אָפגעזונדערט און איז זעהר אַ גרויסער פרעסער. די נקבה לעגט איהרע אייער אין דער צייט פון מערץ ביז מאי אין פלאַכע גריבער, וועלכע זי גראָבט אויס מיט איהר עק אין דעם זאַמדיגען גרונד פון טייך. דאָס פלייש פון דעם „דאָנאי לאַקס" איז ווייסליך און געשמאַק צום עסען.

דער שטער-פיש. — עס זיינען פאראן אייניגע מינים פיש, לויט ווי עס איז שוין דערמאָנט געוואָרען אין אָנפאַנג קאפיטעל, וואָס זייער סקעלעט איז ניט פון ביינער, נאָר פון כראָמשקע, אָדער בלויז טיילווייז ביינערדיג. דער שטער-פיש (סבוירדזשען אין ענגליש) איז איינער פון זיי. פון די פאַרשיידענע ספעציעס איז אין אַמעריקא דער באַקאַנטסטער פון זיי, וועלכער לעבט אין דעם טייך מיסיסיפי און אין די „גרייט לייקס". ער איז אַ גרויסער פיש פון צעהן ביז צוועלף פוס די לענג און פון פינף הונדערט פונט געוויכט. ער לעבט בלויז אין פרישען וואַסער, דאָס הייסט אין טייכען און אין אָזערעס. ער איז דער גרעסטער פיש, וואָס מען קען געפינען אין פרישען וואַסער, ניט אין ים. זיין מויל איז אָהן צייהנער. ער שפייזט זיך מיט קליינע וואַסער-פלאַנצען, קליינע פישלעך און מיט אַנדערע קליינע וואַסער-חיות, וועלכע ער זויגט אַריין מיט זיין ראָהר-עהנליכען מויל.


די מייסטע ספעציעס פון די שטער-פיש לעבען אין ים. זייער קערפער איז באַדעקט מיט גרויסע ביינערדיגע שופען, זייער קאָפ איז פאַרהעלנטיסמעסיג קליין און איז באַדעקט מיט ביינערדיגע פלאַטען. זייער מויל איז קליין און אָהן צייהנער, און אויף דער מאָרדע האָט ער עטליכע לענגערע אַרויסשטאַרצונגען, וואָס ווייזען אויס ווי אַ באָרד.

די שטער-פיש, וואָס לעבען אין אַטלאַנטישען אָקעאַן, ווי אויך אין נאָרד ים, אין באַלטישען ים און אין מיטעל-ים, זיינען גע-וועהנליך אַן ערך 8 אָדער 10 פוס לאַנג, אַנדערע אָבער דער-גרייכען אַ לענג פון אַרום 20 פוס. זייער איקרע (אייער) איז שוואַרץ, און ווען עס קומט זייער פרוכפערונגס-צייט פאַרלאָזען זיי דעם ים און קומען אַריין אין די טייכען, וואו יעדע נקבה וואַרפט אַרויס עטליכע מיליאָן אייער.

דאָס פלייש פון שטער־פיש ווערט הויך געשעצט צוליב זיין געשמאק, און פון זיין איקרע ווערט געמאכט קאוויאר. צו די שטער־פיש באַלאַנגען אויך די סטערלארען און סעור־רונגען פון דעם קאספישען און שווארצען ים, וועלכע ווערען זעהר געשעצט פאַר זייער פלייש און פאַר זייער קאוויאר. איינער פון די גרעסטע פיש פון דעם מין איז דער הויזען־פיש, וואָס לעבט אין שווארצען ים און אין די גרויסע טייכען, וואָס פאלען אין איהם אריין. ער איז אַן ערך 25 פוס לאַנג און וועגט אָפּט ביז 4 טויזענד פונט. פון זיין איקרע ווערט געמאכט דער גוט באַקאַנטער רוסישער קאוויאר. צו די פיש, וועלכע האָבען כראַמשקענע סקעלעטען, באַלאַנגט



צייכונג 188. 1 אַ לעפעל־שנאַבעל־פיש; 2 אַ מאַנ־סטער אָדער כימערע פיש; 3 אַ הונטר־פיש; 4 אַ שטער־פיש (סטערליאַד, סטוירזשען).



צייכונג 189. — 1 א שווערד־פיש; 2 א זעג־פיש;  
 3 א הארן־העכט; 4 א האר־פיש (שאַרק); 5 א רעכט־  
 פיש (ער האט אויף זיין קאפ אזא פלאטע, מיט וועלכער ער קען  
 זיך אנוויגען צו פארשיידענע ים־תיות).




אויך דער האָרן־העכט, וועלכער לעבט אין די גרויסע אָזערעס און טייכען פון דעם מיסיסיפי טהאַל אין אמעריקאָ. דער קערפער פון האָרן־העכט איז פון דריי ביז צעהן פוס די לענג און איז באַדעקט מיט גרויסע פיער־קאַנטיגע שופען. זיין קאָפּ איז שמאַל און לאַנג און ענדיגט זיך ווי אַ שנאָבעל. זיין מויל איז פול מיט צייהנער און ער איז איינער פון די מייסט רויבערישע פישען, וועלכער מאַכט גרויסע פאַרניכטונגען צווישען די קלענערע און שוואַכערע פיש.

דער האַר־פיש (שאַרק). — צו די פיש, וועלכע האָבען אַ כראָמאָסקעדיגען (ניט קיין ביינערדיגען) סקעלעט, באַלאַנגט אויך דער האַר־פיש (שאַרק). דער האַר־פיש איז אַ העכסט רויבערי־שער פיש, וועלכער וואַרפט אָן אַ שרעק אויף אַלע ים־חיות. מאַן־כע אַרטען האַר־פיש פאַלען זאָגאַר אָן אויף מענשען. זיי ווערען גערופען „מענשען־פרעסער“. זיין מויל, וואָס איז פול מיט שאַר־פע, שטאַרקע צייהנער, געפינט זיך אין דער אונטערשטער זייט פון זיין קאָפּ. ער קעהרט זיך דעריבער אום מיט'ן בויך אַרויף, ווען ער דאַרף אָנגרייפען זיין רויב, וועלכע געפינט זיך אויף דער אויבערפלעכע אָרער נאָהנט פון דער אויבערפלעכע פון וואַסער. געווענליך זוכען די מייסטע האַר־פיש זייער רויב אויף דעם גרונד פון ים. די האַר־פיש האָבען ניט קיין שופען, און זייערע זשאַב־רעס זיינען ניט באַדעקט מיט קיין דעקלעך. זיי האָבען פינף אָדער זיבען שפאַלטען אין יעדער זייט, ניט ווייט פון קאָפּ, דורך וועלכע דאָס וואַסער קומט צו זייערע זשאַברעס. מאַנכע האַר־פיש זיינען זעהר גרויס און זיי רעכענען זיך צווישען די גרעסטע און גע־פעהרליכסטע ים־חיות. די האַר־פיש געבערען לעבעדיגע קינדער. עהנליך צו דעם האַר־פיש איז דער זעג־פיש, אַ העכסט רויב־בערישער פיש מיט אַ לאַנגען פלאַכען שנאָבעל, וועלכער האָט פון ביידע זייטען שאַרפע צייהנער און זעהט אויס עהנליך צו אַ זעג. ער געפינט זיך אין מיטעל־מעער און אין דעם גאַלף פון מעקסיקאָ. צו די פיש מיט כראָמאָסקע סקעלעטען באַלאַנגען אויך די ראַכען־פיש, אָדער שטראַהל־פיש. זיי האָבען אַ ברייטע פלאַכע קערפער, עהנליך צו פלאַנדרעס און אַ לאַנגען שמאַלען עק. זיי האַלטען זיך אויף נאָהענט ביים גרונד ים, וואו זיי פאַנגען זייער רויב.

דער לעפעל־שנאָבעל פיש, וועלכער לעבט אין דעם מיסיסיפי

טיד, האָט אַ לאַנגען לעפעל־עהנליכען שנאָבעל, וואָס איז אזוי לאַנג ווי אַ דריטעל פֿון זיין קערפּער. דער פּיש איז 5 פֿוס לאַנג. די לונג־פּיש. — אַ כאַראַקטעריסטישער מין פּיש זיינען די לונג־פּיש, וועלכע לעבען אין מאַנכע טייכען פֿון אויסטראַליע און אין די הייסע געגענדען פֿון אַפֿריקאַ און זיד־אַמעריקאַ. ביי די דאָזיגע פּיש איז דער לופֿט־פּענכער ענטוויקעלט אין אַ פּאָל־שטענדיגער לונג צום אַטהעמען. ווען עס איז פּאַראַן גענוג וואַסער אין די טייכען, אַטהעמען זיי, ווי אַלע אנדערע פּיש, מיט זייערע זשאַברעס, אָבער ווען די טייכען טריקענען אויס, גראָבען זיי זיך



צייכנונג 140. — לונגען־פּיש. (1) דער אַפֿריקאַנער לונג־גען־פּיש. א, דער פּאַרענט פֿון זיין מויל, צייגענדיג זיינע צויהנער; ב, איינער פֿון זיינע שופּען, באַדויטענד פּאַרגרעסערט. (2) דער אויסטראַלישער לונגען־פּיש (באַדויטענד פּאַרקלענערט).




איין אין דעם פייכטען בלאָטיגען גרונד און זיי אָטהעמען מיט זייער לופט־פענכער, וועלכער איז עהנליך צו אַ שוואַמיגען זעקעל. מען געהמט דעריבער אָן, אַז דער לופט־פענכער פון אַלע אַנדערע פיש האָט אַמאָל געהאַט די פונקציעס פון לונגען צום אָטהעמען, נאָר ער איז ביסל־עכווייז, צוליב דעם וואָס ער איז ניט געברויכט געוואָרען פאַר אָטהעמען, דעגענערירט געוואָרען און האָט פאַרלאָר־דען זיין אַמאָליגע פאָרמע.

פאַרשידענע מינים פישען. — די צאָהל פון די פאַרשידענע אַרטען פישען איז אונגעהייער גרויס. זיי זיינען פאַרשידען אין זייערע קאָלירען, אין זייער אויסזעהן, אין זייער גרויס און אין זייערע געוואוינהייטען.

לויט דעם לעבען און די געוואוינהייטען פון די פאַרשידענע אַר־טען פיש, קען מען שליסען, אַז זיי וויסען פיעל וואָס אַרום זיי קומט פאַר. זייערע חושים זיינען גוט ענטוויקעלט. דער חוש המשוש (באַרירונגס־געפיהל) איז ביי זיי פאַרשפּרייט איבער דעם גאַנצען קערפּער, און זיי פיהלען די לייכטסטע באַריהרונג. מאַן־כע פון זיי האָבען אַ חוץ דעם ספּעציעלע פיהלס־אָרגאַנען, עהנליך צו פיהל־הערנער. דער קאַץ־פיש, למשל, אַ נידריגער מין פיש, וואָס לעבט אין דעם בלאָטיגען גרונד פון טייכען און סאַזשעלעקעס, האָט אַזעלכע לאַנגע פיהל־הערנער, וואָס וואַקסען איהם אַרויס פון זיין מאָרדע. אייניגע אַנדערע אַרטען פיש האָבען אַזעלכע ספּע־ציעלע פיהל־אָרגאַנען.

דער חוש הריח און דער חוש השמיעה איז אויך ביי די פיש גוט ענטוויקעלט. ביי די קאַץ־פיש און קאַרפּען־פיש איז דער אויער זייערער פאַרבונדען מיט זייער לופט־פענכער. עס איז אָבער צווייפּעלהאַפּט, אויב ביי זיי איז ענטוויקעלט דער חוש הטעם (געפיהל פון געשמאַק). די מייסטע פיש קייען ניט זייער שפּייז, נאָר שליינגען עס ניט געקוימטערהייד. בלויז אייניגע פון זיי צוקייען זייער שפּייז. נאָר ביי אַלע פון זיי זיינען פאַראַן ווע־ניג נערווען פאַרבונדען אין צונג און אין גומען.

די אויגען פון כמעט אַלע פיש זיינען זעהר גוט ענטוויקעלט. אויסנאַהמען זיינען בלויז די בלינד־פיש, וועלכע לעבען אין די וואַסערען פון הוילען אָדער אין די גרויסע פינסטערע טיפּענישען פון ים. ביי מאַנכע פון די פיש זיינען די אויגען אינגאַנצען פאַרשוואַונדען, דערפאַר אָבער האָט זיך ביי זיי שטאַרקער ענט־




צייכנונג 141. — 1) אן אספרעדא (איינער פון די קאץ פיש) מיט מעהרערע אייער ביישלעך באהעפט צום בויך; 2) אַ יאָזשיק־פיש, וועלכער בלאָזט זיך אויף; 3) אַ יונגער אַנגלער־פיש.

וויקעלט דער חוש המשוש. ביי אנדערע פון זיי זיינען נאָך געבליבען סמנים פון אויגען. ביי מאַנכע פון די פיש, וואָס לעבען אין די גרויסע טיעפענישען פון ים, האָבען זיך ענטוויקעלט זעהר גרויסע אויגען, כדי זיי זאָלען כאָטש וויפיעל עס איז קענען זעהן אין דער גרויסער פינסטערניש, וואָס רינגעלט זיי אַרום. ביי אייניגע פון די פיש, וואָס לעבען אין די טיעפענישען פון ים, געפינען זיך אין זייער הויט אזעלכע פלעקען, וועלכע גיבען פון זיך אַרויס אַ העלען גליהליכט ווי פון די פייער־פליגען. וואָר־שיינליך דיענען די דאָזיגע ליכט־קוועלען אַלס לאַמטערנעס פאַר די פיש, צו באַלייכטען זייער וועג און צו פאַנגען זייער שפייז. מאַנכע ים באַשעפענישען ווערען צוגעצויגען פון דעם ליכטיגען שייין און זיי ווערען קרבנות פון זייער אייגענער נייגעריגקייט. ווי זיי דערנעהנטערען זיך צו דעם פיש מיט די לאַמטערנעס, ווערען זיי פון איהם געפאַנגען און פאַרשלאַנגען. עס איז פאַראַן אַ פיש, וואָס לעבט אין די טיעפענישען פון ים, וועלכער האָט אַזאַ לאַנגען, לייכטענדען אַרויסוואַקס פון זיין רוקען און וואָס בויגט זיך אַריבער איבער זיין מויל. ער ווערט גערופען „אַנגלער פיש“. מאַנכע פיש, זוכענדיג שפייז, ווערען צוגעצויגען צו דעם ליכטיגען שייין פון דעם אַרויסוואַקס, וועלכער פאַרצווייגט זיך ביי זיין ענד, ווי די וואָרצלען פון אַ פלאַנץ. זיי מיינען, אַז זיי האָבען געפונען שפייז, אָבער ווי זיי דערנעהנטערען זיך, ווערען זיי געפאַנגען אין דעם גרויסען, בריימען מויל פון דעם „אַנגלער פיש“.

די אויגען פון די פיש, וועלכע האַלטען כסדר אין אַרומשוויי מען, געפינען זיך אין די זיימען פון זייער קאָפּ, ביי די אָבער, וועלכע ליגען אויפ'ן באַדען פון וואַסער, זיינען די אויגען פון אויבען. אינטערעסאַנט אין דעם פרט זיינען די פלאַנדרעס (אַ מין פלאַטישגע פיש). ווען די פלאַנדרעס קומען אַרויס פון איי, האָבען זיי זייערע אויגען אין די זיימען פון קאָפּ. זיי שווימען דאָן אַ געוויסע צייט אַרום פריי אין וואַסער, ווי אַלע אַנדערע פיש, נאָר ווען זיי ווערען אַביסעל גרעסער, לאָזען זיי זיך אַראָפּ אויפ'ן זאַמדיגען גרונד פון וואַסער און לעגען זיך דאָרטען אַוועק אויף איין זייט און בלייבען אַזוי ליגען. דאָן אָבער פאַנגט אָן דאָס אויג פון דער זייט, אויף וועלכער דער פלאַנדרער ליגט, זיך אַריבערצורוקען צו דער אויבערשטער זייט און ביידע אויגען

פון דעם פלאַנדער קומען אויס פון אויבען. דער זייט פון דעם פלאַנדער, וואָס ליגט אויפ'ן זאָמד איז ווייס, וועהרענר זיין אוי- בערשטער זייט איז דונקעל־ברויַן אָדער שוואַרץ. (זעה צייכנונג 136).


די פרוכפערונגס־צייט פון די מייסטע פיש איז אין פריה־ לינג. די זכרים פון פיעלע ספעציעס באַקומען דאָן אַ שעהנערען און אַן אַנציהענדערען אויסזעהן. מאַנכע פון זיי באַקומען באַ־ זונדערם שעהנע קאַלירען. אין אייניגע ספעציעס ווערט צווישען די זכרים געפיהרט אַ קאַמפּף פאַר דעם באַזיץ פון די נקבות.



צייכנונג 142. — דער ים־פּערד (א נקבה, ביי וועלכער עס קומען אַרויס איהרע אויסגעבריהטע קינדער פון דעם זאַק, וואָס זי האָט אויף איהר בויך).

מאַנכע ספעציעס מאַכען זיך נעסטען צו לעגען זייערע אייער, אַנדערע וויעדער לעגען זייער אייער פריי אין וואַסער. די לאַקס־ פיש, ווי שוין פריהער דערמאָנט געוואָרען, גראָבען אויס מיט זייערע עקען פלאַכע גריבער אין דעם זאַמדיגען גרונד פון וואַסער, וואו זיי לעגען זייערע אייער. אַזוי טוען אויך די זונען־פיש און פיעלע אַנדערע. אייניגע ים־פיש מאַכען נעסטען פאַר זייערע אייער אין ים־גראָז. מאַנכע קאַז־פיש טראָגען זייערע אייער אין מויל אָדער אין די פאַלבען פון זייער הויט ביז זיי ווערען אויסגע־ בריהט. ביי די ים־פּערד, אַזאַ קליינער ים־פיש, וואָס זיין קאָפּ איז עהנליך צו דעם קאָפּ פון אַ פּערד, האָט דער זכר אַזאַ לאַנג שמאַל ביי־

טעלע אין'ם אונטערשטען טייל פון זיין קערפער, וואו די נקבה לעגט איהרע אייער און זיי בלייבען דאָרטען ביז זיי ווערען אויסגע- בריהט. מאַנכע פיש, ווי דער האַי־פיש (שאַרק), למשל, געבערען לעבעדיגע קינדער. מאַנכע פיש באַוואַכען זייערע אייער און די פישלעך, וואָס ווערען פון זיי אויסגעבריהט. דאָס טוען די זכרים, ווי ביי די זונ־פיש, קאַזי־פיש און אייניגע אַנדערע. פיעלע אַנדערע פיש אָבער פאַרלאָזען זייערע אייער, ווי זיי האָבען נאָר זיי אויסגעלעבט, אַנדערע ווידער וואַכען איבער די אייער ביז



צייכונג 143. — 1) אַ זון־פיש; 2) אַ פאַנצער־פיש (זיין קאַפּ און קערפער איז באַדעקט מיט האַרמע ביינערנע פלאַטען; ער קען בלוזן באַוועגען דעם עק, די פלוסי־פעדערען און זיין מויל); 3) דער פענכער־פיש (ער בלאָזט זיך אויף ווי אַ פענכער און שווימט אויף דער אויבער־פלעכע פון וואַסער מיט'ן בויך אַרויף).

זיי ווערען אויסגעבריהט און ווען די יונגע פישלעך קומען פון זיי אַרויס, לאָזען זיי זיי איבער אויף גאָט'ס בעראַט, ווי דאָס איז דער פאל ביי די הערינג, לאַקס, אַקונעס, שטאַק־פיש און פילע אַנדערע. די שוצלאָזע יונגע פישלעך ווערען דער רויב פון די גרעסערע פיש, וואָס לױערן אויף זיי. אָפט דינען זיי זאָגאר פאַר שפייז פאַר זייער אייגענע עלטערען.


ביי די ספעציעס פיש, ביי וועלכע די אייער און די קליינע פישלעך, וואָס קומען אַרויס פון זיי, ווערען באַשיצט פון זייערע עלטערען, איז די פראָדוקטיוויטעט ניט קיין גרויסע. די נקבות

לעגען פארהעלטניסמעסיג וועניג אייער. די פראדוקטיוויטעט איז, אָבער, זעהר אַ גרויסע ביי די יעניגע ספעציעס, וועלכע שיעצן ניט און באוואַכען ניט די אייער אָדער די פישעלעך, וואָס קומען פון זיי אַרויס. די נקבות פון אַזעלכע ספעציעס לעגען אָפט מעהרערע מיליאָנען אייער. די פארמעהרונג אָבער איז אין דורכ־שניט אומגעפעהר דויעלכביגע ביי אַלע ספעציעס. אַנדערע פּוּאָר־דוצירען וועניג אייער אָבער זיי היטען זיי און עס בלייבען איבער פון זיי אַ גרעסערע צאָהל פיש, וועלכע בלייבען לעבען און וואַס־סען אויס. אַנדערע ווידער פּראָדוצירען אַ סך אייער, אָבער בלויז אַ טייל פון זיי ווערען אויסגעבריהט און בלויז אַ טייל פון די אויס־געבריהטע פישעלעך בלייבען לעבען און וואַסען אויס. ווען אַלע אייער, וואָס איין שטאָק פיש לעגט אויס (אַן ערך 8 מיליאָן) וואַלטען אויסגעבריהט ווערען און אַלע פישעלעך, וואָס וואַלטען אַרויסקומען פון זיי, וואַלטען אויסוואַסען און דערנאָך אַליין לעגען אייער. פון וועלכע קיינע וואַלט ניט אַניוועזן קומען, וואַלטען אין פּאַרלוף פון 15 יאָהר צייט די דורות פון איין שטאָק פיש גע־קענט פול מאַכען דעם ים, אַז ער זאָל זיין אזוי געדיכט, דאָס קיין שיפען וואַלטען איבער איהם מעהר ניט געקענט פּאַהרען.

די ענטוויקלונג פון פיש. — פון די פּאָסילען (פּאַרשטיי־נערטע רעשטען פון חיות אָדער פּלאַנצען), וואָס מען האָט גע־פונען אויף פּאַרשיידענע פעלזען, קען מען באַקומען אַ באַגריף ווי אזוי די פיש, וואָס לעבען אין אונזערע צייטען, האָבען זיך ענט־וויקעלט. די פיש וועלכע האָבען געלעבט אין אַ פריהערדיגע פעריאָדע פון דער ענטוויקלונג פון אונזער ערד מיט איהרע פּלאַנ־צען און באַשעפענישען, זיינען געווען זעהר איינפאך און פון אַ פיעל נידעריגערע ענטוויקלונג ווי די היינטיגע פיש. פיעל פון די אַמאָליגע פיש־פּאַרמען זיינען שוין לאַנג פאַרשוואַנדען, ווערענד פיעל פון זיי האָבען זיך ביסלעכווייז געענדערט, כדי זיך צו־צופאַסען צו דער אומגעבונג און צו די באַדינגונגען פון לעבען. די פאַרשיידענע פּאַרמען און טיפען פיש, וואָס מיר האָבען היינט, זיינען אַ רעזולטאַט פון דער נויטווענדיגקייט זיך צוצופאַסען צו דער אומגעבונג און צו די באַדינגונגען פון לעבען. מאַנכע פון די נידעריגע מינים פישען, ווי די לאַנצעטען און לאַמפרעטען, האָבען זיך, ווי עס שיינט, וועניג געענדערט, וועהרענד די העכער־ענטוויקעלטע פּאַרמען האָבען דורכגעמאַכט גאַנץ גרויסע ענדע־




רונגען. און באטראכט מען די ענטוויקלונג פון א יונגע פישעל, פון דער צייט וואָס עס קומט אַרויס פון איי ביז עס וואַקסט אויס גרויס, דאַן קען מען זיך פאַרשטעלען די געשיכטע פון דער ענט- וויקלונג וואָס די פיש אין אלגעמיין האָבען דורכגעמאַכט. עס באַוווּיזען זיך צוערשט די פאַרמען פון קאַפּ און רומפּ, שפּעטער באַוווּיזען זיך די זשאַכרעס און עס ערשיינט דאָס נערווען-סיס- טעם, וואָס שטיצט זיך אויף אַ נאַטאַכאַרד, וועלכער ענטוויקעלט זיך שפּעטער אין אַ רוקען-ביין. מען קען זאָגען, אז דאָס יונג פישעל ווידערהאַלט אין אַ קורצער צייט די גאַנצע געשיכטע פון ענטוויקלונג, וואָס זיין שטאַם האָט דורכגעמאַכט אין טויענדער יאָהרען.



צייכונג 144. — א שטראַהל-פיש. א, זיינע קינבאַקען און ציינער; ב, זיין מויל און זשאַכרעס.

שוויַמיטלען. — די געוועהנליכע שוויַמיטלען פון די מיר סטע פיש, דורך וועלכע זיי קענען אויסמידען זייערע שונאים, זיינען זייערע גוט ענטוויקעלטע חושים. זיי זעהען, זיי הערען און זיי פיהלען יעדע באַריהרונג אָן זייער קערפער. די גרעסטע פיש קענען זיך שיצען מיט זייערע צייהן און מיט זייער עק. פילע פיש האָבען אָבער ספּעציעלע שוויַמיטעל. דער קאַרפּיש, למשל, האָט אזא שאַרפען שטעכער אין זיין ברוסט פלוס-פּעדער, מיט וועלכען ער פאַרוואונדעט זיינע אָנגרייפער. א פּעליקאַן (אזא גרויסער זומפּפויגעל), וואָס פאַרשלינגט אַ קאַרפּיש, בלייבט


זעלטען לעבען. ער שטארבט פון דער וואונד, וואָס דער קאַץ־פּיש מאַכט איהם מיט זיין שטעכער. אַנדערע פּיש, ווי די סקאַרפּיאָן־פּיש, האָבען אַזעלכע שטעכער אין זייערע פלוס־פעדערען, וועלכע זיינען שטאַרק גיפטיג. דער שטעך־שטראַהל־פּיש (אַזאַ פּלאַטשי־נער רונדער פּיש ווי אַ פּלאַנדער, מיט אַ לאַנגען דינעם עק), האָט אויף זיין עק אַ שליים־באַדעקטען שטעכער, וועלכער האָט צייהנער ווי פּון אַ זעג. אַ וואונד, וואָס ווערט געמאַכט מיט דעם דאָ־זיגען שטעכער, איז זעהר געפעהרליך, ווייל דער זעג־שניט, וואָס ער מאַכט, און דער שליים, וואָס קומט אַרײַן אין איהם, פאַר־אורזאכט מייסמענס בלוט־פאַרגיפטונג.




צייכנונג 145. — אַ מאַרפּעדאַ פּיש (אַן עלעקטרישער פּיש). ב, קאַפּ־מאַרד; א, אויגען־נערוו; ע, עלעקטרישע אַרגאַנען; ז, זשאַכרעס; ר, רוקען־נערווען; מ, רוקען־מאַרד; פ, די נערווען, וועלכע פיהרען צו די עלעקטרישע אַרגאַנען.

מאַנכע פּיש זיינען באַשיצט דורך זייער הויט, וואָס איז פול מיט שטעכיגע נאָדלען, ווי די יאָזשיק־פּיש, למשל. די יאָזשיק־פּיש האָבען דערצו נאָך אַ פעהינקייט זיך אויפצובלאָזען מיט לופט, וואָס דאָס גיט זיי אַ ספעציעלען שווע־מיטעל געגען זייערע פאַר־פּאָלנער. ווען אַ יאָזשיק־פּיש ווערט פאַרפּאָלגט פּון אַ פּיינדליכען פּיש, בלאָזט ער אויף זיין מאַגען פול מיט לופט און שווימט אַרויף אויף דער אויבערפלעכע פּון וואַסער, וואו ער בלייבט שוואַמען אויפ'ן רוקען מיט זיין בויך אַרויף. אייניגע מינים פּיש זיינען באַוואַפענט מיט עלעקטרישע באַטאַרעען, ווי דער טאַרפּידאַ פּיש, דער עלעקטרישער אַאל, דער

עלעקטרישער קאז-פיש, דער עלעקטרישער שטראהלען-פיש א. א. וו. ווען די דאָזיגע פיש ווערען אָנגעגריפען, באַקומט דער אָנ-גרייפער פון זיי אַן עלעקטרישען שלאַג.  
עס זיינען פאַראַן פיש, וואָס זייערע פלוס-פּעדערען זיינען גרויס און ענטוויקעלט ווי פליגלען. דאָס זיינען די פליה-פיש. זיי ראַטעווען זיך פון זייערע פאַרפאַלגער אין וואַסער דערמיט, וואָס זיי שפּרינגען אַרויס פון וואַסער אין דער לופט און פליהען נאָך באַדייטענדע שטרעקען איבער'ן וואַסער.



צייכונג 146. — דער געווענליכער פליה-פיש.



צייכונג 147. — פאַרשיידענע פליה-פיש. (1) דער ים-שוואַלב; (2) דער ים-ראַב; (3) דער ים-פויגל.

## זיבעצעהנטער קאפיטעל.

די ענטוויקלונג פון אמפיביען. — דער פראָש און זיינע מעטאָמארפא-  
זען. — די זשאָבעס. — די סאַלאַמאַנדרעס. — די פרוכפערונג פון  
אמפיביען.


## די אמפיביען.

די ענטוויקלונג פון אמפיביען. — מיט דעם נאָמען אמ-  
פיביען ווערען גערופען די ווירבעל-חיות (ווערטעבראַטען),  
וואָס זייער קערפער איז צוגעפאַכט צו לעבען אי אין וואַסער אי  
אויף דער יבשה. די מייסטע פון זיי מאַכען דורך אַ פּאָלשטענדיגע  
מעטאָמאָרפּאָזע. זיי מאַכען דורך אַ גאַנצע רייה ענדערונגען פון  
זייער לאַרווען צושטאַנד (ווען זיי ווערען אויסגעבריהט פון איי)  
ביז זייער אימאַנאָ צושטאַנד (ווען זיי ווערען פּאָלשטענדיג ער-  
וואַקסען). אין זייער לאַרווען צושטאַנד לעבען אַלע אמפיביען  
בלויז אין וואַסער און זיינען כמעט אינגאַנצען עהנליך צו פיש.  
ביסלעכווייז אָבער ענטוויקעלט זיך זייער אָרגאַניזם און ווערט צו-  
געפאַסט צום לעבען אויף דער יבשה. און מאַכט פון זיי שיידען  
זיך דאָן אינגאַנצען מיט דעם וואַסער לעבען און בלייבען לעבען  
אויף דער יבשה.

די לונג-פיש, וועלכע זיינען באַשריבען געוואָרען אין דעם  
פריהערדיגען קאפיטעל, קענען גערעכענט ווערען אַלס די נעהענט-  
סטע עהנליכע באַשעפענישען צו די אמפיביען. עס ווערט דער-  
ריבער אָנגענומען, אז די באַשעפענישען פון וועלכע די אמפיביען  
האַבען זיך ענטוויקעלט, זיינען געווען אַ מין פיש, וועלכע האָבען,  
דורך ענטוויקלונג פון לונגען, זיך ביסלעכווייז צוגעפאַסט צו דעם  
לעבען אויף דער יבשה און דורך אַ לאַנגער קייט פון ענטוויקלונג-  
גען און צופאַסונגען זיינען פון זיי ענטשטאַנען די אמפיביען פון  
אונזער צייט.

צו די אמפיביען געהערען די פרעש, די זשאָבעס און די סאַ-  
לאַמאַנדערס. די פרעש זיינען די מייסט כאַראַקטעריסטישע פון  
זיי און אויך די מייסט באַקאַנטעסטע. די פרעש לעגען זייערע  
אייער אין פריהלינג צייט אין טייכען, אָזערעס אָדער סאַזשעלעקעס.

זייערע אייער זיינען רונד, אזוי גרויס ווי קליינע שראָט, באַדעקט מיט אַ זשעלאַטין הייטעל. זיי לענגען זיי אויף די וואַסער-גראָז אָדער אויף די בלעטער פון די וואַסער-פלאַנצען, צו וועלכע זיי קלעפען זיך צו. אין אַ משך פון עטליכע טעג קומען פון די



צייכונג 148. — די ענטוויקלונג פון אַ פראַש. (1) די אויסגער־ לעגטע אייער פון פראַש; (2) די לאַרווען; (3) דער יונגער אומגעשווי- קעלטער פראַש, מיט פארצווייגטע זשאַברעס; (4) דער יונגער אומגעש- וויקעלטער פראַש, ווען עס פארשווינדען ביי איהם די פאַרצווייגטע זשאַברעס; (5) זיין אויסזעהן פון דער רוקע־זייט; (6) ווען עס וואַקסען אַרויס ביי איהם אויך די הינטערשטע פיס; (7) ווען עס וואַקסען אַרויס ביי איהם אויך די פאָדערשטע פיס; (8) ווען עס פאַנגט אָן ביי איהם פאַרשווינדען דער עק; (9) ווען ער האָט שוין דעם אויסזעהן פון אַ פּוּל־ענטוויקעלטען פראַש; (10) אַ פּאַלשמענדיג אויסגעוואַקסענער פראַש; (11) דער סקעלט פון אַ פראַש; (12) אַ בויס־פראַש (פארקלענערט).

אייער ארויס קליינע לארווען, מיט א לענגליכען קערפער, וועל-  
 כער האָט אַ קאָפּ מיט אַן עק. אין קאָפּ פּעהלען אָבער אויגען  
 מיט אַ מויל. עס דויערט אָבער ניט לאַנג און ביי דער לאַרווע  
 ענטוויקעלט זיך אַ מויל און אויגען, ווי אויך אַ נאָז מיט אויערען.  
 דערביי באַווויזען זיך אויך אויסערליכע זשאַכרעס פון ביידע זיי-  
 טען פון קאָפּ. דער קאָפּ מאַרד און דער רוקען מאַרד זיינען גע-  
 שטיצט דורך אַ נאָטאָכאַרד (אַ כראָמשקעדיגע סטרונע). אין  
 דעם צושטאַנד איז דער יונגער פּראָש פּאָלשטענדיג עהנליך צו אַ  
 פּיש. ער באַוועגט זיך אין וואַכער און שווימט ווי אַ פּיש, און  
 זיין נאַנצער אָרגאַניזם איז ווי פון אַ פּיש.

אין אַ פּאַרלויף פון עטליכע וואָכען פּאַנגען זיך אָן ביי דעם  
 יונגען פּראָש צו ענטוויקלען אַ פּאַר הינטערשטע פּיס און אַביסעל  
 שפּעטער אַ פּאַר פּאַדערשטע פּיס. די הינטערשטע פּיס זיינען  
 לענגער ווי די פּאַדערשטע און דאָס מאַכט דעם פּראָש פּעהיג צו  
 שפּרינגען. די פּאַדערשטע פּיס, וועלכע האָבען צו פיער פינגער,  
 זיינען מעהר עהנליך צו הענט. די הינטערשטע פּיס האָבען צו  
 פינף פינגער, וועלכע זיינען פּאַראַיניגט דורך אַ דין הייטעל, וואָס  
 ווערט פון פּראָש באַנוצט ביים שווימען.

אין דערזעלביגער צייט, וואָס עס קומען אין פּראָש פּאַר די  
 אויסערליכע ענדערונגען אין זיין קערפער, קומען אויך פּאַר אין  
 איהם גרויסע אינערליכע ענדערונגען. עס ענטוויקעלט זיך אין  
 איהם אַ לונג און ער פּאַנגט אָן עפּטער אַרויסצוקומען אויף דער  
 אויבערפלעכע פון וואַסער צו שלינגען לופט, אָבער ער האָט נאָך  
 אויך זיינע זשאַכרעס, מיט וועלכע ער קען אָטהעמען זייענדיג  
 אין וואַסער. אין דעם צושטאַנד איז דער פּראָש אַ פּאָלשטענדיגע  
 אמפיביע (אַ באַשעפעניש, וואָס האָט אָרגאַנען צו אָטהעמען אי  
 אויף דער יבשה אי אין וואַסער). זיין ענטוויקלונג ווערט אַזוי  
 פּאַרטגעזעצט ביז עס פּאַרשווינדעט ביי איהם דער עק און די  
 זשאַכרעס און ער ווערט מעהר צוגעפּאַסט צום לעבען אויף דער  
 יבשה, ווי אין וואַסער. אין דערזעלביגער צייט ענדערט זיך אויך  
 די דיעטע פון דעם פּראָש. פון גרינס־שפּייזען געהט ער איבער  
 צו פּלייש־שפּייזען, ווי אינזעקטען און אַנדערע קליינע באַשעפּע-  
 נישען. און מיט דער ענדערונג פון דער דיעטע ענדערט זיך ביי  
 דעם פּראָש זיין פּאַרדייאָננס־סיסטעם. און אָט אַזוי מאַכט דער  
 פּראָש דורך אַ פּאָלשטענדיגע מעטאַמאָרפּאָזע. אין זיין דערוואַק-

סענעם צושטאנד זעהט ער אויס ווי א גאנץ אנדער באשעפעניש, ווי אין זיין לארווען-צושטאנד, סאי אויסערליך, סאי אינערליך. אין זיין לארווען צושטאנד שוידעט ער זיך וועניג וואָס אונטער פון א פיש, וועהרענד אין זיין דערוואַקסענעם צושטאנד איז ער פיעל נעהנטער צו די פיער-פּיסיע יבשה-באשעפענישען.

דער סקעלעט פון פּראָש איז זעהר עהנליך צו די סקעלעמען פון די פיער-פּיסיע ווירבעל-חיות (ווערטעבראַטען), אָדער זאָ-גאר פון א מענשען. בלויז דער קאָפּ-שאַרבען איז ביי איהם ניט אינגאנצען פאַרביינערט און באַדעקט ניט דעם קאָפּ-מאַרד פון אַלע זיימען.

דאָס מויל פון פּראָש איז גרויס און ברייט. זיין דיקע גאַפּעל-פערמיגע צונג איז צוגעוואַקסען צו דעם אונטערשטען פּאָדערשטען טייל פון זיין מויל, עס הייסט, אַז דער הינטערשטער ענד פון זיין צונג איז פריי, וועהרענד דער פּאָדערשטער ענד איז צוגעוואַקסען. ווען דער פּראָש וויל באַנוצען זיין צונג צו פאַנגען אינזעקטען, מוז ער אַריבערבויען דעם פרייען הינטערשטען ענד איבער דעם פּאָ-דערשטען אָנגעוואַקסענעם ענד. אויף דעם ראַנד פון זיין אוי-בערשטען קינבאַק געפינט זיך אַ רייה קליינע דינע צייהנער, וועל-כע זיינען עהנליך צו קורצע האַרטע הערעלעך. ער האָט אויך צוויי רייהען אַזעלכע צייהנער אין זיין גומען.

דער פאַרדייאונגס-אַפּאַראַט פון פּראָש באַשטעהט פון אַ מאַ-גען, פון אַ דינע געדריעהמע קישקע און פון אַ ברייטע, קורצע קישקע. ער האָט אויך אַ לעבער, וואָס גיט אַרויס פון זיך אַ גאַליקע פליסיגקייט, וועלכע העלפט מיט דעם פאַרדייאונג, און אין זיין אינגעווייד געפינט זיך אויך אַ מילך. די פאַרדייאונגס-אָרגאַנען פון אַ פּראָש האָבען פיעל עהנליכקייט מיט זייער אויס-זעהן און מיט זייער לאַגע צו די פאַרדייאונגס-אָרגאַנען פון אַ מענשען. אין אַלגעמיין האָבען אַלע אָרגאַנען פון אַ פּראָש פיעל עהנליכקייט צו מענשליכע אָרגאַנען.

די לונגען פון פּראָש געפינען זיך נאָהענט פון זיין קאָפּ און זיינען פאַרבונדען מיט אַ קאַנאַל וואָס דינעט אי אַלס לופט-רעהר אי אַלס שטימ-אָרגאַן. אויף דעם אויבערשטען טייל פון דעם דאָזיגען קאַנאַל געפינען זיך די שטימ-בענדער פון דעם פּראָש, מיט וועלכע ער קוואַקעט. ביי די זכרים זיינען די שטימ-בענדער בע-

סער ענטוויקעלט ווי ביי די נקבות, און די זכרים קוואַקען דעריבער בעסער.

דער פּראָש אַטהעמט דורך זיינע נאָזלעכער, האַלטענדיג דאָס מויל פאַרמאַכט. ווען דאָס מויל איז ביי איהם אָפּען, קען דער פּראָש ניט אַטהעמען.

דער פּראָש זויגט אויך אַרײַן אין זיך דעם זויער־שטאַף פון דער לופט דורך זיין הויט, וועלכע איז פול מיט פּאַרען (קלײַנע לעכעלעך) און וועלכע איז אימער פייכט פאַר דעם צוועק.

דאָס האַרץ פון פּראָש, וואָס איז איינגעשלאָסען אין אַ הויט־זעקל, ליעגט צווישען זיינע לונגען און איבער זיין מאָגען. דאָס האַרץ האָט דריי חללים אָדער קאַמערען. אין דעם לינקען חלל גיסט זיך אַרײַן דאָס גערייניגטע בלוט, וואָס קומט פון די לונגען; אין דעם רעכטען חלל גיסט זיך אַרײַן דאָס אומרייניגע בלוט, וואָס קומט פון קערפּער, וועהרענד פון דעם דריטען חלל געהט דאָס בלוט צוריק אין קערפּער.

דאָס בלוט פון פּראָש איז רויט, אָבער קאַלט.

דאָס נערווען־סיסטעם פון פּראָש איז איינגעטיילט אין צוויי טיילען, איין טייל ווערט קאָנטראָלירט פון דעם קאָפּ־מאַרד און דער צווייטער טייל — פון רוקען־מאַרד.

די אויגען פון פּראָש זיינען זעהר גוט ענטוויקעלט. די אויגען פון אַ פּראָש האָבען אין זיך כמעט אַלע טיילען, וואָס אַ מענשליכע אויג. דאָס אויג פון פּראָש זיצט אין אַן אָרביט (אויגען־לאָך) און ווערט באַוועגט דורך עטליכע מוסקולען. דאָס אויג ווערט געשיצט פון צוויי אויגען־לעדעלעך. דאָס אויבערשטע אויגען־לעדעל איז גרעסער אָבער וועניגער באַוועגליך ווי דאָס אונטער־שטע. דערצו איז דאָס אונטערשטע אויגען־לעדעל האַלב דורכ־זיכטיג, וועהרענד דאָס אויבערשטע איז גאָר ניט דורכזיכטיג.

אויך דאָס געהער איז ביי דעם פּראָש גוט ענטוויקעלט. די עפּנונגען פון זיינע אויערען זיינען פאַרבונדען מיט זיין מויל.

מען דאַרף אויך אָננעהמען, אז ביי דעם פּראָש איז אויך ענטוויקעלט דער חוש הטעם (געשמאַקס־געפיהל) און דער חוש הריח, ווייל אין זיין צונג געפיט זיך אַ געשמאַקס־געפיהל נערוו און אין זיין נאָז געפינט זיך אַ נערוו צו פיהלען אַ ריח. דער חוש המשוש (באַריהונגס אָדער טאַפּונגס געפיהל) געפינט זיך



ביי דעם פראָש אין דער הויט און דער דאָזיגער חוש איז ביי איהם זעהר גוט ענטוויקעלט.

עס זיינען פאראן מעהרערע פארשיידענע ספעציעס פרעש, אָבער דער אונטערשיעד צווישען זיי איז ניט גרויס.

די זשאַבעס. — די נעהענטסטע קרובים צו די פרעש זיינען די זשאַבעס. אין אַלגעמיין שיידען זיך די זשאַבעס זעהר וועניג אונטער פון די פרעש. זיי מאַכען דורך פונקט דיזעלביגע ענט-וויקלונג ווי די פרעש, האָבען אומגעפעהר דעמוזעלביגען אויסזעהען און דעמוזעלביגען אָרגאַניזם ווי פון פרעש, און אין דער אומנאַנגס-שפראַך ווערען זיי אויך גערופען פרעש. זיי אונטערשיידען זיך פון פרעש בלויז מיט דעם וואָס זייער הויט איז טרוקען, וואָס זיי האָבען קיין צייהער און וואָס זיי פאַרלאָזען אינאַנצען דאָס וואַסער, ווען זיי דערגרייכען זייער פולער ענטוויקלונג.

ווען די זשאַבעס האָבען דורכגעמאַכט אַלע זייערע מעטאָ-מאָרפאָזען אָדער ענדערונגען אין זייער ענטוויקלונג, פאַרלאָזען זיי דאָס וואַסער און באַזעצען זיך אין טרוקענע לעכער פון דער ערד. מאַנכע ספעציעס באַזעצען זיך אויף בוימער. זיי קומען צוריק צום וואַסער בלויז ווען זיי דאַרפען לעגען זייערע אייער. די זשאַבעס נעהרען זיך מיט אינזעקטען. בייטאָג ליגען זיי באַהאַלטען אין זייערע לעכער, נאָר ווען עס קומט אָן די נאַכט, לאָזען זיי זיך אַרויס זוכען שפּיז.

די זשאַבעס, וועלכע לעבען אויף בוימער, זיינען גוטע קלע-טערער. די פינגערס פון זייערע פיס זיינען אַזוי אויסגעבילדעט, אַז זיי זייגען זיך צו צו דעם אָרט, וועלכען זיי באַריהרען, און דאָס גיט די מעגליכקייט די זשאַבעס לייכט צו קלעמערען אויף בוימער.


דער וויכטיגסטער שוץ-מיטעל פון די זשאַבעס געגען זייערע פייגל, וועלכע לוייערען זיי צו פאַרשלינגען, זיינען זייערע פאַר-בען. ביי די מייסטע ספעציעס איז דער קאָליר פון זייער הויט צו געפאַסט צו דער אומגעבונג, אין וועלכער זיי לעבען. די, וועלכע לעבען צווישען פאַרשיידענע פלאַנצען, האָבען די קאָלירען פון די פלאַנצען בלעמער, צווישען וועלכע זיי געפינען זיך און עס איז זיי דעריבער שווער צו באַמערקען. די בויס זשאַבעס ביימען זייערע קאָלירען, ווען זיי ענדערען זייערע פּאָזיציעס, כדי זיי זאָלען זיך ניט אַרויסזעהן. מאַנכע ספעציעס וויעדער האָבען גראָד

אזעלכע פארבען, וועלכע שלאָגען שטאַרק אָפּ פון דער אומגעבונג אין וועלכער זיי געפינען זיך, אז מען זאָל זיי קענען וואָס בעסער זעהן. זיי האָבען גאנץ העלע רויטע, גרינע אָדער געלע קאָלירען. די דאָזיגע זשאַבעס, ווי עס שיינט, געפינען גראָד אַ שוץ אין דעם, וואָס מען קען זיי דערזעהן פון ווייטען. זיי זיינען, ווי עס ווערט אָנגענומען, ניט קיין אַפּעטיטליכע שפייז פאר די פּויגלען אָדער אַנדערע באַשעפענישען, וואָס זוכען זייער נאָהרונג, און די וועלכע האָבען זיי איינמאָל פּרובירט עסען, ווילען זיי אַ צווייטען מאָל אין מויל ניט נעהמען. די פיעלע קאָלירען זיינען, אַלזאָ, אַ מין וואַרונגס־סיננאַל פאַר מעגליכע געסט, וועלכע האָבען שוין אַמאָל פאַרוזכט דעם טעם פון אַ זשאַבע, אז זיי זאָלען זיך ניט מטריה זיין אומזיסט. עס איז אויך פאַראַן אַן אַרט זשאַבע, וועלכע לאָזט אַרויס פון איהר הויט אַזאַ מילך־ווייסע פליסיגקייט, וועלכע איז זעהר ביטער, און דאָס איז זייער בעסטער שוץ.

די סאַלאַמאַנדרע. — צווישען די מעהר באַקאַנטע אַמ־פּיביען קען אויך גערעכענט ווערען די סאַלאַמאַנדרע. ביי אידען איז פאַראַן אַ גלויבען, דורך אַן אַגרה פון גמרא, אז אַ סאַלאַמאַנדרע ווערט געבאָרען פון פייער. עס הייסט, אז ווען אַ פייער ברענט אויף איין פּלאַץ 7 יאָהר כּסדר, ווערט דאָרטען געבאָרען אַ סאַלאַמאַנדרע. דערביי ווערט אָנגעגעבען, אז דאָס בלוט פון אַזאַ סאַלאַמאַנדרע איז אַ סגולה צו פאַרשיידענע קראַנקהייטען. דער אמת איז אָבער, אז אַ סאַלאַמאַנדרע ווערט ניט געבאָרען אין פייער, נאָר אין וואַסער, און איהר בלוט איז ניט קיין גרעם סערע סגולה פאַר קראַנקהייטען, ווי דאָס בלוט פון אַ פּראָש. די סאַלאַמאַנדרע איז טאַקע אַ גאַנץ נאָהענטע קרובה צו דעם פּראָש און זי מאַכט דורך כּמעט דיזעלביגע ענטוויקלונג וואָס אַ פּראָש מאַכט דורך.

די יונגע סאַלאַמאַנדרעס, ווען זיי קומען אַרויס פון די אייער, וואָס זייער מוטער האָט געלייגט אין וואַסער, זיינען גאַנץ עהנליך צו די לאַרווען פון פרעש, וועלכע זיינען אויבען באַשריבען געוואָרען. און פונקט אַזוי ווי די פרעש, מאַכען זיי דורך די אַלע מעטאַמאָרפּאָזען ביז זיי וואַקסען אויס און באַקומען אַ גאַנץ אַנדער אויסזעהן ווי אין זייער פּריהער יוגענד. עס ענטוויקעלט זיך ביי זיי לונגען, עס וואַקסען זיי אויס פיער פיס און זיי זיינען צוגעפאַסט צו לעבען אי אין וואַסער אי אויף דער יבשה. אי

זייער ענטוויקלונג שידען זיך די סאלאמאנדרעס נאָר אונטער פון די פרעש, וואָס זיי פארלירען ניט זייער עק, וואָס זיי האָבען געהאט אין זייער לאַרווען־צושטאַנד. דער עק בלייבט ביי זיי, ווען זיי האָבען שוין אפילו דורכגעמאַכט אלע מעטאַמאָרפּאָזען. עס זיינען אויך פאַראַן מאַנכע ספּעציעס פון סאלאמאנדרעס, ביי וועלכע עס בלייבען די זשאַברעס אויך נאכדעם, ווי עס האָט זיך ביי זיי ענטוויקעלט לונגען. ביי די מייסטע ספּעציעס אָבער



צייכנונג 149. — סאלאמאנדרעס. 1 א געווענליכע סאלאמאנדרע; 2 א יונגע, ניט ענטוויקעלטע מעקסיקאנער סאלאמאנדרע; 3 א פול ענטוויקעלטע מעקסיקאנער סאלאמאנדרע; 4 א וואַסער סאלאמאנדרע; 5 א יונגע וואַסער־סאלאמאנדרע.

פאַרשווינדען די זשאַברעס ווען די לונגען האָבען זיך ענטוויקעלט. אַזעלכע סאלאמאנדרעס פאַרלאָזען אָפט אינגאַנצען דאָס וואַסער און לעבען אין פייכטע ערטער אויף דער יבשה, מייסטענס אונטער שטיינער אָדער שטיקער האַלץ. זיי קעהרען זיך אום צום וואַסער בלויז ווען זיי דאַרפען לעגען זייערע אייער. די פיס ביי די סאלאמאנדרעס זיינען שוואַך ענטוויקעלט און זיי האַלטען ניט אויף דעם קערפּער. ביי מאַנכע ספּעציעס זיינען

פאַראַן בלוז שפורען פון הינטערשטע פיס, און ביי אנדערע, וועל-  
כע לעבען אין ערדלעכער, פעהלען די פיס אינגאַנצען. די דאָזיגע  
סאַלאַמאַנדרעס האָבען פאַר זייער אַרט לעבען ניט נויטיג קיין  
פּיס און זיי זיינען דעריבער ביי זיי ביסלעכווייז פאַרשוואַנדען  
געוואָרען.

אין אַ פּריהערדיגען פּעריאָד פון אונזער וועלט האָבען גע-  
לעבט גאַנץ גרויסע סאַלאַמאַנדרעס, וועלכע זיינען געווען מעהרערע  
פּוס די לענג. אַנדערע פון זיי האָבען אויף זיך געהאַט בינערנע  
פּאַנצער פּלאַטען. דאָס ווייס מען פון די פּאַסילען (פאַרשטיינער-  
טע היות), וועלכע מען האָט געפונען. די סאַלאַמאַנדרעס פון  
אונזער צייט אָבער זיינען שוואַכע און קליינע, בלוז עטליכע צאָל  
(אינטשעס) די לענג. אין יאַפּאַן און אין אמעריקא זיינען אָבער  
פאַראַן אייניגע ספּעציעס, וועלכע זיינען ציעמליך גרויס און דער-  
גרייכען אַ לענג פון דריי פּוס.

די פּרוכפּערונג פון אמפּיביען. — די מייסטע אמפּיביען  
פאַרען זיך אין פּריהילינג און זיי לעגען זייערע אייער אין וואַסער,  
אָפט אונטער דער באַגלייטונג פון אַ קוואַקעריי, וואָס הערט זיך  
פאַר אַ ווייטען מהלך. פון די אייער קומען אַרויס, ווי אויבען  
איז שוין באַשריבען געוואָרען, לאַרווען, וועלכע זיינען אינגאַנצען  
ניט עהנליך צו זייערע עלטערן, ביז זיי מאַכען דורך אַ גאַנצע רייה  
פון מעטאַמאָרפּאָזען. מאַנכע ספּעציעס פון די סאַלאַמאַנדרעס  
געבערען לעבעדיגע קינדער. עס זיינען אויך פאַראַן אייניגע ספּע-  
ציעס פרעש און זשאַבעס, וועלכע פּאַסען אויף אויף זייערע קינד-  
דער, וועלכע בריהען זיך אויס פון איי, ביז זיי ענטוויקלען זיך, דאָס  
הייסט ביז זיי מאַכען דורך די מעטאַמאָרפּאָזען. ביי מאַנכע ספּע-  
ציעס פון בוים-זשאַבעס טראָגט די נקבה איהרע אייער אין אַ  
בייטעל אויף איהר רוקען ביז זיי ווערען אויסגעבריהט און די  
לאַרווען מאַכען דורך די ערשטע שטופּען פון זייער ענטוויקלונג.  
עס איז אויך פאַראַן אַ אַרט זשאַבעס אין זיד אמעריקא, וואָס  
דער זכר קלייבט אויף די אויסגעלעגטע אייער און לעגט זיי אוועק  
אויף דעם רוקען פון דער נקבה, וואו זיי דרינגען אַריין אין די  
לעבעלעך פון איהר שוואַמיגער הויט און עס ווערט דאָרטען אויס-  
געבריהט פון זיי לאַרווען, וועלכע בלייבען אויף זייער פּלאַץ ביז  
זיי ענטוויקלען זיך אין קליינע זשאַבעס.

## אכצעהנמער קאפימעל.

אלגעמיינע סמנים פון רעפטיילען. — עקדעשען. — כאמעלעאָנען. — שלאנגען. — טשערעפאכעס. — קראָקאָדילען און אליגאטאָרען.

## רעפטיילען.

די אלגעמיינע סמנים פון רעפטיילען. — מיט דעם נאָמען רעפטיילען (בויד־קריבענדע חיות) ווערט באַצייכענט דער קלאַס חיות, צו וועלכען עס געהערען שלאנגען, עקדעשען, טשערעפאָכעס (שילדקראַמען), קראָקאָדילען און אליגאטאָרען. דער נאָמען „קריבענדע“ איז ניט ריכטיג צוגעפאַסט צו מאַכע מיטגליעדער פון דעם דאָזיגען קלאַס, ווייל מאַכע פון זיי זיינען גאָרניט קיין קויבער, נאָר גאַנץ שנעלע לויפער.

צווישען מאַכע פון די רעפטיילען און די אַמפּיביען איז פאַראַן אַ גרויסע עהנליכקייט, סאַי אין זייער אויסערליכען אויס־זעהען סאַי אין זייער אינערליכען אָרגאַניזם. נאָר, ניט קוקענדיג אויף זייער גרויסער עהנליכקייט, זיינען זיי דאָך ניט קיין צו נאָהענטע קרובים. די אַמפּיביען פּיהרען אַ דאָפּעלטען לעבען, זיי זיינען אַי וואַסער חיות אַי לאַנד חיות וועהרענדיג די רעפטיילען זיינען אין דער ווירקליכקייט לאַנד חיות. אַן אויסנאַהמע זיינען בלויז די טשערעפאַכעס, וועלכע פּיהרען ביז אַ געוויסען גראַד אויף אַ וואַסער־לעבען, אָבער אויף זיי באלאַנגען לויט זייער אָרגאַניזם און לויט זייערע געוועהנהייטען צו די לאַנד חיות.

עס ווערט אָנגענומען, אַז די אור־אור־עלטערען פון די רעפ־טיילען, וואָס לעבען איצט, זיינען געווען וואַסער חיות אָדער אַמפּיביען ווי די סאַלאַמאַנדרעס, למשל, אָבער די ענטוויקלונג איז געגאַנגען אַזוי ווייט, דאָס די רעפטיילען זיינען געוואָרען לאַנד־חיות. דער קערפער פון די רעפטיילען איז באַדעקט מיט שופען אָדער מיט האָרנדיגע פאַנצער פלאַמען. דאָס בלוט פון די רעפטיילען איז קאַלט און צירקולירט לאַנגזאַם. אין וואַרעמע וועטערען זיינען זיי זעהר לעבהאַפט, אָבער ווען עס ווערט קאַלט ווערען זיי אָפּגעלאָזען און קוים באוועגליך. אין ווינטער צייט באַהאַלט־טען זיי זיך אין באַשיצטע ערטער און בלייבען דאָרטען ווי פאַר־

גליווערט, ביז עס ווערט צוריק ווארים. די גאנצע צייט וואָס די קאלטע וועטערען פון ווינטער האַלטען אָן, ליגען די רעפּטילען אין זייערע לעכער אָהן באַוועגונג, אָהן שפּייז, דאָס בלוט קוים וואָס עס צירקולירט און דער אָטעם קוים באַמערקבאַר. ווען עס ווערט אַבער וואַרם ווערען זיי צוריק לעכהאַפט און טהעטיג.

אין באַשטימטע פעריאָדען פון זייער לעבען בייטען די רעפּטילען זייער הויט. ביי די שלאַנגען און מאַנכע פון די עקדעשען וואַקסט אויס אַ נייע הויט איידער זיי וואַרפען פון זיך אַראָפּ די אַלטע. ווען די נייע הויט איז ביי זיי פאַרטיג, ווערט זייער אַלטע הויט בלוז ביי די ליפען און זיי קריכען פון איהר אַרויס אָנגעטאָן אין זייער נייע, גלאַנציגע הויט. ביי אַנדערע רעפּטילען פאַלט די אַלטע הויט אַראָפּ ניט מיט אַמאָל, נאָר זי רייסט זיך פון זיי שטיקער ווייז און די רעפּטילען זעהען דאָן אויס ווי זיי וואַלטען זיין אָנגעטאָן אין טראַנטעם.

די רעפּטילען זיינען צום גרעסטען טייל פלייש־עסער חיות. זיי נעהרען זיך מיט אינזעקטען, שנעקען, פּרעש און פיש. די שלאַנגען פאַנגען זאָגאַר פּויגלען און פאַרשיידענע פיער־פּיסיגע חיות פאַר זייער שפּייז. עס זיינען פאַראַן בלוז אייניגע ספּעציעס עקדעשען און טשערעפּאַכעס, וועלכע זיינען וועגעטאַריאַנער, זיי נעהרען זיך בלוז מיט גרינסען אָדער פּרוכט. פיעלע פון די רעפּטילען עסען איינע די אַנדערע און די מייסטע פון זיי זיינען אַן אָנציהענדע שפּייז פאַר פאַרשיידענע רויב־פּויגלען און וואַלד־חיות, וועלכע לויערען באַשמענדיג זיי צו פאַנגען.

די רעפּטילען אָטעמען מיט דער הילף פון לונגען. ביי די יונגע עקדעשען, איידער זיי זיינען נאָך אַרויס פון איי, באַמערקט מען שפורען פון זשאַברעס. דאָס ווערט אָנגענומען אַלס אַ באַווייז, אַז די עקדעשען שטאַמען אָפּ פון וואַסער חיות. נאָר ווען דער יונגער עקדעש האַלט ביים אַרויסקומען פון איי, פאַרשווינדען די שפורען פון די זשאַברעס, וועלכע האָבען זיך ביי איהם באַוויזען, און עס ענטוויקלען זיך ביי איהם לונגען. ניט ביי אַלע רעפּטילען איז די פאָרם פון די לונגען דיזעלביגע. די פאָרם פון די לונגען הענגט אָפּ פון דער פאָרם פון קערפּער. ביי די מייסטע רעפּטילען זיינען פאַראַן צוויי לונגען. ביי די שלאַנגען איז בלוז די רעכטע לונג ענטוויקעלט, וועהרענד פון דער לינקער לונג איז

פאראן בלויז א שפור אָדער זי פעהלט אינגאנצען. די רעכטע לונג ביי דעם שלאנג איז א גאנץ לאנגע.


דער פארדייאונגס־אפאראט איז ביי די רעפטיילען אומגע־ פעהר דער זעלבער ווי ביי די אמפיבען.

די רעפטיילען פרוכפערען זיך דורך לעגען אייער. די אייער זייערע זיינען איינגעשלאָסען אין א שאַלעכץ, ווי די אייער פון א פויגל, אָבער דער שאַלעכץ איז ניט פון קאלף, ווי ביי די פויגל לען, נאָר איז עהנליך צו א לעדערנער הויט. די שלאנגען און עקדעשען לעגען זייערע אייער אין ערד־לעכער, אונטער שטיינער, אונטער קלעצער אָדער בלעטער. די טשערעפאכעס לעגען זייערע אייער אין ווארימע זאמד ביים ברעג פון וואסער. זייערע אייער זיינען פאָלשטענדיג דונד. זיי לעגען זיי געוועהנליך ביי נאכט און אין א קליינער צאָהל. די אליגאטאָרען לעגען אויס ארום הונדערט אייער אָדער מעהר. די אליגאטאָרען אייער זיינען אזוי גרויס ווי די אייער פון א גאנז. די אליגאטאָרען היטען זייערע אייער און באוואַכען זיי ביז זיי ווערען אויסגעבריהט.

מאכע שלאנגען און עקדעשען געבערען לעבעדיגע קינדער, דאָס הייסט די אייער ווערען אויסגעבריהט ביי זיי אין קערפער. פיעלע פון די רעפטיילען ווערען רייף זעהר לאנגזאם און לעבען זעהר לאנג. די טשערעפאכעס לעבען איבער הונדערט יאָהר. עס לעבען אויך זעהר לאנג די גרויסע שלאנגען, די אלי־ נאטאָרען און די קראָקאָדילען.

די עקדעשען. — דער קערפער פון דעם עקדעש באשטעהט פון א פארהעלטניסמעסיג קליינעם קאָפּ וועלכער איז פארבונדען דורך א קורצען דיקען האַלז מיט'ן רומפּ, וועלכער ענדיגט זיך מיט א לאנגען שפיציגען עק. ער האָט פיער פיס, צוויי פאָר־ דערשטע און צוויי הינטערשטע. זיין קערפער איז אזוי פראָפאָר־ ציאַנעל געבויט און זיינע מוסקולען זיינען אזוי ענטוויקעלט, אז ער קען זיך באזונדערס זעהר שנעל באוועגען. זיין מויל איז עהנליך צו א שפאלט, איז גרויס און באוואַפענט מיט צייהנער. ער האָט שאַרפע אויגען און א שאַרפע געהער.

דער קערפער פון עקדעש איז באדעקט מיט שופען, פון פאר־ שיידענע קאָלירען, וועלכע זיינען אויסגעלעגט אין א באַשטימט־ טער אָרדנונג. ביי מאכע ספעציעס זיינען די שופען פון פאר־ שיידענע בונטע און שעהנע קאָלירען, וועלכע האַרמאָניזירען מיי־



ציכוננג 150. (1 — דער סקעלעט פון אן עקדעש. 2) דער סקעלעט פון א שלאנג. ר, די ריפפן; ק, דער קוואדראנשמען-ביין, וואס פארבינדט דעם אויבערשמען קינבאקי-ביין מיט דעם אונטערשמען; א און ב, צוויי ביינדלעך פון א שלאנג'ס רוקען-ביין. (ב צייגט דעם רונדען ענד פון ביינדעל, וועלכער זעצט זיך אריין אין דער רונדער אויסהוילונג פון דעם ביינדעל א.) (3) צייגט א דיאגראם פון דער בלוט-צירקולאציאן אין דעם קערפער פון א רעפטיל. א, דער רעכטער הארץ-קאמער, וועלכער באקומט דאס אדערען-בלוט פון קערפער; א', דער לינקער הארץ-קאמער, וועלכער באקומט ארמעריען-בלוט פון די לונגען; ב, דער אונטערשטער הארץ-קאמער, וועלכער באקומט געמישט בלוט (אדערען בלוט און ארמעריען בלוט), וואס ווערט געטריבען דורך די לונגען-ארמעריען ג צו די לונגען און דורך די הארץ ארמעריען ד צום קערפער. (דאס אדערען סיסטעם איז אויף דער צייכונג אנגעצויגט דורך ווייס, דאס ארמעריען סיסטעם — דורך שווארץ און די בלוט-געפעס, וועלכע ענטהאלטן געמישט בלוט זיי-נען אנגעצויגט מיט שאמען-שטריכען).



סטענס מיט דער אומגעבונג, אין וועלכער דער עקדעש לעבט. דאָס גיט דעם עקדעש אַ גוטע מעגליכקייט זיך אויסצובאַהאַלטען פון זיינע שונאים, וועלכע לוייערען אויף איהם.


דער סקעלעט פון עקדעש באַשטעהט פון אַ קאַפּ-שאַרבען, אַ לאַנגען רוקען-ביין, וועלכער געהט ביז צו דעם ענד פון זיין עק, פון מעהרערע דינע ריפען, פון אַ ברוסט-ביין און פון שולטער ביין נער, וועלכע שטיצען די פיס. דער שאַרבען איז ביי דעם עקדעש נאָך גיט פאַלקאָם פאַרביינערט, מאַנכע פון זיינע טיילען באַ-שמעהען נאָך פון כראָמשקע, אָבער דער עקדעש האָט אויף זיין קאָפּ אַ פעסטע פאַנצער-פלאַטע, וועלכע איז אַ געניגענד שטאַרקער שוץ פאַר דעם קליינעם מאַרד, וואָס לייענט אונטער איהר.

די פיס פון דעם עקדעש זיינען דיין און גיט גענוג שטאַרק, אויפצוהאַלטען זיין קערפער. זיין בויך שאַרט זיך אויף דער ערד, ווען ער באַוועגט זיך. ער איז גיט קיין געהענדע חיה, נאָר אַ בויך-קריכענדע. ער באַוועגט זיך דאָך אָבער זעהר שנעל.

מאָנכע עקדעשען האָבען אינגאַנצען גיט קיין פיס. דאָס זיי נען די זאָגענאַנטע „בליןד-ווערים“, וועלכע זיינען גיט בלינד און אויך גיט קיין ווערים, נאָר עקדעשען אָהן פיס, וועלכע מען האָט געגעבען על פי טעות אַ פאַלשען נאָמען. דאָס זעלבע איז אויך מיט דעם „גלאַז-שאַנג“, וועלכער איז אַן עקדעש אָהן פיס און וועלכער האָט זיין נאָמען געקראָגען צוליבע זיין שלאַנגען עהנ-ליכען אויסזעהען און צוליבע דעם, וואָס זיין עק ברעכט זיך אזוי ליכט ווי גלאַז.

ביי מאַנכע ספעציעס באַווייזען זיך הינטערשטע פיס אין זייער פריהען יוגענד, אָבער זיי בלייבען קליין און שפעטער פאַר-שווינדען זיי אינגאַנצען. פאַר דעם אַרט לעבען, וואָס די דאָזיגע עקדעשען פיהרען איז זיי גיט נויטיג קיין פיס און זיי זיינען דעריבער ביי זיי ביסלעכווייז פאַרשוואַנדען.

דער עק ביי די עקדעשען ברעכט זיך זעהר ליכט, ער ברעכט זיך אָפּ ביי דער קלענסטער באַריהרונג. ער וואַקסט אָבער אָפּ צוריק אין אַ פאַרלויר פון אַ געוויסער צייט. די ברעכניגקייט פון דעם עק איז אַ גוטער מיטעל פאַר דעם עקדעש זיך צו ראַטעווען פון זיינע שונאים, וואָס יאָגען זיך נאָך איהם. דער עק בלייבט ביים שונא אין די נעגעל אָדער אין מויל און דער עקדעש אַנט-לויפט. געוויסע ספעציעס עקדעשען האָבען די אייגענשאַפט אַליין



צייכונג 151. — 1) א געווענליכער עקדעש; 2) דער גרינער עקדעש; 3) דער אינדישער עקדעש; 4) דער הארן־עקדעש; 5) א כאמעלעאן; 6) די צונג פון כאמעלעאן.

אוועקצואווארפען זייער עק. זיי טוען דאָס, ווען אַ שונא יאָגט זיך נאָך זיי. זיי וואַרפען פון זיך אַראָפּ זייער עק, און אין דער צייט וואָס דער שונא כאַפט דעם אַראָפּגעוואַרפענעם עק, אַנטלויפט דער עקדעש און ראַטעוועט זיך מיט זיין לעבען. דער עקדעש האָט דערביי אויך גאָרנישט אָנגעוואַרען. אין אַ משך פון אַ געוויסער צייט וואַקסט איהם אָפּ אַנאָדער עק, הגם ניט אזוי טימעטרישער ווי דער ערשטער.

די עקדעשען לעבען מייסטענס אין די וואַרימע געגענדען. אין די טראָפישע (הייסע) געגענדען געפינען זיי זיך אין גאַנץ גרויסע צאָהלען, אין פאַרשיידענע בונטע קאָלירען און מאַנכע ספּעציעס פון אַ גאַנץ גרויסען וואַקס. אין די מעסיגע און אין די קעלטערע געגענדען איז זייער צאָהל אַ קליינע און די מייסטע פון זיי זיינען קליין געוואַקסען.

אַן אינטערעסאַנטער מין עקדעשען געפינט זיך אין די הייסע זאַמדיגע מדבריות פון מעקסיקאָ און וועסט אמעריקא (פאַראַיי-ניגטע שטאַטען). מען רופט זיי „פרעש-עקדעשען“ צוליעב זייער גרויסער עהנליכקייט צו פרעש. זייער קערפער איז ברייט און פלאַטיג און איז באַדעקט מיט שופען און שטעכיגע נאָדלען פון אַ הונקעל-ברוינליכען קאָליר. זייער קאָליר מיט די שטעכיגע נאָדלען, מיט וועלכע זיי זיינען באַדעקט, מאַכט זיי אזוי עהנליך צו די טרוקענע קאקטוס פלאַנצען, וועלכע געפינען זיך אין יענע געגענדען, אַז עס איז שווער זיי צו באַמערקען. זיי נעהרען זיך מיט פליגען, מוראַשקעס און אַנדערע אינזעקטען, וועלכע זיי פאַנגען מיט זייער לאַנגער צונג.

די פרעש-עקדעשען זיינען פּאָלשטענדיגע אימשעדליכע באַ-שעפענישען און זיי געוועהנען זיך שנעל צו אין געפאַנגענשאַפט צו זייער נייער אומגעבונג. ווען מען צורייצט זיי אָבער, טרעפט עס אָפּט, אַז זיי גיבען אַ שפּריץ אַ שטראָם בלוט פון זייער אויג גענען זייער אויפרייצער.

די עקדעשען זיינען אין אַלגעמיין אומשעדליכע באַשעפּע-נישען. פון די אַלע באַקאַנטע עקדעשען ווייס מען נאָר איין מין, וועלכער איז ניכטיג, דאָס זיינען די העלאַדערמען, וועלכע געפינען זיך אין אַריזאָנאַ, פאַראַייניגטע שטאַטען פון אמעריקא.

די כאַמעלעאָנען. — עס זיינען פאַראַן געוויסע ספּעציעס עקדעשען, וועלכע באַזיצען די אייגענשאַפט צו בייטען זעהר שנעל

דעם קאליר פון זייער הויט. אזא מין עקדעש געפינט זיך אין די זיד-שטאטען פון אמעריקא. זיין געוועהנליכער קאליר איז גרין, נאָר ער בייט גאַנץ שנעל זיין קאליר פון גרין, דורך פארשיידענע שאטירונגען, אויף ברוין. מעהר באקאנט מיט דער דאָ-זינער אייגענשאפט איז דער כאַמעלעאָן, אַ מין עקדעש, וועלכער לעבט אין די הייסע געגענדער.

דער כאַמעלעאָן האָט וועניג עהנליכקייט צו די געוועהנליכע עקדעשען. ער האָט פיער לאַנגע דינע פינגער פינגערדיגע פיס, מיט וועלכע ער קען גאַנץ געשיקט קלעטערען אויף בוימער און זיך האַלטען אויף צווייגען. זיין קערפער איז פון די זייטען צונויפ-געדריקט און דער רוקען איז ביי איהם אַ שאַרפער. דער קערפער ענדיגט זיך מיט אַ לאַנגען עק, וועלכער קען זיך צונויפדרעהען ווי אַ ספיראַלע. ער האָט גרויסע אויגען, וועלכע זיינען באַדעקט מיט שטאַרקע אויגען-לעדלעך, אין וועלכע עס איז פאַראַן אַ רונד לעכעל, דורך וועלכען עס קוקט דורך בלוזי דער שוואַרץ-אַפּעל פון אויג. זיין קאָפּ איז אַ קאַנטיגער מיט אַ גרויסען מויל, און אַ לאַנגע צונג, וועלכע קען אויסגעצויגען ווערען ביז אַן ערד אַ האַלב פוס אין דער לענג. די צונג האָט ביי איהר ענד אַ דיקען קלעפּיגען קנאַפּ. ווען דער כאַמעלעאָן דערזעהט פון ווייטען אַן אינזעקט, שיסט ער שנעל אַרויס זיין צונג פון מויל און דער אינזעקט ווערט געפאַנגען דורך דעם קלעפּיגען קנאַפּ.

אונטער דער דינער הויט פון דעם כאַמעלעאָן געפינען זיך צוויי פאַרביגע שיכטען. דער אויבערשטער שיכט איז העל-געלעך און דער אונטערשטער שיכט איז דונקעל-ברוין. דורך די דאָזיגע צוויי פאַרבען שיכטען קען דער כאַמעלעאָן אָננעהמען אַ געוויסע צאָהל פאַרשיידענע קאלירען. געוועהנליך איז זיין פאַרב גרין, ער קען זי אָבער ענדערען אויף בראַנז קאליר, געל-גרין, בלוז-גרין, גרוי, שוואַרץ, ווייס, פלייש-קאליר, ראַסט-ברוין, וויאָלעט און בלוז-גרוי. די אַלע קאלירען קומען אין דער אויסגערעכענטער אָרדנונג. דער כאַמעלעאָן אין אין אַלגעמיין אַן אומשוילדיגע באַשע-פעניש. ער שפּיזט זיך מיט אינזעקטען און שפינען. ווען מען רייצט אָבער איהם אויף, בלאָזט ער זיך צווי שטאַרק אויף, אַ זיין קערפער ווערט דורכזיכטיג, ער פאַנגט אָן שיפען און פאַלט זיך בייסען.

די נקבה פון די כאַמעלעאָנען לעגט אויס אַן ערך 30 אייער אין

א גרוב, וועלכע זי פארשיט מיט ערד און באדעקט מיט בלעטער, און זיי ווערען דאָרטען אויסגעבריהט.


די שלאַנגען. — דער לאַנגער, רונדער קערפער פון א שלאַנג באַשטעהט פון א קאָפּ, א האַלז, א רומפ און אַן עק. די אלע קערפער־טיילען זיינען אָבער ניט שאַרף אָפּגעטיילט איינע פון די אנדערע. דער קאָפּ איז ניט שאַרף אָפּגעטיילט פון האַלז, די האַלז איז ניט שאַרף אָפּגעטיילט פון רומפ און דער רומפ איז ניט שאַרף אָפּגעטיילט פון עק. דער סקעלעט פון שלאַנג, וועלכער באַשטעהט פון אַ רוקען־ביין, ריפּען און אַ שאַרבען, איז זעהר אַ בויגזאַמער און אַ פריי באַוועגליכער. ביי די מייסטע שלאַנגען איז דער אונטערשטער קינבאַק ניט פאראייניגט דירעקט מיט דעם קאָפּ־שאַרבען, ווי דאָס איז דער פּאַל ביי די העכערע חיות, נאָר ער איז פאַרבונדען מיט אַ צווישען־ביין, וועלכער ווערט אָנגערופען „קוואַדראַט־ביין“. דער דאָזיגער ביין פאַרבינדט עס דעם אונטער־שטען קינבאַק פון שלאַנג מיט דעם קאָפּ־שאַרבען און דאָס גיט דעם שלאַנג די מעגליכקייט זעהר ברייט פאַנאַנדערצועפענען זיין מויל און האַלז צו פאַנגען און צו פאַרשלינגען זיין רויב, וואָס איז אָפט ניט פיעל קלענער ווי ער אליין.

דער שלאַנג צוקייט ניט זיין שפייז. זיינע קליינע געבויר־גענע צייהנער ווערען פון איהם באַנוצט בלויז אָנצוהאַלטען זיין רויב ביז ער פאַרשלינגט עס. די גאָפּעל־פערמיגע צונג פון שלאַנג ווערט פון איהם באַנוצט, ווי עס שיינט, אַלס אַ טאַפ־אָרגאַן.

דער שלאַנג האָט אפילו ניט קיין שפור פון פיס, ער איז דער אמת'ער בויך־קריכער צווישען אלע רעפטיילען. מאַנכע ספּע־ציעס פון די גרויסע שלאַנגען אָבער, ווי די באָאס און טיגער־שלאַנגען, האָבען שפורען פון הינטערשטע פיס אין דער פאָרם פון קליינע גרופען ביינדלעך אונטער דער הויט. עס ווערט אָנגענומען, אַז די אור־עלטערען פון די איצטיגע שלאַנגען זיינען געווען אַ מין פיער־פיסיגע עקדעשען־עהנליכע באַשעפענישען, וועלכע האָבן בען ביסלעכווייז פאַרקאָרען זייערע פיס צוליב די געענדערטע באדינגונגען פון זייער לעבען. עס זיינען פאַראַן אייניגע ספּעציעס עקדעשען, וועלכע האָבען ניט קיין פיס און מאַנכע פון זיי זיינען גאַנץ עהנליך צו שלאַנגען, ווי דער עקדעש וואָס רופט זיך „גלָאָז־שלאַנג“, וועלכער איז פריהער שוין דערמאָנט געוואָרען.

נאָר ניט קוקענדיג אויף דעם וואָס דער שלאַנג האָט קיין פיס

ניט, איז ער דאך זעהר א שנעל־באוועגליכע באשעפעניש. ער באוועגט זיך זעהר שנעל אויף זיין בויך אויף דער יבשה און ער איז אויך א שנעלער שווימער. זיין שנעלע באוועגונגס־פעהיגקייט האָט דער שלאַנג צו פאַרדאַנקען דעם געבוי פון זיין סקעלעט און זיינע קרעפטיגע מוסקולען. דער רוקען־ביין פון שלאַנג באשטעהט פון צוויי ביז דריי הונדערט ביינדלעך, וועלכע זיינען פאראיי־גיגט דורך זעהר לייכט באוועגליכע געלענקען. פון יעדען ביינדל געהען אַרויס צוויי דינע ריפען (פון יעדער זייט איינער), וועלכע זיינען מיט איהם פארבונדען דורך פרייבאוועגליכע געלענקען.



צייכונג 152. — (1) דער עגיפטישער גיפטיגער שלאַנג „נאַיא האַיע“; (2) דער קאַפּ פון אַן אַמערי־שלאַנג.

די אונטערשטע ענדען פון די ריפען זיינען פארבונדען מיט די בויך־פלאטען. די ריפען קענען זיך באוועגען פאָרווערטס און ריקווערטס, און דורך דעם איינציהען און אויסציהען פון זיינע קרעפטיגע מוסקולען, קען זיך דער שלאַנג זעהר שנעל באוועגען. די שלאַנגען געפינען זיך אין גרעסערע צאָהלען אין די וואַ־רימע געגענדען. אין די מעסיגע געגענדען איז זייער צאָהל קליין און אין די קאַלטע געגענדען זיינען זיי אינגאַנצען ניטאָ. זיי


לעבען מייסטענס אין בערניגע געגענדען און זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אונטער שטיינער, אין מאָך אָדער צווישען קוסטעס פון בויםלעך. אַנדערע לעבען אויף בויער און עס זיינען אויך פאַראַן אַזעלכע, וואָס לעבען אין וואַסער.

די מייסטע שלאַנגען קומען אַרויס פון אייער, וועלכע די נקבות לעגען. די אייער זיינען פאַרהעלטניסמעסיג גרויסע און זיינען באַדעקט מיט אַ לעדער-עהנליכען שאַלאַכץ. מאַנכע וואָס סער שלאַנגען און גיפטיגע שלאַנגען געבערען לעבעדיגע קינדער. די מייסטע שלאַנגען נקבות בריהען ניט זייערע אייער און באַוואָסן כען זיי ניט. עס זיינען אָבער אויך פאַראַן אַזעלכע, וואָס באַוואָסן כען זייערע קינדער און ערציהען זיי. זיי נעהמען זיי אַרײַן אין זייער מויל און האַלטען זיי דאָרטען ביז זיי קענען זיך אַליין באַזאָרגען מיט שפײַז.

מען רעכענט, אז עס זענען פאַראַן אַן ערך טויזענד פאַרשידענע אַרטען (ספעציעס) שלאַנגען. די מייסטע פון זיי זיינען ניט קיין גיפטיגע. אין אַלגעמיין זיינען אין די מעסיגע געגענדען, וועלכע זיינען געדיכטער באַפעלקערט מיט מענשען, פאַראַן וועניג גיפטיגע שלאַנגען. דער גרעסטער טייל פון די גיפטיגע שלאַנגען, וועלכע האָבען זיך אין די מעסיגע געגענדען געפונען, זיינען אויס-געראַט געוואָרען. די גיפטיגע שלאַנגען האָבען צוויי פאַדערשטע, גרויסע, דורכגעלעכערטע צייהנער, וועלכע זיינען פאַרבונדען מיט גיפטרדיזען. ווען דער שלאַנג גיט מיט די דאָזיגע צייהנער אַ ביס זיין קרבן פליסט פון די גיפטרדיזען דורך די לעכער פון די צייהנער אַ גיפטיגע פליסינקייט אין דעם וואונד פון דעם קרבן און פאַרגיפטעט זיין בלוט. אַנדערע גיפטיגע שלאַנגען האָבען בלויז איין גיפטר-צאָהן.

די מעהר באַקאַנטע גיפטיגע שלאַנגען אין אַמעריקאַ זיינען די קופער-שלאַנגען, די מאַקאַסען-שלאַנגען און די קלאַפער-שלאַנגען. די ערשטע צוויי געפינען זיך מייסטענס ביי די ברעגעס פון טייכען און זומפען, וואו זיי לוייערען אויף פרעש און פיש. די דאָזיגע שלאַנגען זיינען באַזאָנדערס געפעהרליך, ווייל זיי זיינען שטיל, זיי שיפען ניט און לאָזען ניט אַרויס קיין שום אַנדער קלאַנג, ווען זיי באַפאַלען זייער קרבן, און מען קען זיך דאַריבער פון זיי שווער אויסהיטען. דער קלאַפער-שלאַנג לעבט געוועהרליך אין בערניגע געגענדען, אָבער ער איז וועניגער געפעהרליך דורכדעם,

וואָס ער וואַרנט אַליין וועגען זיין אַנוועזענהייט. ער האָט ביי זיין  
 עק אַ גאַנצע רייע אַזעלכע האָרן־רינגעלעך מיט וועלכע ער מאַכט  
 אַ גאַנץ שטאַרקען קלאַפּער־גערויש.  
 אַ זעהר גיפטיגער שלאַנג איז דער ברילען־שלאַנג אין אינדיע.  
 ער לעבט מייסטענס נאָהענט פֿון מענשליכע וואָהנונגען, אָבער ער  
 בייסט בלויז ווען ער ווערט גערייצט.




צייכנונג 158. — אַ קלאַפּער שלאַנג. די צייכנונג פֿון אויבען  
 צייגט אַן אויפגעשניטענעם קאָפּ פֿון אַ קלאַפּער־שלאַנג, וואו מען קען  
 זעהן די גיפטיגהעכער צ, דעם גיפטיגן ג, פֿון וואָס ער דער גיפטי קומט  
 אין די צויהעכער. ש צייגט די שפּויעכץ־דריזען פֿון שלאַנג.



אין די וועלדער פון די טראַפישע געגענדען געפינען זיך ריי זיגע גרויסע שלאַנגען, ווי דער באַא, אָדער ריווען-שלאַנג און דער טיגע-שלאַנג. זיי זיינען ניט גיפטיג, אָבער זיי זיינען געפעהרליך פאַר חיות מיט זייער קראַפט, וואָס זיי באַזיצען אין זייערע מוס-קולען. זיי פאַנגען יונגע חיות, אַרום וועלכע זיי וויקלען זיך אַרום, צודריקען זיי און פרעסען זיי נאַכהער אויף. מענשען גרייפען זיי ניט אָן. אויסער דער זיד-אַמעריקאנישער אַנאַקאָנדאַ, וועלכער גרייפט אָפט אָן שלאַפּענדע מענשען. דער אַנאַקאָנדאַ לעבט מיט סטענס אין וואַסער אָדער אויפ'ן ברעג. ער קריכט אָפט אויף אַרויף אויף בוימער. ער איז זעהר רויבעריש.

**טשערעפּאַכעס** (שילדקראַטען). — די טשערעפּאַכעס צייע כענען זיך אויס פון אַלע אַנדערע רעפּטילען דערמיט, וואָס זיי זייען גען באַדעקט מיט אַ פאַנצער-מושעל. דער דאָזיגער פאַנצער-מושעל באַשטעהט פון צוויי טיילען — פון אַן אויבערשטען אויס-גערונדעטען מושעל אויפ'ן רוקען און פון אַ פלאַכע פלאַטע אונטער'ן בויך. ביידע טיילען שמעלען מיט זיך צונויף אַ קעסטעל-עהנליכען פאַנצער מיט עפענונגען, פון וועלכע די טשערעפּאַכע קען אַרויסשמעקען איהר קאָפּ, פיס און עק. דער רוקען-פאַנצער האָט ביי די פאַרשידענע אַרטען טשערעפּאַכעס אַ פאַרשידענע פאָרם. ביי אַנדערע האָט ער די פאָרם פון אַ גאַנץ טיעפען געוועלכ, וועהר רענד ביי אַנדערע איז ער בלווי עטוואַס אויסגעבויגען. ביי מאַנכע אַרטען טשערעפּאַכעס איז דער פאַנצער ניט אין גאַנצען פאַר-האַרטעוועט, ער באַשטעהט פון אַזאַ מין כראַמשקע, וועהרענד ביי אַנדערע איז ער פאַרהאַרטעוועט ווי ביי און איז זעהר שטאַרק. דער פאַנצער איז צוגעוואַקסען צו דעם קערפּער פון דער טשערע-פאַכע. דער אויבערשטער טייל פון פאַנצער איז צונויפגעוואַקסען מיט דעם רוקען-ביין און מיט די ריפען און איז אייגענטליך אַ טייל פון דעם סקעלעט פון דער טשערעפּאַכע.

דער קערפּער פון דער טשערעפּאַכע אין אויסערליך זעהר ווער ניג עהנליך צו די אַלע אַנדערע רעפּטילען. דער קאָפּ פון דער טשערעפּאַכע איז דיק און מוסקולדיג, מיט אַ שנאָבעל-עהנליכען מויל אָהן צייהנער, ווי אַ פויגעל, און אַ צונג וואָס האָט די פאָרם פון אַ לעפעל און איז אונבאַוועגליך. די אויגען האָבען צוויי אוי-גען-לעדלעך און אַ האַלב דורכזיכטיגע היימעל, אַלס שוץ געגען דער צו שטאַרקער שיין פון דער זון. איהרע פיס זיינען קורץ און



צייכונג 154. — משערעפאכעס (שילדקראמען). 1 א סקעלעט פון א משערעפאכע (און איהר שילד); 2 די קנאקטשערעפאכע (זי קנאקט מיט די קינבאקען ווען זי באפאלט איהר רויב); 3 די שנאָבעל משערעפאכע; 4 די וואַלד־משערעפאכע; 5 די קעסעל משערעפאכע.

דיק. אין די פאָדערשטע פיס האָט זי פינף פינגער און אין די הינר מערשטע פיער. די פינגער האָבען נעגעל. די פיס זיינען אָבער ניט ביי אַלע אַרטען טשערעפאָכעס גלייך. זיי זיינען צוגעפאָסט צו דעם אַרט לעבען וואָס זיי פיהרען. ביי די טשערעפאָכעס, וועלכע לעבען אין וואַסער, זיינען די פיס געהר צוגעפאָסט צום שווימען, זיי האָבען אַ הויט צווישען די פינגערס. דער עק פון דער טשערעפאָכע איז דיק און קורץ און ענדיגט זיך מיט אַ שפיץ. דאָס בלוט פון דער טשערעפאָכע איז רויט אָבער קאַלט. איהרע לונגען זיינען גוט ענטוויקעלט און זי אַטעמט עהנליך ווי אַ פראַש, זי שלענגט די לופט אנשטאַט זי אַריינצוציהען אין זיך.

ווי שוין באַמערקט זיינען אויסערליך די טשערעפאָכעס ווע- ניג עהנליך צו די אנדערע רעפטיילען, אָבער ווען מען פאַרגלייכט זייער אָרגאַניזם און זייער ענטוויקלונג זעהט מען אַז זיי האָבען צווישען זיך זעהר אַ נאָהנטע קרובה'שאַפט, באַזאָנדערס מיט די עקדעשען.

די טשערעפאָכעס זיינען פאַרשפּרייט אין די פאַרשידענע טייל לען פון ערד-קוגעל, סאָי אין די הייסע געגענדען, סאָי אין די מע- סיגע. זיי לעבען געוועהנליך אַרום פּרישע וואַסערען, ווי טייכען און אָזערעס. אַנדערע פון זיי לעבען אין וועלדער און אין לאַג- קעס. עס זיינען אָבער אויך פאַראַן אייניגע ספּעציעס, וועלכע לעבען אין ים. צווישען די ים טשערעפאָכעס זיינען פאַראַן מאַנ- כע ספּעציעס, וועלכע זיינען ציעמליך גרויס אין וואַוקס. די לע- דער-טשערעפאָכעס, צום ביישפּיעל, וועלכע שווימען אַרום אויף דער אויבערפלעכע פון וואַסער אין די וואַרימערע געגענדען פון דעם אַטלאַנטישען ים, זיינען פון זעקס ביז אַכט פוס די לענג און וועגען ביז איבער טויזענד פונט. זיי ווערען אָפט געפאַנגען, ווען זיי קומען אַרום אויפ'ן ברעג צו לעגען דאָרטען זייערע אייער, וועל- כע זיי באַהאַלטען אין זאַמד. פיעלע ספּעציעס פון די טשערע- פאָכעס ווערען געברויכט אַלס שפּייז און זייערע ביינערנע פאַנ- צערס ווערען באַנוצט פאַר דער פאַבריקאַציע פון פאַרשידענע אַר- טיקלען.

די מייסטע טשערעפאָכעס זיינען פלייש עסענדע באַשעפּע- נישען, מאַנכע פון זיי זיינען זעהר גרויסע פרעסערס און זיינען. אין פאַרהעלטניס מיט זייער גרויס, זעהר שטאַרק און קרעפטיג.

זייער פאנצער איז זייער בעסטע שויץ געגען פיינד, נאָר אַ חוץ דעם איז די פּאַרם פון זייער קערפּער מייסטענס אזוי גוט צוגע- פּאַסט צו דער אומגעבונג, אין וועלכער זיי לעבען, דאָס מען קען זיי שווער באַמערקען.



קראַקאָדילען און אַליגאַטאָרען. — צווישען אַלע רעפּטי- לען זיינען די קראַקאָדילען און אַליגאַטאָרען די העכסט ענטווי- קעלטע. אין זייער אויסזעהן האָבען זיי פיעל עהנליכקייט צו עק- דעשען, אָבער זייער אָרגאַניזם און זייער בוי איז מעהר קאָמפּלי- צירט און מעהר ענטוויקעלט. דער קערפּער פון די קראַקאָדילען און אַליגאַטאָרען איז באַדעקט מיט דיקע ביינערנע פּאַנצער-פּלאַ- טען און שטאַרקע האָרנדיגע שופּען. זיי האָבען אַ לאַנגען קרעפּ- טינגען עק, וועלכער דיענט זיי אַלס אַ שטאַרקער גוט באַוועגליכער רודער צום שווימען. די קראַקאָדילען און אַליגאַטאָרען לעבען אין זומפּען, שטעהענדע וואַסערען און אין טייכען אין די וואַרימע גע- גענדען. זייער מויל איז גרויס און מיט אַ סך גרויסע, שטאַרקע שפּיציקע צייהנער. זייער נאָז, אויערען און שלונד זיינען באַ- זאָרגט מיט אַזעלכע קלאַפּאַנעס (ווענטילען) אָדער דעקלעך, וועל- כע קענען פאַרמאכט ווערען, אַז עס זאָל אין זיי קיין וואַסער ניט קענען אַריינקומען. ווען אַ קראַקאָדיל פּאַנגט מיט זיין גרויסען מויל אַ קאַלב, אָדער וועלכע עס איז חיה, וואָס איז צוגעקומען צום וואַסער זיך אָנטרינקען, לאָזט ער זיך אַראָפּ מיט זיין רויב אויפ'ן גרונד פון וואַסער, פאַרמאכט זיינע דעקלעך פון נאָז, פון די אויערען און פון האַלז, און בלייבט דאָרטען אזוי לאַנג ביז זיין קרבן ווערט דערטרונקען. דאָן קומט ער צוריק אַרויף אויף דער אויבערפלעכע און ריכט אָפּ זיין מאַלצייט.

די אַליגאַטאָרען זיינען אַמעריקאַנער קראַקאָדילען. זיי גע- פינען זיך בלויז אין אַמעריקאַ, אין די זידליכע געגענדען פון די פאַראייניגטע שטאַטען, די גרעסערע פון זיי זיינען אַן ערך זעכ- צעהן אָדער זיעבעעהן פוס לאַנג, זייער קאָליר איז אויף דער רוקען זייט שמוציג גרין מיט דונקעלע פּלעקען און אויף דער בויך-זייט העל געלב. אויף דער יבשה באַוועגען זיי זיך גאַנץ לאַנגזאַם און זיינען ניט דרייסט, זיי קענען זיך זאָגאַר שוואַך פאַרטיידיגען. זייער גאַנצע פאַרטיידיגונג איז מיט זייער עק, מיט וועלכען זיי וועהרען זיך. אין וואַסער אָבער זיינען זיי דרייסטער. זיי געה- רען זיך הויפטזעכליך פון פיש, אָבער זיי באַפּאַלען אויך קעלי-

בער, ציעגען, הירשען, הינד און זאגאר פערד, וועלכע קומען צום וואסער טרינקען.

ווינטער-צייט, פארנראָבען זיי זיך אין די בלאָטיגע זומפּען, כדי זיך צו שיצען פון קעלט.

די נקבות פון די אליגאַטאָרען גראָבען אויס גריבער, אין וועלכע זיי לעגען זייערע אייער. זיי לעגען פון 100 ביז 200 אייער, באַדעקען זיי מיט בלעטער און וואַכען איבער זיי ביז זיי ווערען אויסגעבריהט.



צייכנונג 155. — 1 אַ קראָקאָדיל; 2 אַן אליגאַטאָר; 3 דער הינטערשטער פּוס פון אַ קראָקאָדיל.

די קראָקאָדילען, וועלכע לעבען אין די הייסע געגענדער, זיי נען גרעסער און געפעהרליכער אַלס די אליגאַטאָרען. דער פּאָנ-צער-קראָקאָדיל, וועלכער לעבט אין די גרויסע טייכען פון אַפּריקאַ איז אַן ערך 20 פּוס לאַנג. דער ריזען-קראָקאָדיל פון מאַדאַגאַס-קאַר איז איבער דרייסיג פּוס לאַנג. די נקבה גראָבט אויס אַ גרוב פון אַן ערך דריי פּוס טיעף, לעגט דאָרטען אויס איהרע אייער און פאַרשיט זיי. זי באַוואַכט די גרוב יעדע נאַכט, ביז די אייער ווערען אויסגעבריהט. ווען די אייער ווערען אויסגעבריהט און די יונגע קראָקאָדילען דארפּען שוין אַרויסקריכען פון זיי, פּאָנגען

זיי און ארויסלאָזען אַזעלכע שלוכצענדע טענער און ווי די מוטער דערהערט עס, עפענט זי די גרוב און נעהמט זיי פון דאָרטען אַרויס.

דער לייסטען־קראַקאָדיל, וועלכער לעבט אין די וואַסערען פון דרום אַזיען און אין דעם צפון טייל פון אויסטראַליען איז עטליכע און דרייסיג פוס די לענג און איז איינער פון די גרעסטע רויבער אין דער קראַקאָדילען־משפּחה. ער באַוועגט זיך אין וואַסער זעהר שנעל, אָפט מאַכט ער אַ שפּאַציער פון טייך, אין וועלכען ער לעבט, מעהרערע מיילען אין ים. ער באַפּאַלט יעדע באַשעפעניש, וועלכע ער טרעפט אין וואַסער אָדער ביים וואַסער. ער באַפּאַלט אויך מענשען. אויף דער יבשה אָבער איז ער ניט דרייסט, ער זוכט גיכער צו אַנטלויפע איידער אַנצוגרייפען.

דער ניל־קראַקאָדיל איז בלויז אַן ערך 20 פוס די לענג, אָבער ער איז זעהר רויבעריש און אין פריהעריגע צייטען איז ער געווען דאָס שרעקען פון די איינוואַהנער אין עגיפטען (מצרים). אין די לעצטע צייטען האָט מען איהם אָבער אין עגיפטען כמעט אין גאַנצן צען אויסגעראַט. ער געפינט זיך איצט אין די וואַסערען פון פאַרשידענע טיילען אין אַפריקאַ. דער ניל־קראַקאָדיל איז אַן אויסגעצייכענטער שווימער און ער קען זיך אויך שנעל באַוועגען אויף דער יבשה, ווען ער יאָגט זיך נאָך רויב אָדער ווען ער דאַרף אַנטלויפען פון אַ שונא. ער געהט אָבער קיין מאָל ניט צו ווייט אַוועק פון ברעג. אין אַלגעמיין איז ער אויף דער יבשה ניט דרייסט, אין וואַסער אָבער איז ער געפעהרליך. אויף דער יבשה אַנטלויפט ער פון אַ מענשען, אָבער אין וואַסער באַפּאַלט ער איהם און מאַכט גיך אַ סוף פון איהם. ווען ער איז אין וואַסער קומט ער אַלע צעהן מינוטען אַרויס אויף דער אויבערפלעכע צו אטעמען. מיטאַנצייט קומט ער אַרויס אויפ'ן ברעג זיך וואַרעמען אויף דער זון און שלאָג־פען. אַלע קראַקאָדילען האָבען זיך ליעב צו וואַרעמען אויף דער זון. ווען עס פאנגט אָן ווערען דונקעל לאָזט ער זיך אַוועק אויף רויב. ער פאנגט אַלעס וואָס עס מאַכט זיך איהם: פיש, קליי־גע קראַקאָדילען, חיות, וועלכע קומען צום וואַסער טרינקען, פערד, קעמלען, קיח, אַקסען, א. ז. וו. די נקבה לעגט אויס אַן ערך 100 אייער אַזוי גרויס ווי פון אַ גאַנז, פאַרשארט זיי אין זאַמד און באַ־וואכט זיי ביז זיי ווערען אויסגעבריהט. אין אַ משך פון 40 טעג ווערען די אייער אויסגעבריהט און עס קומען אַרויס פון זיי קליי־גע קראַקאָדילען, וועלכע זיינען אונגעפעהר אַ האַלב פוס די לענג.

## ניינצעהנטער קאפיטעל

דער אַרגאַניזם פון די פּוּיגלען. — דאָס לעבען פון די פּוּיגלען. — די אױכטױלונג פון די פּוּיגלען אין קלאַסען. — שױס־פּוּיגלען. — זומפּ אָדער בראַדזשע פּוּיגלען. — די שאַר אָדער קראַץ־פּוּיגלען. — די קלעטער־פּוּיגלען. — די רױב־פּוּיגלען.

## פּוּיגלען (אַױעס)

אַלגעמײנע כאַראַקטעריסטיק. — די פּוּיגלען, אָדער „אַױעס“, װי זײ װערען גערופּען מיט זײער װיסענשאַפּטליכען נאָמען, שטעלען מיט זיך פאַר אַ גאַנץ באַזונדערס שאַרף אױסגע־שפּראַכענעם קלאַס אין דער טיער־װעלט. און װי פּאַרשידענ־אַרטיג די פּוּיגלען זאָלען ניט זײן אין זײער גרויס, אין זײער אױסזעהן, און אין זײער אַרט לעבען, איז דאָך אין זײער קערפּער־געבוי, אין זײער אַרגאַניזם כמעט קײן אונטערשייד ניטאָ. דער אונטערשייד אין קערפּער־געבוי און אין אַרגאַניזם צװישען דעם גרויסען שטרויס־פּוּיגעל און צװישען דעם קלײנעם גן־ערן פּוּיגעלע איז פּיעל קלענער װי דער אַנאַטאָמישער אונטערשייד צװישען צװײ נאָהענטע ספּעציעס עקרעשען אָדער טשערעפּאַכעס.

די פּוּיגלען האָבען אין פּיעלע הינזיכטען געװיסע עהנליכקײ־טען צו די רעפּטילען, און מיט לאַנגע צײטען צוריק, אין אַ פּריהעדרײגער פּעריאָדע פון דער װעלט, איז די עהנליכקײט און די קרובּהשאַפט צװישען די פּוּיגלען און די רעפּטילען געװען נאָך אַ גרעסערע. מיר װײסען עס פון די פּאַסילען (פּאַרשטײנערטע רעשכען פון חיות) װעלכע זײנען געפונען געװאָרען אין פּאַר־שײדענע ערטער פון דער װעלט. אײנער פון די דאָזיגע געפונענע פּוּיגעל פּאַסילען, װעלכען מען האָט אַ נאָמען געגעבען „אַרכע־אַפּעטריקס“, שטעלט מיט זיך פאַר אַ באַמערקסװערטע קאָמבי־נאַציע פון אַ פּוּיגעל און אַן עקרעש. דער דאָזיגער פּוּיגעל האָט אַ סך שפּיצײגע צײהנער אין זײן מויל. ער האָט קלײנע פּליגלען און אַ לאַנגען געגלידערטען (פון פּיעל בײנדרלעך) עק װי אַן עקרעש, פון יעדען בײנדרעל פון עק זײנען אַרױסגעװאַקסען צװײ לאַנגע פּעדערען. דער דאָזיגער פּוּיגעל איז אומגעפּעהר אַזױ גרויס װי

א ראָב. עם זיינען געפונען געוואָרען א סך אנדערע פארשטיינער-  
טע פויגלען, וועלכע שטעלען מיט זיך פאָר א קאָמבינאַציע פון  
פויגלען און רעפטילען און וועלכע באווייזען וואָס פאָר א נאָהענטע  
קרובהשאפט עם האָט אַמאָל עקזיסטירט צווישען די ראָזיגע צוויי  
קלאַסען באַשעפענישען. עם ווערט דעריבער אָנגענומען, אַז די



צייכנונג 156. — עקדעשען, וועלכע האָבען עקזיסטירט  
אין פּריהערהדיגע פעריאָדען פון דער ערד. (1) דער פליהעקדעש,  
וועלכער האָט געהאַט פּלעדער-מוזע-הנליכע פליגלען; (2) דער  
ים-עקדעש.

אור-אורעלטערן פון וועלכע די פויגלען שטאַמען אָפּ, זיינען געווען  
רעפטילען, נאָר צופאַסענדיג זיך אַלץ מעהר צו דעם לעבען אין  
דער לופטען האָבען זיי באַקומען אנדערע פאָרמען און האָבען זיך  
אַנטוויקעלט אין אַ ספּעציעלען קלאַס באַשעפענישען, וועלכע  
שטעהען היינט גאַנץ ווייט פון די רעפטילען.  
די פויגלען צייכענען זיך אויס פון אַלע אנדערע ווירבעל-



חיות (ווערטבראטען) מיט זייער פעהיגקייט צו פליהען. דער קערפער פון א פויגעל האָט די פאָרם פון אַ שפינדעל, כדי ער זאָל קענען לייכטער שפאלטען די לופט. די הויך און ווייט פליהענדע פויגלען האָבען געוועהנליך אין זייער קערפער אזעלכע לופט־קאָמערען, וועלכע גיבען זיי אַ בעסערע מעגליכקייט זיך צו האַלטען אין דער לופט. די לופט־קאָמערען ביי די גוט־פליהענדע פויגלען ערפילען אַן עהנליכע אויפגאבע ווי דער לופט־פענכער ביי די פיש.

נאָר דער באַזונדערס כאַראַקטעריסטישער צייכען פון די פויגלען זיינען זייערע פּעדערען. קיין אנדערע באַשעפענישען אויף דער וועלט, אויסער די פויגלען, האָבען ניט קיין פּעדערען. די פּעדערען פון די פויגלען האָבען פאַרשיידענע קאָלירען, פאַרשיידענע פאַרמען, זיינען פון פאַרשיידענער גרויס און דיענען פאַרשיידענע צוועקען. די גרויסע פּעדערען, וועלכע בילדען דעם עק פון פויגעל דיענען אַלס אַ רודער ביים פליהען; די גרויסע פּעדערען פון די פליגלען זיינען אזוי אויסגעבילדעט, דאָס ווען דער פויגעל באַוועגט מיט זיינע אויסגעשפּרייטע פליגלען נאָך אונטען ווערט די לופט אונטער איהם צונויפגעדריקט און ער הויבט זיך העכער, וועהרענר ווען ער באַוועגט מיט די פליגלען נאָך אויבען, לאָזען די פּעדערען פון די פויגלען לייכט דורך די לופט און דער פויגעל לאָזט זיך אַראָפּ נידעריגער. די דאָזיגע באַוועגונגען פון די פויגלען ווערען אזוי שנעל געמאַכט, דאָס מען קען זיי קוים באַמערקען מיט'ן אויג. די גוט פליהענדע פויגעל מאַכען מיט זייערע פליגלען ביז איבער פינף הונדערט באַוועגונגען אין אַ מינוט. די איבעריגע פּעדערען, וועלכע זיינען געוועהנליך קליין און פּוכיג, גיבען צו רונדקייט און גלאַטקייט צו דעם פויגעל'ס קערפער און גיבען איהם די מעגליכקייט לייכטער צו שפאלטען די לופט ביים פליהען. די ווייכע פּעדערען האַלטען וואַרים דעם קערפער פון פויגעל. די פויגלען זיינען הייס־בלוטטיגע באַשעפּער־נישען און צייכענען זיך אויס מיט דער הויכער טעמפּעראַטור פון זייער קערפער.

די פויגלען קומען ניט אויס מיט איין „קאָסטיום“ פּעדערען פאַר זייער גאַנצען לעבען. אויך פּעדערען ווערען אָפּגעטראָגען. ווען דער אַלטער פּעדערען „קאָסטיום“ ווערט אָפּגעקראַכען און אָפּגעטראָגען, וואַרפט איהם דער פויגעל אוועק און באַקליידט

זיך מיט א נייעם. די אפגעטרעגענע און אפגעקראכענע פערערען פאלען ארויס און עם וואקסען אויס אויף זייער אָרט נייע. גע- וועהנליך קומט די דאָזיגע איבערבייטונג פון די פערערען, פון אלטע אויף נייע, ניט מיט איין מאָל, נאָר ביסלעכווייז, ניט פארר קלענערענדיג די פעהיגקייט פון פויגעל צו פליהען; ביי מאַנכע פויגעל אָבער, ווי ביי די ווילדע ענטלעך (קאטשקעס), למשל, פאלען ארויס אלע פערערען פון עק און פון די פליגען מיט איין מאָל, און זיי פארלירען פאר א געוויסע צייט, ביז נייע פערערען וואקסען זיי אָפ, די פעהיגקייט צו פליהען. זיי פארר בלייבען די גאנצע צייט אין וואסער, וואו זיי שיצען זיך פון זייערע שונאים דורך שווימען און אונטערטונקען זיך.

דאָס בייטען פון די פערערען קומט ביי די פויגעלען מייסטענס פאָר אין הערבסט, ווען זיי האָבען שוין אויסגעהאָדעוועט זייערע אויסגעבריהטע קינדער. צום ווינטער איז טאקע אויך נויטיג א נייער פערערען קאָסטיום, ער איז וואַרעמער. פיעל פויגעלען באַקומען אין פריהלינג פארשיידענע קאָלירטע פלעקען אין זייערע פערערען. זיי באַקומען זיי מיט א קורצער צייט פריהער פאר דער פאָרונגס-צייט. עם ווערט אָנגענומען, אז די דאָזיגע קאָלירען האָבען דעם צוועק צוציהען די געשלעכטער און צו פאָרלייכטערען די שדוכים. ביי מאַנכע פויגעלען קומט די ענ- דערונג אין דעם קאָליר פון די פערערען, ווי עם שיינט, צוליעב דער צופאסונג צו דער אומגעבונג. די שנעעהוהן, למשל, וועלכע לעבט אין די ווייטע נאָרדליכע געגענדען פון ערד-קוגעל, האָט אין ווינטער-צייט פאָלשטענדיג ווייסע פערערען, דאָס מען קען זי קוים ארויסזעהן פון שנעע, נאָר אין פריהלינג, ווען דער שנעע ווערט פארשוואונדען, פאלען ביי איהר ביסלעכווייז ארויס די ווייסע פערערען און עם וואקסען אויס אויף זייער אָרט נייע פערערען, וועלכע האָבען דעם קאָליר פון די מאָד-באוואקסענע שטיינער, אויף וועלכע די שנעעהיהנער ליעבען צו זיצען. דער קאָליר פון די פערערען האַרמאָניזירט אזוי מיט די שטיינער, דאָס מען קען די שנעעהיהנער, וועלכע זיצען אויף זיי, קוים באַמערקען אפילו פון דער נאָהנט.

פיעלע פויגעלען, באַזונדערס די וועלכע פליהען אין מחנות, האָר- בען קאָליר-סיגנאלען אָדער קאָליר-צייכענס, ווי די נאָטור-פאָרשער רופען עם. די דאָזיגע פויגעלען האָבען אין פארשיידענע טיילען

פון זייער קערפער בינטלעך פערדערען פון פארשיידענע אויפפא-  
לענדע קאָלירען. אנדערע האָבען איינעם אָדער מעהרערע אויפ-  
פאלענר קאָלירטע פערדערען אין עס. ווען די דאָזיגע פויגלען רוהען  
אָדער געהען אַרום אויף דער ערד, זיינען זייערע בונט-פארביגע  
פערדערען מייסטענס פארדעקט מיט די אַרומיגע פערדערען, אָבער  
ווען זיי פליהען, שטעלען זיי אַרויס זייערע קאָלירטע פלעקען אין  
זייער פולען גלאַנץ. מאַנכע נאַטור-פאַרשער באַהויפטען, אַז די  
דאָזיגע קאָלירטע פערדערען האָבען דעם צוועק פון סיגנאַלען אָדער  
צייכענס פאַר די פויגלען, נאָכצופליהען זייערע פיהרער און דע-  
ריבער האָט מען אָט די קאָלירטע פערדערען א נאָמען געגעבען  
„קאָלירסיגנאַלען“ אָדער „קאָליר צייכענס“. נאָר דאָס זיינען אַלץ  
סברות, וועלכע האָבען ביז איצט נאָך ניט געקענט באַוווּזען ווערען.  
אין אַלגעמיין ווייס מען נאָך וועניג וועגען די אורזאַכען פון די  
פארשיידענע קאָלירען ביי פויגלען און ביי אַנדערע לעבעדיגע  
באַשעפענישען און ווי אזוי מען קען זיי ערקלערען.

די זכרים פון די פויגלען האָבען מייסטענס בונטערע און  
שעהנר קאָלירטע פערדערען ווי די נקבות. צווישען די זינג-  
פויגעל זיינען די זכרים בעסערע זינגער ווי די נקבות. עס ווערט  
אָנגענומען, אַז די שעהנע פערדערען ווי אויך דאָס שעהנע  
זינגען פון די זכרים זיינען די מיטעל מיט וועלכע זיי קענען  
בעסער צוציהען צו זיך די נקבות.

ביי די מייסטע פויגלען, אזוי נוט ווי ביי פיש און אַנדערע  
חיות, איז דער קאָליר פון אויבערשטען טייל פון קערפער העלער  
ווי דער אונטערשטער טייל. די נאַטור-פאַרשער באַטראַכטען עס  
אַלס אַ שווי-מיטעל פאַר די חיות געגען זייערע שונאים. אַן אַמע-  
ריקאַנער קונסט-מאַלער האָט אָנגעוווּזען אויף דעם פאַקט, אַז  
דאָס ליכט, וואָס פאַלט פון אויבען, מאַכט דעם רוקען פון פויגעל  
העלער, ווי ער איז ווירקליך, וועהרענר דער שאַטען, וואָס פאַלט  
פון אונטען, ווערט אָפגעשוואַכט דורך דעם העלערען קאָליר פון  
דעם פויגעל'ס בויך. דער פויגעל איז אויף אַזאַ אופן גלייכמעסיג  
באַליכטעט פון אַלע זייטען און ער וואַרפט זיך ניט אין אויג,  
אָדער איז זאָגאַר אינגאַנצען אונזיכטבאַר, ווען ער געפינט זיך  
אַפילו פאַר ניט קיין איבריגס ווייטע שטרעקע. דערזעלביגער מאַ-  
לער האָט אויך אָנגעוווּזען דערויף, אַז די פארשיידענע קאָלירטע


פלעקען און שטרייפען פון די פויגלען און די באלייכטונג, וואָס זיי קריגען, מאַכט זיי וועניגער זיכטבאַר.

דער אינערליכער אָרגאַניזם פון די פויגלען האָט אַ סך עהנ־ליכקייטען צו דעם אָרגאַניזם פון די רעפּטילען, עס פאַרשטעהט זיך, מיט מעהרערע וויכטיגע ענדערונגען, וועלכע פאַסען צו די פויגלען צום פליהען און צו זאַמלען שפּייז. דער שנאָבעל פון דעם פויגעל איז איינער פון די וויכטיגסטע טיילען פון זיין שפּייז־אַפאַראַט, מיט איהם זאַמעלט ער זיין שפּייז, און דעריבער זיינען די שנאָבלען ביי די פאַרשיידענע אַרטען פויגלען פון פאַרשיידענע פאַרמען און פאַרשיידענער גרויס, צוגעפאַסט צו דעם מין שפּייז, מיט וועלכען זיי ערנעהרען זיך. אויך די צונג האָט פאַרשיידענע פאַרמען. ביי רויב־פויגלען און ביי פּאַפּוגאַיען איז זי ברייטער, פליישיגער און ווייכער, וועהרענר ביי די וואָס נעהרען זיך מיט קערנער און אינזעקטען איז זי שמעלער און האַרטער.

דער סקעלעט פון די פויגלען איז פיעל מעהר ענטוויקעלט ווי ביי די רעפּטילען. דער סקעלעט פון אַ פויגעל שטעלט מיט זיך פאַר אַ געשלאָסענעם ראַהם. די ביינדלעך, פון וועלכע דער רוקען־ביין איז צונויפגעשטעלט, זיינען פעסט צונויפגעוואַקסען איינע מיט די אַנדערע און צו זיי זיינען שטאַרק באַפעסטטיגט די ריפּען־ביינער, וועלכע זיינען פון אונטען פאַראייניגט מיט דעם ברוסט־ביין. די ביינדלעך פון האַלז זיינען אָבער אזוי פאַרבונדן דען איינע מיט די אַנדערע, אז זיי זאָלען זיך קענען לייכט באַ־וועגען. דער עק באַשטעהט פון עטליכע קליינע ביינדלעך, וועלכע זיינען צונויפגעוואַקסען אין איין קנאַפּ, אויף וועלכען עס שטיצען זיך די עק־פּעדערען. די פליגלען פאַרנעהמען דעם פלאַץ פון הענט אָדער פּאָדערשטע פיס, וואָס אַנדערע ווירבעל־חיות האָבען. די פליגלען פון אַ פויגעל האָבען דיזעלביגע ביינער, וואָס די פּאָד־פּעדערשטע פיס פון אַנדערע ווירבעל־חיות — איין אויבערשטען ביין, צוויי אונטערשטע און אַ פינגער־ביין (דאָס איז דאָס אונט־טער־פליגעלע), וואָס דערמאָנט דעם גראָבען פינגער ביי די פיער־פיסיגע חיות. עס זיינען אויך פאַראן שפורען פון עטליכע ביינער־לעך, וועלכע צייגען, אז אַמאָל האָבען די פליגלען געהאַט מעהר פינגער און האָבען געהאַט די פאַרם פון הענט אָדער פּאָדערשטע פיס. די פויגעלשע פיס זיינען אזוי אויסגעבילדעט, דאָס זיי זאָלען קענען שטיצען דעם קערפּער און האַלטען זיין גלייכגעוויכט. די

קניע פון די פיס זיינען אריינגעוואקסען טיעף אין קערפער. דער געלענק פון די פויגעלשע פיס, וואָס מען נעהמט געוועהנליך אָן פאַר אַ קניע, איז אין דער ווירקליכקייט דאָס קנעכעל פון זיין פוס, וועהרענר דער אמת'ער קניע איז אריינגעוואקסען אין קערפער פון פויגעל און מען זעהט איהם ניט.

דער מאַרד פון די פויגלען איז בעסער ענטוויקעלט, ווי ביי אַלע אנדערע חיות, וועלכע זיינען ביז איצט באַשריבען געוואָרען. די פאַרשידענע חושים זיינען ביי די פויגלען אויך גוט ענטוויקעלט, באַזאָנדערס דער חוש הראיה. די נאָדלעכער פון פויגעל געפינען זיך אין דעם אויבערשטען טייל פון שנאָבעל ; זיינע אויערען גע-



צייכנונג 167. — (1 סקעלט פון אַ פויגעל. 2) דער אינגעווייד פון אַ פויגעל. א, ושמ (שלונד); ב, קראַפּ; ג, דער צווייטער קראַפּ אָדער דער הויט־מאַען; ד, דער פּופיק (דער דריטער מאַען); ה, דער מילץ; ו, די צוועלף־פינגער קישקע; ז, די בלינדע קישקעס; ח, די לאַנגע קישקע; ט, דער אורין־קאָנאַל; כ, דער אייער־קאָנאַל; ל, דער אַפּיהרונג־קאָנאַל; מ, די הינטער־לויב עפענונג; נ, דער לעבער; ס, דאָס גאַלזעקעל; ע, די קורצע קישקע. 3) קאַפּ־מאַרד; 4) דאָס אויג.

פינען זיך פון ביידע זייטען פון קאפ און זיינען באוואקסען מיט בינטלעך פערדערען.

די לונגען פון א פויגעל באשטעהען פון צוויי דונקל־רויטע אָרגאַנען, וועלכע ליגען אין דעם חלל צווישען די ריפען און רוקען־ביין. יעדער פון די לונגען איז פאַרבונדען מיט לופט־בייטעלעך, וועלכע ציהען זיך אין די חללים צווישען די פאַרשידענע גליעדער. ביי מאַנכע פויגלען ציהען זיך די דאָזיגע לופט־בייטעלעך אַרײַן אין די ביינער פון קערפער, דאָס הייסט, אַז די ביינער זיינען פוסטע, און פאַרקלענערען דערמיט דאָס געוויכט פון פויגעל. ווען דער פויגל געל דערהויבט זיך אין דער לופטען צו פליהען, נעהמט ער אָן די אַלע לופט־בייטעלעך פול מיט לופט, און זיין ספעציפישע געוויכט ווערט פיעל פאַרקלענערט (דאָס הייסט, אַז דער אונטערשיעד אין זיין געוויכט מיט דעם געוויכט פון לופט ווערט קלענער).

מיר וויסען שוין פון פריהער, אַז לופט ווערט אַרײַנגעאַטעמט אין קערפער פאַר דעם צוועק, אַז דער זויער־שטאָף, וואָס לופט ענטהאַלט, זאָל זיך פאַרבינדען מיט דעם בלוט און מיט דעם פלייש פון קערפער, כדי צו שאַפען וואַרעמקייט און ענערגיע, וואָס איז נויטיג פאַר דער לעבענס־טעטיגקייט פון דער באַשעפעניש. וואָס טיעפער און אָפטער עס קומט פאַר די איינאַטעמונג פון לופט, אַלץ גרעסער איז די מאָס וואַרימקייט און ענערגיע, וואָס ווערט געשאַפֿט פון קערפער. פויגלען אטעמען געוועהנליך טיעפער ווי אנדערע באַשעפענישען און זיי נעהמען אַרײַן אין זייערע לונגען און אין זייערע לופט־בייטעלעך, וועלכע פאַרצווייגען זיך איבער זייער קערפער, מעהר זויער־שטאָף. און דער אַרײַנגענומענער זויער־שטאָף ווערט פאַרטיילט איבער דעם גאַנצען קערפער דורך אַ נוט־ענטוויקלעטען בלוט־צירקולאַציאָנס־סיסטעם, פיעל בעסער ענטוויקעלט, ווי ביי די אַלע חיות, וועלכע זיינען באַשריבען געוואָרען ביז איצט. די פיער האַרץ־קאַמערען פון אַ פויגעל, וואו עס קומט אַרײַן דאָס גערייניגטע בלוט און פון וועלכע עס געהט אַרויס דאָס אונגריינע בלוט, זיינען אָפגעטיילט איינע פון די אנדערע, דאָס ריינע בלוט און דאָס אונגריינע מישען זיך ניט מיטאַנאַנדער. דאָס האַרץ ביי די פויגלען שלאָגט פיעל שנעלער, ווי ביי די חיות, וועלכע זיינען ביז איצט באַשריבען געוואָרען. דאָס שנעלע שלאָגען פון האַרץ טרייבט דעם איינגעאַטעמטען זויער־שטאָף, וואָס האָט זיך באַהעפט מיט דעם בלוט, זעהר שנעל אין אַלע טיילען פון קערפער, און דער

רעזולטאט איז, אז ווארעמקייט ווערט געשאפען איבער דעם גאנצען קערפער פון פויגעל. די פערערען, מיט וועלכע דער קערפער פון פויגעל איז באדעקט, האָבען די אייגענשאפט, אז זיי לאָזען שווער דורך ווארעמקייט דורך זיך. פארשידענע שטאָפען האָבען אין באַ צוג צו ווארעמקייט פארשידענע אייגענשאפטען. אייזען, קופער, ניקעל און אנדערע מעטאלען לאָזען דורך ווארעמקייט זעהר לייכט. האָר, שטרוי, וואָל, פאפיער און פערערען לאָזען דורך ווארעמקייט זעהר שווער. שטיין לאָזט דורך ווארעמקייט לייכטער ווי וואָל אָדער פערערען אָבער שווערער ווי אייזען. די פערערען, מיט וועלכע די פויגלען זיינען באדעקט, לאָזען, אַלזאָ, שווער דורך די ווארעמקייט פון זייער קערפער און לאָזען זיך איחס ניט אָפקיהלען. די טעמפעראטור פון א פויגעלשען קערפער איז אין פארגלייך מיט אנדערע חיות א גאנץ הויכע. די מייסטע פויגלען האָבען א טעמפּעראטור פון 103 ביז 104 גראד פארנהייט. אנדערע פויגלען האָר בען זאָגאר א טעמפעראטור פון 110 גראד פארנהייט (די טעמפעראטור פון א מענשליכען קערפער איז פון 98 ביז 99 גראד פארנהייט אָדער 37 גראד צעלזיוס).

די איינאטעמונג פון א סך זויער־שטאָף, וואָס פאראורזאכט א שנעלע בלוט־צירקולאציע און העלפט שאַפען ווארעמקייט און לעבענס־ענערגיע, פאָדערט אָבער א סך הייז־מאטעריאל, דאָס הייסט, שפייז. דער אָפעטיט פון פויגלען איז דאָריבער זעהר א גרויסער. באַזאָנדערס ביי די יונגע, וועלכע האַלטען נאָך אין וואַקסען. יונגע פויגלען, וואָס האַלטען נאָך אין וואַקסען, קענען אין א טאָג אויפֿעסען מעהר שפייז ווי גרויס זיי זיינען. אנדערע פויגלען קענען אויפֿעסען אין איין טאָג דריי מאָל אזוי פיעל שפייז ווי זייער אייגענע געוויכט. ווען א מענשליך קינד פון 8 אָדער 10 יאָהר אַלט וואָלט געהאט אזא אָפעטיט וואָלט עס געדארפט אויפֿ־עסען פון 150 ביז 200 פונט שפייז א טאָג. דערוואַקסענע פויגלען עסען וועניגער, אָבער דאָך איז זייער אָפעטיט זעהר א גרויסער. א דערוואַקסענער פויגעל קען אויפֿעסען אין איין טאָג אונגעפעהר א זעקסטעל טייל פון זיין אייגענער געוויכט. ווען א דערוואַקסענער מענש זאָל האָבען אזא אָפעטיט, וואָלט ער געדארפט אויפֿעסען פון 25 ביז 30 פונט שפייז א טאָג.

די שפייזען מיט וועלכע די פארשידענע פויגלען נעהרען זיך, זיינען זעהר פארשידען, און דאָס פאָרדייאונגס־סיסטעם פון די פאָר־

שירדנע אַרטען פּויגלען איז צוגעפּאסט צו די שפּייזען מיט וועלכע זיי נעהרען זיך. ביי די רויב־פּויגלען און ביי די גרויסע פּויגלען, וועלכע נעהרען זיך מיט קערנער, ווי די הויז־עופות, טויבען, א. ז. וו., געהט דער ושמ (שלונד) אַרײַן אין קראַפּ (וואַליע), וואו דאָס שפּייז ווערט אויפגעזאמעלט און ווייך געמאכט איידער עס קומט אַרײַן אין פּופיק (דער מאַגען פּון פּויגעל). דער פּופיק האָט פעסטע מוסקול־ווענטלעך, באַזאָנדערס ביי די פּויגלען, וואָס נעהרען זיך מיט קערנער, און איז אויסגעפוטערט מיט אַ פעסטער האַרנדיגער הויט. אזוי ווי די פּויגלען האָבען ניט קיין צייהנער, צוצוקייען זייער שפּייז, העלפט אָט די דאָזיגע האַרנדיגע הויט פּון זייער מאַגען (פּר־פּיק) צורײבען דאָס שפּייז. ביי מאַנכע פּויגלען, ווי ביי די הויז־עופות און טויבען, ווערט דער פּראָצעס פּון צורײבען דאָס שפּייז אין מאַגען נאָך געהאַלפּען דורך די קליינע שטיינדלעך, וואָס זיי פאַרשלינגען מיט זייער שפּייז. פּון מאַגען קומט אַרײַן דאָס שפּייז אין די קישקעס. די דינע קישקע איז געדרעהט און איז אָפט דריי אָדער פּיער מאָל אזוי לאַנג ווי דער קערפּער פּון פּויגעל. די לענג פּון דער קישקע הענגט אָפּ פּון די שפּייזען מיט וועלכע דער פּויגעל נעהרט זיך. פּון דער דינער קורצער קישקע געהען אַרויס צוויי בלינדע קישקעס (ביים ענד געשלאָסען).

צו דער פאַרדייאונג זייער שפּייז העלפט אויך מיט די פּליסיג־קייט וואָס קומט פּון זייער לעבער, ווי אויך די פּליסיגקייט פּון דער בויך־דריזע, וועלכע ווערט גערופּען „פּאַנקרעאַס“. די דאָזיגע בויך־דריזע גיט אַרויס פּון זיך אזאַ שפּייעכץ עהנליכע פּליסיגקייט, וועלכע העלפט זעהר פּיעל מיט צו דער פאַרדייאונג פּון שפּייז ביי די פּויגלען. די פּויגלען האָבען אויך אַ מילץ און אַ גאַל.

דאָס צווערעכפּעל (די דיקע הויט וואָס טיילט אָפּ דעם ברוסט־קאַסטען פּון דעם חלל פּון בויך) איז ביי די פּויגלען וועניג ענטוויקעלט, דער ברוסט־קאַסטען און דער חלל פּון בויך איז, אַלזאַ, ביי זיי ניט אָפּגעטיילט איינע פּון די אנדערע.

דער גאָרעל האָט ביי די זכרים פּון די פּויגלען, באַזאָנדערס ביי די זינג־פּויגעל, אין מאַנכע פּרטים אַן אנדער פּאַרם, ווי ביי די נקבות. ער איז מעהר געבויגען און געדרעהט.

די נייערען פּון די פּויגלען זיינען פאַרעהלטיגטעמיג גרויס און לאַנג, זיי ליגען אין די פּערטיפונגען פּון קרייז־ביין און זיי צוטייל לען זיך ווי אין פינגער פּון וועלכע עס קומען אַרויס די אוריין־קאנאַל



לען. די פויגלען האָבען אָבער ניט קיין אורין פענכער. די אורין־קאָנאלען קומען אַריין דירעקט אין דער עפּנונג פון הינטער־לייב. דער אורין פון פויגלען איז אַזאַ ווייסע געדיכטע מאַסע, וועלכע ווערט שנעל פאַרהאַרטעוועט.

די געשלעכטס־טיילען ביי די פויגלען געפינען זיך אין דער געדענד פון די ניערען. די גשלעכטס־טיילען זיינען ביי פויגלען און רעפּטילען זעהר עהנליך. ביי די זכרים פון די פויגלען געפינען זיך ניט ווייט פון די ניערען צוויי דריזען, וועלכע ווערען שטאַרק אויפֿ־געדרונגען אין דער פּאַרונגס־צייט. נעבען די צוויי דריזען געפינען זיך אַנדערע צוויי, וועניג ענטוויקעלטע, דריזען, וועלכע פיהרען צו צוויי געדערעהטע זאַמען קאָנאַלען, וועלכע ענדיגען זיך אין דער עפּנונג פון הינטער־לייב אין צוויי קאָנוס־פערמיגע קנעפלעך. אַ געשלעכטס־גליעד האָבען ניט די פויגלען. מאַנכע פויגלען אָבער, ווי די גרויסע רויב־פויגלען און זומפֿ־פויגלען, ווי אויך גענז, ענטלעך און שוואַנען און באַזאַנדערס די שטרויס־פויגלען האָבען שפורען פון אַ נע־שלעכטס־גליעד.

די נקבות האָבען אַן אייער־נעסט אָדער זייער־שטאַק, וואָס געפינט זיך אין דער גענענד פון די ניערען. בלויז דער לינקער זייט פון אייער־נעסט איז נוט ענטוויקעלט, דער רעכטער זייט איז ביי מאַנכע פויגלען כמעט אין גאַנצען אטראָפירט. יעדע געלכעל, וואָס ענטוויקעלט זיך אין אייער־נעסט וואַנדערט דורך דעם געדערעהטען אייער־קאָנאַל, וואו זי ווערט אַרומגעלעגט מיט ווייסעל, וואָס קומט אַרויס פון די דריזען, וועלכע געפינען זיך אין די ווענטלעך פון אייער־קאָנאַל ; אויף איהר ווייטערדיגען וועג ווערט זי באַדעקט מיט אַ הויט און נאַכדעם מיט אַ קאַלכיגען שאַלאַכין.

די פויגלען לעבען געוועהנליך אין נעסטען. בלויז די שטרויס־פויגלען, די ים־שוואַלבען און וועניג אַנדערע גראָבען אויס איינפאַ־כע לעכער אין דער ערד, וואו זיי וואוינען. אָבער די איבריגע פויגעל בויען ספעציעלע נעסטען, אַנדערע זאָגאַר זעהר קונסטפולע, און זיי בעמען זיי אויס מיט מאַך, שפּין־געוועבס, פּוך, א. ז. ו., יעדער פויגעל האָט זיך זיין געשמאַק און זיין פּלאַץ פאַר זיין נעסט, וואָס ער בויט. מייסטענס בויט די נקבה דעם נעסט, ביי מאַנכע פויגלען, אָבער, בויט איהם דער זכר.

די פאַרמעהרונג פון פויגעל קומט דורך לעגען אייער. ביי פיעלע אַרטען פויגלען העלפט אויך דער זכר בריהען די אייער, ווי

ביי טויבען, למשל, וואו די נקבה און דער זכר בייטען זיך מיט'ן בריהען. זיי זיען אויף די אייער א וויילע אום א וויילע. דאָס זעלבע קומט פאַר אויך ביי פיעלע ים פויגלען. ביי אנדערע פויגלען בריהט בלוז די נקבה, און דער זכר באַזאָרגט דאן איהר און די יונגע פויגעלעך מיט שפייז. עס זיינען אויך פאראן אַזעלכע פויגלען, וועלכע בריהען גאָר ניט אַליין זייערע אייער, נאָר אנדערע בריהען פאַר זיי. דער קוקוק, למשל, לעגט זיינע אייער אין אַ פרעמד דען נעסט, וואו זיי ווערען אויסגעבריהט פון דעם פויגעל, וואָס וואוינט אין איהם, און די יונגע קוקוקלעך, וואָס קומען אַרויס פון זיי, ווערען ערצויגען פון פרעמדע עלטערען, מייסטענס אויף דעם רעכנונג פון זייערע אייגענע קינדער, ווייל די יונגע קוקוקס זיינען גרויסע פרעסער און עס קלעקט ניט קיין שפייז פאַר די איבריגע פויגעלעך פון נעסט.

אין די קאלטע און אין די מעסיגע געגענדען בריהען די פויגלען מייסטענס בלוז איינמאָל אין יאָהר. זיי פאַרען זיך נע- וועהנליך אין פרייהלינג. פיעלע פון די קלענערע פויגעל אָבער, באַ- זאָנדרערס די זינגפויגעל, בריהען שפעט אין זומער אַ צווייטען מאָל. אין די הייסע געגענדען בריהען די מייסטע פויגלען עטליכע מאָל אין יאָהר. געוועהנליך לעגען די קליינע פויגלען מעהר אייער, ווי די גרויסע, אָבער דאָס איז ניט קיין כלל. גראד לעגט דאָס קליין קאליברים פויגעלעך נאָר 2 אָדער 3 אייער, וועהרענד דער גרויסער שטרויס-פויגעל לעגט פון 15 ביז 20 אייער.

די צייט, וואָס דויערט ביי די פארשידענע פויגלען אויסצו- בריהען זייערע אייער, הענגט אָפּ פון דער גרויס פון די אייער. ביי די קלענערע ארטען פויגלען דויערט דאָס בריהען פון עלף ביז פיער- צעהן טעג, ביי הויז-היהנער אַן ערף דריי וואָכען, וועהרענד ביי די שטרויס-פויגלען דויערט דאָס בריהען פון זיבען ביז אכט וואָכען. ווען דאָס יונג פויגעלע איז שוין אויסגעבריהט, לעכערט עס דורך מיט זיין שנעבעלע דעם שאַלאַכץ פון איי און קריכט פון איהם אַרויס.

מאנכע ארטען פויגעל, ווי פאזאנען, רענען-פייפער, וואכטלען און מעהרערע אנדערע, קומען אַרויס פון איי גוט ענטוויקעלט, באַ- וואַקסען מיט פערדערען, מיט ברייט געפענטע אויגען און גענוג קרעפטיג נאָכצופאָלגען זייערע עלטערען אָדער גאָר זיך אַוועקצולאָזן זען אין דער וועלט אָהן אירגענד וועלכע הילף פון די עלטערען. אנדערע ארטען ווידער, ווי טויבען, וואַראַבייטשיקעס, האַלץ-פיקער,

א. ז. וו., קומען ארויס פון איי גאנץ הילפלאָז און זיינען פאַר אַ לעני גערע צייט אַבהענגיג פון זייערע עלטערן, אז זיי זאָלען זיי ערנעהרען און שיצען.

מאנכע פויגלען, ווי ראָבען, האָלץ־פיקער, וואראבייטשיקעס, וואכטלען, אויבען, א. ז. וו., בלייבען געוועהנליך וואוינען אויף זייער רע ערטער, וואו זיי זיינען נעבאָרען געוואָרען. די מייסטע פויגלען אָבער וואנדערען אויס, ווען עס קומט אָן דער ווינטער. זיי פליהען אַוועק אין ווארעמע געגענדער. זיי ווערען דאָריבער גערופען „צוג־פויגלען“ אָדער „וואנדער־פויגלען“. די מייסטע ארטען וואנדערען אויס אין גרויסע מחנות. מאנכע פויגלען אָבער פליהען איינציגווייז אָדער פאָרווייז. עס זיינען פאראן פויגלען, וועלכע וואנדערען אויס פאַר מעהרערע טויזענדע מילען ווייט. זיי פליהען אין אַ באַשטימטע ריכטונג, ווי זיי וואָלטען זיך האָבען איינגעצייכענט דעם וועג, פלי־ הענדיג אין דערזעלבער ריכטונג מיט אַ יאָהר צוריק. די ים־פויגלען וואנדערען, האַלטענדיג זיך נאָהענט צום ברעג, ווארשיינליך צוליבע דעם, אז זיי זאָלען זיך קענען אַראָפּלאָזען אַפּרוּהען, ווען נויטיג.

די אויסוואנדערונג פון די פויגלען איז נאָך ניט גענוג אויפ־ געקלערט געוואָרען. אין מאנכע פעלע ערקלערט זיך די אויסוואנדערונג צוליבע שפייז־מאָנגעל. עס שיינט אָבער, אז עס זיינען פאראן נאָך אנדערע אורזאָכען, צוליבע וועלכע די פויגלען וואנדערען אויס, אָבער מען האָט זיי נאָך ביז איצט ניט געקענט אויספאָרשען. די אויסוואנדערונג פון די פויגלען איז אַלענפאלס איינע פון די אינטערעסאנטעסטע ערשיינונגען אין דער נאַטור. אין אַ באַשטימטער צייט פאַרלאָזען די פויגלען זייערע נעסטען, פליהען אַוועק פאַר טויזענדער מילען און נאכדעם, ווען דער ווינטער איז פאַראיבער, קומען זיי צוריק צו זייער פריהערדיגען פלאַץ. דאָס באַווייזט, אז די פויגלען האָבען זעהר אַ גוטען זכרון און אַ באַזונדערע פעהיגקייט צו דערקענען די געגענדער, וועלכע זיי זיינען דורכגע־ פלויגען.

אין זייער אויסוואנדערונגס־פלאַץ בריהען ניט די פויגלען און לאָזען דאָרטען ניט איבער קיין דור נאָך זיך.

דער לעבענס־אַרט פון די פויגלען הענגט אין אַלגעמיין אָפּ פון דער ענטוויקלונג פון זייער פליה־קראַפט. די פאלקען און די זענ־ לער, למשל, וועלכע באַזייען אַ גאנץ באַזונדערס גרויסע פליה־ קראַפט, פאַרבריינגען די מייסטע צייט פון זייער לעבען אין דער

לופט. זיי לאָזען זיך אַראָפּ אויף דער ערד בלויז צום שלאָפען, צו לעגען אייער און צום בריהען. מאַנכע צוגיפּויגעל פליהען דריי אָדער פיער טעג נאָך דער רייה, אין וועלכער צייט זיי מאַכען די לאַנגע רייזע פון מיטעל־איראָפּא ביז אַפּריקאַ.

נאָר ניט אַלע פּויגעל זיינען גוטע פליהער. די הויז עופות זיי נען גאַנץ שוואַכע פליהער און זיי פאַרבריינגען זייער לעכען אויף דער ערד. דער שטרויס־פּויגעל קען נאָר ניט פליהען, ער איז אָבער דערפאַר אַן אויסגעצייכענטער לויפער. ער לויפט מיט אַן איבער־ראַשענדער שנעלקייט. די וואַסער־פּויגעל פאַרבריינגען דעם גרעס־טען טייל פון זייער לעכען אויפ'ן וואַסער. זיי זיינען אויסגעצייכענטע שווימער און טויכער. אַנדערע קענען בלייבען אונטער'ן וואַסער זעקס מינוטען לאַנג. פיעלע פון די וואַסער־פּויגעל זיינען אויך גוטע פליהער, אָבער אויף דער יבשה באַוועגען זיי זיך זעהר אומגעלומפערט. דער קערפער פון די וואַסער־פּויגעל איז מייס־טענס פלאַטשיג, און די פיס געפינען זיך נעהנטער צום הינטערשטען טייל פון קערפער, דאָס גיט דעם פּויגעל אַ בעסערע מעגליכקייט צו שווימען, אָבער עס מאַכט איהם שווערער צו געהן. די וואַסער־פּויגעלען האָבען אויך אַזאַ אויל־דריזע, וועלכע גיט אַרויס פון זיך אַן אויליגע פליסיגקייט, מיט וועלכע די פּויגעלען באַדעקען זייערע פע־דערען. אַזאַ אויל־דריזע האָבען אויך די מייסטע אַנדערע פּויגעלען און זיי מאַכען מיט דער אויליגער פליסיגקייט גלאַנציג זייערע פּעדערען.

אויך צווישען די וואַסער־פּויגעלען זיינען פאַראַן אויסוואַנדע־רער. אַ טייל פון זייער רייזע מאַכען זיי מיט'ן וואַסער, שווימענ־דיג און ווען דער וואַסער־וועג ענדיגט זיך מאַכען זיי דעם איבריגען טייל פון דער רייזע אויף זייערע פליגעלען. די אויסוואַנדערער צווי־שען די לויף־פּויגעלען מאַכען די רייזע צופּוס.

מאַנכע אַרטען פּויגעלען לאָזען זיך זעהר גוט לערנען, באַזאָנדערס אין נאָכאַמען (נאָכמאַכען), ווי די פּאַפּאַגאַיען און ראָבען, למשל.

די מייסטע פּויגעלען האַלטען פון מאַגאַנאַמיע (איינ־ווייבעריי), איין „ער“ פאַרט זיך בלויז מיט איין „זי“, עס זיינען אויך פאַראַן אַזעלכע וואָס לעבען אין פּאַליגאַמיע (פיעל ווייבעריי), וואו איין „ער“ האָט אַ סך ווייבער, ווי ביי היהנער און פאַזאַנען, למשל. עס זיינען פאַראַן פּויגעלען, ביי וועלכע דער „ער“ מיט דער „זי“ לעבען אימער צוזאַמען און בלייבען פאַרבונדען אויף זייער גאַנצען לע־

בען. אין די מייסטע פעלע, אָבער, צושיידט זיך דער „ער“ מיט דער „זי“ נאָכדעם ווי זיי האָבען געבראכט אַ יונגען דור אויף דער וועלט.

ווען עס קומט די פאָרונגס־צייט, פאנגט זיך אָן ביי די „ער'ען“ פון מאַנכע אַרטען, באַזאָנדערס פון די קלענערע פויגלען, אַ קאמף צו געווינען די ליעבע פון די „זי'ען“. די „ער'ען“ פוצען זיך אויס מיט שעהנע בונטע פּעדערען פון פארשידענע קאָלירען. עס וואַסען ביי מאַנכע פון זיי אויס לאַנגע שעהנע פּעדערען פון די זיימען און פון עס, ביי אנדערע וואַסען אויס בונטע בינטלעך פּעדערען אויפ'ן קאָפּ, א. ז. וו. דער „ער“ האָט דאָן אַ גאנץ אנדער אויסזעהן ווי די „זי“, וועלכע בלייבט אין איהר באַשיידענעם וואַכערדיגען קאָס־טיום. מען קען זיי דאָן שווער דערקענען, אַז זיי געהערען צו איין מין. ביי מאַנכע פויגלען זוכען די „ער'ען“ צו געווינען די ליעבע פון די „זי'ען“ דורך פאַרשידענע טאַנץ־באַוועגונגען. זיי טאַנצען אויס קונציגע וואַלצען, וואו זיי מאַכען פאַרשידענע גראַציעזע קונץ ציגע באַוועגונגען. ביי דעם זינג־פויגעל קלינגט אין יענער צייט העלער זיין שטים און ער צוניסט זיך אין זינגען. נאָר דאָס אין אַלץ פאַר דער חתונה. ווען די חתונה איז, אָבער, פאַריבער, פאנגט אָן דער „ער“ צו פאַרלירען זיין גאַנצען גלאַנץ. די חתונה־קליידער פאַנגען אָן אָפּפּריכען, די העלע בונטע פאַרבען פאַרשווינדען, די לאַנגע פּויגל־פּעדערען פאַלען אַרויס, ער טאַנצט ניט מעהר, ער הערט זיך אויף צו חנ'לען און אויף זיין שטים ווערט שוואַכער.

די איינטיילונג פון פויגלען. — עס זיינען ביז איצט אויס־געפאַרשט געוואָרען אַן ערך 16 הונדערט פאַרשידענע גאַטונגען פון פויגלען, וועלכע ווערען איינגעטיילט אין אַן ערך 10 טויזענד ספּע־ציעס (אַרטען). די צאָהל פון די פאַרשידענע ספּעציעס איז אָבער ניט קיין זיכערע, ווייל ביי די נאַטור־פאַרשער עקזיסטירען מיינונגס־פאַרשידענהייטען וועגען אַ גאַנץ גרויסער צאָהל פויגלען, אויב מען זאָל זיי רעכענען פאַר באַזונדערע ספּעציעס.

די אַלע פאַרשידענע פויגלען ווערען איינגעטיילט אין צוויי הויפּט־גרופּען: אין פּלאַך־ברוסטיגע און שאַרף־ברוסטיגע, אָדער ר א ט י ט ע ן און ק א ר י נ א ט ע ן, ווי זיי ווערען גערופּען מיט זייערע לאַטיינישע נעמען. („ראַטיס“ איז אין לאַטיין אַ פּלאַך־כער פליט פון צונויפגעבונדענע קלעצער, וואָס שווימען אויפ'ן וואַסער. דערפון נעהמט זיך דער נאָמען „ראַטימען“ — פּלאַך ווי אַ


פּליט. „קארינא“ איז אין לאטיין א קיעל, דער פּאָדערשטער שאר-  
פער ענד פון א שיף. דערפון נעהמט זיך דער נאמען „קארינאמען“  
— שארף ווי א קיעל). צו די פּלאַך-ברוסטיגע, געהערען געוועהנ-  
ליך די ניט-פּליהענדע פּויגלען, ווי דער שטרויס, וועהרענד די פלי-  
הענדע פּויגלען באלאנגען צו די שארף-ברוסטיגע. ביי די ערשטע  
איז די ברוסט א פּלאַכע, וועהרענד ביי די צווייטע איז די ברוסט א  
שארפע, די ברוסט-ביינער קומען זיך צונויף ווי א קיעל פון א שיף  
אָדער ווי א קליין, כדי זיי זאָלען קענען בעסער דורכשניידען די לופט  
ביים פליהען.

די דאָזיגע איינטיילונג איז ניט קיין באַזונדערס וויכטיגע, זי  
ווערט אָבער באַנוצט פאַר דער באַקוועמליכקייט צו באַשרייבען די  
פאַרשידענע פּויגלען, וועלכע באלאנגען צו פאַרשידענע קלאַסען  
אָדער אָרדנונגען.

דער שטרויס-פּויגלעל. — די שטרויס-פּויגלען שטעלען מיט  
זיך פאַר דעם אויסגעשפּראַכענעם טיפּ פון די פּלאַך-ברוסטיגע פּויג-  
לען, אָדער ראטימען. אין א פריהערדיגע ערד-פּעריאָדע זיינען  
שטרויסען אויך געווען פאַרשפּרייט אין אייראָפּא, ווי דאָס באַוויי-  
זען די פּאַסילען (פאַרשטיינערטע רעשטען פון חיות), וועלכע מען  
האַט געפונען אין ענגלאַנד. איצט אָבער זיינען די שטרויסען אין  
אייראָפּא ניט מעהר בנמצא. די גרעסטע שטרויס-פּויגלען לעבען  
אין אַפריקאַ, זיי דערגרייכען א הויך פון איבער זיעבען פוס. די  
פּעדערען, מיט וועלכע זייער קערפּער איז באַדעקט, זיינען פּוכיג.  
פון די זייטען און אין עק האָבען זיי גרויסע פּוכיגע געקרוינטע פּע-  
דערען. זייער האַלז און קאָפּ איז נאַקעט, ניט באַוואַקסען מיט  
קיין פּעדערען. זייערע פּליגלען זיינען וועניג ענטוויקעלט און קע-  
נען ניט באַנוצט ווערען פון זיי צום פליהען. זייערע פּליגלען קע-  
נען זיי בלויז העלפּען שנעלער צו לויפּען, און זיי זיינען אויך זעהר  
שנעלע לויפּער, זיי קענען לויפּען שנעלער ווי א פּערד. זייערע פּיס  
האַבען בלויז צוויי פינגער, אָבער זיי זיינען זעהר קרעפּטיג. ווען  
זיי ווערען אָנגעגריפּען אנטלויפּען זיי געוועהנליך, אָבער ווען דער  
זועג איז זיי פאַרשטעלט צום אַנטלויפּען, פאַרטיידיגען זיי זיך ענער-  
גיש מיט זייערע קרעפּטיגע פּיס און שנאָבלען.

די שטרויס-פּויגלען לעבען אין די סטעפעס און מדבריות פון  
אַפריקאַ, וואו זיי וואנדערען אַרום אין גרופּען, איין זכר מיט עטליכע  
נקבות. זייער שפייז באַשטעהט פון אינזעקטען, בלעטער, גראַז

און אנדערע גרינסען. מיט זייער שפיז פארשלינגען זיי זאמד און שטיינדלעך, וועלכע העלפען צורייבען די פארשלונגענע שפיז אין זייער מאָגען. קיין קראָפּ האָבען ניט די שטרויסען. זייער מאָגען גען (פּוּפּיק) האָט זעהר שטאַרקע מוסקולען און א באַזונדערס שטאַרקע פאַרדייאונגס־פּערהינקייט.




צייכונג 158. — דער זיד־אַמעריקאַנער שטרויס־פּױגל.

אויסער אין אַפריקאַ זיינען אויך פאַראַן שטרויס־פּױגלען אין זיד־אַמעריקאַ. דער אַמעריקאַנער שטרויס־פּױגל ווערט גערופּען רהעאַג. ער איז באַדייטענד קלענער ווי דער אַפריקאַנער שטרויס־פּױגל. דער אַמעריקאַנער שטרויס־פּױגל שייַדעט זיך אויך אונטער פון דעם אַפריקאַנער דערמיט, וואָס זיינע פּיס זיינען דריי פינגערדיגע און זיין קאָפּ איז באַדעקט מיט פּעדערען. אַ שטרויס־פּױגל לעגט געוועהנליך אויס פון 15 ביז 20 אייער, וועלכע ווערען מייסטענס אויסגעבריהט פון דעם זכר.

אינגאנצען זיינען איצט פאראן בלויז פינף גאטונגען שטרויס־פויגלען, וועלכע זיינען איינגעטיילט אין צוואנציג ארטען (ספעציעס). ניט לאנג צוריק זיינען געווען פיעל מעהר גאטונגען און ספעציעס, אבער זיי זיינען אויסגעשטאָרבען.

די שטרויס־פויגלען באַלאַנגען צו דעם קלאַס אָדער אָרדנונג פון די קורסאַרען (לויפּענדע, ניט פליהענדע פויגלען). די קורסאַרען אָרדנונג ענטהאַלט איצט אַ קליינע צאָהל פויגלען. פיעלע




צייכנונג 159. — דער אַפּטעריקס (קיווי קיווי) פון ניו־זעלאַנד מיט זיינע האַר־עהנליכע פעדערען .

גאטונגען און ארטען פון זיי זיינען אויסגעשטאָרבען. אַן אינטערעסאַנטער פויגל פון דער קורסאַרען אָרדנונג איז דער אויסטראַלישער „אַפּטעריקס“, וועלכער געפינט זיך אין ניו־זעלאַנד. זיינע פעדערען זיינען לאנג און עהנליך צו האַר. ער האָט כמעט איינציג גאנצען ניט קיין שפורען פון פליגלען. זיין שנאָבעל איז לאַנג און דין און אַטוואָס פאַרבויגען ביים ענד. זיינע נאָזלעכער געפינען זיך ביים ענד פון דעם אויבערשטען טייל פון זיין שנאָבעל. זיינע



מיס זיינען פארהעלטניסמעסיג קורץ און האָבען דריי גרויסע פינגער פון פאָרענט און אַ קליין פינגערעל פון הינטען.  
דער אפּטעריקס, וועלכער ווערט אויך גערופען „קיווי קיווי“ איז ניט קיין גרויסער פויגעל, ער איז ניט פיעל גרעסער ווי אַ גער וועהנליכע הוהן. די נקבה לעגט בלויז איין איי, אָבער אַ זעהר גרויסע, וועלכע וועגט אונגעפעהר אַ פיערטעל פון דער געוויכט פון דער לעגערין.



זייכנונג 160. — דער מאַא־פויגעל, וואָס האָט אַמאָל געלעבט אין ניי־זעלאַנד, און דריי אַפּטעריקסען.

אין ניו זעעלאַנד האָט מיט ניט לאַנג צוריק געלעבט אַ זעהר גרויסער שטרויס־עהנליכער פויגעל, וועלכער איז געווען נאָהענט פון צעהן פוס די הויך. מען האָט איהם גערופען דער מאַא־פויגעל. די שווייס־פויגעל (נאַטאַטאַרען). — עס זיינען פאראן פויגלען, וועלכע פארבריינגען זייער גאַנצען לעבען אויפ'ן וואַסער. די שווייס־


פויגלען האָבען ברייטע, פלאַטשיגליכע קערפערס, וועלכע זיינען באַדעקט מיט געדיכטע אויליגע פּעדערען, זייערע פיס געפינען זיך געווענהליך מעהר צום הינטערשטען טייל פון זייער קערפער, און צווישען זייערע פינגער האָבען זיי געווענהליך אַ שוויס־הויט, וואָס פאַרלייכטערט זיי דאָס שווימען.

צווישען די פויגלען, וועלכע לעבען אימער אויפ'ן וואסער קען נען באַצייכענט ווערען דער הויבען־טויכער אָדער גרעבע („גריעב" אין ענגליש). דער דאָזיגער פויגל פאנגט זיין שפיין אין וואַסער. ער לעגט זיינע אייער אין אַ נאַסען־שווימענדען נעסט און בריהט זיי אויס פאַרבלייבענדיג אין וואַסער. ער טראָגט די יונגע אויסגעבריהטע פויגעלעך אויפ'ן רוקען, ביז זיי פאנגען אָן אליין שווימען. ער האָט אַ דינעם האַלז, אַ קליינעם קאָפּ, אַ לאַנג גען, דינעם שפיציגען שנאָבעל, ניט קיין גאנץ הויכע פיס מיט פינגער, וועלכע האָבען שוויס־הויטלעך פון ביידע זייטען און וועל־כע ענדיגען זיך מיט ברייטע פלאַכע נעגעל. זיינע פליגלען זיינען שמאָלע און אויפ'ן עק האָט ער אַ בינטעל קליינע שיטערע פּעדערען. ער איז אַן אויסגעצייכענטער שווימער און טויכער. ער שווימט זאָנאר גאנץ שנעל אונטער'ן וואַסער. ער קען אויך גאנץ גוט פליהען. ער שפיזט זיך מיט פיש, פרעש, אינועקסטען און אויך מיט פלאַנצען. ער האָט אויך אַ טבע אויסצוצופען די פּעדערען פון זיין ברוסט און זיי אויפצועסען.

די ים־טויכער אָדער אייז־טויכער פיהרען אונגעפעהר אזא לע־בען ווי די גרעבען. דער ים־טויכער איז אַ גאנץ גרויסער פויגעל. ער האַלט אָפּט איבער דריי פוס אין דער לענג. ער איז שלאַנק, מיט אַ לאַנגען שפיציגען שנאָבעל, מיט אַ מיטעל־לאַנגען האַלז און מיט דריי־פינגערדיגע פיס, וועלכע זיינען בעזאָרגט מיט שוויס־הויט. זיינע פליגלען זיינען קורצע און באַוואַקסען מיט האַרטע פּעדערען, זיין עק איז אַ קורצער און זיין קערפער איז באַוואַקסען מיט זעהר געדיכטע פּעדערען. די ים־טויכער לעבען הויפטזעכליך אויפ'ן ים און נעהרען זיך מיט פיש. זיי זיינען וואונדערבארע שווימער און טויכער. אויף דער יבשה קענען זיי זיך קוים דער־ריהרען, אָבער זיי זיינען אויסגעצייכענטע פליהער. זייער נעסט מאַכען זיך די ים־טויכער אין אַ טיף, ניט ווייט פון ברעג ים. דאָרטען לעגט די נקבה אויס צוויי דונקעל אַליו־גרינע אייער, וועל־כע ווערען געבריהט אבוועקסלענד פון איהר און פון דעם זכר.

אין אמעריקא געפינען זיך דריי פארשידענע ספעציעס פון די ים־טויכער (לוהן). דער באקאנטסטער פון זיי איז איבער דריי פוס אין לענג, איז באדעקט מיט שווארצע פעדערען דורכנעמישט מיט ווייס.


די פאפאנאיען טויכער אָדער אַלקען זיינען ים־פויגלען. זיי זיינען אויסגעצייכענטע שווימער און טויכער, שטארקע פליהער



צייכונג 161. — שוויס־פויגלען. (1) דער אייז־טויכער; (2) די הויב־גרעבע, אָדער הויבען־טויכער; (3) די געווענליכע גרעכע; (4) דער אַלק אָדער פּאָפּאָנאָען־טויכער.

און פארבריינגען די מייסטע צייט אויפ'ן ים. ווען עס קומט זייער בריהונגס-צייט, פארזאמלען זיי זיך אין גרויסע מחנות אויף די פעלזען ביים ברעג ים, וואו זיי לעגען זייערע אייער און וואו זיי בריהען זיי אויס.

א כאראקטעריסטישער וואסער-פויגעל איז דער פיגווין. זיינע פליגלען זיינען קליין און וועניג ענטוויקעלט, און זיי זיינען באדעקט מיט א שופען-הויט אנשטאט פערדערען. צום פליהען




צייכונג 162. — (1 דער פיגווין ; 2) די בוים-ענמעל.

טוינען זיינע פליגלען אין גאנצען ניט, ער באנוצט זיי פיעל מעהר אלס פלוס-פערערען (ווי א פיש), ווען ער שווימט אונטער'ן וואַסער. די פיגוויןען לעבען אין דעם זידליכען טייל פון אונזער ערד-קוגעל.



די אלע אויסגערעכענטע שוויס-פויגעלען ווערען קלאַסיפֿיצירט אונטער דעם נאָמען פיגאַפּאַדען, וואָס דאָס מיינט פויגלען, ביי וועלכע די פיס געפינען זיך מעהר צו דעם ענד פון זייער הינטערשטען טייל פון זייער קערפער.

א מעהר באקאנטע גרופע שוים - פויגלען זיינען די לאַנגר־פענען, װאָס דאָס מיינט לאַנג - פליגעלדיגע. צו דער דאָזיגער גרופע באלאנגען די נוט באקאנטע ים־פויגלען די מעװען, ים־שוואַלבען, שטורם־פויגלען און אלבאטראַסען, װעלכע שװימען און פליהען ביי די ברעגעס פון אונזערע ימים. די דאָזיגע פויגלען האָבען לאַנגע, שפיציגע פליגעלען און האָבען טױבען אָדער שװאַלבען עהנליכע קערפערס. פיעלע פון זיי זיינען אױסגעצױכענטע שװי־מער און פליהער. באַזאָנדערס צױכענען זיך אױס אַלס גוטע פליהער די שטורם־פויגלען און די אלבאטראַסען, װעלכע קענען אָפּפליהען עטליכע הונדערט מייל אָהן אַן אָפרױה.



צױכנונג 168. — (1 דער שטורם־פויגעל; 2) די ים־שוואַלב.

די מעװען, װעלכע פליהען אַרום אין גרויסע מחנות ביי די ברעגעס פון אונזערע ימים, שװעבען מעהר איבער'ן װאַסער, װי זיי שװימען אין איהם. געװעהנליך פליהען זיי אַרום לאַנגזאַם איבער'ן װאַסער ניט װײט פון ברעג, װאז זיי קוקען אױס פאַר שפײז. די ים־שוואַלבען זיינען לײכטער געבױט װי די מעװען און זיינען בעסערע פליהער. װען זיי דערזעהען אַ פיש, װעלכען זיי װילען פאַנגען, ניבען זיי אַ שפרונג פון דער לופט אין װאַסער אַרײן.



צייכונג 164. — (1 מעווען ; 2) דער דונקלער אלבארטאס.

סאי די מעווען, סאי די ים־שוואלבען בריהען אין קאלאניעס. זיי פארנעהמען ניט ווייט פון ים גרויסע שטרעקען לאנד, וואו זיי מאכען זייערע נעסטען. אָפּט איז אַ גרויסע שטרעקע לאנד געריכט באַדעקט מיט זייערע נעסטען, וועלכע זיי בויען פון גראָז און ריטלעך אויף דעם ערד־באָדען.

די שטורם פויגלען און די אלבאטראַסען קומען זעלטען אַרויס אויפ'ן ברעג, אויסער ווען זיי דאַרפען לעגען אייער און בריהען. דער אלבאטראַס ווערט גערעכענט אַלס דער גרעסטער פון די ים־פויגלען. ווען ער האַלט אויסגעשפּרייט זיינע פליגלען איז פון איין ברעג פליגעל ביז'ן צווייטען אונגעפּעהר פיערצעהן פּוס. ער לעבט אין זידליכען טייל פון אונזער ערד־קוגעל.

דער אַלבאטראַס איז זעהר אַ קרעפטיגער פויגעל. ער האָט אַ קורצען האַלז, אַ גרויסען קאָפּ מיט אַ לאַנגען, שטאַרקען שנאָבעל, וועלכער איז ביים ענד אַביסעל געבויגען, לאַנגע שמאָלע פליגלען און קורצע שטאַרקע דריי־פינגערדיגע שוויים־פּיס. ער איז אין גאַנצען ווייס, אויסער די שפיצען פון זיינע פליגלען, וועלכע זיינען שוואַרץ. ער פליהט הונדערטע מילען נאָך די שיפען אויפ'ן ים, און ער שפייזט זיך מיט דעם אַבפאַל, וואָס ווערט פון די שיפען אַרויסגעוואָרפען. דער אלבאטראַס איז ניט קיין איבערקלייבער אין שפייז, ער עסט אַלעס וואָס ער קען נאָך געפינען אין ים. ער מאַכט זיין נעסט אויף איינזאַמע אינזלען, און די נקבה לעגט אויס בלוז איין איי, וועלכע איז אונגעפּעהר פינף צאָל (אינמט) לאַנג.


עס זיינען אויך פאַראַן רונקעלע אלבאטראַסען, זיי זיינען אָבער פיעל זעלטענער ווי די ווייסע.

אַ באַזונדערע גרופע שוויים־פויגלען שטעלען מיט זיך פאָר די פעליקאנען, ים־ראָבען און שטירץ־פויגלען. די דאָזיגע גרופע ווערט גערופען מיט דעם נאָמען סטעגאַנפאַדען, וואָס דאָס מיינט, פיער פינגערדיגע שוויים־פּיס. די דאָזיגע פויגלען האָר בען אין זייערע פּיס צו פיער פינגער, וועלכע זיינען פאַרבונדען איינע מיט די אנדערע דורך אַ שוויים־הויט.

די פעליקאנען און ים־ראָבען זיינען פאַרהעלטניסמעסיג גרוי־סע פויגלען און זיי געפינען זיך אָפּט אין גרויסע מאַסען ביי די ברעגעס פון פאַרשידענע ימים.

די פעליקאנען האָבען לאַנגע שנאָבלען פון וועלכע עס הענגט אונטען אַראָפּ אַ צינמליך גרויסער הויט־זאַק, וואָס דיענט זיי אַלס

א נעץ צו פאנגען פיש, מיט וועלכע זיי שפייזען זיך. דער פעליקאן איז א גוטער שווימער און א גוטער פליהער. די פעליקאנען זיינען אין גאנצען ווייס, אויסער די ענדען פון זייערע פלינגלען, וועלכע זיינען שווארץ.



ציכונג 165. — (1 דער פעליקאן; 2) דער פוס פון א פעליקאן.

דער יסדראָב איז א שוואַרצער, גלאַנציגער פויגעל מיט א קרוי מען שנאָבעל, א לאַנגען האַלז און קורצע פלינגלען. ער שפייזט זיך מיט פיש, וועלכע ער פאנגט מיט זיין קרומען שנאָבעל, אונטער-טונקענדיג זיך אין וואַסער.

די מעהר באַקאַנטעסטע שווייס-פוינגלען זיינען די ענטלאַך (קאַטשקעס), גענו און שוואַנען. די דאָזיגע שווייס-פוינגלען זיינען, צי אין א ווילדען צושטאַנד, צי אין א הויזליכען, פאַרשפרייט איבער אַלע טיילען פון דער וועלט. די דאָזיגע פוינגלען ווערען קלאַסיפיר צירט אונטער דעם נאמען לאַמעליראַסמערען, וואָס דאָס מיינט, בלעטער-צויהנערדיגע שנאָבלען, צוליב דער פאָרם פון די שנאָבלען מיט די צויהנדלעך פון די זייטען, וואָס די דאָזיגע פוינגלען האָבען.

די ענטלעך (קאַטשקעס), גענו און שוואַנען האָבען ברייטע, פלאַכע שנאָבלען באַדעקט מיט א ווייכער הויט, מיט קליינע צויהנדלעך פון די זייטען און מיט א נאָגעל ביים ענד. מען קען זיי לייכט פאַרוואַנדלען פון וואַלד-פוינגל אין הויז-פוינגל. די פאַר-



שידענע ארטען הויז-ענטלעך און הויז-גענו שטאמען אָפּ פון ווילד-  
דע ענטלעך און ווילדע גענו.

די פעדערען פון די זכרים זיינען בונטער, פיעל-פארביגער, ווי  
פון די נקבות. אין ווילדען צושטאנד לעבען זיי אין די ימים, טיי-  
כען און אָזערעס. פליהען ווייטע שטרעקען, וואַנדערען פון איין  
אָרט צום צווייטען. ווען זיי וואַנדערען לאָזען זיי זיך אין מיטען  
דער נאכט אַראָפּ אויפ'ן וואסער און ווען עס קומט דער מאָרגען  
הויבען זיי זיך ווידער אויף אין דער לופט און פליהען ווייטער.  
זיי זיינען גרויסע פרעסער, אָבער ניט קיין גרויסע איבערקלויבער  
אין זייערע שפייזען.


די ענטלעך זיינען שטארק פרוכטבאר און פארמעהרען זיך  
נאנץ שנעל. זיי האלטען זיך ניט זעהר שטרענג פאר מאָנאָגאָמיע  
(איין ווייבעריי). זיי מאכען זייערע נעסטען אין קאָמפּאָניעס,  
מאנכע אין הוילען, מאנכע אין פעלזען-שפאלטען, אין לעכער פון  
בוימער, אויף דער ערד און מאנכע אויף אויף בוימער. די צאָהל  
אייער, וואָס די ענטלעך לעגען, איז ניט אימער די גלייכע. זיי  
לעגען אויס פון 6 ביז 16 אייער, וועלכע ווערען אויסגעבריהט אין  
21 אָדער 24 טעג. די ענטלעך גנב'ענען אָפט אייער איינע פון  
די אַנדערע.

פיעלע ארטען פון די ענטלעך זיינען וואַנדער-פויגעל אָדער  
צוגפויגעל, דאָס הייסט, זיי וואַנדערען אוועק פאַר'ן ווינטער און  
וואַרימע געגענדען, וואו זיי פאַרבלייבען ביז פריהלינג.

די הויז-ענטלעך זיינען אין אָלגעמיין עהנליך צו די ווילדע,  
זיי זיינען בלויז באדייטענד שווערער און באזיצען פאַרבען-רייכערע  
פעדערען, ווי די ווילדע. די הויז-ענטלעך זיינען נאָך גרעסערע  
פרעסער ווי די ווילדע, און זיי בראַקירען מיט קיין שפייז ניט,  
וואָס מאכט זיך זיי אונטער'ן שנאָבעל. צווישען די הויז-ענטלעך  
זיינען פאַראַן פאַרשידענע ספעציעס, אַנדערע פון זיי זעהר פרוכט-  
בארע, וועלכע לעגען ביז 150 אייער א יאָהר. די מייסטע פּיין זיי  
אָבער לעגען בלויז פון 60 ביז 100 אייער א יאָהר. זיי פאנגען  
געוועהנליך אָן לעגען אין פעברואַר אָדער אין מערץ און דאָס בריהען  
דויערט ביי מאנכע ארטען פון 26 ביז 28 טעג, און ביי מאנכע פון  
32 ביז 33 טעג.

די גענו, וועלכע לעבען אין ווילדען צושטאנד, זיינען קלענער  
און לייכטער ווי די הויזליכע גענו, וועלכע שטאמען פון זיי אַרויס.

די גענו האָבען פאָרדעלטינסמעסיג אַ גרויסען קאָפּ, אַ מיטעל־לאַנגען האַלז, לאַנגע פליגעל, אַ קורצען עק, נידריגע באַוואַקסענע פיס מיט אַ שוויס־הויט צווישען די פינגער. די גענו זיינען פאָר־שפּרייט אין אַלע טיילען פון דער וועלט. זיי לעבען געוועהנליך אין פלאַכע געגענדען, אָבער מען געפינט זיי אויך אין גאנץ הויכע געגענדען. די ווילדע גענו זיינען גוטע פליהער און אויך גוטע שווימער, אָבער זיי פאָרבריינגען זייער צייט פיעל וועניגער אין וואַסער ווי די ענטלעך, זיי זיינען אויך טאַקע ניט אַזעלכע גוטע שווימער און טויכער ווי די ענטלעך, אָבער דערפאַר זיינען זיי בע־סערע געהער און לויפער פון זיי.



צייכנונג 166. — רעכטס, פוס פון אַן ענטלעך; לינקס, קאָפּ און פוס פון אַ גענו.

די ווילדע גענו האַלטען זעהר שטרענג פון מאַנאָגאָמיע. ווען אַ פּאַר קומט זיך צונויף האַלטען זיי זיך צוזאַמען זייער גאנצען לעבען. זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אין גרעסערע קאָמפּאָניעס אויף דער ערד, אָדער אויף בוימער, וואו זיי לעגען פון 6 ביז 12 אייער. סאָ די גענו, סאָ די ענטלעך זיינען געזעלשאַפטליכע פויגלען, זיי לעבען אימער צוזאַמען אין גרעסערע גרופען, הגם יעדער פויגלעל דאַרף זאָרגען פאַר זיך אליין. די מייסטע אַרטען גענו זיינען וואַנדער־פויגעל אָדער צוג־פויגעל. איידער דער ווינטער קומט אָן פליהען זיי אַוועק אין גרויסע

מחנות אין די וואַרימע געגענדען און פארבלייבען דאָרטען ביז'ן פרייהלינג, ווען זיי קעהרען זיך אום צוריק. זיי פליהען אין צוויי רייהען, וועלכע קומען זיך צונויף ווי אַ קלוי, ווי דער לאַטיינישער בוכשטאב A. אַן דער שפיצע פליהט אַ גענסער (אַ גאַנער) און די גאנצע מחנה נאָך איהם.

די הויזגאנז, וועלכע שטאמט אָפּ פון דער ווילדער גרויגאנז, האָט אַ שווערערען און מאַסיווערען קערפער, אַ קירצערען האַלז און אויך קירצערע פיס, ווי די ווילדע גאנז, פון וועלכער זי שטאמט אָפּ. דער גענסער (גאַנער) איז גרעסער, שטאַרקער און האָט אַ לענגערען און דיקערען האַלז ווי די גאנז. די הויזגענז היטען ניט אָפּ קיין מאַנאַגאַמיע. איין גענסער האָט אַרום זיך עטליכע גענז. אונגעפעהר אין פעברואַר אָדער אין מערץ פאַנגען אָן די הויזגענז צו לעגען. זיי לעגען געוועהנליך אַ טאָג איבער אַ טאָג, ביז זיי לעגען אים פון 12 ביז 20 אייער און אַמאָל מעהר. דאָס בריהען דויערט פון 28 ביז 32 טעג. די יונגע הויזגענז זיינען ניט קיין גוטע בריהער, מען ועצט דאָריבער אויף זייערע אייער עלטערע גענז בריהען.

דער שוואַן איז איינער פון די שעהנסטע וואַסער-פויגלען. ער איז ציעמליך גרויס, באַדייטענד גרעסער ווי אַ גאַנז, מיט זעהר אַ לאנגען האַלז, אַ מיטעלמעסיגען קאָפּ, אַ געראַדען שנאָבעל, וועל-כער איז ביים ענד עטוואַס געוועלכט, און נידעריגע שטאַרקע פיס מיט אַ שוויים-הויט צווישען די פינגער.

די שוואַנען זיינען פאַרשפּרייט איבער אַלע וועלט-טיילען, אָבער זיי געפינען זיך אין אַ גרעסערע צאָהל אין די מעסיגערע און קאַלטע געגענדען פון דעם נאָרדליכען טייל פון ערד-קוגעל. זיי לעבען אין ימים, אין טייכען און אַזערעס. זיי נעהרען זיך מיט פלאַנצען, מאַלוסקען, ווערם, פיש און אנדערע קליינע באַשעפעניש-שען, וועלכע זיי געפינען אין וואַסער, וואו זיי פאַרבליינגען די מייסטע צייט זייערע. די שוואַנען זיינען שוואַכע פליהער, אָבער גוטע שווימער. זיי פליהען און געהן זעהר וועניג. זיי הויבען זיך אַמאָל אויף פון וואַסער, אָבער פליהען פון איהם ניט אַוועק, נאָר לאָזען זיך באַלד צוריק אַרונטער. זיי געהען אויך אַמאָל אַרויס אויפ'ן ברעג, אָבער זיי געהן וועניג אַרום. זיי לעבען גע-וועהנליך אין געזעלשאַפט, אָבער בלויז מיט די שוואַנען פון זייער ספּעציע און ניט מיט קיין אנדערע. ווען עס קומט זיך צונויף

א פּאָר האַלטען זיי זיך שוין צוזאַמען דאָס גאַנצע יעבען און זיינען זעהר צערטליך איינע צו די אנדערע.

די שוואַנען לעבען געוועהנליך אין ווילדען צושטאַנד, אָבער מען קען זיי לייכט צוגעוועהנען אַלס היימישע, אָדער האַלב היימי-שע פּויגעל. די שוואַנען, וועלכע לאָזען זיך אַם לייכסטען צוגע-וועהנען זיינען די העקער-שוואַנען אָדער די שטומע שוואַנען, ווי מען רופט זיי. אין דער יוגענד זיינען זיי גרוי-ווייס, אָבער ווען זיי וואַסען אױס ווערען זיי שנעע-ווייס. זיי לעגען זעהר גרויסע אייער ביז 5 צאָל (אינטשעס) די לענג און אַן ערך אַ פונט שווער. די אייער זיינען גרינליך-ווייס מיט בלוי-גרויע פּלעקען. זיי לעגען פון 6 ביז 8 אייער.

עס זיינען אויך פאַראַן שוואַנען, וועלכע ענדערען ניט דעם קאָליר פון זייערע פּעדערען. זיי זיינען שוין אין דער יוגענד ווייס ווי שנעע.

אַן אינטערעסאַנטער פּויגעל איז דער „זינג-שוואַן“. ער האָט אַ העלע, לויטערע און וואויל-קלינגענדע שטימע, וועלכע ער לאָזט זעהר אָפט הערען. ווען ער געפינט זיך אין געפּאהר, אָדער אין ווינטער ווען ער איז הונגעריג און קען קיין עסען ניט געפינען, צו-ליעב דעם וואָס די וואַסערען זיינען פּאַרפּראָרען, לאָזט ער אַרויס טענער, וועלכע קלינגען העכסט מעלאַנכאָליש.

די זומפ אָדער באַדזשע פּויגלען (גראַלאַטאַרען). — די זומפ אָדער באַדזשע פּויגלען זיינען האַלבע וואַסער-פּויגלען. פּיעלע פון זיי האַלטען זיך אויף אין זומפּיגע געענדען, אין פּלאַכע וואַסערען, ביי די ברעגעס פון ים, פון טייכען און פון אַזערעס. זיי שווימען ניט אין וואַסער נאָר באַדזשען אין איהם צו זוכען זייער שפּייז. זיי האָבען לאַנגע נאַקעמע פּיס אין וועלכע עס גע-פינען זיך דריי פּאָדער-פּינגער און איין הינטער-פּינגער. זיי האָ-בען אויך מייסטענס לאַנגע שנאָבלען. זייערע פּליגלען זיינען לאַנג און זיי זיינען גוטע פּליהער. מאַנכע פון די זומפּ-פּויגעל פּאַר-בריינגען מעהר אויף דער יבשה ווי אין זומפּען אָדער וואַסער, די מייסטע אָבער האַלטען זיך כמעט אימער אויף אין זומפּען אָדער ביים וואַסער, וואו זיי פּאַנגען פּיש, פּרעש, מאָלוסקען, ווערם און אינוועקטען פאַר זייער שפּייז. די יעניגע, וועלכע האַלטען זיך אויף מעהר אויף דער יבשה, שפּייזען זיך צום גרעסטען טייל מיט גרינסען.

דער שטארך, דער רייהער אָדער צאָפּליא זיינען טיפּישע זומפּ-פּויגלען, וועלכע בראָדזשען אַרום אין די זומפּען און פּלאַכע וואַסערען צו זוכען זייער שפּייז. דער רייהער האָט לאַנגע פּיס, אַ זעהר לאַנגען דינעם האַלז, און אַ מיטעל-לאַנגען דינעם שנאָבעל. מען קען איהם אָפט זעהן, ווי ער שטעהט אונבאַוועגליך אין אַ פּלאַץ-צען וואַסער און קוקט אויס אויף פּיש, וועלכע זיינען זיין ליבעלינגס-



צייכונג 167. — די בלויע צאָפּליא (רייהער).

שפייו. מען קען איהם אויך זעהן אַרומבראָדזשענדיג אין נאַסע  
לאַנקעס און אין זומפיגע געגענדען, וואו ער פאנגט פרעש און אַנ-  
דערע באַשעפענישען, וועלכע ער פארשלינגט. די רייהער קענען  
אויך ערצויגען ווערען אַלס הויז־פויגלען.

די נאכט־רייהער געהען אַרויס זוכען זייער שפייו בלויו ביי  
נאכט. אין דער צייט פון טאָג פאַרזאמלען זיי זיך אין גרויסע  
קאָמפאַניעס, זעצען זיך אויס אויף בוימער און כאַפען אַ דרעמעל.  
דער שטאָרף איז איינער פון די באַקאנטסטע זומפ־פויגעל,  
באַזאָנדערס דער ווייסער שטאָרף אָדער קלאַפ־ער־שטאָרף, ווי ער  
ווערט גערופען. די שטאָרען זיינען פאַרשפּרייט אין אַלע ערד-  
טיילען, מעהר, אָבער, אין די הייסע געגענדען. זיי וואַנדערען  
אַרום אין זומפיגע געגענדען, אין וועלכער און בראַדזשען אין פּלאַ-  
כע וואַסערען, וואו זיי פאנגען פיש, פרעש און אנדערע וואַסער-  
טיערע. זיי זיינען גוטע פליהער און זיי מאַכען זייערע נעסטען  
אויף בוימער אָדער דעכער פון הייזער. אין אַ נויט־פאַל קענען  
זיי אויך שווימען. זיי לעבען אין געזעלשאַפט, אָבער זיי זיינען  
זעהר רויבעריש. זיי באַפאַלען יעדע לעבעדיגע בעשעפעניש, וועל-  
כע זיי קענען נאָר בייקומען.

דער ווייסער שטאָרף איז אַ באַזאָנדערס שעהנער פויגעל. ער  
איז אין גאַנצען ווייס, בלויו די שפיצען פון זיינע פליגלען זיינען  
שוואַרץ. זיין לאַנגער גראַדער שנאָבעל און זיינע לאַנגע דינע  
פיס זיינען רויט. דער ווייסער שטאָרף לעבט אין אייראָפּא, אין  
מיטעל־אַזיען און אין נאָרד אַפריקאַ. אויף ווינטער וואַנדערט ער  
אויס אין זיד־אַפריקאַ און נאָרד־אינדיען. ער געהרט זיך מיט  
פרעש, שלאַנגען, עקדעשען, פיש, שנעקען, רעגע־ווערס, מייז, קראָ-  
טען, יונגע האַזען און מיט מאַנכע אינזעקטען (באַזאָנדערס ביענען).  
ער באַפאַלט אויך די נעסטען פון אנדערע פויגלען און פארשלינגט  
זייערע אייער און זייערע יונגע פויגעלעך. די שטאָרען זיינען אין  
אַלגעמיין גרויסע פרעסער. שפייו, וואָס זיי קענען ניט פאַרדייען,  
בריינגען זיי אַרויס צוריק פון זייער מאָגען און שפייען אַרויס.

די שטאָרען לעבען אין פּאַרן, און ווען אַ פּאַר קומען זיך  
איין מאָל צונויף, בלייבען זיי שוין, געוועהנליך, לעבען צוזאַמען  
זייער גאַנצען לעבען. עס זיינען אָבער באַמערקט געוואָרען מעהר  
דערע פלעע פון אונטערייהייט אויך צווישען די שטאָרען.  
אַ שטימע האָט דער שטאָרף זעהר אַ שוואַכע. ער קען בלויו

שיפען אָדער צישען, דערפאר אָבער קען ער מאַכען אַ שטאַרקען גערויש קלאַפּענדיג מיט'ן שנאָבעל, באַזאָנדערס ווען ער איז אויפֿ גערייזט. דאָס קלאַפּען פון די שטאַרקען מיט זייערע שנאָבלען איז אזוי שטאַרק, דאָס מען קען דעם גערויש הערען פון ציעמליך ווייט.

די שטאַרקען פאַרלאָזען זייערע נעסטען אַרום ענדע אויגוסט אויסצואוואַנדערען פאַר'ן ווינטער אין די וואַרימע געגענדען און זיי קעהרען זיך אום צוריק אונגעפּעהר אין מיטען אַפּריל. אידער זיי וואַנדערען אויס קלייבען זיך די שטאַרקען פון דעם געגענד צוזאַמען אין איין פּלאַץ, קלאַפּען שטאַרק מיט די שנאָבלען, ווי זיי וואַלטען זיך דורכריידען מכה דער רייזע, וועלכע זיי דארפּען אונטערנעהמען, און נאכדעם הויבען זיי זיך אויף אויף די פּליגלען, אויסשטרעקענדיג די לאַנגע פיס אַ הינטער און די לאַנגע האַלז אין פאַראַויס און זיי פּליהען אַוועק.

עס ווערט פון מאַנכע נאַטור־פּאָרשער איבערגעגעבען, דאָס עס קומען פאַר פעלע, ווען די פאַרואַמעלטע שטאַרקען בעפּאָר זייער אַפּרייזע באַפּאַלען איינעם אָדער צוויי פון זייערע חברים און דער־הרג'ענען זיי מיט זייערע שנאָבלען. דאָס פּאָלק גלויבט, אַז דאָס משפּט'ען די שטאַרקען די פאַרברעכער צווישען זיי. צווישען פּאָלק זיינען פאַרשפּרייט פיעלע געשיכטען וועגען דעם משפּט פון די שטאַרקען, ווי אזוי עס ווערט געפיהרט און ווי אזוי די פאַרברעכער ווערען פאַראַרטיילט. נאָר די אַלע געשיכטען, וואָס מען דערצעהלט זיך וועגען די שטאַרקען, דארפּען ניט באַטראַכט ווערען אַלס פּאַקטען. די פּאַנטאַזיע פון פּאָלק שפּיעלט אין אַזעלכע געשיכטען אַ גאַנץ גרויסע ראַלע. מען דענקט אָבער, אַז די פעלע, וועלכע זיינען באַמערקט געוואָרען, דאָס די שטאַרקען טויטען איינעם אָדער צוויי פון זייערע חברים פאַר זייער אַפּרייזע, קענען ער־קלערט ווערען דערמיט, וואָס די פאַראַרטיילטע צום טויט זיינען קראַנקע אָדער שוואַכע, וועלכע קענען ניט מיטמאַכען די לאַנגע רייזע. נאָר עס איז אין אַלגעמיין ניט זיכער, אַז דער פּאַקט איז איבערהויפּט אַ ריכטיגער, דאָס הייסט, אויב די שטאַרקען פאַראַרטיילט טיילען טאַקע צום טויט זייערע חברים.

ווען די שטאַרקען קומען צוריק פון זייער ווינטער־רייזע, קעהרען זיי זיך געוועהנליך אום צו זייערע אַלטע נעסטען, וועלכע זיי בעסערען אויס און וואו זיי באַזעצען זיך. די נקבה לענט אויס

פון 2 ביז 5 אייער און אין א פארלויף פון 28 ביז 31 טעג בריהט זי זיי אויס.

עס זיינען אויך פאראן שטאָרקען, וועלכע האָבען שוואַרצליכע פּעדערען. זייער רוקען און זייערע פלינגלען זיינען שוואַרצליך וועהרענד זייער בויך איז ווייס.

די שטאָרקען קענען לייכט ערצויגען ווערען אלס הויז־פּויגעל, ווען מען פאנגט זיי יונג.

דער רייהער־שנאָבעל אָדער „פּלאַקען־קלאַפּער“, וועלכער איז פאַרשפּרייט אין אַמעריקאַ, איז אויך אַ טיפּישער זומפּ־פּויגעל. ער פאַרבּריינגט מייסטענס אין זומפּיגע געגענדען, וואו ער זוכט זיין שפּייז. ער וואַנדערט אַרום ביי נאַכט און ער לאָזט אַרויס אַזאַ קלאַנג, וואָס איז עהנליך צו דעם קלאַנג, וואָס מען הערט, ווען מען קלאַפט אַ פּלאַקען אין דער ערד. פון דעם קומט זיי נאָמען „פּלאַקען־קלאַפּער“ (סטיוק דראַווער, אין ענגליש). זיי מאַכען געוועהנליך זייערע נעסטען צווישען די טראַסטיקעס אָדער דאָהר־גראַז (קאַמיש) פון די זומפּען, וואו זיי לעבען.

די רייהער אָדער צאַפּליאַס בריהען געוועהנליך אין קאַמפּאַניעס. זיי בויען אויס גרויסע פּלאַכע נעסטען, מייסטענס אויף בוימער, וואו זיי לעגען זייערע אייער און בריהען.

דער קראַניך, די זומפּ־ראַלע און די וואַסער־הוהן זיינען אויך זומפּ־פּויגעל, אָבער זיי זיינען ניט גרויסע ליעבהאַבער פון בראַד־זשען אין וואַסער. דער קראַניך שפּייזט זיך הויפּטזעכליך מיט קערנער, פּלאַנצען, פּרוכט, אינזעקטען און אַמאָל אויך מיט פרעש. די ראַלען און וואַסער־היהנער פּאנגען פרעש און אינזעקטען אין די זומפּיגע געגענדען, וואו זיי לעבען, אָדער זיי פּאנגען פּיש ביים ברעג פון וואַסער, וואו זיי שטעלען זיך אַוועק און וואַרטען ביז אַ פּיש וועט צושווימען נאָהנט, אַז זיי זאָלען איהם קענען אַ כאַפּ טאָן מיט זייער לאַנגען שנאָבעל, אויסשטרעקענדיג זייער לאַנגע האַלז.

דער קראַניך איז אַ גרויסער פּויגעל מיט אַ לאַנגען בויגזאַמען האַלז, מיט אַ לאַנגען שפּייצגען שנאָבעל און מיט גאַנץ לאַנגע פּיער־פּינגערדיגע פּיס. ער איז אַ געזעלשאַפּטליכער פּויגעל, לעבט מייסטענס אין גרויסע קאַמפּאַניעס. ער איז זעהר אַ גוט־מוטיגער פּויגעל, אימער לוסטיג און שפּיעלעך. ער לעבט אָפט צו וואַר־פען שטיינדלעך און העלצלעך אין דער לופט און יאָגט זיך זיי צו כאַפּען. ער איז זעהר פּאַרויכטיג. די קאַמפּאַניעס אין וועלכע




זיי לעבען שטעלען ארויס וועכטער צו היטען פון נעפאהר. דער קראניך לאָזט זיך לייכט ערציהען אלס הויז־פויגעל און ווייזט אַרויס זעהר פיעל פארשטאנד. ער איז אַ גוטער וועכטער פאַר די הויז־עופות און הויז־פיה, ווי אַ הונד.

די קראניכס לעבען אין פאַרען. ווען אַ פאַר האָבען זיך פאַראייניגט, בלייבען זיי שוין צוזאַמען זייער גאנצען לעבען. זיי מאַכען זייערע נעסטען פון גראָז און טראָסטיקעס אין די זומפיגע געגענדען, וואו זיי לעבען. די נקבה לעגט אין אַפּריל אויס 2 אייער וועלכע ווערען געבריהט אַבוועקסלענדיג פון דעם זכר און פון דער נקבה. זיי זיינען גוטע פליהער און וואנדערען אויס פאַר'ן ווינטער.

די זומפֿראַלען זעהט מען זעהר זעלטען אַרויסקומענדיג פון די זומפען, וואו זיי לעבען. זיי לעבען אימער בעהאלטען צווישען די הויכע גראָז און טראָסטיקעס פון די זומפען. זיי פליהען אויך גאנץ זעלטען. און ווען זיי הויבען זיך אַמאָל אויף אויף זייערע פליגלען, פליהען זיי אויך בלויז אַ קורצע שטרעקע און לאָזען זיך צוריק אַרונטער אין די טיעפע גראָז און מען זעהט זיי ווייטער ניט. די וואַסער־הוהן האָט דונקעל גרויע פּעדערען, אַ ווייסען שנאָבעל און שוויס־הויטיגע פינגערס. די וואַסער־היהנער זיינען שטאַרק פאַרשפּרייט אין די פּעראייניגטע שטאַטען פון אַמעריקאַ. זיי לעבען אין זומפיגע געגענדען, אָבער זיי זיינען אויך גוטע שווי־מער. זיי שווימען אַרום אויף אַזערעס און אויף שטילע טייכען, וואו זיי פאנגען פיש. זייערע נעסטען מאַכען זיי פון גראָז־ראָהר און די אויסגעבריהטע פויגעלעך פאַרלאָזען דעם נעסט, ווי זיי פיקען זיך נאָר אַרויס פון איי.

עס זיינען אויך פאַראַן אַ גאַנצע רייע קליינע זומפֿֿפויגלען אָדער באַרד־זשע־פויגלען. די מעהר כאַראַקטעריסטישע פון זיי זיינען די שנעפען, די שטראַנד־לויפער און די רעגען־פייפער. די דאָזיגע פויגלען זיינען געוועהנליך קליין און לעבען אין זומפיגע געגענדען און אויף די זאַמדיגע ים־ברעגען. די מייסטע ספּעציעס האָבען לאַנגע פיס און דינע לאַנגע שנאָבלען. זיי נעהרען זיך הויפטזעכליך מיט קליינע וואַסער־חיה'לעך און אינועקטען, וועלכע זיי פאנגען אין די פלאַכע וואַסערען און אין די זומפען. זיי פליהען די מייסטע צייט פון יאָהר אַרום אין גרויסע מחנות, ווען עס קומט אָבער די צייט פון לעגען אייער און בריהען צוטיילען זיי זיך אין



צייכונג 168. — בראדזשע פויגלען. (1) דער „פלאַך-קעזיקלאַפער“; (2) די זומפֿיראלע; (3) דער רעגען־פויפער; (4) די שנעפע; (5) דער שטראַנד־לויפער; (6) דער איביס.

פאָרען און בויען זייערע נעסטען אין פלאַכע ערד-גריבלעך. זייערע אייער זיינען מייסטענס געשמריפט און געפלקט און האַרמאָד-ניזירען מיט דער אומגעבונג, אין וועלכע זיי געפינען זיך. די יונגע פויגלעך פארלאָזען דעם נעסט גלייך ווי זיי פיקען זיך אויס פון איי.

די שנעפען לאָזען זיך אַוועק זוכען זייער שפייז מייסטענס פון אַווענד אָדער ביי נאכט. זיי זיינען גוטע פליהער און אויך גוטע לויפערס. די נקבה לעגט פיער אייער, וועלכע ווערען אב-וועקסלענדיג געבריהט פון ביידע געשלעכטער. עס זיינען פאראן אַ גאַנצע רייהע פאַרשידענע ספּעציעס פון די שנעפען. מאַנכע פון זיי לאָזען זיך גאַנץ לייכט ערציהען אַלס הויז-פויגלען.

די שטראַנד-לויפער לויפען אַרום ביי די זאַמדיגע ברעגעס פון ים אָדער ביי די שלאַמיגע ברעגעס פון טייכען, וואו זיי זוכען זייער שפייז. זיי האָבען אַ מיטעל-לאַנגען שנאָבעל און קורצע, דיקע פיס. זומער ענדערט זיך דער קאָליר פון זייערע פּעדערען. דער רעגען-פייפער האָט אַ פּערהעלטניסמעסיג גרויסען קאָפּ, אַ קורצען דיקען האַלז און אַ מיטעל-לאַנגען שנאָבעל. ער האָט אַ פייפּענרע שטימע און ווען די לופט איז פול מיט געוויטער אָדער עס האַלט ביים רעגענען לאָזט ער זי שטאַרק הערען. דערפון קומט זיין נאָמען „רעגען-פייפער“. ער איז אַ גוטער פליהער און אַ גוטער לויפער, איז אימער לוסטיג און ליכט געזעלשאַפט. די נקבה לעגט דריי אָדער פיער אייער און אַ פלאַכע ערד-גריבעל, וואו זי בריהט זיי אויס.

די שאַר אָדער קראַץ-פויגלען (ראַזאַרען). — אין דער אָרדנונג פון די קראַץ-פויגלען אָדער ראַזאַרען ווערען אריינגערע-כענט אַלע אַרטען פויגלען, וועלכע לעבען מייסטענס אויפ'ן טרוקע-נעם באַדען און האָבען די טבע צו קראַצען און צו שאַרען די ערד מיט זייערע פיס. זיי האָבען געוועהנליך קורצע, שטאַרקע פיער-פינגערדיגע פיס מיט שטאַרקע טעמפע נעגעל, צוגעפאַסט צו קראַ-צען און שאַרען די ערד. פון די פיער פינגער זיינען דריי פאַר-דערשטע און איינער אַ הינטערשטער. דער הינטערשטער פינגער איז באדייטענד קירצער ווי די פאַדערשטע און ער איז עטוואַס העכער אַרויפגערוקט. די קראַץ-פויגעל נעהרען זיך הויפטזעכליך מיט פאַרשידענע קערנער און זאָט. זיי האָבען דאַריבער אַ גרויסען קראַפּ, וואו די פאַרשלונגענע האַרטע קערנער ווערען צוערשט וויי-


כער געמאכט, איידער זיי קומען אַרײַן אין זייער מאָגען (פּופיק), וועלכער באַשטעהט פּון זעהר שטאַרקע מוסקעלען מיט אַ פעסטער האָרן־הויט, צום צורײבען דאָס שפּײז. די קראַץ־פּױגלען לעגען געוועהנליך זייערע אייער אויף דער ערד און בײ די מײסטע פּון זײ עקזיסטירט פּיעל וויבערײ. די זכּרים געהמען נײט קײן אַנ־טײל אין בויען די נעסטען און אין בריהען די אייער, דאָס טוען די נקבות. בײ די מײסטע פּון זײ זײנען די יונגע אויסגעברױהטע פּױגעלעך פּעהיג אַרומצולױפּען און זיך צו באַזאָרגען מיט שפּײז גלייך ווי זײ פּיקען זיך אױס פּון אײ. די פּליגלען פּון די קראַץ־פּױגעל זײנען, געוועהנליך, שוואַך ענטוויקעלט און זײ זײנען דאָ ריבער גאַנץ שוואַכע פּליהער.

צו דער אָרדנונג קראַץ־פּױגלען באַלאַנגען די פּאַרשידענע אַר־טען הױז־הױהנער און וואַלד־הױהנער, די וואַכטלען, די פּאָזאַנען, די אינדיקעס, די פּאַוועס, די וואַל־נעסט־הױהנער (אַזעלכע הױהנער־עגלעך פּױגלען אין אױסטראַליען, וועלכע בויען אױס אַ הױכען וואַל (וואַנד) אַרום זייער נעסט, וואו זײ לעגען זייערע אייער) און מאַכע אנדערע.

צו די קראַץ־פּױגלען ווערען אויך צוגערעכענט די פּאַרשידענע אַרמען טױבען, אָבער מען שטעלט זײ אין אַ באַזונדערע אַבטייל־לונג, ווייל די טױבען אונטערשיידען זיך אין פּיעלעס פּון די טױפֿ־שע קראַץ־פּױגלען. די טױבען זײנען גוטע פּליהער, זײנען זעהר שטרענגע מאָנאָגאַמיסטען, אַ פּאָר וואָס האָט זיך אײנמאַל פּעראַיִ־ניגט בלייבט שױן אויף אימער פּעראַיִניגט, דער זכּר העלפט דער נקבה בריהען די אייער, און די יונגע טױבעלעך, וועלכע קומען אַרויס פּון אײ, זײנען פּאָלשטענדיג הילפּלאַז און מוזען געקאָרמעט ווערען אַ לענגערע צײט, ביז זײ קענען זיך אַלײן באַזאָרגען זייער שפּײז. אויך די שטימע פּון די טױבען אונטערשיידעט זיך זעהר שטאַרק פּון די שטימען פּון די קראַץ־פּױגעל. די שטימען פּון די קראַץ־פּױגלען זײנען, געוועהנליך, האַרט, רײסענד, וועהרענד די שטימע פּון די טױבען איז זאַנפט, ווייך און מעלאַנכאָליש.

די שנאָבלען פּון די קראַץ־פּױגלען זײנען, געוועהנליך, קורצע, שטאַרקע און שפּײציגע און זײנען צוגעפּאַסט צו פּיקען די אַרמען שפּײז — קערנער און יאָרעס, וואָס איז זייער הױפּט־נאַהרונג. זײ עסען אויך יאָגדעס, פּרוכט און אינזעקטען. די וואַכטלען זײנען פּאַרשפּרײט אין אײראָפּאַ, אין אַזיען,

אפריקא און אייניגע פון זייערע ספעציעס געפינען זיך אויך אין אמעריקא. דער וואכטעל איז ניט קיין גרויסער פויגעל, ליעבט ניט קיין געזעלשאפט און ליגט ביי טאָג מייסטענס באַהאַלטען. ווען עס קומט די נאכט לאָזט ער זיך אַרויס זוכען זיין שפּיין, וואָס באַשטעהט הויפּטזעכליך פון קערנער, בלעטער און קנאַספּען. די וואכטלען מאַכען זיך געוועהנליך זייערע נעסטען אין ווייץ-פעל-דער אָדער אַרבעס-פעלדער. דער זכר פון די וואכטלען איז זעהר ליידענשאפטליך, גאַנץ באַזאָנדערס קאַמפּסלוסטיגקייט און העכסט אייפערזיכטיג. די נקבות לעגען ענדע מאַי פון 8 ביז 14 אייער און בריהען זיי אַליין אויס. די יונגע וואכטלען וואָס ווערען אויס-געבריהט האַלטען זיך ביי זייער מוטער ביז זיי ווערען גרויס.



צייכונג 169. — וואכטלען. 1) די פעלד-וואכטעל; 2) די אמעריקאנער בערג-וואכטעל.

ענדע זומער אין אויגוסט וואנדערען די וואכטלען אויס אין די ווארעמע לענדער און אנפאנג פריהלינג קומען זיי צוריק. זיי פליהען ניט גרען. זיי האַלטען זיך געוועהנליך אויף אויפ'ן באַ-דען, זיי הויבען זיך אויף אויף זייערע פליגלען צו פליהען בלוז ווען זיי דארפען אויסוואנדערען, אָדער ווען זיי זיינען געצוואונגען. די אינדיקעס (אינדישע הינער) ווערען גערעכענט אַלס אמעריקאנער פויגעל. זיי געפינען זיך אין גרויסע מאַסען אין די גרויסע וועלדער פון די מיטעל-וועסטליכע שטאַטען פון אמעריקא. אין הערבסט צייט וואנדערען זיי אַרום פון אָרט צו אָרט אין גרויסע

מחנות, די זכרים באזונדער און די נקבות מיט די יונגע אינדיקעס באזונדער. זיי וואנדערען אימער צו פוס, נאָר ווען זיי קומען צו אַ טייך פליהען זיי איהם מיט מאטערניש אַריבער. די נקבות לעגען זייערע אייער אין פייכטע, פלאַכע ערד-גריבער. זיי לעגען פון 10 ביז 20 אייער און בריהען זיי אויס אין אַ פארלויה פון 4 וואָכען. די אינדיקעס עסען פאַרשידענע קרייטיכער, וואַלד-פּרוכט, קערנער און שנעקען.

די אינדיקעס לאָזען זיך לייכט ערציהען אַלס הויזעופות, און דער אונטערשיעד צווישען די וואַלד-אינדיקעס און די הויז-אינדיקעס איז אין אַלגעמיין זעהר אַ קליינער. אָפּט זאָגאר פאַרען זיך ווילדע אינדיקעס מיט הויז-אינדיקעס.

די אינדיקעס געפינען זיך, אויסער אין אַמעריקא, אויך אין אנדערע לענדער, אָבער בלויז אַלס הויזעופות. זיי זיינען באַ קאנט אַלס זעהר דומע פויגלען, זיי זיינען אויך זעהר קריגעריש, ביז און ווערען גיך אויפגערגנט.


די פּאָוועס זיינען באזונדערס פארשפּרייט אין אַסט-אינדיען און אין ציילאָן, וואו זיי לעבען אין בערגיגע וועלדער. זיי פאר-טראַגען אָבער אויך זעהר גוט דעם קלימאט פון קעלטערע געגענדען און זיי זיינען דאָריבער אויך פארשפּרייט געוואָרען אין פאַרשי-דענע אנדערע לענדער.

די פּאָוועס זיינען ציעמליך גרויסע פויגלען. זיי האָבען אַ לאנגען האַלז, אַ קליינעם קאָפּ און אַ קליינעם שנאָבעל. די פּאַר-וועס לעבען אין געזעלשאַפט, מייסטענס אין גרופען פון 30 ביז 40 שטיק. זיי זיינען גאנץ שלעכטע פליהער, אָבער גוטע לויפער. זיי געהרען זיך מיט קערנער, ווערס און אויך מיט שלאנגען און עקדעשען.

דער זכר איז באַדייטענד גרעסער פון דער נקבה און זעהט אויך אויס פיעל שעהנער פון איהר. די פרעכטיגע פּאָווע פּעדערען מיט דער שעהנער לאנגער שלעפע באַזיצט דער זכר. די פּעדערען פון דער נקבה זיינען איינפאַך און זי האָט אויך גיט קיין שלעפע.

די היהנער זיינען די מייסט פארשפּרייטעסטע הויז-פויגלען. די הויז-היהנער געפינען זיך אין אַלע וועלט-טיילען, אויסער אין די קאַלטע פּאָלאַר-געגענדען. אייניגע אַרטען היהנער לעבען אין אַ ווילדען צושטאנד, אָבער עס איז צווישען זיי גיט פאַראַן קיין גרוי-סער אונטערשיעד מיט די הויז-היהנער. זיי לעבען אין פאַמיליען.

וועלכע באשטעהען מייסטענס פון 20 היהנער און איין האָהן. די נקבות ערציהען די יונגאויסגעבריהטע היהנרעלעך און פיהרען זיך מיט זיי ארום ביז זיי ווערען זעלבסטשטענדיג. דער איינציגער גרויסער אונטערשיעד צווישען די ווילדע היהנער און די הויז-היהנער באשטעהט אין זייערע שטימען, וועלכע האָבען וועניג עהנליכקייט.



צייכונג 170. — (1 די בערג־טויב; 2) די וואַלד־הוהן.

די הנהגער האָבען אַ רויטען אָדער ראָזען פֿלייש־קאָס אויפֿן קאָפּ און צוויי רויטע אַראָפהענגענדע לעפלעך (ווי אַ באָרד) פֿון ביידע זייטען פֿון דעם אונטערשטען טייל פֿון זייער קאָפּ. ביי די הנהגער איז געוועהנליך דער קאָס באַדייטענד גרעסער ווי ביי די הנהגער. די הנהגער זיינען גרעסער ווי די הנהגער, האָבען שעה־נערע און גרעסערע עק און זייטען פֿעדערען, האָבען שפּאַרען אויף די פֿיס און האָבען אויך אַ העכערע און שטאַרקער שטימע, אַ שטימע צום קרעהען.


צווישען די הויז־הנהגער געפינען זיך פֿארשידענע אַרטען, אָדער ריכטיגער, ראַסען, ווייל די מייסטע פֿון זיי קומען אַרויס דורך געמישטע פּאַרונגען (פּאַרונג פֿון פֿארשידענע אַרטען), וועלכע זיינען פּאַרעקומען אין זייער ווילדען צושטאַנד און באַזאַנדערס אין זייער היימישען צושטאַנד. עס ווערען היינט גערעכענט אַרום 50 הייה־נער ראַסען. די מייסטע הויז־הנהגער זיינען זעהר פֿרוכטבאַר. עס זיינען פֿאַראַן אַזעלכע וואָס לעגען ביז 200 אייער אַ יאָהר און אַגאַר מעהר.

די הנהגער פֿון די מייסטע ראַסען זיינען זעהר קאַמפּלֿוסטיג. ווען עס טרעפען זיך אָן צוויי הנהגער ברעכט מייסטענס אויס צווי־שען זיי אַ בלוטיגער קאַמף. אין מיטעל־אַלטער און אויך אין דער נייערער צייט איז אין פֿיעלע לענדער געווען זעהר פֿארשפּרייט דער הנהגער־קאַמף, אַלס איינע פֿון די באַליעבטעסטע עפענטליכע שפּיעל־פּאַרשטעלונגען. עס פֿלעגען פֿאַר דעם צוועק ספּעציעל ער־צויגען און געלערנט ווערען קאַמפּלֿוסטיגע הנהגער, וועלכע פֿלע־גען באַזאָרגט ווערען מיט אייזערנע שפּאַרען און אַרויסגעשטעלט ווערען אין קאַמף איינע געגען די אנדערע. די הנהגער פֿלעגען מייסטענס קעמפען ביז איינער פֿון זיי פֿלעגט פֿאַלען טויט.

די פּאַזאַנען באַלאַנגען צו דער גאַטונג הנהגער־פּויגלען. זיי זיינען גרויסע זעהר שעהן געפֿאַרבעט פּויגלען, באַזונדערס די זכּרים, מיט זעהר לאַנגע עקען. זיי לעבען צום גרעסטען טייל אין ווילדען צושטאַנד און מאַכען זיך זייערע נעסטען אין קוסטאַרניקעס אָדער בוש־וועלדער ניט ווייט פֿון פֿאַרזייהטע פֿעלדער און לאַנגעס. זיי זיינען שלעכטע פֿליהער, אָבער גוטע לויפּער. זיי לעבען אין גור־פען פֿון 5 ביז 6 פּאַזאַנען־הנהגער מיט איין פּאַזאַנען־האָהן. די פּאַזאַנען־הוהן בויט אויס אַן איינפֿאַכען נעסט אין דער ערד, אין גראַז אָדער אין בוימלעך, וואו זי לעגט אויס פֿון 8 ביז 15 אייער



אין בריהט זיי אויס אין אַ משך פון 24 טעג. אין ענגער געפאנגענער שאפט בריהען ניט די פאזאנען, הגם אייער לעגען זיי יא. די פאזאנען לאָזען זיך אין אַלגעמיין זעהר שווער פארוואנדלען אין הויזעופות.




צייכנווי 171. — אַ פאָזאָן.

עס זיינען פאראן מעהרערע פארשידענע ארטען פאזאנען. מאג כע ארטען פאזאנען האָבען גאנץ באַזונדערס לאנגע עקען. דען קעניגפאזאן, למשל, וועלכער לעבט אין די בערג פון נאָרד כינע האָט אַן עק וואָס איז אַרום 6 פוס די לענג, וועהרענר זיין קערפּען

איז בלויז אן ערף אַנדערטהאלבען פּוס די לענג. באַזונדערס  
שעהנע פּאזאנען זיינען די גאַלד־פּאזאנען און דימענט־פּאזאנען,  
וועלכע לעבען אין כינאַ. דער דימענט־פּאזאן איז גרויס געוואק־  
סען, זיין קערפּער איז איבער 5 פּוס די לענג און זיין עק איז אַרום  
3 פּוס די לענג, און ער צייכענט זיך אויס מיט אַ באַזונדערער  
שעהנקייט און פּאַרבען־רייכקייט פּון זיינע פּעדערען.

קלעטער־פּויגלען (סקאַנזאַרען). — אין דער אָרדנונג „קלע־  
טער־פּויגלען“ ווערען קלאַסיפּיצירט די אַלע פּויגלען, וואָס באַזיצען  
די פּעהיגקייט צו קלעטערען, דורך דעם, וואָס זייערע פּיער פּוס־  
פּינגער זיינען צוטיילט אין צוויי פּאָדערשטע און צוויי הינטערשטע.  
די דאָזיגע איינאַרדנונג פּון די פּינגער ניט די קלעטער־פּויגלען די  
מעגליכקייט זעהן לייכט צו קלעטערען אויף בוימער.




צייכנונג 172. — דער אַמעריקאַנער געל־שנאַבעלדיגער קוקוק.

דער קוקוק האָט די פּאַראַזיטישע אייגענשאַפט צו לעגען זיינע  
אייער אין פּרעמדע נעסטען, וואו זיי ווערען אויסגעבריהט און ער־  
צויגען פּון פּרעמדע פּויגלען. דער אַמעריקאַנער געל־שנאַבעל־  
דיגער קוקוק איז אָבער אין דעם פּרט אַן אויסנאַהם. ער בויט  
זיך אַליין אַ נעסט און בריהט אַליין זיינע אייער.  
די קלעטער־פּויגלען זיינען מייסטענס ניט קיין גוטע פליהער.  
זיי שפּייזען זיך מיט אינזעקטען און מיט פּרוכט. זייערע נעסטען  
מאַכען זיי זיך, געוועהנליך, אין די לעכער פּון אַלטע בוימער. זיי  
לעבען אין פּאַרען, איין זכר לעבט צוזאַמען בלויז מיט איין נקבה.  
די יונגע פּויגעלעך, ווען זיי פּיקען זיך אַרויס פּון איי, זיינען נאַקעט  
און הילפּלאָז.

און היילפלאָז. זיי מוזען געשפייזט און ערצויגען ווערען פון זייער מוטער.

צו דער אָרדנונג פון קלעטער-פויגלען באלאנגען אַ גאנצע רייה פארשידענע פויגלען, וועלכע האָבען וועניג געמיינשאפטליך-כעס צווישען זיך, אויסער דער אייגענשאפט פון קלעטערען. צו די קלעטער-פויגלען באלאנגען די פויגלען פון דער קוקוס פאמיליע, פון דער שפעכט אָדער האָלידפיקער פאמיליע, פון דער פּאָפּאָגאיען פאמיליע, די טוקאנען, און אייניגע אנדערע.

דער האָלידפיקער אָדער שפעכט איז אַן אויסגעצייכענטער קלעטערער. ער פיקט אויס לעכער אין דער קאָרע פון בוימער, אַרויסצוקריגען די אינזעקטען, וועלכע לעבען דאָרטען. דער



צייכונג 178. — אַ פּאָפּאָגאי ; (2) דער רויטקעפּיגער שפעכט.

שפעכט שפייזט זיך הויפטזעכליך מיט אינזעקטען, ער פאנגט זיי מיט זיין אייגענארטיגער לאנגער וואָרם-ארטיגער צונג, וועלכע האָט אַ האקען-עהנליכען ענד.

די פּאָפּאָגאיען צייכענען זיך אויס מיט זייער פעהיגקייט נאָך-צוזאמען (נאָכצומאכען) פארשידענע קלאנגען, מאנכע פון זיי קענען נאָכמאכען דעם געזאנג פון פארשידענע פויגעל און אויך די שטימע פון מענשען. מען קען זיי זאָגאר אויסלערנען נאָכריידען ווערטער און זיי האָבען אַן אויסגעצייכענטען זכרון. די פּאָפּאָגאי האָט אַ


פארהעלמניסמעסיג גרויסען קאפ, א קורצע, דיקע פליישיגע צונג און א קורצען, צייהנערדיגען, דיקען, קרומען שנאָבעל. דער ענד פון איהר אויבערשטען טייל פון שנאָבעל איז אויסגעבויגען ווי א קרומשאַק (האקען) און געהט אריבער איבער דעם אונטערשטען האַלבען שנאָבעל. די פאָפּונאיען באַנוצען זייער געבויגענעם שנאָבעל צום קלעטערען אַלס אַ דריטען פּוס. זיי זיינען זעהר גוטע קלעטערער און מאַנכע פון זייערע אַרטען זיינען אויך גוטע פליהער און גוטע לויפער. עס זיינען אָבער פאַראַן מאַנכע אַרטען, וועלכע געהען זעהר אומגעלומפערט און מאַנכע, וועלכע זיינען שלעכטע פליהער.



צייכנונג 174. — די סאָוואַ פּאָפּונאיע.

די פאָפּונאיען לעבען אין די הייסע געגענדען, מייסטענס אין וואַלדיגע ערטער. מען געפינט זיי אָבער אויך אָפּט ביי די ברעך נעם פון ים, אויף נאַקעטע בערג. זייערע פּעדערען האָבען פאַרשידענע בונטע, גלענצענדע קאָלירען. ביי די מייסטע פון זיי איז די גרינע און רויטע פאַרבען די הויפט קאָלירען. עס זיינען אויך פאַראַן ווייסע פּאָפּונאיען.

די פאָפּונאַיען לעבען אין געזעלשאפט, אין גרעסערע אָדער קלענערע גרופּען, אָבער זיי האַלטען פּון מאָנאָגאַמיע, איין זכר לעבט בלויז מיט איין נקבה. די פּאָפּונאַיען לעגען זייערע אייער אין די לעבער פּון בוימער, אין ערד-גריבער, אָדער אין פעלזען-שפּאַלטען. זיי לעגען פּון 2 ביז 10 אייער, וועלכע ווערען גע-בריהט פּון ביידע געשלעכטער. די פּאָפּונאַיען געהרען זיך הויפט-זעכליך מיט פּרוכט. זיי געוועהנען זיך זעהר לייכט צו צו מענשען.



צייכנונג 175. — (1 דער טוקאַן ; 2 דער האַלץ-פיקער.

די טוקאַנען אָדער „פעפּער-פרעסער“ צייכענען זיך אויס מיט זייערע אונגע-הייער גרויסע שנאָבלען, וועלכע זיינען אָפט אַזוי גרויס ווי זייער גאַנצער קערפּער. זיי לעבען אין די געדיכטע וועל-דער פּון זיד-אַמעריקאַ און געהרען זיך הויפטזעכליך מיט פּרוכט-טען. זיי באַפּאַלען אָבער אויך די נעסטען פּון אנדערע פּויגלען און פּאַרשלינגען די אייער און די יונגע פּויגעלעך וואָס זיי גע-פינען דאָרטען.

דער אונגע-הייער גרויסער שנאָבלע פּון די טוקאַנען איז אָבער


ניט מאסיוו. זיין געוויכט וואָלט געווען צו גרויס, ווען ער וואָלט געווען מאסיוו, און די טוקאנען וואָלטען איהם ניט געקענט דער-טרָאָגען. דער טוקאנען שנאָבעל באַשטעהט פון דינע ווענטלעך און איז לייכט אין געוויכט. די צונג פון דעם טוקאן איז לאַנג, ברייט און דין, עהנליך צו אַ בענרעל. די פּעדערען פון די טור קאנען זיינען פון פארשידענע בונטע, גלענצענדע קאָלירען. אויך זייערע פיס, שנאָבעל און אויגען האָבען גלענצענדע קאָלירען.

זיץ-פּויגלען. — צו דער אָרדנונג זיץ-פּויגלען באַלאַנגען אַ זעהר גרויסע צאָהל פאַרשידענאַרטיגע פּויגלען פאַמיליען. זיי צייר כּענען זיך אויס דערמיט, וואָס זייערע פּיער-פּינגערדיגע פּיס זיינען אזוי געבויט, דאָס זיי קענען מיט זיי זעהר גוט זיצען אויף צוויי גען אָדער אויף שטאַנגען.

די פארשידענע ארטען זיץ-פּויגלען האָבען ניט פּיעל געמיינ-שאַפּטליכע האַראַקטעריסטישע סמנים, וועלכע זאָלען זיי פאַראַיי-ניגען אין איין אָרדנונג. די אַלגעמיינע כאַראַקטעריסטיק זייערע באַשטעהט הויפּטזעכליך אין דעם, וואָס זייערע פּיס זיינען צונג-פאַסט צום זיצען אויף צווייגען, בוימער אָדער שטאַנגען. זייערע דינע פּיס, מיט זייערע דינע בויגזאמע פּאָדערשטע און איין הינד-טערשטען פּינגער, מיט לאַנגע, דינע עטוואַס געבויגענע שפּיציעגע נעגעל, זיינען אויך גוט צוגעפאַסט צום בויגען נעסטען. אַ גרויסער טייל פון זיי האָבען מעלאָדישע שטימען. די זינג-פּויגלען, ווי קאד נאַריקעס, נאַכטיגאַלען, א. ז. וו., באַלאַנגען צו די זיץ-פּויגלען. די נקבות זיינען אין אַלגעמיין קלענער ווי די זכרים און האָבען אויך ניט אַזעלכע שעהנע קאָליר-רייכע פּעדערען ווי די זכרים. זיי לעבן אימער אין פּאַרען און בויגען זייערע קונסטפולע נעסטען אין בוימער. די יונגע פּויגעלעך, ווען זיי פּיקען זיך אויס פון איי, זיינען נאַקעט, בלינד און הילפּלאָז.


די זיץ-פּויגלען ווערען איינגעטיילט אין פּיער אפטיילונגען לויט דער פּאַרם און דעם געבוי פון זייער שנאָבעל. דער שנאָבעל פון די פּויגלען דאַרף זיין צוגעפאַסט צו די ארטען שפּייז מיט וועליכע זיי נעהרען זיך. איין טייל האָט אַ קאַנוס-פּערמיגען שנאָבעל, ברייט ביים אנפאַנג, וואו ער וואַקסט אַרויס פון קאָפּ, און שפּיציק ביים ענד, ווי דאָס איז דער פּאַל ביי די שפּערלינגען, פּינקען, קאד נאַריקעס, קראָהעס, א. ז. וו., דער גרעסטער טייל פון די פּויגלען מיט די קאַנוס-פּערמיגע שנאָבעלען עסען אַלעס, וואָס עס מאַכט זיך

זיי, מאנכע פון זיי אָבער עסען בלויז קערנער און יאָגדעס ווי די פינקען, לערכען, שטאַרס, קראָהעס און עלסטערס. אַ צווייטער טייל האָט אַ שנאָבעל, וואָס דער אויבערשטער העלפט זיינער איז פון אונטען איינגעקארבט ביים ענד. די דאָזיגע פויגלען שפייזען זיך מיט קליינע לעבעדיגע באַשעפענישען, באַזאָנדערס מיט אינזעקטען. צו די דאָזיגע פויגלען באלאנגען די ווערנער אָדער טויט־פויגלען (וועלכע טויטען פיעל מעהר אינזעקט־



צייכנונג 176. — די שנאָבלען און פיס פון זיך־פויגלען. (1) דער שנאָבעל פון אַ וויעדערהאַפער; (2) דער שנאָבעל פון אַ ווערנער אָדער טויטען־פויגל; (3) דער שנאָבעל פון אַ מויער־שוואַב; (4) דער שנאָבעל פון אַ וואַראָביומשיק; (5) דער פיס פון אַן עק־טרייסלער (אַ פויגעלע וואָס טרייסעלט אימער מיט'ן עק); (6) דער פיס פון אַ פינק.

טען און קליינע חיה'לעך ווי זיי קענען אויפעסען), די פליגען-כאפער, די דראָסלען און דער אמעריקאנער זינג-פויגעל (הוואָרבלער). צו דער דריטער אפטיילונג געהערען די פויגלען, וועלכע האָבן א לאנגען דינעם שנאָבעל, וועלכער ווערט שטופענווייז דינער און פארענדיגט זיך מיט אַ שפּיץ. די פויגלען פון דער דאָזיגער אפטיילונג האָבען געוועהנליך אויך לאנגע, דינע פינגער. מאַנכע פון זיי פאנגען זייער שפּייז — אינזעקטען, פליהענדיג, ווי דאָס




צייכונג 177. — 1) אַ פינק; 2) אַ נאַכטיגאַל; 3) אַ לערבע; 4) אַן אמעריקאנער לערבע; 5) אַן עלסטער; 6) אַ זינג-שפּערלינג.




איז דער פאל מיט די שעהן קאלירטע זשום־פויגעלעך. זיי פליהען מיט אן אפענעם מויל און פאנגען די אינועקטען, וועלכע פליהען ארום אין דער לופט. צו דער דאָזיגער אפטיילונג באַלאַנגען די האָניג־זויגער, די זשום־פויגלען, וועלכע האָבען אַ לאַנגען דינעם שנאָבעל מיט אַ לאַנגער צונג צו ציהען דעם זיסען זאפט פון בלו־מען און בליהונגען, און די וויעדעהאַפּפער (אַ פויגעל מיט אַ ציעמ־ליך לאַנגען שנאָבעל און מיט אַ פעדערען־הויב אויפ'ן קאָפּ, וואָס זעהט אויס ווי אַ פליגעל).

צו דער פיערטער אפטיילונג באַלאַנגען די פויגלען וואָס זייער שנאָבעל איז אין אַלגעמיין דין און קורץ, אָבער די עפונג פון זייער



צייכונג 178. — (1) דער קעניג־פישער; (2) דער נאַכט־האַביכט; (3) דער ציגענמעלקער.

מויל איז זעהר א ברייטע און אין דער עפנונג פון זייער שנאָבעל געפינען זיך אַן אנצאהל האַרטע הערעלעך. די דאָזיגע פּויגלען שפּייזען זיך מיט אינועקטען, וועלכע זיי פּאנגען פּליהענדיג. זיי פּליהען מיט אַן אָפענעם מויל, און די ברייטע עפנונג פון זייער מויל גיט זיי די מעגליכקייט לייכטער צו פּאנגען זייער שפּייז און די הערעלעך אין דער עפנונג פון זייער שנאָבעל פּארהאלטען די געפּאנגענע אינועקטען, אַז זיי זאָלען ניט קענען אנטלויפען. אוי- סער דעם האָבען מאנכע פון די דאָזיגע פּויגלען נאָך אַזא קלעפּיגע פּליסיגקייט אין זייער מויל אַן וועלכע די געפּאנגענע אינועקטען קלעפען זיך אָן, אַז זיי זאָלען ניט קענען אנטלויפען. צו דער דאָ- זיגער אפּטיילונג באלאנגען די שוואלבען, די ביענען-עסער, די קעניג-פּישערס, נאכט-האַביכטען און ציגענמעלסער.




צייכונג 179. — 1 און 2) אַמעריקאַנער זינג-פּויגלען (הוואַרב- לער); 3) דער ווערגער אַדער טוישען-פּויגלעל; 4) דער פּליגען- באַפּער; 5) דער קעניג-פּויגלעל; 6) דער וואַלד-דראַסעל.



צייכונג 180. — (1) דאס גן־עדן פויגלע; (2) א נעסט פון דעם שניידער־פויגל (א פויגל וואס נעמט צוזאמען בלעטער, פון וועלכע ער מאכט זיין נעסט); (3) דאס זשוי־פויגלע; (4) דאס נעסט פון זשוי־פויגלע.

די שוואלבען רעכענען זיך צווישען די בעסטע פליהערס צוויי-שען די פויגלען. זיי פליהען זעהר לאנג און אן אפרוה און בא-זונדערס שנעל. זיי נעהרען זיך מיט אינועקסטען און וואנדערען אויס פאר'ן ווינטער אין די ווארימע געגענדען.

די קעניג-פישערס נעהרען זיך מיט פיש. זיי זיצען אויף די צווייגען פון בוימער, וועלכע געפינען זיך ביי די ברעגעס פון ווא-סערען, און ווען זיי דערזעהען א פיש גיבען זיי א האסטיגען פליה פון בוים אין וואסער אריין צו פאנגען זייער קרבן. זיי מאכען זיך זייערע נעסטען אין לעכער ביי די ברעגעס פון טייכען.




צייכנונג 181. — דער שטאר-פויגעל.

די נאכט-האביכטען האנגען זייער שפיין (אינועקטען) ביי נאכט. א גאנצען טאג זיצען זיי אויף בוימער, נאָר ווען עס ווערט אַווענד הויבען זיי זיך אויף אויף זייערע פליגלען הויך אין דער לופט און פליהען מיט אן אָפענעם מויל און פאנגען אינועקסטען, וועלכע פליהען ארום אין דער לופט.

דער ציגענמעלקער איז א קליינער אמעריקאנער פויגעל. שלאָפּט ביי טאָג זיצענדיג אויף א בוים, און ביי נאכט פליהט ער ארום מיט אן אָפענעם מויל הויך אין דער לופט, וואו ער פאנגט פלי-הענדע אינועקסטען.

די רויב-פויגלען (ראפּטאַרען). — די רויב-פויגלען האָבען


שטארקע, קרומע שפיציגע שנאָבלען, קורצע, קרעפטיגע פיס מיט פיער שטארקע פינגער — דריי פאָדערשטע און איין הינטערשטער, וועלכע זיינען באַוואַפענט מיט שטארקע, קרומע, שפיציגע נעגעל. זייער קערפער איז פעסט געבויט און באַזיצט שטארק ענטוויקעלטע מוסקולען. זיי נעהרען זיך מיט פלייש פון פארשידענע באַשע־ פענישען, וועלכע זיי טויטען אַליין אָדער וועלכע זיי געפינען טויט.



צייכנונג 182. — 1) דער שנאָבל פון אַ רויב־פויגעל; 2) פיס פון אַ רויב־פויגעל.

זיי פאנגען זייערע קרבנות מיט זייערע קרעפטיגע, שפיציגע נעגעל און טויטען זיי מיט זייערע שטארקע שפיציגע שנאָבלען. זיי זיי־נען, געוועהנליך, שנעלע און קראפטפולע פליהער, צייכענען זיך באַזונדערס אויס מיט זייער שאַרפען חוש הראיה און שאַרפען גע־הער. זיי לעבען אין פאָרען, מאַנכע פון זיי בלייבען נאָך דער ער־שטער פאָרונג לעבען צוזאמען אויף אימער. די נקבות זיינען, געוועהנליך, גרעסער ווי די זכרים. זיי בויען מייסטענס זייערע

נעסטען אויף הויכע בערג אָדער פעלזען צו וועלכע מען קען שווער צוקומען. זיי לעגען זעלטען מעהר ווי פיער אייער. די זכרים העלד־פען געוועהנליך ניט די נקבות בריהען די אייער. עס בריהען די נקבות און די זכרים באַזאָרגען זיי מיט שפּיז. די יונגע אויסגע־בריהטע פּויגלען קומען אַרויס פון איי נאַקעט און הילפּלאַז און מו־זען אַ לענגערע צייט געקאָרמעט און אויפגעפּאסט ווערען פון זייער מוטער.



צייכנונג 184.  
די שנעע־סאָווע.



צייכנונג 183.  
די אויערען־סאָווע.

די רויב־פּויגלען ווערען איינגעטיילט אין צוויי טיילען : אין נאכט רויב־פּויגלען, וועלכע פליהען אַרויס זוכען זייער רויב בלוז ביי נאכט, און אין טאָג רויב־פּויגלען, וועלכע פאנגען זייער רויב ביי טאָג.

צו די נאכט רויב־פּויגלען באלאנגען אייניגע ספעציעס פון די סאָוועס (איילען), וועלכע האָבען גרויסע, שארפע אויגען אין פאַרענט פון זייער רונדען קאָפּ, און זעהען זעהר גוט אין דער דונק־

קעלהייט פון דער נאכט. זייערע פערדערען זיינען זעהר ווייך, און ווען זיי פליהען הערט זיך פון זיי כמעט קיין גערויש ניט. די נאכט־סאָוועס פליהען, געוועהנליך, אַרויס נאָך זייער רויב אין דער צייט פון בין השמשות (דעמערונג) אָדער ביי נאכט, ווען די לבנה געהט אויף. דאָס טאָג־ליכט קענען די נאכט־סאָוועס (נאכט־איילען) ניט גוט פארטראָגען, און מאנכע פון זייערע ארטען האַל־טען ביי טאָג זייערע אויגען האַלב פארמאכט.


די סאָוועס זיינען פארשפרייט אין אַלע וועלט־טיילען, סאי אין די וואַרעמע, סאי אין די קאָלטע געגענדען. זיי לעבען אין וועל־דער, אין סטעפעס, אין וויסטענישען און אויף אין געגענדען, וועל־כע זיינען באַוואוינט פון מענשען. די מייסטע פון זיי האָבען הוי־כע, קלינגענדע שטימען און מאנכע פון זיי לאָזען אַרויס ביי נאכט אַזעלכע אייגענטימליכע טענער, ווי זיי וואָלטען וועמען עס איז רוי־פען אָדער עטוואַס אָנזאָגען.

די סאָוועס זיינען ביזע גרויזאַמע פויגלען. צווישען זיך לע־בען זיי פריעדליך, נאָר ווען אַ סאָווע ווערט קראַנק אָדער ווערט פארוואַנדעט און קען זיך ניט וועהרען, עסען די איבריגע איהר אויף. די סאָוועס נעהרען זיך מייסטענס פון מייז און פון פויגעל, אַנדערע פאנגען אויף פיש און פרעש. זיי שליינגען זייער רויב אין גרויסע ביסענס און שפייען אַרויס די פערדערען, אָדער די האָר און ביינער פון זייער קרבן אין צונויפגעראַלטע קייקעלעך. די מייסטע סאָוועס מאַכען זייערע נעסטען אין הויהלען, אין שפאל־טען און אין פארלאָזענע נעסטען פון אַנדערע רויב־פויגעל.

מאַנכע ספעציעס פון די סאָוועס האָבען אויף זייערע אויערען הויכע בינטלעך פערדערען ווי הערנער. זיי ווערען גערופען אויער־סאָוועס (אויער־איילען). איינע פון די סאָוועס, וועלכע ווערט גערופען אוהו, צוליעב דעם הילכענדען קלאַנג „אוהו“ אָדער „בוהו“ וואָס זי לאָזט אַרויס אין די נעכט פון פריהלינג, אין אַ נאַנץ גרוי־סער פויגעל, אונגעפעהר צוויי אַ האַלב פוס די לענג. ער לעבט אין די גרויסע געדיכטע וועלדער און אויף די הויכע בערג פון אייראָ־פּאַ. ער איז זעהר אַ בייזער פויגעל. ביי טאָג זיצט ער באַווע־גונסלאָז אויף אַ הויכען בוים אָדער אין אַ הויהל, נאָר ווען עס קומט אָן די נאכט לאָזט ער זיך אַרויס אויף יאָגד. ער פאנגט, אויסער מייז, אויף היהנער, גענז, ענטלעך, יאָזשיקעס (איגלען), האָזען און אַנדערע קלענערע חיות.

עם זיינען אויך פאראן מאנכע ארטען סאָוועס, וועלכע זיינען טאָג־פּוּיגלען.

צו די טאָג רויב־פּוּיגלען באלאנגען די אָדלערס, די נייערס, די פאלקען, די האַביכטען, די שפּערבער און אַ גאַנצע רייה אנדערע. זיי זיינען באַזונדערס שנעלע און קרעפטיגע פליהער. אנדערע פון זיי, ווי מאנכע אדלערס, באַזיצען אַזאַ קראַפּט, דאָס זיי קענען פאַנגען מיט זייערע נעגעל אַ יונג שפּעסעל און אַוועקפליהען מיט איהם הויך אין דער לופט.



צייכנונג 185. — אַ ווייסקעפּיגער אָדלער.

די אָדלערס זיינען פארשפּרייט איבער אַלע וועלט־טיילען, אָבער אין די וואַרעמע געגענדען זיינען זיי פאראן אין גרעסערע מאַסען. זיי האַלטען זיך אויף אין די וועלדער, מאנכע פון זיי אויף בערג און אין סטעפעס. זיי בויען געוועהנליך זייערע נעסטען אויף הויכע פעלזען אָדער אויף די שפיצען פון הויכע בוימער, אָבער אין אַ נויט־פאַל מאַכען זיי זייער נעסט אויך אויף דער פלאַך כּער ערד. זיי לעבען אין פּאַרען, אָבער איין פּאַר האַלט זיך אָפּ געזונדערט פון די אנדערע און בויען ניט זייערע נעסטען אין נאָהנטער שכנות. די נקבה איז גרעסער און מייסטענס אויך שעה־נער פון דעם זכר. זי לעגט 1 אָדער 2 אייער און ברייט פון 4 ביז 5 וואָכען. דער זכר העלפט בריהען. די אדלערס לעבען זעהר



לאנג. מאנכע אָדלערס, וועלכע מען האָט געהאלטען אין געפאנ-  
גענשאפט האָבען געלעבט איבער 100 יאָהר.  
צווישען די גרעסערע ארטען אָדלערס צייכענט זיך אויס דער  
שטיין־אָדלער. ער איז איבער דריי פוס די לענג. ער לעבט אויף  
די הויכע בערג און אין די גרויסע וועלדער פון אייראָפּא, אַזיע,



צייכנונג 186. — א פאלק.

נאָרד־אַמעריקא און נאָרד־אַפריקא. די שטיין־אָדלערס לעבען אין  
פּאָרען און פליהען אויך אויף געיעג צוזאמען אין פּאָרען. זיי זיי-  
נען זעהר רויבעריש. זיי באפאלען יונגע שעפסען, יונגע קינדער  
און אָפט אויך ערוואקסענע מענשען. אין מאנכע געגענדען פון

אזיען ווערען די שטיין-אָדלער געפאנגען און ווערען ערצויגען אלס יאגד-פויגלען. זיי ווערען באנוצט צו פאנגען פוססען, וועלף און אנטילאָפּען.

די פאלקען זיינען מיטעל-גרויסע פויגלען אָבער באַזונדערס קרעפטיגע און שנעלע פליהער. זיי לעבען, געווענהליך, אין גרוי-סע וועלדער, אויף הויכע פעלזען, אָפט אָבער מאַכען זיי זייערע געסטען אויף אין שטעדט און דערפער. זייער רויב, וואָס באַ-שטעהט הויפטזעכליך פון פויגלען, פאנגען זיי מייסטענס פליהענדיג. זיי לאָזען זיך אַראָפּ אויף די פויגלען, וועלכע פליהען נידערדיגער פון זיי און פאנגען זיי מיט זייערע קרעפטיגע, שארפע קרומע נעגעל. זיי פליהען דאן אַוועק מיט זייער קרבן אין אַ זיכערען




צייכנונג 187. — אַ קאַליפּאָרניער גייער.

פלאץ, פליקען אָפּ פון איהם די פעדערען און רייסען אַראָפּ פון איהם זיין הויט מיט זייער שארפען קרומען שנאָבעל און פרעסען איהם אויף. גוט פליהענדע פויגלען פרובירען זיך ראַטעווען פון די רויבערישע פאלקען דערמיט, וואָס זיי פליהען אַרויף העכער אין דער לופט איבער דעם פאלק, וואָס יאָגט זיך נאָך זיי.

די נקבה פון די פאלקען, וועלכע איז גרעסער פון דעם זכר, לעגט פון 3 ביז 7 אייער און בריהט זיי אליין אויס.

סאי די אדלערס, סאי די פאלקען עסען ניט גערען קיין נבלות, זיי עסען זיי בלויז אין גרויס נויט.

דער גייער איז אַ גרויסער פויגעל, איבער דריי פוס די לענג, מיט אַ שטאַרקען, שארפען קרומען שנאָבעל, זיינע נעגעל זיינען אָבער טעמפ, קורץ און וועניג געבויגען. די הויפט־וואַפע פון דעם גייער איז, אַלואָ, זיין שטאַרקער שנאָבעל און ניט זיינע נעגעל. דער קאָפּ פון גייער איז, געוועהנליך, נאָקעט אָהן פעדערען. ביי מאַנכע אַרטען, אָבער, זיינען די קעפּ באַוואַקסען מיט פעדערען.



צייכונג 188. — אַ קאַרשון (האַביכט).

די גייער געהרען זיך הויפטזעכליך מיט נבלות, וועלכע זיי דערשמעקען פון וויימען. זיי זיינען גרויסע פרעסער, אָפּט עסען זיי זיך אָן אזוי פיעל, אַז זיי קענען זיך פון דער ערד ניט אויפֿ-הויבען צו פליהען. די גייער זיינען הויפטזעכליך פארשפרייט אין די וואַרעמערע לענדער. זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אויף בוי-מער, אויף פעלזען און אויף אויף דער ערד. די נקבה לעגט פון 1 ביז 2 אייער.

דער האַביכט (קארשון) איז זעהר אַ רויבערישער פויגעל. ער איז איבער צוויי פוס לאנג, האָט אַ שטאַרקען, שאַרפען קרומען שנאָבעל, שאַרפע קרומע גענעל, איז דרייסיג און בלוט-גייעריג. ער פליהט זעהר שנעל און קרעפטיג. ער איז הויפטזעכליך פארשפרייט אין אייראָפּא און אין נאָרד און מיטעל אַזיען. ער באַד פאלט אַלע פויגלען און אויך קלענערע חיות, ווי האָזען, קראָליקעס, א. ז. וו.

פּאַרווייז לעבען די קאַרשונען בלויז אין דער צייט פון פּאַרונג און בריהען, נאכדעם לעבען זיי אָפּגעזונדערט און אַליין. זיי בויען זייערע נעסטען אויף הויכע וואַלד-בוימער, וואו די נקבה לעגט פון צוויי ביז פיער אייער.

דער שפּעריבער איז קלענער פון דעם האַביכט, אָבער ער איז פיעל עהנליך צו איהם. ער האָט אַ שאַרפען קרומען שנאָבעל און זעהר שאַרפע, קרעפטיגע גענעל. ער איז אַ גוטער פליהער. ער איז הויפטזעכליך פארשפרייט אין אייראָפּא און אין מיטעל אַזיען. ער לעבט אין קלענערע וועלדער, ניט ווייט פון באַוואוינטע ערטער, קומט אָפּט אויך אין שטערט און דערפער. ער באַפאלט קלענערע פויגלען. אָפּט אָבער אויך טויבען און קוראַפּאַטקעס. ער מאכט זיך זיין נעסט מייסטענס אויף נידריגע בוימער, אַם ליעכסטען אויף נאדעל-בוימער. די נקבה לעגט פון 3 ביז 5 אייער און בריהט זיי אַליין אויס.

פיעלע מינים פויגלען זיינען אויסגעשטאָרבען און זיי עקזיסטירען ניט מעהר, מאנכע מינים זיינען אויף דעם שוועל פון פארשווינדען, זיי ווערען אַלץ זעלטענער און וועלען וואהרשיינליך אין פאַרלוף פון אַ מעהר אָדער וועניגער לענגערע צייט אין נאנצען פארשווינדען. אין אַ פריהערדיגע פעריאָדע פון דער ערד האָט

בען געלעכט פויגלען, וועלכע זיינען געווען באדייטענד פארשירען פון אונזערע איצטיגע פויגלען. פון מאַנכע פון זיי האָט מען גע- פונען פארשטיינערטע רעשטען. איינער פון אַזעלכע פויגלען איז געפונען געוואָרען אין נאָרד-אַמעריקא. ער איז אַ ריזיגער גרוי- סער פויגעל אַרום 5 פוס די הויך, מיט זעהר אַ לאנגען האַלז און אַ גרויסען שנאָבעל מיט געדיכטע רייהען שפיציגע צייהנער. די פליגלען זיינען ביי איהם קליין און ניט ענטוויקעלט, עס הייסט, אַז פליהען האָט ער ניט געקענט. ער איז, לויט אַלט סמנים, גע- ווען אַ שוויים און אַ טייך פויגעל.



צייכנונג 189. — דער סקעלעט פון דעם פויגעל, אַהן פליגלען און מיט צייהנער, וואָס האָט אַמאָל געלעבט אין אמעריקא.

## צוואנציגסטער קאפיטעל.

די כאראקטעריסטישע סמנים פון זויג-חיות. — די שנאָבעל חיה. — די כויטעל-חיות. — די צייהנלאָזע חיות (עדענטאָמען). — וואַל-פיש און ים-קיה. — גרויזונעס. — אינזעקטען-עסער. — פלעדער-מייז. — הוף-חיות. — העלפאנטען. — רויב-חיות. — האַלבי-אַפען. — אַפען.

## זויג-חיות (מאַמאַליען).

אַלגעמיינע כאראקטעריסטיק. — די זויג-חיות שטעלען מיט זיך פאָר דעם העכסטען קלאַס פון די ווירבעל-חיות און די העכסט ענטוויקעלטע לעבעדיגע באשעפענישען אין אַלגעמיין. אַלע פון זיי האָבען וואַרם בלוט, געבערען לעבעדיגע קינדער (אויסער אַ פאָר אויסנאַמען, וועלכע לעגען אייער), וועלכע געהרען זיך אין זייער יוגענד מיט דעם מילך, וואָס זיי זייגען פון זייער מוטער. פון דעם קומט דער נאָמען „זויג-חיות“. די הויט פון די זויג-חיות איז מעהר אָדער וועניגער באַדעקט מיט האָר. זייער סקעלעט באַשטעהט פון פעסטע, האַרטע ביינער, דער קאָפּ-שארבען און דער קאָפּ-מאַרף איז פארהעלטניסמעסיג גרעסער, ווי ביי די אַלע בעשעפענישען, וועלכע זיינען פריהער באַשריבען געוואָרען.

די מייסטע זויג-חיות לעבען אויף דער יבשה. עס זיינען אָבער אויף פאראַן אַזעלכע, וואָס לעבען טיילווייז אָדער אין גאַנצען אין וואַסער. די וואַלפיש און ים-הינד זיינען פאָלשטענדיגע וואַסער-חיות, הגם זיי געהערען צו די זויג-חיות. זיי האָבען וואַרם בלוט, אַטעמען מיט לונגען און געבערען לעבעדיגע קינדער, וועלכע ערנעהרען זיך מיט די מילך פון זייער מוטער ווי לאַנג זיי זיינען קליין. דער ביבער, דער היפּאָפּאַטאַמוס און פיעלע אנדערע זיינען טיילווייזע וואַסער-חיות. זייער קערפער און זייער אָרגאַניזם אין אַלגעמיין איז הויפטזעכליך צוגעפאַסט צו דעם לעבען אויף דער יבשה, אָבער זיי פאַרבריינגען אַ גרויסען טייל פון זייער צייט אין וואַסער. עס זיינען אויך פאראַן פליהענדע זויג-חיות, ווי די פלע-דער-מייז און פלעדער-הינד.

די זויג-חיות האָבען, געוועהנליך, אַ נייגונג צו לעבען אין

געזעלשאפט. די נייגונג איז פאראן סאי ביי די קלענערע זויג-חיות, ווי מען זעהט עס ביי די וועווערקעס, ראצען, מייז, א. ז. וו., סאי ביי די גאנץ גרויסע, ווי ביי העלפאנטען, וואלפיש, בופעל-אקסען, א. ז. וו.

די שוץ און פארטיידיגונגס-מיטלען פון די זויג-חיות זיינען פארשידען. אנדערע באשיצען זיך מיט זייערע שארפע צייהן און נעגעל; אנדערע מיט זייערע הערנער און קאפיטעס; מאנכע האבען פאנצער-פלאטען, וועלכע באדעקען זיי, ווי דאָס איז דער פאל ביי די פאנצער-חיות (ארמאדעלאָס), אָרער האַרט-שטעכיגע האָר, ווי דאָס איז דער פאל ביי די יאָזשיקעס. אנדערע פארטיי-דיגען זיך דורך אַ שטארקען שלעכטען ריח, וואָס זיי לאָזען פון זיך אַרויס, ווי דאָס איז דער פאל ביי די שעסקעס (טכוירען) און אַמעריקאַנער סקאַנקס. די מייסטע באַנוצען זייערע שוץ און פארטיידיגונגס-מיטלען אַלס אָנגרייפס-מיטלען. מיט דיזעלביגע וואַפען, וואָס זיי פארטיידיגען זיך געגען שטארקערע פון זיי, גרייט פֿען זיי אָן די שוואַכערע פון זיי. אָפט דיענט אויך פאר די חיות אַלס אַ גוטער שוץ-מיטל דער קאָליר פון זייערע האָר, וואָס האַרט מאַניזירט מיט דער אומגעבונג אין וועלכער זיי לעבען, דאָס מען קען זיי ניט באַמערקען. מאַנכע בייטען זאָנאר דעם קאָליר פון זייערע האָר אין ווינטער און אין זומער, כדי צו האַרמאָניזירען מיט דעם קאָליר פון דער אומגעבונג, ווי דאָס איז דער פאל ביי מאַנכע האָזען און קראָליקעס אין די ווייטע צפון געגענדען, וועלכע באַקומען אין ווינטער-צייט אַ פּאָלשטענדיג ווייסע פֿעל.


דער סקעלעט איז ביי די פארשידענארטיגסטע זויג-חיות אין אַלגעמיין זעהר עהנליך. די צאָהל ביינער פון קאָפּ און פון רומפּ איז אין אַלגעמיין ביי אַלע זויג-חיות גלייך. דער אונטערשיעד איז בלויז אין דער פּאָרם, אין דער גרויס און אין דער פּראָפּאָרציע, אָבער ניט אין דער צאָהל. אין דער לאַנגער האַלז פון אַ זשיראַף אין די צאָהל ביינער ניט מעהר ווי אין דער קורצער האַלז פון אַ מענשען. עס איז בלויז פאראן אַן אונטערשיעד אין דער צאָהל פון די ביינער אין די ענד-גלידער (הענד און פיס), אָבער דאָס קומט דערפון, וואָס ביי מאַנכע חיות זיינען אַ טייל פון די ענד-גלידער, צוליב געוויסע אורזאָכען פארשוואַנדען געוואָרען. אַלס כּלל דארפֿען אַלע זויג-חיות האָבען צו פינף פינגער אין די הענד (פּאָדערשטע פיס) און אין די פיס. ביי אַ פּערד זעהט מען אָבער

בלויז איין פינגער. זיין קאָפיטע שטעלט מיט זיך פאָר דעם מיטעל־סטען פינגער. די איבריגע פיער פינגער זיינען ביי איהם פאר שוואונדען, עם זיינען בלויז געבליבען שפורען פון זיי אין דער פאָרם פון קליינע ביינדלעך, וועלכע געפינען זיך אין זיינע פאָדערשטע און הינטערשטע פיס. דאָסזעלבע איז דער פאל ביי די חיות, וועלכע האָבען געשפאָלטענע קאָפיטעס, ווי קיה, הירשען, שעפסען, א. ז. וו. זיי האָבען, הייסט עם, בלויז צוויי פינגער, וועהרענד די איבריגע זיינען פארשוואונדען און עם זיינען בלויז געבליבען שפורען פון זיי. די שפורען פון נאָך צוויי פינגער זיינען ביי מאנכע פון זיי גוט קענטיג, באַזונדערס ביי חזירים, זיי געפינען זיך אויף דער הינטערשטער זייט פון די פיס, אַביסעל העכער פון די קאָפיטעס. ביי די וואַלפיש זיינען די הינטערשטע פיס אין נאנצען פארשוואונדען, וועהרענד די פאָדערשטע פיס אָדער הענד זיינען ביי איהם ענטוויקעלט געוואָרען אין דער פאָרם פון שוויס־רודערס, און קיין פינגערס זעהן זיך גאָר ניט. ווען מען נעמט אָבער אַראָפּ די הויט און פלייש פון זיינע שוויס־רודערס זעהט מען די ביינער פון פינגער.

א נאנץ גרויסען אונטערשיעד געפינט מען צווישען די זויג־חיות אין באַצונג צו זייערע אויגען. ביי מאנכע זיינען די אויגען גאנץ קליין, איינגעגראָבען אין הויט און כמעט אין נאנצען דענע־נערירט, ווי דאָס איז דער פאל ביי קראָטען, וועהרענד ביי אנדערע זיינען די אויגען באַזונדערס גרויס און שטארק ענטוויקעלט, ווי דאָס איז דער פאל ביי די חיות, וועלכע זוכען זייער שפייז ביי נאכט. עם איז אויך פאָראַן אַ גרויסער אונטערשיעד אין דער ענטוויקלונג פון די אויערען ביי די פאַרשידענע זויג־חיות, אַבערניג פון דעם אַרט לעבען, וואָס זיי פיהרען. ביי די חיות, וועלכע לעבען איינגעגראָבען אין דער ערד זיינען די אויערען און דער חוש השמיעה שוואַך ענטוויקעלט, וועהרענד ביי די חיות, וואָס לעבען אויף דער ערד זיינען די אויערען און דער חוש השמיעה שטארק ענטוויקעלט. אַ באַזונדערס שאַרפען חוש השמיעה האָבען הירשען און אנדערע מעלה גרה'דיגע חיות. זיי דערהערען דאָס אַנקומען פון זייערע שונאים פאַר אַ גאנץ ווייטען מהלך. דער חוש הריח איז באַזונדערס שטארק ענטוויקעלט ביי די פלייש עסענדע חיות, זיי דערשמעקען זייער רויב פון זעהר ווייט. וואַלפיש און ים־הינד, ווערט אָנגענומען, האָבען אין נאנצען ניט קיין חוש הריח.



די שפייזען, מיט וועלכע די זויג־חיות נעהרען זיך, זיינען פארשידען. מאנכע פון זיי עסען אלעס, וואָס עס מאכט זיך זיי, פונקט ווי דער מענש; אנדערע, ווי וועלף, לייבען, טיגערס, א. ז. וו., זיינען פלייש עסענדע; און אנדערע, ווי הירשען, בופעל־אַקסען, האָזען, א. ז. וו., זיינען וועגעטעריאנער, זיי עסען בלויז גרינסען, תבואה און פרוכטען. דאָס פארדייאונגס־סיסטעם איז אין אלגעמיין ביי אלע זויג־חיות געבויט אונגעפעהר אויף דעם זעלביגען פלאן, אָבער אין מאנכע טיילען פון דעם פארדייאונגס־סיסטעם, ווי פון מאָגען און די קישקעס, זיינען ביי די פארשידענע חיות פאַראַן געוויסע אונטערשידען, לויט די שפייזען, מיט וועלכע זיי נעהרען זיך. די קישקעס, למשל, זיינען ביי די פלייש־עסענדע




צייכנונג 190. — א צייהנער־געביס. ש, די שנייד־צייהנער;  
א, אויגען־צאָהן; ב, ביקוספידאטען (פאָדערשטע באַק־צייהנער);  
ג, מאָלאָרען (הינטערשטע באַק־צייהנער).

חיות א סך קירצער, ווי ביי די וועגיטארישע חיות. די קישקעס פון די פלייש־עסענדע חיות זיינען פון דריי ביז פיער מאָל אזוי לאנג ווי זייער קערפער, וועהרענד ביי די וועגעטארישע חיות זיינען זיי פון צעהן ביז צוועלף מאָל אזוי לאנג. אַם בעסטען קען מען דערקענען, מיט וועלכע אַרטען שפייזען די חיות נעהרען זיך, נאָך זייערע צייהנער. די פלייש־עסענדע חיות האָבען שטאַרק ענטוויקעלטע בייס־צייהנער און שפיציגע אויגען־צייהנער (הינטישע צייה־נער); די וועגיטארישע חיות האָבען שטאַרק ענטוויקעלטע באַק־צייהנער (מאָלאָרען), וועהרענד די אלעס עסענדע חיות האָבען ביידע סאָרטען צייהנער. מעהרסטע פון די זויג־חיות בלייבען ביי די

צײהנער, וועלכע עס וואקסט זיי אויס אין דער יוגענד, ביי אנדערע אָבער בייטען זיך די צײהנער, ווען זיי ווערען עלטער. די ערשטע צײהנער, וועלכע פאלען אַרויס, ווערען גערופען „מילך־צײהנער“, און די, וואָס וואקסען אויס נאָך זיי, ווערען גערופען באַשטענדיגע צײהנער. די צײהנער ווערען איינגעטיילט אין פיער טיילען: שנייד־צײהנער (פּאָדערשטע), אויגען־צײהנער (די שפּיצניגע זייטען־צײהנער), ביקוספּיראַטען (פּאָדערשטע באַק־צײהנער) און מאָד־לאָרען (הינטערשטע באַק־צײהנער).

דער חלל פון בויך איז ביי די זויג־חיות פּאָלשטענדיג אָפּגע־טיילט פון דעם ברוסט־קאַסטען דורך א פלייש־וואַנד, וואָס ווערט




צײכנונג 191. 1— אַ דיאַגראַם פון דער בלוט־צירקולאַציע ביי אַ זויג־חיה. א (פון דעם שוואַרצען טייל פון דיאַגראַם), דער רעכטער אויבערשטער האַרץ־קאַמער; ב, דער רעכטער אונטערשטער האַרץ־קאַמער; אַ (פון ווייסען טייל פון דיאַגראַם), דער לינקער אויבערשטער האַרץ־קאַמער; ב, דער לינקער אונטערשטער האַרץ־קאַמער; ג (שוואַרץ), די לונגען־אַרטעריע, וועלכע ברענגט אַדערען־בלוט צו די לונגען; ג (ווייס), די לונגען־אַדערען, וועלכע טראָגען פּאַנאָדער אַרטעריע־בלוט פון די לונגען; ד, די אַאַרטאַ (האַרץ־אַרטעריע), וועלכע פּיהרט דאָס אַרטעריע־בלוט צום קערפּער; ה, דאָס בלוט־געפעס וואָס ברענגט דאָס אַדערען־בלוט צום האַרצען. (די בלוט־געפעס, וועלכע ענטהאַלטען אַדערען־בלוט זיינען געל און ווייס). 2 און 3 קאַפּ־מאַרך פון אַ זויג־חיה (פון אַ קראַליק); 2 צײגט דעם אויבערשטען אויסזעהן פון מאַרך און 3 דעם אונטערשטען. א, צײגט דעם זעה־נערו און ב, דעם הער־נערו.

אָנגערופען די אַ פּראָג (צווערד־פעל). דער חלל פון בויך ענטהאַלט דעם מאָגען, די קישקעס, דעם לעבער, דעם מילץ, די ניערען און אנדערע אָרגאַנען. דער ברוסט־קאַסטען ענטהאַלט הויפטזעכליך דאָס האַרץ און די לונגען. דאָס האַרץ ליגט אין אַזאַ הויט־בייטעל און האָט צוויי פּאַרקאַמערען און צוויי אונטערקאַמערען, יעדע זייט פון האַרץ האָט איין פּאַרקאַמער און איין אונטער־קאַמער, וועלכע זיינען איינע מיט די אנדערע פאַרבונדען דורך עפּנונגען, באַזאָרגט מיט דעקלעך. די דעקלעך זיינען אַזוי איינ־געריכט, אַז דאָס בלוט קען געהן פון פּאַרקאַמער אין אונטער־קאַמער אָבער ניט פון אונטערקאַמער אין פּאַרקאַמער.

די בלוט צירקולאַציע קומט פאַר אויף דעם פּאָלגענדען אופן: דאָס אָדערען בלוט, וואָס איז געוואָרען אונריין דורכגעהענדיג דורכ'ן קערפּער, קעהרט זיך אום צוריק צום האַרצען און געהט אריין אין דעם רעכטען פּאַרקאַמער, פון וואָנען עס געהט אריין אין דעם רעכטען אונטערקאַמער. פון דאָרטען געהט דאָס בלוט דורך אַ גרויסען אָדער, וואָס ווערט גערופען די „לונגען ארטעריע“ צו די לונגען, וואו עס קומט אין באַריהרונג מיט דער לופט און ווערט גערייניגט דורך דעם זייער־שטאַף, וואָס די לופט ענטהאַלט. דאָס בלוט ווערט דאָן גערופען „אַרטעריע בלוט“. דורך אַ גאַנצע רייה לונגען־אָדערען קעהרט זיך דאָס בלוט אום צוריק צום האַרצען און געהט אריין אין דעם לינקען פּאַרקאַמער, פון וואָנען עס געהט אריין אין דעם לינקען אונטערקאַמער. פון דעם לינקען אונטער־קאַמער געהט דאָס בלוט אריין אין אַ גרויסען אָדער, וואָס ווערט גערופען אַ אַרט א פון וואָנען עס פאַרשפּרייט זיך איבער דעם גאַנצען קערפּער.

די זויג־חיות, ווי שוין באַמערקט, האָבען גרעסערע און מעהר ענטוויקעלטערע געהירען, ווי די אַלע אנדערע קלאַסען פון חיות, וועלכע זיינען באַשריבען געוואָרען ביז איצט, און זיי צייכענען זיך דאָריבער אויס מעהר מיט זייער שכל. עס איז אמת, אַז אין די מייסטע פעלע ווערען אויך די האַנדלונגען פון די זויג־חיות באַשטימט פון זייערע מיטגעבאָרענע אינסטינקטען און ניט דורך זייער שכל. פונקט ווי די ביענען מאכען זייערע סימעטרישע זעקס־קאַמניגע וואַסקענע קעסטעלעך דורך זייער מיטגעבאָרענעם אינ־סטינקט, ווי די מוראַשקעס בויען זייערע וואונדערבאַרע נעסטען מיט די פאַרשידענע גאַסען און גאַלעריען און פונקט ווי דאָס יונגע

ענטלע, וואָס האָט זיך ערשט אַרויסגעפיקט פון איי, וועלכע איז אויסגעבריהט געוואָרען פון אַ הוהן, וואַרפט זיך אין וואַסער שווימען, אַזוי ווערען די האַנדלונגען פון די זויגחיות כאַשטימט פון זייערע מיטגעבאַרענע אינסטינקטען. אָבער אַ באַדייטענדע צאָהל זויגחיות ווייזען אויך אַרויס שכל און פאַרשטאַנד. זיי צייגען אַרויס, אַז זיי לערנען פון ערפאַהרונג, אַז זיי געדענקען פאַסירונגען, אַז זיי טראַכטען און ציהען שליסע, אַז זיי קענען ליעבען און האַסען, זיין טריי און איבערגעבען ביז זעלבסט־אויפ־אַפּפערונג און קענען אויך זיין פאַלש און פאַררעטעריש. די זויגחיות ווערען איינגעטיילט אין צוועלף אָרדנונגען, און יעדע אָרדנונג ווערט איינגעטיילט אין אַ גאַנצע רייהע פאַמיליעס,



צייכנונג 192. — (1) דאָס האַרץ און לונגען פון אַ זויגחיות. א, דער גאַרעל; (2) דאָס פאַרדיוואַנגס־סיסטעם פון אַ זויגחיות. א, דער ושמ (שלונד); ב, דער מאַגען; ג, די קורצע קישקע; ד, די לאַנגע קישקע; ה, די פאַרענדערונג פון דער לאַנגער קישקע אין רעקטום (עפנונג פון הינטערלויב).

גאטונגען און ספעציעס, פון וועלכע דאָ וועלען באַשריבען ווערען בלויז די מיסטע כאַראַקטעריסטישע.

די שנאָבעל - חיה. — די נידריגסטע אָרדנונג פון די זויג-חיות זיינען די מאַנאַטרעמען, צו וועלכע עס באלאנגט די שנאָבעל-חיה.

די שנאָבעל-חיה קען אָנגענומען ווערען אלס אַן איבערנאָנט שטופע פון די רעפּטילען און פּויגעל צו די זויג-חיות. די שנאָבעל-חיה האָט פון איין זייט מאַנכע שטאַרק אויסגעשפּראַכענע סמנים פון אַ פּויגעל אָדער רעפּטיל, וועהרענד פון דער אנדערער זייט האָט זי די וויכטיגסטע סמנים פון אַ זויג-חיה. די שנאָבעל-חיה האָט פיער פיס, איז באַוואַקסען מיט האָר און איהר אינערליכער אָרגאַניזם איז אין זיינע וויכטיגסטע טיילען אַזוי ווי ביי אַלע אנדערע זויג-חיות. זי האָט אָבער אַ ענטעל-שנאָבעל, לענט אייער ווי אַ פּויגעל אָדער רעפּטיל, האָט אַ שוויים-הויט צווישען די פינגערס פון די פּאָדערשטע פיס און האָט בלויז איין עפּנונג אין איהר הינטער-לייב, ווי דאָס איז דער פּאַל ביי פּויגעלען. אין דער עפּנונג ענדיגט זיך איהר שפייז-קישקע און פון דער זעלבער עפּנונג לענט זי איהרע אייער און לאָזט אויך אַרויס איהר אורין (השתנה). דערפון קומט דער נאָמען „מאַנאַטרעמען“, וואָס די אָרדנונג האָט באַקומען. עס מיינט חיות מיט איין עפּנונג.

די שנאָבעל-חיה געפינט זיך אין אויסטראַליע. זי לעבט ביי די ברעגעס פון טייכען אָדער אָזערעס, וואו זי גראַבט אויס לאַנגע גערעהטע הוילען, אין וועלכע זי מאַכט איהר נעסט. דער קערפער פון דער שנאָבעל חיה איז עהנליך ווי פון אַן אטער (ווידרא). זי האָט אַ ברוינע פעל און אַ ברייטען, פלאַטשיגען, האָריגען עק. די זכרים אונטערשיידען זיך פון די נקבות דערמיט, וואָס זיי האָבען שפּאַרען אויף די הינטערשטע פיס, אַזוי ווי מאַנכע פּויגעלען. אין דער יוגענד האָט די שנאָבעל-חיה צייהנער, אָבער זי פאַרלירט זיי גיך און באַקומט אויף זייער פּלאַץ צוויי האָרנדיגע פלאַטען, וועלכע דיענען איהר צו צומאָלען איהר שפייז. דער מאַרד איז ביי דער שנאָבעל-חיה קליין און וועניג ענטוויקעלט; אויסערליכע אויערען פעהלען איהר; איהרע אויגען זיינען קליין, און איהרע נאָזלעכער געפינען זיך אין דעם פּאָדערשטען טייל פון איהר שנאָבעל. די טעמפּעראַטור פון איהר קערפער איז 25 גראַד צעלזיוס, באַדייטענד נידריגער, ווי ביי אַלע אנדערע זויג-חיות. די נקבה לענט אויס

איין איי מיט א ווייכען שאַלאכץ, פון אונגעפעהר א האלבען צאָל (אינטש) די לענג, פון וועלכער עס קומט אין א קורצער צייט אַרום אַרויס אַ קליין אונבאַהאַלפּען חיה'לע, וואָס נערט זיך מיט דעם מילך פון איהר מוטער. די מילך־דריזען ביי דער שנאָבעל־חיה שטארצען ניט אַרויס ווי אַן אייטער, ווי ביי די מייסטע זויג־חיות, נאָר זיי זיינען גאנץ פלאך און ליגען אין איין שטח מיט דעם פעל פון בויך. די מילך־דריזען האָבען אויך ניט קיין נאָפּלען, פון וועלכע דאָס נייד געבאָרענע חיה'לע זאָל קענען זויגען. עס איז בלויז פאראן אַן עפּונג פון וועלכער דאָס יונג חיה'לע לעקט די מילך אנשטאט צו זויגען.

צו דער אָרדנונג פון די מאָנאָטרעמען (חיות מיט איין עפּונג) באלאנגט אויך דער מוראשקעס יאָזשיק, וועלכער לעבט אין אויס־טראַליע. דער מוראשקעס יאָזשיק האָט אַ לאנגען דינעם שנק, וועלכער איז אין גאנצען באַדעקט מיט פעל און האָט בלויז אַ קליינע



צייכונג 193. — די אויסטראַלישע שנאָבעל חיה.

עפונג ביים ענד, דורך וועלכע די חיה קען ארויסשטעקען איהר לאנגע, בויגזאמע און קלעפיגע צונג, מיט וועלכער זי פאנגט מור ראשקעס און אנדערע אינזעקטען. קיין צייהנער האָט ניט דער מוראשקעס יאָזשיק און ער האָט אויך ניט קיין אנדערע אָרנאָנען, וועלכע זאָלען פארנעהמען דעם פלאַץ פון צייהנער. זיינע פיס האָט בען צו פינף פינגער, וועלכע זיינען באַזאָרגט מיט שטארקע גראָב־נעגעל, אויסצוגראָבען הוילען אין דער ערד, וואו ער מאכט זיך זיין נעסט. זיין פעל איז באַדעקט מיט האַרטע שטעכיגע האָר און מיט שפיציגע נאָדלען, ווי א יאָזשיק. ער איז אונגעפעהר אַנדערטהאַלבען פוס די לענג. די נקבה געבערט ניט קיין לעבעדיגע קינדער, נאָר זי לעגט אייער, וועלכע זי נעמט אַרײַן אין א הויט־בייטעל, וועלכע געפינט זיך אונטער איהר בויך, וואו זיי ווערען אין א קורצער צייט אויסגעבריהט.


די בייטעל־חיות (מארסופיאליען). — עטוואס אַ העכערע שטופע אין דער ענטוויקלונג פון די זויג'חיות שטעלען מיט זיך פאַר די בייטעל־חיות, אָדער „מארסופיאליען“, ווי זיי ווערען גערופען מיט זייער וויסענשאפטליכען נאָמען. זיי האָבען זייער נאמען גע־עראַנגען צוליבע דעם, וואָס די נקבות פון די דאָזיגע חיות האָבען אונטער זייער בויך אַזא הויט־בייטעל (מארסופיום), וואו עס געפי־נען זיך די נאָפאלען פון זייערע מילך־דרײַזען, און וואו זיי האַלטען זייערע קליינע זויג'קינדער.

די קינדער פון די בייטעל־חיות ווערען געבאָרען פאַלשטענדיג הי־פלאַץ און אונגעטוויקעלט. זיי זיינען קליין, בלינד און נאָקעט. די מוטער לעגט זיי אַרײַן אין איהר הויט־בייטעל און טראָגט זיי דאָרטען מיט זיך ביז זיי וואַסען אויס און ווערען פעהיג אַליין צו באַזאָרגען זיך זייער שפּײַז.

די בייטעל־חיות ווערען איינגעטיילט אין וועגעטאָריער (גרינס און פרוכט עסענדע) און אין פלייש־עסער. די וועגעטאָריער האָט בען ניט קיין שפיציגע אויגען־צייהנער אָבער זיי האָבען ברייטע באַק־צייהנער צום קייען. די פלייש־עסער ווידער האָבען גוט ענט־וויקעלטע שפיציגע אויגען־צייהנער, וועהרענד זייערע באַק־צייהנער זיינען קליין און ניט צוגעפאסט צום קייען.

צווישען די וועגעטאָרישע בייטעל־חיות זיינען די קאנגאָרוס די באַקאנטעסטע. די קאנגאָרוס צייכענען זיך אויס דערמיט, וואָס זייערע הינטערשטע פיס זיינען באַדייטענד לענגער ווי די פאָדער־

שמע. זייער גאנג איז דאריבער א שפרינגדיגער. די ריזען-קאנגארוס, וועלכע דערגרייכען א הויך פון איבער זעקס פוס, האָבען אויך א שטארקען עק, אויף וועלכען זיי שטיצען זיך, ווען זיי ווילען מאַכען א גרעסערען שפּרונג. מיט דער הילף פון זייערע לאַנגע, שטארקע הינטערשטע פיס און זייער קרעפטיגען עק, אויף וועלכען זיי שטיצען זיך, קענען די קאנגארוס מאַכען איבערראשענדע גרויסע שפּרונגען. ווען זיי ווערען פארפאָלגט מאַכען זיי אַזעלכע גרויסע שפּרונגען און לויפען אַזוי געשווינד ווי דער שנעלסטער פּערד.




צייכונג 194. — א קאנגארו.

די קאנגארוס, וועלכע לעבען אין אויסטראַליען, טיילען זיך אין מעהרערע ספעציעס. מאַנכע פון זיי זיינען בלוזן אַזוי גרויס ווי קראָליקעס. זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אין קוסטארניקעס (געדיכטע קליינע בוימלעך) און שפייזען זיך מיט גראַז אָדער מיט די יונגע צווייגלעך פון בוימער. עס זיינען אויך פאראן קאנגארוס, וועלכע פארבריינגען די מייסטע צייט זייערע אויף בוימער, זיי ווערען גערופען „בוימער קאנגארוס“. צו די בוימער קאנגארוס באלאנגט אויך „ער קאנגארויבער. זיינע פאָדערשטע פיס זיינען אַזוי אויסגעבילדעט, אַז ער קען זיי געברויכען אַלס הענד מיט וועלכע ער קלעטערט און הענגט זיך אָן אויף די צווייגען פון די בוימער, וואו ער פארבריינגט די מייסטע פון זיין צייט. ער האָט ניט קיין עק און זיין קערפער איז באַדעקט מיט סורצע געדיכטע האָר. דער קאנגארויבער איז א נאכטחיה, ער געהט אַרויס זוכען זיין שפייז ביי נאכט, וועהרענד ביי טאָג רוהט ער.



א זעהר כאראקטעריסטישער טיפ פון די וועגעטארישע ביי-  
טעל-חיות זיינען די „פאלאנגערען“, וועלכע לעבען אין איטאליען.  
די מייסטע פון זיי זיינען קליינע חיה'לעך מיט לאנגע וויקעל-  
עקען (עקען, וועלכע קענען זיך צונויפוויקלען). זיי לעבען אויף  
בוימער און שפייען זיך מיט גראָז, בלעטער און יונגע צווייג-  
לעך. צו די דאָזיגע פאלאנגערען באלאנגט אויך דאָס „פליה-  
חיה'לע“. עס איז אַ קליין חיה'לע וואָס האָט אַ הויט-פאלב  
צווישען די פאָדערשטע און הינטערשטע פיס, און מיט דער הילף  
פון דער דאָזיגער הויט קען עס מאַכען גרויסע שפרונגען פון איין  
בויס צום צווייטען, און עס זעהט אויס ווי זי וואָלט פליהען. אין  
דער ווירקליכקייט אָבער פליהט זי ניט, נאָר זי שפרינגט.



צייכונג 195. — אַפּאַסום. (רעכטס, אַ געווענליכער אַפּאַסום;  
לינקס, אַן אַפּאַסום, וואָס טראָגט די קינדער אויפ'ן רוקען).

צו די פלייש-עסענדע בייטעל-חיות באלאנגט דאָס אמעריקאָ-  
נער אַפּאַסום און אַ גאַנצע רייה אַנדערע קלענערע און גרעסער-  
רע חיות אין אויסטראַליען. דאָס אמעריקאָנער אַפּאַסום איז אַ  
קליין חיה'לע פון אַ ווייס-געלבלויכען קאַליר, מיט אַ לאַנגען, די-  
נעם עק און איז קערפערליך פיעל עהנליך צו אַ ראַץ. עס לעבט  
אין די וואַרמע געגענדען פון אמעריקא. ביי טאָג האַלט עס  
זיך אויף אין לעכער פון בוימער און ביי נאכט געהט עס אַרויס  
זוכען זיין שפיין. עס נעהרט זיך מיט פויגלען, מיט וואַרצלען און

מיט פּרוכט, און עס לעבט, אויסער דער פּאַרונגס-צייט, אן אפֿ-געזונדערט, איינזאם לעבען.

עס זיינען פּאַראַן מעהרערע ספּעציעס פון די אָפּאַסומס אין אַמעריקאַ. איין ספּעציע איז פּאַראַן אַזעלכע, וואָס די נקבות טראָגען זייערע יונגע קינדער אויף זייער רוקען. די קליינע חייה'לעך ליגען אויף זייער מוטערס רוקען און האַלטען זיך אָן מיט זייערע עקלעך, וועלכע זיינען אַרומגעדרעהט אַרום זייער מוֹ-טערס עק.

די עדענטאַטען. — מיט דעם נאָמען „עדענטאַטען“ ווערט באַצייכענט די אָרדנונג פון די זויגחיות וועמענס צייהנער זיינען ניט פּאַלשטענדיג ענטוויקעלט אָדער עס פּעהלט זיי אין גאַנצען צייהנער. דאָס וואָרט „עדענטאַטאַ“ אין לאַטיין מיינט אָהן צייה-נער. אייגענטליך איז דער נאָמען ניט אין גאַנצען גוט צוגעפּאַסט צו דער אָרדנונג פון די חיות, וועלכע ווערען מיט איהם גערופּען, ווייל בלויז צוויי נאַטונגען (מינים) פון דער דאָזיגער אָרדנונג האָבען ניט קיין צייהנער, וועהרענד די איבריגע האָבען יא צייה-נער, זיי זיינען ביי זיי בלויז ניט אַזוי גוט ענטוויקעלט ווי ביי די אַנדערע העכערע מינים זויגחיות, אָבער אַזוי איז שוין דער נאָמען אָנגענומען געוואָרען און איז געבליבען.

צו דער אָרדנונג פון די עדענטאַטען באַלאַנגען די פּאַנצער-חיות, די מוראַשקעס-עסער און די פּויל-חיות. זייער כאַראַקטער-ריסטישער צייכען איז, וואָס זייערע צייהנער, ווי שוין באַמערקט, זיינען ניט פּאַלשטענדיג ענטוויקעלט. צו אַלער ערשט זיינען זייערע צייהנער ניט באַדעקט מיט קיין עמאַליע. די צייהנער פון די העכערע זויגחיות באַשטעהען פון דריי טיילען: פון אַן עמאַליע (אַ זעהר האַרטער ווייסער אָדער ווייס-געלבלויכער שטאַף, מיט וועלכען די צייהנער זיינען באַדעקט), פון דענטין (דער ביינ-שטאַף, וואָס געפינט זיך אונטער דער עמאַליע), און די פּולפּע (אַ וויכע מאַסע, וועלכע געפינט זיך אין דעם חלל פון די צייהנער און באַשטעהט פון דעם נערוו און בלוט-אָדערלעך פון די צייהנער). אויסער וואָס די צייהנער פון די עדענטאַטען חיות זיינען ניט באַ-דעקט מיט קיין עמאַליע, האָבען זיי אויך ניט קיין פּאַלשטענדיג ענטוויקעלטע וואָרצלען. זייערע צייהנער זיינען געווענהליך רונד און שיטער, זאָס הייסט, אָפּגעטיילט איינעל פון די אַנדערע. זיי בלייבען אימער ביי די ערשטע צייהנער, וואָס וואַקסט זיי אַרויס

אין דער יוגענד, עס בייטען זיך ניט ביי זיי די צייהנער, ווי דאָס איז דער פאל ביי די העכער ענטוויקעלטע זויג-חיות. קיין צענד-טראַלע שנייד-צייהנער (פאָדערשטע שארפע צייהנער) האָט קיינער ניט פון זיי. בלויז איין גאטונג האָט איבערהויפט שנייד-צייהנער, די איבריגע האָבען זיי אין גאנצען ניט.

די עדענטאטען ווערען איינגעטיילט אין צוויי הויפט-גרופען, לויט די שפייזען, מיט וועלכע זיי נעהרען זיך. איין גרופע נעהרט זיך מיט גראָז, יונגע בוימלעך און מיט פרוכטען, און די צווייטע גרופע — מיט אינזעקטען. צו דער ערשטער גרופע באלאנגען די פויל-חיות (בראָדיפאָדען), און צו דער צווייטער גרופע — די פאנצען חיות (ארמאדילען) און די מוראשקעס עסער.


די פויל-חיות. — זיי לעבען אין די אור-וועלדער פון זיד-אמעריקא און זיינען צוגעפאסט צו לעבען אויף בוימער. זייערע



צייכנונג 196. — די פויל חיה.

פֿיס האָבען זעהר לאנגע, געבויגענע נעגעל און זיי קענען זיך דאָריי בען גאנץ פריי באַוועגען אויף די צווייגען פון בוימער, מיט זייערע


קערפערס אראָפּגעהאַנגען נאָך אונטען. אויף דער ערד באַוועגען זיי זיך זעהר אומגעלומפערט און לאַנגזאַם. דער קאָפּ פון דער פּויל־חיה איז רונד און איז עהנליך צו דעם קאָפּ פון אַ מאַלפּע (אַבעזיאַנע). זי האָט אַ קליינעם מויל, קליינע אויגען און קליינע אויערען. איהר געביס באַשטעהט פון פינף רונדע באַק־צייהנער אין יעדער רייה, קיין שניד־צייהנער האָט זי אין גאַנצען ניט. איהר קערפער איז באַדעקט מיט לאַנגע האָר, וועלכע לעגען זיך אָפּ פון בויך צום רוקען (ביי די מייסטע חיות לעגען זיך די האָר אָפּ פון רוקען צום בויך). זי איז זעהר פּויל, הענגט שטונדען־לאַנג אויף אַ צווייג פון אַ הויכען בוים מיט'ן קערפער אראָפּ און גיט זיך אַ ריהר ניט. פון איהר גרויסער פּוילקייט שטאַמט אויך איהר נאַמען „פּויל־חיה“. געגען דעם אַנגריף פון אַ שונא פּאַרטיידיגט זיך די פּויל־חיה דערמיט, וואָס זי כאַפט אַרום איהר אַנגרייפער מיט איהרע פיס, דריקט איהם צו פעסט צו איהר קערפער און האַלט איהם אזוי מעהרערע טעג. די פּויל־חיה צייכענט זיך אויס מיט אַ באַזונדערס גרויסער לעבענס־קראַפט. זי קען לעבען אַ לאַנגע צייט אָהן עסען, און קען אויסהאַלטען די געפּעהרליכסטע וואַונדערן.



צייכנונג 197. — די דרוי־שטרייפיקע פאַנצער חיה (אַרמאַדילאַ).

זי נעהרט זיך מיט בלעטער און מיט פרוכט און לעקט דעם טוי פון די בוימער אלס איהר טרונק.  
אין בראזיליען געפינט זיך א פויל-חיה, וועלכע האָט בלוז דריי נעגעל אין יעדען פוס.

די פּאַנצער חיות (אַרמאַדילען). — זיי געפינען זיך בלוז אין זיד-אַמעריקא. די דאָזיגע חיות זיינען באַדעקט מיט אַזעלכע האַרטע האָרענדיגע פּלאַטען אָדער פּאַנצערס. די מייסטע פון זייערע ספּעציעס קענען זיך אַזוי צונויפּציהען, דאָס זייער גאַנצער קערפּער איז פּאַלשטענדיג געשיצט דורך זייערע פּאַנצער-פּלאַטען. די אַרמאַדילען האָבען שטאַרקע נעגעל מיט וועלכע זיי קענען אויסגראָבען לעכער און הוילען אין דער ערד, וואו זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען. קיין שנייד-צייהנער האָבען זיי ניט, זיי האָבען



צייכנונג 198. — דער מוראַשקעס עסער.

בלוז באַק-צייהנער אין א זעהר גרויסע צאָהל. ביי מאַנכע ספּע-ציעס דערגרייכט די צאָהל ביז הונדערט. זייער הויפּט-שפּיץ באַשטעהט פון אינזעקטען, וועלכע זיי פּאַנגען.

די מוראַשקעס-עסער, וועלכע לעבען אין זיד-אַמעריקא, האָבען אין גאַנצען ניט קיין צייהנער. זייער קערפּער איז באַדעקט מיט האָר און האָבען אַ לאַנגען עק. זיי שפּייזען זיך הויפּטזעכליך מיט מוראַשקעס, וועלכע זיי פּאַנגען, אַרויסשטעקענדיג זייער לאַנגע, קלעפּיגע צונג, נאכדעם ווי זיי האָבען זיך אריינגעבראַכען אין אַ מוראַשקעס נעסט.

אין אַזיע און אין אַפּריקא געפינט זיך אַ גאַטונג מוראַשקעס-

עסער, וואָס זייער קערפּער און עס איז באַדעקט מיט גרויסע האַרטע האַרנדיגע שופּען, וועלכע ליגען איינע איבער די אנדערע, ווי שינדלען אויף אַ דאָך.

אין זיד־אַפּריקאַ געפינט זיך דער ערד־שוויין, וועלכער באַ־לאַנגט צו דער אַרדנונג פון די עדענטאַטען חיות. אויך ער נעהרט זיך מיט אינועקטען. דער ערד־שוויין האָט שטאַרקע גראַב־נעגעל, מיט וועלכע ער גראַבט די ערד, זיין קערפּער איז באַדעקט מיט האָר, ער האָט אַ לאַנגען קאַפּ, מיט אַ שוויין־ענהליכען שנוק און לאַנגע אויפגעשטעלטע אויערען.

די וואַל־פּיש — די אַרדנונג פון די זויג־חיות, וועלכע ווערען באַצייכענט מיט דעם נאָמען „וואַל־פּיש“ נעהמט אַרײַן אין זיך, אויך די דעלפינען, די ים־חזורים און די ים־קיה. גיט קוקענדיג אויף דעם, וואָס די אויסגערעכענטע חיות זיינען אין זייער אויסער־ליכען אויסזעהן עהנליך צו פּיש און זיינען פּאַלשטענדיגע וואַסער־חיות, געהערען זיי דאָך צו דעם קלאַס זויג־חיות. די וואַל־פּיש געבערען לעבעדיגע קינדער, וועלכע נעהרען זיך אין זייער יוגענד מיט דעם מילך פון זייער מוטער, וואָס זיי זויגען, זיי האָבען וואַרעם בלוט און זייער גאַנצער אָרגאַניזם האָט אַלע כאַראַקטעריסטישע סמנים פון די זויג־חיות.

אנדערע זאָאָלאָגען טיילען אײַן די זויג־חיות, וועלכע לעבען אין וואַסער אין צוויי אַרדנונגען: אין צ ע ט א צ ע ן צו וועלכע עס באלאנגען די וואַל־פּיש, דעלפינען און ים־חזורים, און אין ס י ר ע נ ע ן, צו וועלכע עס באלאנגען די ים־קיה. דער הויפּט־אונטערשייד צווישען די צעטאַצען און די סירענען באַשטעהט אין דעם, וואָס די ערשטע זיינען פּלייש־עסענדע חיות, (זיי נעהרען זיך מיט פּיש און מיט אַנדערע ים חיות), וועהרענד די צווייטע זיינען וועגעטאַריער, (זיי נעהרען זיך מיט ים־גראַז און מיט אַנדערע גרינסען). די מייסטע זאָאָלאָגען אָבער נעהמען אַרײַן די ים־קיה אין דער אַרדנונג פון וואַל־פּיש.




פון די ים־קיה עקזיסטירען איצט בלויז צוויי מינים: דער „מאַנאַטוס“ און דער „דונאַנג“. דער מאַנאַטוס לעבט ביי דעם מזרח ברעג פון אַמעריקאַ און ביי דעם מערב ברעג פון אַפּריקאַ, וועהרענד דער דונאַנג לעבט ביי די ברעגען פון דעם אינדישען אַקעאַן און ביי דעם צפון ברעג פון אויסטראַליען. די ים־קיה זיינען גרויסע אומגעלומפערטע חיות. דער מאַנאַטוס דערגרייכט

א לענג פון פונפצעהן פוס, וועהרענד דער דוגאנג דערגרייכט א לענג פון צוואנציג פוס. די ביינער פון דעם דוגאנג צייכענען זיך אויס מיט זייער באזונדערער הארטקייט.

די ים-קיה האָבען צוויי פּאָדערשטע לאַפעס, מיט וועלכע זיי שווימען. עס הייסט, אַז זייערע פּאָדערשטע פּיס האָבען זיך, צוליבע דעם אַרט לעבען וואָס זיי פּיהרען (לעבענדיג אין וואַסער), פּאַרוואַנדעלט אין שוויס-רודערס. קיין הינטערשטע פּיס האָבען זיי אין גאַנצען ניט. זיי האָבען אַ ברייטען, פּלאַטשיגען עק ווי אַ פּיש, אָבער אַנשטאַט דעם וואָס ביי אַ פּיש איז דער עק געוואַקסען אַזוי, דאָס ער שניידט דאָס וואַסער ווערטיקאַל ווען ער שווימט, איז דער עק ביי די ים-קיה אַזוי געוואַקסען, דאָס ער איז האָרזאָנטאַל צום וואַסער, ווען זיי שווימען. עס קומט אויס ווי זיי פּאַטשען דאָס וואַסער מיט זייער עק. דער קערפּער פּון די ים-קיה איז באַוואַקסען מיט קורצע, שיטערע האַרטע האָר. זיי האָבען פּלאַכע באַקצייהנער, וועלכע זיינען צוגעפּאַסט צום קייען, ווייל זיי געהרען זיך מיט גראָז און מיט אנדערע גרינסען, וועלכע דארפּען צוקייט ווערען, צום אונטערשייד פּון די וואַל-פּיש, דעלפּינען און ים-חזורים, וועלכע האָבען ניט קיין פּלאַכע באַקצייהנער צום קייען, ווייל זיי געהרען זיך מיט פּיש און מיט אנדערע ים-חיות, וועלכע זיי שליינגען.

די וואַל-פּיש, ווען זיי זיינען יונג, האָבען שפורען האָר אויף זייער קערפּער, ווען זיי וואַקסען אָבער אויס ווערען די האָר-שפורען פּאַרשוואַנדען. זיי האָבען בלוז צוויי פּאָדערשטע קורצע פּיס, וועלכע דיענען זיי אַלס שוויס-רודערס, קיין הינטערשטע פּיס האָבען זיי אין גאַנצען ניט. זיי האָבען אויך ניט קיין אויסערליכע אויערען. זייערע אויגען זיינען, אין פּאַרגלייך מיט זייער גרויסען קערפּער, זעהר קליין. די אויגען פּון רייזגע וואַל-פּיש, וועלכע דערגרייכען אַ לענג פּון אַכציג פּוס, זיינען ניט גרעסער ווי די אויגען פּון אַן אַקס. די נאָזלעכער פּון וואַל-פּיש, ביי אנדערע בלוז איין נאָזלעך, געפינען זיך אין דעם שטערען, און ווען דער וואַל-פּיש קומט אַרויס אויף דער אויבערפלעכע פּון וואַסער צו אַטעמען לופט, לאָזט ער אַרויס פּון זיינע נאָזלעכער אַדער נאָזלעך זי שטראָם איינגעאַטמעמטע לופט און דאַמף, וואָס שיסט הויך אין דער ליפט ווי אַ פּאַנטאַן.

די וואַל-פּיש קענען זיך האַלטען אונטער'ן וואַסער פּון צעהן



צייכונג 199. — (1 א ים-קוה; 2 א דעלפין; 3 א שפאט וואל-פיש א קאשעלאט).




ביז צוואנציג מינוטען און דאן מוזען זיי ארויסקומען אויף דער אויבערפלעכע זיך אָנצואַטעמען מיט לופט.

מאנכע פון די וואל־פיש, ווי די דעלפינען, שווערד־וואל־פיש, ברוין־וואל־פיש אָדער ים־חזרים, ווי זיי ווערען אויך גערופען, שפאט־וואל־פיש (קאשעלאָטען), האָבען צייהנער. דאָס איז מייס־טענס דער פאל ביי די קלענערע ארטען, אויסער דעם שפאט־וואל־פיש, וועלכער איז גאנץ גרויס. די גרעסערע ארטען אָבער האָבען ניט קיין צייהנער. ווען זיי זיינען יונג זיינען ביי זיי יא פאראן שפורען פון צייהנער, הגם זיי שניידען זיך קיינמאל ניט דורך דורך'ן פלייש פון זייערע יאסלעס. ווען זיי ווערען אָבער עלטער פארשווינדען אויך די שפורען פון זייערע צייהנער און זייער פלאץ ווערט פארנומען מיט אַ גרויסער צאָהל פישביין פלאטען, וועלכע ווערען אין דער אומגאנגס שפראך באַצייכענט אַלס די צייהנער פון די וואל־פיש. אין דער ווירקליכקייט אָבער זיינען די פישביין פלאטען ניט קיין צייהנער און ערפילען אויך ניט דעם צוועק פון צייהנער. די פישביין פלאטען, וועלכע די וואל־פיש האָבען אין זייער מויל, ווערט פון זיי באַנוצט אַלס זייערס, אויסצוויען דאָס וואסער פון זייער מויל, וואָס זיי האָבען אַרייַנגענומען פאנגענדיג זייער שפייז. די דאָזיגע וואל־פיש שווימען מיט זייער גרויסע, ריזיגע מויל אָפען און זיי פאנגען אויף דעם אופן זשעלאטען פיש, שנעקען, קליינע ראַקעס און אנדערע קליינע באַשעפענישען, וועלכע שווימען אַרום אין ים. דאן פארמאכען זיי זייער מויל, זייען דורך דאָס וואסער דורך די פישביין פלאטען און שליינגען אַראָפּ זייער רויב. די גרויסע, ריזיגע וואל־פיש, וועלכע צייכענען זיך אויס מיט זייערע ריזיגע גרויסע קעפּ און גרויסע מיילער, האָבען גראַד אַ פארהעלטניסמעסיגען גאנץ שמאָד לען שלונד. דער קאָפּ פון די גרויסע וואל־פיש פאָרנעמט אַן ערך אַ דריטעל פון זייער קערפער. עס הייסט, אַז ביי אַ וואל־פיש פון זעכציג פוס לאַנג איז דער קאָפּ אַן ערך צוואנציג פוס די לענג און די עפונג פון זיין מויל איז אין דער פּראָפּאָרציע פון דער גרויס פון זיין קאָפּ. אַזאַ וואל־פיש קען לייכט אין זיין מויל אַרייַננעמען אַ גרויסע חיה, אָבער זיין שלונד איז גראַד שמאָל, אַז ער קען אַפילו אַ מיטעל־גרויסען פיש ניט אַראָפּשלינגען. דער ריזיג גרויסער וואל־פיש איז דאָריבער געצוואונגען זיך צו שפייזען מיט קליינע ים־באַשעפענישען, וועלכע ער קען אַראָפּשלינגען מיט

ויון שמאָלען שלונד. די קלענערע אַרטען וואַל־פּיש, וועלכע האָבען צייהנער, ווי די דעלפּינען, ים חזרים און שווערד־וואַל־פּיש נעהרען זיך הויפטזעכליך מיט פּיש. אָפּט קומען זיי צו נאָהענט צום ברעג, וואָו דער פּיש־פּאַנג איז פאַר זיי לייכטער.

עס איז שוין פריהער באַמערקט געוואָרען, אַז די וואַל־פּיש געבערען לעבעדיגע קינדער, וועלכע זיי זויגען מיט זייער מילך ביז זיי וואַקסען אויס און קענען זיך אַליין באַזאָרגען מיט שפּיז. געווענהליך געבערט די נקבה פון די וואַל־פּיש איין קינד, גאַנץ זעלטען צוויי, און זי איז א טרייע מוטער. זי פאַרלאָזט ניט איהרע קינדער ביז זיי ווערען גרויס און קענען זיך אַליין באַזאָרגען. דאָס



צייכנונג 200. — (1) דער סקעלעט פון אַ ים־קוה; (2) דער סקעלעט פון אַ פּיש־בּיין וואַל־פּיש (אַהן קאַפּ). א, האַנט אָדער פּאַ־ דערשטיער פּוס; ב, די שפּורען פון הינטערשטען פּוס און פון היפּטען־בּיין. (3) דער שאַרבען און די פּיש־בּיין פון וואַל־פּיש; (4) דער שאַרבען און די צייהנער פון אַ קאַשעלאָט (שפּאַט־וואַל־פּיש).

בלוט פון די וואל-פיש איז ווארעם ווי ביי אלע אנדערע זויג-חיות. די ווארעמקייט פון זייער קערפער ווערט אויפגעהאלטען דורך א דיקען שיכט פעטס וואָס געפינט זיך אונטער זייער הויט און וואָס באַדעקט זייער קערפער פון אלע זייטען. פון דיווען פעטס שיכט ווערט עס געצויגען דער פיש-אוייל אָדער פיש-טראָן, ווען די וואל-פיש ווערען געפאנגען. פיש-טראָן און פישביין זיינען די צוויי הויפט-פראָדוקטען וואָס מען באקומט פון וואל-פיש. מאנכע פון די גרויסע זאָרטען וואל-פיש דערגרייכען א לענג פון דרייסיג ביז הונדערט פוס. די קלענערע זאָרטען דערגרייכען א לענג פון פינף ביז פונפצעהן פוס.

אן אינטערעסאנטער וואל-פיש, וועלכער באלאנגט צו די דעל-פינען, געפינט זיך אין דעם אייזים, דאָס איז דער „נארוואל“ אָדער איינהאַרן-פיש, ווי ער ווערט אויך גערופען. ביי די זכרים פון די דאָזיגע וואל-פיש וואקסט איינער פון די אויגען-צייהנער (דער לינקער) אויס אזוי גרויס, דאָס ער האָט דאָס אויסזעהן פון א רייזען האָרן. פון דעם קומט דער נאָמען „איינהאַרן-פיש“. דער דאָזיגער צאָהן וואקסט דאָס נאנצע לעבען פון דעם וואל-פיש און דערגרייכט אַפט א לענג פון 10 פוס.

די נאָגענדע חיות אָדער גריזונעס (ראָדענטען). — צו דער אָרדנונג פון די גריזונעס (ראָדענטען) באלאנגט א גרויסע גרופע קלענערע חיות, וועלכע זיינען כאַראַקטעריסטיש דערמיט, וואָס זייערע פאָדערשטע צייהנער זיינען אזוי געוואקסען און איינגע-אָרדענט, דאָס זיי קענען צוגריזשען און צושניידען מיט זיי ציעמליך האַרטע שטאָפּען. צו די גריזונעס באלאנגען די מייז, ראַצען, קראָליקעס, וועוורקעס, האָזען, ביבערס, פריירי-הינד און א גאנצע רייה אנדערע קליינע חיות. די דאָזיגע חיות האָבען לאנגע, געבויר-גענע, שאַרפע פאָדערשטע צייהנער, וועלכע זיינען אָפגעטיילט אויף א רעכטע שטרעקע פון זייערע באַק-צייהנער. די מייסטע פון זיי האָבען בלוז צוויי אויבערשטע אַזעלכע שנייד-צייהנער און צוויי אונטערשטע. מאנכע האָבען פיער אויבערשטע שנייד-צייהנער, אָבער קיין מאָל ניט מעהר, ווי צוויי אונטערשטע. באַק-צייהנער האָבען זיי מייסטענס פיער אויבערשטע און פיער אונטערשטע אויף יעדער זייט.

די פאָדערשטע צייהנער פון די גריזונעס זיינען באַזאָנדערס כאַראַקטעריסטיש דערמיט, וואָס זיי וואקסען אזוי לאנג ווי די

חיה לעבט. פון דער אויסוועניגסטער זייט זיינען די דאָזיגע צייהנער באַדעקט מיט אַ זעהר האַרטער עמאַליע, וועהרענר די אינעוועניגסטע זייט פון די צייהנער האָט ניט אַזאַ האַרטע עמאַליע. די אינעוועניגסטע זייט פון די צייהנער, הייסט עס, איז ווייכער ווי זייער אויסוועניגסטע זייט. דאָס פיהרט דערצו, אַז דורך דעם שטענדיגען גריזשען ווערען די צייהנער ביי זייערע ענדען אָפגעשליפען פון אינעוועניג מעהר ווי פון אויסוועניג, און זייערע ענדען באַקומען די פאָרמע פון אַ דלאָט מיט אַ שאַרף וואָס באַשטעהט פון דער האַרטער עמאַליע.

די גריזענס נעהרען זיך הויפטזעכליך מיט פלאַנצען, באַזונדערס מיט די האַרטע טיילען פון די פלאַנצען, ווי קאָרע, וואָרצלען, קערנער, ניס, א. א. ו. מאַנכע פון זיי, ווי דער ביבער, למשל, קען ביסלעכווייז מיט זיינע שאַרפע צייהנער דורכגריזשען אַ דיסקען בוים און איהם אָפשניידען פון זיין וואָרצלע.



ציכונג 201. — אַ ביבער.

דער ביבער איז אין אַלגעמיין אַן אינטערעסאנטע חיה. ער לעבט געוועהנליך נאָהענט צו אַ וואַסער און לייעבט זעהר שטארק אַרומצושווימען אין וואַסער, וואו ער פארבריינגט אַ גרויסען טייל פון זיין צייט. צווישען די פינגער פון זיינע הינטערשטע פיס האָט ער אַ שוויסהויט, זיין עק איז פלאַטשיג און באַדעקט מיט שופען, און ווערט פון איהם באַנוצט ביים שווימען אַלס רודער. זיין פעל איז באַדעקט מיט קורצע געדריכטע האָר און ווערט דאָריבער הויך געשעצט אַלס פעלץ-פעל. דער ביבער בויט זעהר קונציג אויס זיין הויז אין אַ הויץ, וואָס ער גראַבט אויס ביי דעם ברעג פון אַ טייך. ער בויט אויס קונציגע דאָמבעס פון שטיקער האַלץ, שטיי-


נער און בלאָטע דורך וועלכע ער באשאפט פון דעם וואסער-טייך פארשידינע סאזשעלעקעס, וואו ער שווימט ארום און באהאלט זיך, ווען ער ווערט פארפאלגט. דער ביבער ארבייט מייסטענס ביינאכט. ער שניידט אָפּט אָפּ מיט זיינע שארפע צייהנער א גאנץ גרויסען בוים, דורך דעם וואָס ער גריזשעט איהם ארום פון אַלע זייטען, ביז ער פאלט אַנידער. דאן גריזשעט ער אָפּ די צווייגען פון בוים און צושניידט איהם אין קורצע קלעצער פון וועלכע ער בויט זיינע דאָמבעס און זיינע הייזער. די קאָרע פון די בוימער באַ-נוצט ער פאַר זיין שפּייז. די נקבות פון די ביבערס געבערען, נאָך אַ שוואנגערשאפט פון זעקס וואָכען, צוויי אָדער דריי קינדער. די ביבערס לעבען געוועהנליך אין פאָרען, אין שטילערע געגענדען אויך אין פאמיליעס, און זיי גרייטען זיך אָן זייער שפּייז פון זומער אויף ווינטער.

די אָרדנונג פון גריזונעס, ווי שוין אויבען באַמערקט געוואָר-רען, ענטהאלט אַ גאנץ גרויסע גרופע פון חיות. די מייסטע פון זיי זיינען אויסגעצייכענטע שווימער, קלעטערער, שפּרינגער, לויפער און גרעבער און דערפון קען מען פארשטעהן, אז זייערע גליעדער זיינען זעהר גוט ענטוויקעלט. מען טיילט די גריזונעס איין אין פופצעהן פאמיליען, ווי פאָלגט :

האַזען. געדיכטע האָר, לאנגע אויערען, אַ קורצער עק, די הינטערשטע פיס לענגער ווי די פאָדערשטע, צו פינף פינגער אין די פאָדערשטע פיס און צו פיער פינגער אין די הינטערשטע, פיער פאָדערשטע צייהנער און צוויי אונטערשטע, צוועלף אויבערשטע באַק-צייהנער און צעהן אונטערשטע. די האַזען-פאמיליע, פון וועלכער עס לעבט איצט בלויז איין גאטונג (לעפוס, דער האָז) איז פארשפרייט אין נאָרד-אַמעריקא, אין אייראָפּא און אין נאָרד אַזיען, און ענטהאלט ארום 40 ספּעציעס.

פּייה-האַזען. די דאָזיגע פאמיליע איז זעהר עהנליך צו דער געוועהנליכער האַזען פאמיליע. זיי האָבען אָבער קירצערע אויערען, קירצערע הינטערשטע פיס, האָבען כמעט אין גאנצען ניט קיין עק און באַזיגען צוואנציג באַק-צייהנער. זיי לעבען אין הוילען, וועלכע זיי גראָבען פאַר זיך אויס און זיי זאַמלען אָן שפּייז פון זומער אויף ווינטער. זיי זיינען פארשפרייט אין די הויכע געגענדען אין נאָרד-אינדיען, נאָרד-אַמעריקא און סיביר. ווען זיי זיינען אין געפאָהר לאָזען זיי אַרויס אַ שטאַרקען פּייה. פון דעם קומט זייער

נאָמען „פּייה-האַזען“. פון דער גאנצער פאמיליע עקזיסטירט איצט בלויז איין גאטונג מיט אונגעפעהר צעהן ספעציעס. שטאַכעל-שוויינען. די חיות פון דער דאָזיגער פאמיליע האָבען אויף זייער רוקען און הינטערשטען טייל פון קערפער לאנגע און דיקע שטעכיגע האָר. זיי האָבען קורצע פיס מיט שאַרפע שטאַרקע נעגעל. זיי האָבען בלויז זעכצעהן באַק-צייהנער. זיי זיינען נאכט חיות, דאָס הייסט, זיי געהען אַרויס זוכען זייער שפּיז ביי נאכט. זיי לעבען אויף בוימער אָדער אין לעכער, וועלכע זיי



צייכנונג 202. — אַ שטאַכעל-שוויין.

גראָבען פאַר זיך אויס. זיי זיינען פארשפּרייט אין אַפריקאַ, דרום-אַזיע, דרום-אייראָפּא און אַמעריקאַ. עס עקזיסטירען היינט זעקס גאטונגען מיט 25 ספעציעס.

יס-חזורים' לעך. קליינע חיה' לעך מיט ברייטע אויערען, כמעט אין גאנצען אָהן אַן עק, דיקע, הארטע האָר, צו פיער פינגער אין די פאָדערשטע פיס און דריי פינגער אין די הינטערשטע מיט טעמפע נעגעל. זיי האָבען בלויז זעכצעהן באַק-צייהנער. זיינען פארשפּרייט אין זיד-אַמעריקאַ און אין צענטראַל אַמעריקאַ. די גרעסטע חיה פון דער דאָזיגער פאמיליע איז דער וואַסער-חזיר.

ער איז אונגעפעהר פיער פוס לאנג און נאָהענט פון צוויי פוס הויף. ער איז די גרעסטע חיה צווישען די גרוזנעס. ער איז אַן אויסגע- צייכענטער שווימער און נעהרט זיך מיט וואסער-פלאנצען און מיט קאָרע פון בויער. עס עקזיסטירען זעקס גאטונגען מיט אונגעפעהר 30 ספעציעס.

מיין און ראָצען. די מייסט באַקאנטע און איבעראל פאר- שפרייטעטע פון די נאָגענדע חיות (גרוזנעס) זיינען די מיין און ראָצען. ביידע באלאנגען צו איין פאמיליע, נאָר די ראָצען זיינען גרעסער געוואקסען און זייערע פיס זיינען דיקער און קענען גערע- כענט ווערען אַלס אומגעלומפערט אין פארגלייך מיט די שלאַנקע פיס פון מיין. ראָצען וואַקסען אויס ביז נאָהענט אַ פוס די לענג, וועהרענד מיין וואַקסען אויס בלויז ביז דריי פערטעל פוס די לענג. דער עק פון אַ ראַץ האָט פון 200 ביז 260 שופען-רינגעלעך, וועהר- רענד פון אַ מויז בלויז פון 120 ביז 180. די מיין האָבען פון 8 ביז 14 באַקציייהנער, אַ שפיציגען, מיט האָר באַוואַקסענעם שנוק און אַ לאַנגען שופיגען, רינגעלדיגען עק.

די מיין זיינען אַמאָל געווען פארשפרייט בלויז אין אייראָפּא, אָבער איצט זיינען זיי פארשפרייט איבער אַלע וועלט-טיילען. זיי זיינען אַהין געבראכט געוואָרען פון אייראָפּא דורך די שיפען, אין וועלכע די מיין מאַכען זיך גערען זייערע נעסטען.

די הויזמויז (מוס מוסקולוס) איז אַ גאַנץ קליינ באַשעפעניש, אונגעפעהר פון דריי ביז פיער צאָל (אינטשעס) די לענג מיט אַ נאַקעטען עק, וואָס איז אזוי לאנג ווי איהר קערפער. איהר פעל איז פון גרוי-שווארצען קאָליר מיט אַ געלבלעכער שאַטירונג. זי האָט פינף פינגערדיגע הינטערשטע פיס און פיער פינגערדיגע פאָ- דערשטע פיס. זומער-צייט פארלאָזט אָפט די הויזמויז איהר הויז- נעסט און געהט אַוועק זוכען איהר שפייז אין גערטנער און פעל- דער. סאַי אין הויז, סאַי אין פעלד מאַכען זיך די מיין זייערע נעסטען אין לעכער און הוילען וואָס זיי גראָבען אויס. זיי זיינען זעהר פלינק, לעכהאפט, זיינען גוטע שפרינגער און קלעטערער אָבער ניט קיין איבריגס גוטע שווימער. זיי קענען שווימען בלויז אַ קורצע שטרעקע און דאָס אויך מיט אנשטרענגונג.

די הויזמויז געבערט קינדער פיער-פינף מאָל אַ יאָהר. זי געבערט איהרע קינדער נאָך אַ שוואַנגערשאפט פון 22 ביז 24 טעג און זי געבערט יעדעס מאָל פון 4 ביז 8 מייזלעך. ווען די מייזלעך

ווערען געבארען זיינען זיי נאקעט, בלינד און היילפלאָז, אָבער זיי וואַקסען שנעל אויס.

עס זיינען אויך פאַראַן ווייסע מייז און פון אַנדערע קאָלירען, וועלכע לעבען אין וועלדער און פעלדער.

די מייז עסען אויסער פלאַנצען, קערנער, ניס, און אַנדערע וועגעטאַרישע שפייזען, אויך פלייש־שפייזען. די הויז־מייז עסט כמעט אַלעס, וואָס זי געפינט אין הויז און צוגרויזשעט ביכער, פאַפירען, האַלץ, קליידער, א. א. וו.

עס עקזיסטירען אַרום 30 גאַטונגען מייז מיט 250 ספּעציעס. כראַס־מייז. זיי זיינען עהנליך צו די געוועהנליכע ראַצען מיט דער פאָרם פון זייער קערפּער און מיט זייער עק. זיי אונטער־שיידען זיך אָבער שטאַרק פון זיי מיט זייער פעל. די האָר פון זייער פעל איז טיילווייז האַרט און דורכגעמישט מיט באַרשט־האַר און שטאַכעלען. זיי האָבען צו פינף פינגער אין זייערע פיס און זעכצען באַקצייהנער. מאַנכע גאַטונגען האָבען בלוין צוועלף. זיי זיינען הויפטזעכליך פאַרשפּרייט אין זיד־אַמעריקא, זיי געפינען זיך אָבער אויך אין אַפריקא און אין זיד־אַיראָפּא. עס עקזיסטירען אַרום צוואַנציג גאַטונגען מיט אונגעפּעהר 50 ספּעציעס.

**האַזען־מייז.** זיי האָבען לאַנגע, ווייכע און וואָליגע האָר, אַ האָריגען עק, לאַנגע, ברייטע אויערען און הינטערשטע פיס לענגער ווי די פאָדערשטע. זיי לעבען געזעלשאַפטליך, מייסמענס אויף בערג און זיינען פאַרשפּרייט אין זיד־אַמעריקא. עס עקזיסטירען פון זיי דריי גאַטונגען מיט זעקס ספּעציעס.

**טאַשען־מייז.** קליינע חיה־לעך, וועלכע האָבען טאַשען אָדער קעשענעס פון ביידע זייטען פון זייערע באַקען, אין וועלכע זיי זאַמלען אַן שפייז און ברוינגען אין זייערע נעסטען. זיי האָבען צו פינף פינגער אין זייערע פיס און זעכצען באַקצייהנער. עס עקזיסטירען זעקס גאַטונגען און 25 ספּעציעס. לעבען אין נאָרד־אַמעריקא.

**טאַשען־ראַצען.** זיי האָבען עהנליכע טאַשען אויף זייערע באַקען ווי די טאַשען־מייז. זיי האָבען אַ דיקען קערפּער, אַ דיקען קאָפּ, אַ קורצען האַלז, אַ קורצען עק, קורצע פינף־פינגערדיגע פיס מיט לאַנגע און שטאַרקע נעגעל אויף די פינגער פון די פאָדערשטע פיס. זיי זיינען פאַרשפּרייט אין נאָרד־אַמעריקא, זיי מאַכען זיך



זייערע נעסטען אונטער דער ערד, ווי קראָטען, און נעהרען זיך מיט וואַרצלען.

שפּרינג-מייז. זיי האָבען זעהר לאַנגע הינטערשטע פּיס, וועלכע זיינען עהנליך צו די פּיס פון א פּויגעל אין זייער קאָנ-סטרוקציע, וועהרענד די פּאָדערשטע פּיס זיינען ביי זיי גאנץ קורצע. די הינטערשטע פּיס האָבען מייסטענס בלוז צו דריי פינגער, וועהרענד די פּאָדערשטע — צו פינף. זיי האָבען א שטארקען עק, אויף וועלכען זיי שפּאַרען זיך אָן ביים שפּרינגען. זיי זיינען אויס-געצייכענטע שפּרינגער. זיי האָבען פון צוועלף ביז זעכצען באַק-צייהנער. עס עקזיסטירען דריי גאַטונגען מיט אונגעפעהר צוואַנציג ציג ספּעציעס. זיינען פּאַרשפּרייט אין די מזרח געגענדען, וועלכע זיינען נאָהענט צום מיטעללענדישען ים, אין אַסטיאָנידען און אין נאָרד-אַמעריקאַ.

קראָט-מייז. — זיי זיינען עהנליך צו די געוועהנליכע קראָטען. די אויערען און אויגען זיינען ביי זיי איינגעגראָבען אין דער הויט. האָבען קורצע פינף פינגערדיגע פּיס מיט שטארקע גראָב-נעגעל. זיי לעבען אונטער דער ערד אין הוילען, וועלכע זיי גראָבען אליין אויס. עס עקזיסטירען זעכען גאַטונגען מיט אונגעפעהר צוואַנציג ספּעציעס און זיי זיינען פּאַרשפּרייט אין זיד-איראָפּאַ, אין וועסט און זיד אַזיע און אין אַפּריקאַ.

וואַסער-מייז. זיי האָבען אַ קורצען שנוק, א קורצען עק, קורצע אויערען און צוועלף באַק-צייהנער. זיי לעבען אונטער דער ערד, אין לעכער, וועלכע זיי גראָבען זיך אויס, נאָהענט פון א וואַסער, וואו זיי לייעבען ארומצושווימען. עס עקזיסטירען זעקס גאַטונגען מיט זעכציג ספּעציעס און זיינען פּאַרשפּרייט אין אַלע וועלט טיילען, אויסער אויסטראַליע און פּאָלינעזיע.


שלאָף-מייז. לויט זייער אויסערליכען אויסזעהן זיינען זיי עהנליך צו וועווערקעס, אָבער לויט דער קאָנסטרוקציע פון זייערע ביינער זיינען זיי נעהנטער צו די מייז. זיי האָבען 16 באַק-צייהנער. זייערע הינטערשטע פּיס האָבען צו פינף פינגער, וועהרענד זייערע פּאָדערשטע פּיס — פייער. זייער עק איז באַדעקט מיט געדיכטע האָר. זיי זיינען נאכט-חיות. זיי נעהרען זיך מיט פּלאַנץ צען, פרוכטען און אויך מיט אינזעקטען, אייער, א. ז. וו. ווען עס קומט אָן דער ווינטער פּאַלען זיי אַרײַן אין א טיעפען שלאָף, ביז עס קומט אָן דער פּריהלינג. דערפון קומט זייער נאָמען „שלאָף-“

מייז". עקזיסטירט בלויז איין גאטונג מיט צוועלף ספעציעס. זיינען פארשפרייט אין אפריקא, אין אייוואפא און אזיע. וועווערקעס. צווישען די מעהר באקאנטע נאָגענדע חיות (גריזונעס) קענען אויך גערעכענט ווערען די וועווערקעס. זיי זיי פארשפרייט איבער אלע וועלט-טיילען, אויסער אויסטראליע, מאַדאַגאַסקאַר, פּאָלינעזיע און וועסט-אינדיען. זיי צייכענען זיך אויס מיט זייערע גרויסע האַריגע עקען. זיי זיינען פלינק, לעב-האַפטיג און אויסגעצייכענטע קלעטערער. זיי לעבען מייסטענס אויף בוימער. מאַנכע פון זיי גראָבען אויס היילען אין דער ערד, וואו זיי איבערשלאָפען דעם ווינטער. עס עקזיסטירען אַכט גאַטונגען מיט 180 ספעציעס.

ביי מאַנכע גאַטונגען וועווערקעס בייט זיך דער קאָליר פון די האַר אין זומער און אין ווינטער. די קאָלירען פון די פארשידענע גאַטונגען און אַרטען וועווערקעס זיינען אין אַלגעמיין פארשידען. עס זיינען פאראן ברוין-רויטליכע, העל-גרוי, ווייס-גרוי, ווייסע און אויך שווארצע מיט ווייסע בייכער. זיי עסען קערנער, ניס, קנאַספען און זיי פאנגען אויך פויגעל און קליינע זויגחיות, וועלכע זיי באַנוצען פאַר זייער שפייז. זומער זאַמלען זיי אָן שפייז אויף ווינטער און זיי באַהאַלטען דאָס אָנגעזאַמעלטע שפייז אין לעכער פון בוימער אָדער אונטער שטיינער. דעם ווינטער פאַרבריינגען זיי מייסטענס אין זייערע נעסטען, וועלכע זיי בויען זיך אויס פון מאַך אין די ווינקלען פון צווייגען, אָדער אין לעכער פון בוימער. עס איז אויך פאראן אַ מין וועווערקע, וועלכע האָט אַ פאַלכ-הויט, און זי קען מיט איהר הילף מאַכען ווייטע שפרונגען פון איין בוים צום צווייטען. עס זעהט אויס ווי זי וואָלט פליהען, און זי ווערט דאָריבער גערופען פליה-וועווערקע. באַמט אָבער פליהט זי ניט, נאָר זי שפרינגט.

די וועווערקעס פאַרען זיך געוועהנליך אין מערץ. אין פיער וואָכען נאָך דער פאַרונג געבערט די נקבה פון 3 ביז 7 וועווערקע-לעך, וועלכע זיינען בלינד און הילפלאָז. זיי זייגען פיער וואָכען צייט און אין הערבסט זיינען זיי שוין כמעט אַזוי גרויס ווי זייערע עלטערען. די וועווערקעס געבערען צוויי מאָל אין יאָהר, אין אַפּריל און אין יוני.

די בייכער. פון דער פאַמיליע בייכער עקזיסטירט איצט בלויז איין גאַטונג, אונטער דעם זאָלאָגישען נאָמען „קאַסטאַר“, וועלכער



צויכנונג 203. — גרוזשענדע חיות. (1) דער שאַרבקן און די שנייד-צייהנער פון אַ גרוזשענדע חיה; (2) אַ געשמריפטע וועווערקע; (3) אַ מויז; (4) אַ פליהענדע וועווערקע; (5) אַ שפּרינג-מויז; (6) אַ לעמפערט-וועווערקע; (7) אַ גרויע וועווערקע; (8) אַ גאַפער מיט באַקען-קעשענס (אַן אַמעריקאַנער גרוזשענדע חיה'לע); (9) אַ פּרוייע הונט (אַן אַמעריקאַנער גרוזשענדע חיה'לע).

איז שוין אויבען באשריבען געוואָרען. די גאטונג באשטעהט פון צוויי ספעציעס.

עס זיינען אמאָל געווען מעהר גאטונגען און ספעציעס פון די נאָגענדע חיות, אָבער זיי זיינען אויסגעשטאָרבען.

די אינזעקטען-עסער (אינזעקטיוואָרען). צו דער אָרדנונג „אינזעקטען-עסער“ באלאנגט א גאנצע רייה קליינע זויגחיות, וועלכע זיינען אין פיעלע הינזיכטען עהנליך צו די גריזונעס, זיי האָבען אָבער ניט די אייגענטימליכע פאָדערשטע שנייד-צייהנער, מיט וועלכע די גריזונעס צייכענען זיך אויס. עס איז אויך פאָראַן אַן אונטערשייד צווישען די צוויי אָרדנונגען אין דער קאָנסטרוקציע פון זייער סקעלעט. ביי די גריזונעס פעהלט דער שליסעל-ביין (דער ביין וואָס געהט פון האַלז ביי דער פלייצע צום ברוסטביין) אָדער ער איז ביי זיי ניט ענטוויקעלט, וועהרענד די אינזעקטען-עסער האָבען א שליסעל-ביין.

דעם נאָמען „אינזעקטען-עסער“ האָט די אָרדנונג באַקומען, ווייל די חיות, וועלכע באלאנגען צו דער דאָזיגער אָרדנונג געהרען זיך הויפטזעכליך מיט אינזעקטען. די אינזעקטען-עסער האָבען אַלע דריי סאָרטען צייהנער: שנייד-צייהנער, אויגען-צייהנער און באַק-צייהנער. די באַק-צייהנער זיינען אָבער ביי זיי ניט פלאַך, נאָר האָבען קליינע אַרויסגעשטארצטע שפיצען, וועלכע זיינען צוגע-פאסט צום צורייבען די אינזעקטען.

די מייסטע אינזעקטען-עסער זיינען פארשפרייט איבער אַלע וועלט-טיילען, אויסער אין אויסטראַליע און זיד-אַמעריקא. זיי ווערען איינגעטיילט אין מעהרערע פאַמיליעס, פון וועלכע די קראַץ-טען און די שפיץ-מייז זיינען די וויכטיגסטע.

די קראַטען האָבען קורצע פינף-פינגערדיגע פיס, וועלכע זיינען באַזאָרגט מיט שטאַרקע קרומע נעגעל צוגעפאסט צום גראַץ-בען. זייער קערפער איז באַדעקט מיט קורצע זיידענארטיגע האַר, קיין אויסערליכע אויערען האָבען זיי ניט און זייערע אויגען זיינען אָדער זעהר קליין אָדער זיי זיינען אין גאנצען באהאַלטען אין זייער פעל און זיי זעהען אויס ווי זיי וואַלטען איבערהויפט קיין אויגען ניט האָבען. זיי האָבען א שפיציגען שנוק און א קורצען שפיר-ציגען עק.

די קראַטען זיינען נאכט-חיות, זיי לעבען אין הויילען, וועלכע זיי גראָבען אונטער דער ערד און זיי שפייזען זיך מיט די אינזעקט-


טען און ווערן, וועלכע זיי געפינען אין דער ערד, גראָבענדיג זייערע לאַנגע הוילען. זיי עסען אָבער אויך קליינע זייג-חיות, פויגלען, פּרעש און שנעקען, ווען זיי קענען זיי נאָר פּאַנגען.

דער קראָט פּאַנגט אָן צו גראָבען זיין הויל מיסמענס פון אזא פּלאַץ צו וועלכען עס איז שווער צוצוקומען, ווי פון אונטער א בוים-וואַרצל, פון אונטער אַ שטיין, א. א. ז. אונטער דער ערד, אַרום צוויי פּוס טיעף בויט ער אויס זיין הויז און בעט עס אויס מיט מאָך און בלעטער. ער גראָבט מיט אַן איבערראשענדע שנעל-קייט און ער קען אויך גאַנץ גוט לויפען, ווען עס קומט איהם אויס אַרויסצוקומען אויף דער אויבערפּלעכע. אין די זומער מאָנאַטען קומט ער אָפט אַרויס ביי נאַכט פון אונטער דער ערד צו פּאַנגען פּרעש, מייז, שנעקען און פויגלען. ביי טאָג קומט ער זעלטען אַרויס אויף דער ווייסער וועלט. ער איז זעהר פּרעסעריש, רויט בעריש און בלוט-דרושטיג. ער לעבט איינזאַם, און ווען ער באַגעט גענט זיך מיט אַן אנדער קראָט פּאַנגט זיך אָן צווישען זיי א בלויט טיגער קאַמף ביז איינער פאַלט אין שלאַכט און ווערט אויפגעגעסען פון דעם זיענער. ווען עס קומט אָן דער ווינטער גראָבט ער זיך איין טיעפער אין דער ערד און פּאַנגט דאָרטען די ווערן און אינוועד טען, וועלכע גראָבען זיך איין אין דער ערד זיך צו שיצען פון דער ווינטער קעלט. ער זאַמעלט זיי אָן אין גרויסע מאַסען מעהר וויפיעל ער קען אויפּעסען איבער'ן ווינטער. די נקבה געבערט, נאָך א פיער-וואָכטיגער שוואַנגערשאַפט, פון דריי ביז פינף קינדער, וועלכע געהרען זיך מיט זייער מוטערס מילך און וואַסען שנעל אויס.

די שפּיץ-מייז זיינען אין זייער אויסערליכען אויסזעהן זעהר שטאַרק עהנליך צו געוועהנליכע מייז. אין דער ווירקליכקייט אָבער איז דער אונטערשייד צווישען זיי זעהר אַ גרויסער. פון די אינזעקטען-עסער זיינען די שפּיץ-מייז מעהר פון אלע אנדערע מינים פאַרשפּרייט איבער דער ערד. די צווערג-שפּיץ-מייז איז ניט מעהר ווי אַנדערטהאַלבען צאָל די לענג שוין מיט איהר עק צוזאַמען. זי איז די קלענסטע זייג-חיה.

אין אפריקא געפינט זיך אַ שפּיץ-מייז, וועלכע האָט לאַנגע הינטערשטע פיס ווי אַ קאַנגאַרו, און אַ לאַנגען העלפּאַנט-ענהליכען נאָז. זיי ווערען דאָריבער גערופען „העלפּאַנט-שפּיץ-מייז“. די שפּיץ מייז געהרען זיך הויפטזעכליך מיט אינזעקטען. די מייסטע פון זיי זיינען נאַכט-חיות.

דער יאָזשיק (איגעל) באַלאַנגט אויך צו די אינזעקטען־עסער. דער אויבערשטעמער טייל פון דעם קערפער פון דעם יאָזשיק איז באַדעקט מיט האַרטע שטעכיגע שפּילקעס און ער קען זיך צו־נויפֿדרעהען אין אַ קנויל, ווען ער ווערט אָנגעגריפען. זיינע שטע־בעדיגע שפּילקעס איז זיין בעסטער שוץ. ווען מען באַגיסט איהם מיט וואַסער, אָדער ווען מען בלאָזט אויף איהם רויך פון טאַבאַק ציהט ער זיך אויס. דער יאָזשיק, וואָס לעבט אין מאַראַגאַסקאַר האָט אָבער ניט די פּעהיגקייט זיך ציניופּצודרעהען אין אַ קנויל. דער יאָזשיק איז שטאַרק פאַרשפּרייט אין אייראָפּא, באַזונד־דערס אין רוסלאַנד. ער מאַכט זיך זיין נעסט אין לעכער פון בוי־מער, אין קופּעס מיסט אָדער אין לעכער פון ווענט. אָפט גראָבט ער זיך אויס אַ הויל אין דער ערד און בעט זי אויס מיט בלעטער, מיט שטרוי און מיט היי. ער לעבט געוועהנליך איינזאַם און



צייכונג 204. — 1 אַ שאַרבען און צייהנער פון אַן אינזעקטען־עסנדיגע חיה; 2 אַ קראַט; 3 אַ ריסעל־חיה/לע; 4 אַ שפּיץ־מוז; 5 אַ יאָזשיק.

זוייזט זיך זעלטען ביי טאָג. ניט אַכטענדיג וואָס ער האָט פאַר-  
העלטניסמעסיג גרויסע אויגען זעהט ער אָבער דאָך ניט איבריגס  
גוט. דערפאַר אָבער האָט ער זעהר א שארפען געהער. ביי טאָג  
שלאָפט ער, נאָר ווען עס ווערט אווענד לאָזט ער זיך אַרויס אויף  
יאָג. ער פאנגט אינועקטען, רעגען־ווערים, מייז, פרעש, קליינע  
פויגלען און שלאנגען. דער ביס פון גיפטיגע שלאנגען שארט  
איהם ניט. ער עסט אויך שפּאַנישע פליגען, וועלכע זיינען זעהר  
גיפטיג פאַר אַנדערע חיות. ער עסט פרוכט.

די יאָזשיקעס פאַרען זיך אין דער צייט פון צווישען ענדע  
מערץ ביז אַנפאַנג יוני. די נקבה געבערט, נאָך א שוואַנגערשאפט  
פון זיבען וואָכען, פון דריי ביז זעקס קינדער, וועלכע וואקסען אין  
פאַרלויף פון אַ אַהער פאַלשטענדיג אויס. איידער עס קומט אָן דער  
ווינטער שלעפט ער אָן אין זיין נעסט שטרוי, היי, בלעטער און  
מאָך און ער פאנגט זיך אָן אויף זיי קייקלען ביז ער מישט אַלע  
צונויפגעשלעפטע מאַטעריאַלען גוט צוזאַמען, דאן גראַבט ער זיך  
אין זיי איין און שלאָפט ביז מערץ.

די פלאַטער־חיות (כיראַפּטערען). — צו דער אָרדנונג  
„פלאַטער־חיות“ באַלאַנגט אַ ציעמליך גרויסע גרופע זויג'חיות,  
וועלכע צייכענען זיך אויס דערמיט, וואָס זיי קענען פליהען ווי  
פויגלען. דאָס זיינען די פלעדער־מייז, די פלעדער־הינד, די פלע-  
דער־פוקסען און מעהרערע אַנדערע.

עס זיינען שוין אויך פריהער דערמאָהנט געוואָרען מאַנכע  
זויג'חיות, וועלכע האָבען די פעהיגקייט צו מאַכען פליהענדע באַווע-  
גונגען, ווי די פליה־וועורקע, למשל. אָבער אין דער ווירקליכקייט  
זיינען זיי ניט קיין פליהענדע חיות. זיי האָבען בלויז אַזאַ פאלכ-  
הויט, וואָס ניט זיי די מעגליכקייט צו מאַכען גרויסע שפרונגען פון  
איין בוים צום צווייטען און עס זעהט אויס, ווי זיי וואָלטען פליהען.  
די פלאַטער־חיות זיינען אָבער אמת'ע פליהער, זיי פליהען פונקט  
ווי פויגלען. אין אַלע אַנדערע באַציהונגען זיינען זיי נאָהענט צו  
די אינועקטען־עסער, און מאַנכע זאָלאָגען רעכענען זיי אויך אריין  
אין דער אָרדנונג פון די אינועקטען־עסער.

די פלאַטער־חיות ווערען איינגעטיילט אין מעהרערע פאַמיל-  
ליען, נאַטונגען און ארטען (ספּעציעס), אָבער די איינטיילונג איז  
ניט אין גאַנצען קיין זיכערע. מען ווייס פון אונגעפעהר 400 פאַר-  
שידענע ארטען פלעדער־מייז, פלעדער־הינד, פלעדער־פוקסען, א.

אז. וו. אָבער זייער איינטיילונג אין פאמיליען און אין גאטונגען  
איז ניט ביי אלע זאָאלאָגען די גלייכע.

אין אלגעמיין ווערען די פלאטער־חיות איינגעטיילט אין צוויי  
הויפט־אפטיילונגען: אין אינזעקטען־עסער (אינזעקטיוואָרען) און  
אין פרוכטעסענדע (פרוגיוואָרען).

ביי די פלאטער־חיות זיינען די פאָדערשטע פיס פיעל לענגער  
ווי די הינטערשטע. די פינגערס פון די פאָדערשטע פיס, אויסער  
דער גראָבער פינגער, זיינען זעהר לאנגע און זיי זיינען פארבונדן  
דען איינע מיט די אנדערע דורך א הויט. די דאָזיגע הויט פאר  
בינדעט אויך די פאָדערשטע פיס מיט די הינטערשטע און איז פאר  
בונדען מיט די זייטען פון קערפער. מיט דער הילף פון דער דאָזיגער  
גער הויט קענען עס די פלאטער־חיות פליהען אזוי ווי פויגלען מיט  
זייערע פליגלען. דער קערפער פון די פלאטער־חיות איז באדעקט  
מיט האָר, די פליה־הויט זייערע איז אָבער נאָקעט און זעהט אויס  
ווי לעדער. זייערע זויג־דריזען געפינען זיך אויף זייער ברוסט  
און זייערע קינדער האַלטען זיך פעסט ביי זייער ברוסט, ווען זיי  
פליהען.

די פלאטער־חיות זיינען געוועהנליך נאכט־חיות. ביי טאָג  
פארשטעקען זיי זיך אין זייערע נעסטען, הענגען זיך אָן אויף עט  
וואס מיט זייערע הינטערשטע פיס, מיט'ן קאָפּ אַראָפּ און ווארטען  
ביז דער אווענד קומט אָן, ווען זיי לאָזען זיך אַרויס אויף געיעג.  
דער חוש הראיה איז ביי זיי שוואך ענטוויקעלט, דערפאר אָבער  
האָבען זיי א שארפען חוש השמיעה און א באַזונדערס שטארק ענט  
וויקעלטען חוש המשוש (טאָפונגס אָדער באַריהרונגס־געפיהל).  
דעם שארפען חוש המשוש האָבען זיי דורך זייער פליה־הויט, וועלכע  
איז דורכגעוועבט מיט זעהר פיעל נערווען. מיט זייער פליה־הויט  
קענען זיי דערפיהלען די נאָהנטקייט פון גאנץ קליינע גענענשטענדע  
ניט באַריהרענדיג זיי מיט זייער קערפער. בלינד־געמאכטע פלעך  
דער־מיין מיידען אויס מיט דער גרעסטער פאָרויזכטיגקייט דינע  
פעדים אין דער לופט, זיי דערפיהלען זיי פון דער ווייטענס.

פלעדער־מיין. — די מייסט באַקאנטע פון די פלאטער־חיות  
זיינען די פלעדער־מיין. זיי האָבען קליינע אויגען, גרויסע אויער  
רען, וועלכע זיינען אינוועניג פארשטעלט מיט קלאַפען (דעקלעך).  
די מייסטע פון זיי זיינען ווינטער־שלאָפענדע. ווען עס קומט אָן  
דער ווינטער פאַלען זיי אַרײַן אין א טיעפען שלאָף און ווען עס



קומט דער פריהלינג ערוואַכען זיי. עס זיינען אָבער אויך פאַראַן מאַנכע גאַטונגען, וועלכע פליהען אַוועק איבער ווינטער אין די וואַרימע געגענדען.


עס זיינען פאַראַן פלעדער־מייז, וועלכע האָבען אויף זייער נאָז אַרום די נאָז־לעכער אַזאַ בלאַט־פערמיגע הויט, זיי ווערען דאַריבער גערופען „בלאַט־נעזער“. זיי נעהרען זיך הויפט־זעכליך מיט אינע־זעקטען. אַ גרויסער טייל פון זיי אָבער זיינען בלוט־זויגער. זיי באַפאַלען פערר, קיה, עופות און אויך מענשען, מאַכען אַ קליינע, פלאַכע וואונד אין דער הויט, וועלכע מען פיהלט קוים, און זיי זויגען דורך איהר דאָס בלוט פון זייער קרבן. דאָס בלוט וואָס זיי זויגען אויס איז אָבער ניט אַזוי פיעל, אַז דער בלוט־פאַרלוסט זאָל ווערען געפעהרליך. מען רופט די דאָזיגע פלעדער־מייז מיט דעם נאָמען „וואַמפירען“.

אַ זעהר גרויסע פלעדער־מייז איז דער וואַמפיר פון בראַז־זיליען. זי איז אומגעפעהר צוויי פוס לאַנג און אומגע־פעהר צוויי און אַ האַלב פוס ברייט (דאָס הייסט פון איין שפיץ פליגעל ביז'ן צווייטען). זי האָט אַ דיקען, לאַנגען קאָפּ מיט אַן אויסגעשטעלטען שנוק, גרויסע לאַנג־רונדע אויערען מיט אַ לאַנג־צעטען־פערמיגע קליינע הויט־בלאַט אויפ'ן נאָז. איהר פעל איז אויבען דונקל־ברוין, אונטען גרוי־ברוין מיט אַ געלביכער שאַטי־רונג און איהר פליה־הויט איז ברוין. זי נעהרט זיך הויפט־זעכליך מיט אינזעקטען און פרוכטען און, ווי אונטערזוכונגען און פאָרשונג גען האָבען באַזייזן, באַלאַנגט זי ניט צו די בלוט־זויגענדע פלעד־דער־מייז. דער נאָמען „וואַמפיר“ איז איהר, אַלזאָ, געגעבען גע־וואָרען דורך אַ טעות.

אין עגיפטען זיינען פאַראַן פלעדער־מייז, וועלכע האָבען דעם נאָמען „קלאַפ־נעזער“, צוליב זייער אייגענאַרטיגען נאָז. זיי זיי־גען קליינע חיות, אומגעפעהר צוויי צאָל אין די לענג און 8 צאָל די ברייט פון איין שפיץ פליגעל ביז'ן צווייטען. זיי האָבען אַ לאַנגען, זינעם עק, ווי פון אַ מייז און זייער קערפער איז באַדעקט מיט לאַנגע, העל־גרויע האָר. זיי לעבען אין גרויסע מחנות אין הוילען און אין־די לעכער פון די מויערען.

אין אייראָפּא זיינען פאַראַן פלעדער־מייז, וואָס אַרום זייער נאָז האָבען זיי אַזאַ הויט, וואָס איז עהנליך צו אַ פאָדקאָוע. מען רופט זיי דאַריבער „פאָדקאָוע נעזער“. די קלאַפ־ען (דעקלעך)

אין זייערע אויערען זיינען קליין און ניט ענטוויקעלט. זייער פליההויט איז ברייט אָבער קורץ. זיי האָבען אויך אַ קורצען עק. זיי לעבען אין גרויסע מחנות אין הוילען און אין לעכער פון מויער רען. זיי זיינען פון אַ גרוי־ווייסליכען קאָליר, נעהרען זיך מיט אינזעקטען און זיינען אויך בלוט־וויגער. זיי באַפאַלען טויבען ווי אויך אנדערע פלעדער־מייז און זייגען זייער בלוט. אין ווייניגער פאלען זיי אַרײַן אין אַ לאַנגען טיעפען שלאָף. זיי זיינען אין אַלגעמיין ניט קיין איבריגס גוטע פליהער.



צייכונג 205. — אַ געווענליכע פלעדער־מייז.

מעהר פארשפרייט זיינען די פלעדער־מייז, וועלכע האָבען ניט קיין בלאט־פערמיגע הויט איבער זייער נאָז. מען רופט זיי „גלאט־געזער“. זיי זיינען פארשפרייט אין אַלע וועלט־טיילען, אויסער אין די קאלטע געגענדען. זיי לעבען געוועהנליך אין איינזאמע, דונקעלע ערטער, אָפט אויך אין וועלדער צווישען די געדיכטע צווייגן פון די בוימער. זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אין הוילען, אין שפאַלטען פון פעלזען, אין חורבות, א. א. ו. זיי לעבען אין קלענערע אָדער גרעסערע מחנות, באַזונדערס קלייבען זיי זיך צונויף אין גרעסערע מחנות פאַר זייער ווינטער־שלאָף. דער ווינטער־שלאָף פאנגט זיך ביי זיי אָן פריה אין הערבסט און ענדיגט זיך ביז

שפעט אין פריהלינג. די מייסטע פון זיי פליהען ארויס פון זייערע לעכער אין דער צייט פון בין השמשות (פארנאכט, דעמערונג) און אין די ערשטע נאכט־שטונדען. פון האלבע נאכט ביז אין דער פריה רוהען זיי. אין פריהען מאָרגען פליהען זיי ווידער ארויס אויף אַ קורצע צייט אויף געיעג. זיי זיינען אויסגעצייכענטע פליהער און קענען אויך גוט קלעטערען, זיי געהען אָבער אויף דער ערד זעהר אומגעלומפערט. זיי נעהרען זיך מיט אינזעקטען, ווי נאכט שמעטערלינגען, זשוקעס, א. א. וו. זיי לאָזען אָפט ארויס אַ פיי־פענדען דורכדרינגענדען געשריי, ווען זיי ווערען פארפאלגט.

א גוט באקאנטע פלעדער־מויז איז די „אויערען־פלעדער־מויז“. זי איז אומגעפעהר דריי צאָל לאַנג, צעהן צאָל ברייט (פון איין שפיץ פליגעל ביז'ן צווייטען) און האָט גרויסע אויערען, וועלכע זיי גען אומגעפעהר אַנדערטהאלבען צאָל די לענג. איהר פעל איז גרוי־ברוין און איהר געזיכט איז ביז'ן ראנד פון איהרע נאָזלעכער באַוואַקסען מיט לאַנגע האָר. זי מאכט זיך גערען איהר נעסט נאָהענט פון מענשליכע וואָהנונגען. זי פליהט אַרום ביז שפעט אין דער נאכט. זי פליהט הויך אָבער ניט זעהר שנעל. זי פליהט אַרום אין וועלדער, אין פרוכט־גערטנער און אין בוימער־אלעען. ביי טאָג שלאָפט זי. ווען עס קומט אָן דער ווינטער, פארשטעקט זי זיך אין אַ תורבה אָדער אין אַ לאָך פון אַ בויס און שלאָפט ביז שפעט אין פריהלינג.

עס זיינען פאראן פלעדער־מויז, וועלכע פליהען ארויס אויף געיעג נאָך פאַר זוך־אונטערגאנג. מען רופט זיי „פריה־פליהער“. זיי פליהען גאנץ הויך און לעבען מייסטענס אין וועלדער. זיי זיינען זעהר פרעסיג, און האָבען אַ לאַנגען ווינטער־שלאָף.

די „צווערן־פלעדער־מויז“ איז קליין געוואקסען, אונגעפעהר צוויי און אַ האַלב צאָל די לענג און אַן ערך זיבען צאָל די ברייט. זי פליהט אַרויס בלויז ביי נאכט. זי פליהט זעהר געשיקט און לעבט אין גרויסע מחנות, באַזונדערס אין דער צייט פון ווינטער־שלאָף, ווען זיי קלייבען זיך צונויף אין מחנות פון פיעלע טויענ־דער. דער ווינטער־שלאָף איז ביי דער צווערן־פלעדער־מויז אַ סרצער.


די פלעדער־הינד. — די פלעדער־הינד, אָדער פליהינד, זיינען באַדייטענד גרעסער פון די פלעדער־מויז. די פאָרם פון זייער קאָפּ איז עהנליך צו דעם קאָפּ פון אַ הונד. זיי געפינען זיך אין

די וועלדער פון די הייסע געגענדען פון אפריקא, זיד־אזיען און אויסטראליען. זיי לעבען אין גרויסע מחנות און וואנדערען ווייטע שטרעקען. זיי געהרען זיך הויפטזעכליך מיט זיסע, זאפטיגע פרוכטען, אָבער זיי עסען אויך אינזעקטען, פויגלען און זאָגאַר פיש. זיי פליהען שנעל, הויך און ווייט, זיי קלעטערען אויך און לויפען זעהר געשיקט. זיי זיינען נאכט־חיות. ביי טאָג היינגען זיי זיך אָן מיט זייערע הינטערשטע און פאָדערשטע פיס אויף צווייגען פון בוימער, מיט'ן קערפער אַראָפּ, איינגעוויקעלט אין זייער פליה־הויט און ווארטען ביז די נאכט וועט אָנקומען, ווען זיי לאָזען זיך אַרויס זוכען זייער שפייז. די נקבות געבערען איינס אָדער צוויי קינדער, וועלכע האַלטען זיך פאַר איהר ברוסט, ווען זי פליהט. מאַנכע פון די פלעדער־הינד זיינען צימליך גרויסע חיות. דער קערפער פון דעם קאלאָנג, א פלעדער־הונד, וועלכער לעבט אין אַסט־אינדיען, איז אומגעפעהר אַנדערטהאלבען פוס די לענג און אַרום פינף פוס די ברייט (פון איין שפיץ פלינגעל ביז'ן צווייטען). דער קאָליר פון זיין פעל איז שוואַרץ, זיין קאָפּ און האַלז איז געלב־רויט. קיין עק האָט ער ניט. עהנליך צו די פלעדער־הינד זיינען די פלעדער־פוקסען (זייער קאָפּ איז עהנליך צו א פוקסען־קאָפּ).

די הוף־חיות (אונגולאַטען). — מיט דעם נאָמען „הוף־חיות“ אָדער אונגולאַטען באַצייכענט מען די חיות, וועלכע האָבן בען קאָפיטעס (הופען) אויף זייערע פיס, ווי פערד, אַקסען, שעפ־סען, הירשען, חזירים א. אַז. וו. די אָרדנונג פון די הוף־חיות נעמט אין זיך אַרײַן אַ גרויסע צאָהל פאַרשיידענע חיות, זייער אַלגעמיינע כאַראַקטעריסטיק איז אָבער, וואָס זיי האָבען קאָפּ־טעס אויף זייערע פיס. די קאָפיטעס פאַרנעמען ביי די דאָזיגע חיות דעם פלאַץ פון נעגעל, עס הייסט, אַז אַנשטאָט זייערע פינגער זאָלען האָבען נעגעל, האָבען זיי קאָפיטעס.

די הוף־חיות ווערען איינגעטיילט אין צוויי גרופען: אין אַזעלכע חיות ביי וועלכע די צאָהל פון זייערע קאָפיטעס אָדער פינגער איז אום און אַזעלכע וואָס די צאָהל איז גראָד. א פערד, למשל, האָט בלוז איין קאָפיטע אויף יעדער פוס, אָדער איין פינגער, א רהינגאַצערום האָט דריי, אַן אַקס האָט צוויי און אַ חזיר פיער. א פערד און א רהינגאַצערום געהערען צו דער גרופע.

וואָס די צאָהל פֿון זייערע קאָפיטעס אָדער פינגער איז אום, וועהר רענד אן אַקס און אַ חזיר געהערען צו דער גרופע וואָס די צאָהל פֿון זייערע קאָפיטעס אָדער פינגער איז גראָד. די אום-גרופע ווערט גערופען מיט דעם נאָמען פּעריסאָדאָקטילען, ווערענד די גראָד-גרופע ווערט די גראָד-פינגערדיגע גרופע (ארטיאָדאָקטילען) איינ-געטיילט אין צוויי אפטיילונגען: אין מעלה-גרה'דיגע חיות (ווי דער-קייער), ווי רינדער, שעפּסען, ציגען, הירשען, אנטעלאָאָ פּען, און ניט מעלה-גרה'דיגע. די מעלה-גרה'דיגע חיות זיינען שטרענגע וועגעטעריאנער, זיי נעהרען זיך בלויז מיט פלאַנצען, ווערענד צווישען די ניט מעלה-גרה'דיגע הוי-חיות זיינען פאַראַן אַזעלכע, וואָס עסען אַלין, ווי די חזירים, למשל.



צייכנונג 206. — דער מאָגען פֿון אַ שעפּס. א, דער ושמ; ב, די וואַמפּ (פּליאַקע); ג, די משעפּטשע; ד, דער בלעטער-מאָגען (סדור); ה, דער אמת'ער מאָגען; ו, דער אַנפּאנג פֿון די קישקעס.

דער מאָגען ביי די מעלה-גרה'דיגע חיות איז אַ גאַנץ קאָמפּליצירטער. ער באַשטעהט פֿון פיער טיילען און דער פּאַרדיר-אונגס-פּראָצעס קומט פֿאַר אויף דעם פּאַלגענדען אופן: דאָס שפּייז ווערט צוערשט פֿון דער באַטרעפּענדער חיה דורכגעמישט מיט דעם שפּייעכץ פֿון איהר מויל און אַראָפּגעשלונגען, ניט-צור-קייטערהייט דורכ'ן שלונד (ושט) אין פּאַר-מאָגען (די וואַמפּ), וועלכער שטעלט מיט זיך פֿאַר אַ צימליך גרויסען זאַס. דאָס איז דער ערשטער מאָגען, וואו דאָס שפּייז פּאַרבלייבט אַ געוויסע צייט און ווייקט זיך גוט דורך. נאכדעם געהט דאָס שפּייז אַריי בער פֿון ערשטען מאָגען אין צווייטען מאָגען (משעפּצע), וואָס

איז אויסגעפוטערט מיט אַ געקעסטעלטער הויט. אין דעם דאָ-  
זיגען מאָגען ווערט דאָס עסען צומאָלען און צונויפגעקויקעלט אין  
קליינע קנוילען. דאָן געהען די צונויפגעקנוילטע שפייז-שטיקער  
איינס נאָכ'ן אנדערען צוריק אין מויל. די חיה צוקייט דאָן לאַנג-  
זאָם דאָס צוריקגעקעהרטע שפייז מיט איהרע באַק-צייהנער און  
שלינגט עס אַראָפּ אין איהר דריטען מאָגען, (דער בלעטער-מאָגען,  
דער „סדור“), וועלכער איז אויסגעפוטערט מיט אַ בלעטערדיגער  
הויט (א הויט מיט גרויסע פאַלבען, וועלכע זיינען עהגליך צו בלע-  
טער פון אַ בוך), דערפון קומט דער נאָמען „בלעטער-מאָגען“.  
אָדער „פּסאַלם“ (תהילים), ווי אויך דער אידישער נאָמען „סדור“,  
מיט וועלכען דער דאָזיגער מאָגען ווערט גערופען. פון דעם „סדור“  
געהט דאָס שפייז דורך אַ ברייטע עפענונג צום פערטען מאָגען,  
אָדער „וויקליכער מאָגען“, ווי ער קען גערופען ווערען. דער  
פערטער מאָגען איז צימליך גרויס און ער איז אויסגעפוטערט מיט  
אַ הויט, וואָס גיט אַרויס אַ פליסינקייט (פאַרדייאונגס-זאַפט),  
וואָס העלפט פאַרדייען דאָס שפייז. דער פערטער מאָגען ענדיגט  
זיך מיט דער קורצער קישקע, דורך וועלכער דאָס פאַרדייטע שפייז  
געהט ווייטער דורך די געדערים ביז עס ווערט אַרויסגעשטויסען  
דורכ'ן רעקטום (די עפענונג פון הינטער-לייב).

די באַקאַנטעסטע פון די מעלה-גרה'דיגע חיות זיינען די הויז-  
חיות, אָדער בהמות, ווי מען רופט זיי, ווי קיה, שעפסען און ציגען.  
די דאָזיגע בהמות באַלאַנגען צו דער פאַמיליע „קאָוויקאָרניאַ“,  
דאָס מיינט חיות, וואָס האָבען אויסגעהוילטע הערנער. צו דער  
דאָזיגער פאַמיליע באַלאַנגען אויך די אַנטעלאָפּען און די בופעל-  
אַקסען. די הערנער פון די דאָזיגע בהמות אָדער חיות באַשטעהען  
פון אַ האָרענדיגען שייד, אין וועלכען עס געפינט זיך אַ ביינער-  
נער קערן. די הערנער זיינען באַשטענדיגע, זיי ביימען זיך ניט,  
ווי דאָס איז דער פאַל ביי אנדערע הערנער-חיות, ווי הירשען,  
למשל. עס איז בלויז פאַראַן איין מין אַנטעלאָפּ, וואָס וואַרפט  
אַראָפּ יעדעס יאָהר דעם אַלטען האָרען-שייד פון זיינע הערנער  
און באַקומט אַ נייעם.

די חיות פון דער פאַמיליע „קאָוויקאָרניאַ“ קענען אין אַלגעמיין  
גערעכענט ווערען אַלס די מיינסט טיפישע און כאַראַקטעריסטישע  
פון די מעלה-גרה'דיגע חיות, באַזונדערס אין דער ענטוויקלונג פון  
זייערע ציינער. די הויז-חיות אין אַלגעמיין האָבען הויפטזעכליך


צוויי מינים ציינער — שנייד-ציינער (פאָדערשטע) און מאָלאָרען (באַקציינער), וועהרענד אויגען ציינער (די שפיציגע זייטען ציי-נער) פעלען ביי די מייסטע פון זיי. אנדערע האָבען אויך ניט קיין שנייד-ציינער. די הוה-חיות האָבען צוויי גאַנג ציינער, צו-ערשט האָבען זיי מילך-ציינער, וועלכע פאלען אַרויס, ווען זיי ווערען עלטער און אויף זייער פלאַץ וואַקסען אויס באשטענדיגע ציינער.

די אַנטעלאָפּען זיינען עהנליך צו הירשען, אנדערע האָבען אויך עהנליכקייט צו קיה און פערד. די מייסטע פון זיי האָבען גע-דרעהטע הערנער. די אַנטעלאָפּען זיינען שטאַרק פארשפרייט אין אפריקא. אין אייראָפּא זיינען פאראן פון זיי בלויז צוויי אַרטען און אין אמעריקא בלויז איין אַרט, די הירש-אַנטעלאָפּען (פּראַנגיבאַק). די אַנטעלאָפּען לעבען מייסטענס אין סטאַדעס אין סטעפּעס, מאַכע אויך אויף בערג. זיי זיינען זעהר באַוועג-ליך, פּאַרזיכטיג און וואַכזאַם. די נקבות געבערען, נאָך אַ טראַגען פון אומגעפעהר זעקס חדשים, איינס אָדער צוויי קינדער. די אַנטעלאָפּען ווערען פיעל געפאַנגען צוליעב זייער פלייש, האָר און פעל.

די בופלאָקסען זיינען גרויסע חיות, וועלכע לעבען אין אַ ווילדען צושטאַנד אין אפריקא, אַזיען און אין אמעריקא. דער אמעריקאנער בופלאָקס, דער ביזאָן, ווי מען רופט איהם, שיידעט זיך אונטער פון די אפריקאנער און אַזיאַטישע מיט זיין גרויסען קאָפּ און מיט זיין הויקער וואָס ער האָט אויפ'ן רוקען. אין אַלגעמיין ווערען די הוה-חיות איינגעטיילט אין עלף פאַמיליעס, וועלכע עקזיסטירען היינט. פון די עלף פאַמיליעס זיינען די פּאָלגענדע דריי פון די פּעריסאָדאַקטילען (וואָס די צאָהל פון זייערע פוס-פינגער אָדער קאָפיטעס איז אום).

מאַפּירען. — אין די פּאָדערשטע פיס האָבען זיי פיער פינגער מיט קאָפיטעס און אין די הינטערשטע פיס בלויז דריי. זיי האָבען אַן אומגעלומפערטען קערפער, אַ לענגליכען קאָפּ, אַ דינע האַלז, קליינע אויגען, קורצע אויפגעשטעלטע אויערען, אַן אויס-געצויגענע אויבערשטע ליפּ אין דער פּאַרם פון אַ שנויז און אַ קורצען עק. זיי האָבען עטוואָס עהנליכקייט צו אַ חזיר. עס זיינען איצט פאראן בלויז צוויי גאַטונגען, מיט פינף אָדער זעקס ספּע-ציעס, וועלכע לעבען, די איבעריגע גאַטונגען זיינען אויסגעשטאָר-

בען. דער אינדישער טאפיר איז אומגעפעהר אכט פוס לאנג און איבער דריי פוס הויך. זיין פעל איז באוואקסען מיט קורצע גלייכמעסיגע האָר. דער קאָפּ, האַלז און דער גאַנצער פּאָדערשטער טייל פון קערפער ביז איבער די שולטערן, ווי אויך זיינע פיס זיינען שוואַרץ, ווערענד די איבעריגע טיילען פון זיין קערפער זיינען גרוי־ווייס. ער לעבט אין כינאַ, אין אינדיען און סומאַטראַ. דער אמעריקאנער טאפיר איז עטוואָס קלענער ווי דער אינדישער, איז דונקעל גרוי־ברוי, מיט אַ קורצער שטייפער גרווע אויפ'ן נאַקען.




צייכונג 207. — זיד־אמעריקאנער טאפירען.

דער טאפיר האַלט זיך אויף אין געדיכטע וועלדער, לעבט מייסטענס איינזאַם, אָבער אויך אַמאָל אין קליינע פּאַמיליעס. ער ליעבט זיך צו קייקלען אין לוזשעס און בלאַטעס. ער איז אַן אויסגעצייכענטער שווימער און טויכער. ער קען זיך אויפהאַלטען אַ לענגערע צייט אונטער'ן וואַסער און אַרומלויפֿען אויפ'ן גרונד. אין אַלגעמיין איז ער אַ פּרידליכע חיה. בייטאָג ליגט ער מייסטענס באַהאַלטען. ער נעהרט זיך מיט פּאַרשיידענע פּלאַנצען, באַזונדער מיט בלעטער.

גאַזעהערנער. — פון דער פּאַמיליע „גאַזעהערנער“ לעבט איצט בלויז איין גאַטונג, דער רהינאָצערוס, פון וועלכען עס זיינען



פאראן ארום צעהן ספעציעס. דער רהינאָצערוס אָדער „נאָזהאָרן“ איז אַ גרויסע אומגעלומפערטע חיה מיט זעהר אַ דיקער הויט, וועלכע איז כמעט נאָקעט, מיט אַ קורצען האַלן, אַן אויסגעשטעל־טען קאָפּ, אַ קליינעם מויל און מיט אַ שפיציגען האָרן, אָדער צוויי הערנער איינער הינטער דעם אנדערען, אויפ'ן נאָז. זיינע פיס זיינען קורץ און יעדער פון זיי האָט דריי פינגער מיט קאָפּיטעס. די מיטעלסטע קאָפּיטע איז כמעט דאָפעלט אזוי ברייט ווי די זייטליכע. זיינע אויערען זיינען מיטעלמעסיג און זיין עק קורץ. זיין דיקע הויט איז צוקנייטשט אין גרויסע, טיפע פאלען. זיין געביס באַשטעהט פון זיבען אויבערשטע און זיבען אונטערשטע באַקצייענער פון יעדער זייט. אויגען־צייענער האָט ער אינגאנצען ניט און די פאָדערשטע ציינער פאלען ביי איהם ארויס, ווען ער איז נאָך יונג, אָדער זיי וואַקסען איבערהויפט ניט ארויס דורך זיינע יאָסלעס.



צייכנונג 208. — דער אינדישער איינהאָרניגער רהינאָצערוס.

דער אינדישער רהינאָצערוס איז אומגעפעהר צעהן פוס לאַנג און אַן ערך זעקס פוס הויך. ער האָט אויפ'ן נאָז אַ שטארקען האָרן, וועלכער איז אַביסעל געבויגען און איז נאָהענט פון צוויי פוס לאַנג. זיין הויט איז נאָקעט, אָהן האָר, איז פון אַ דונקעלען גרוי־ברוינעם קאָליר און איז צוקנייטשט אין טיפע גרויסע פאלען, און עס קוקט אויס, ווי ער וואַלט זיין באַדעקט מיט פאַנצערס. אין סומאטראַ געפינט זיך אַ גרויסער רהינאָצערוס, וואָס

האָט צוויי הערנער, איינער הינטער דעם אַנדערען, אויף זיין נאָז. דער אַפּריקאָנער רהינאָצערום האָט אויך צוויי הערנער, דער פּאָדערשטער האָרן איז אַן ערך צוויי און אַ האַלב פּוס לאַנג, וועד-דענד דער הינטערשטער אַרום צוויי פּוס. זיין הויט איז דונקעל-ברוין און גלאַט, אָהן פּאַלבען.

דער רהינאָצערום לעבט הויפטזעכליך אין וועלדער נאָהענט פון טייכען און זומפען, וואו ער קייקעלט זיך אין דער בלאָטע אָדער שווימט. בייטאָג שלאָפט ער, ווערענד ביינאַכט וואַנדערט ער אַרום. ער לאָזט זיך אָפט אַוועק אויף ווייטע רייזען. ווען ער מאַכט זיין רייזע דורך אַ געדיכטען וואַלד, ברעכט ער זיך דורך אַ גראַדען וועג דורך די בוימער. ער איז זעהר קרעפטיג. אין אַל-געמיין איז עס אָבער ניט אין די נאַטור פון רהינאָצערום אַרומ-צואַוואַנדערען פון איין אָרט צום צווייטען. ער וואַנדערט בלוז, ווען ער איז געצוואונגען, ווען ער דאַרף זוכען שפייז. ער געהרט זיך מיט גראָז, בלעטער, יונגע צווייגען און וואָרצלען. ער איז אַן אויסגעצייכענטער שווימער. ווען מען גרייפט איהם ניט אָן איז ער פּאַלשטענדיג אומשעדליך. ווען ער ווערט אָבער אַנגע-גריפען, ווערט ער שרעקליך ווילד און וואַרפט זיך אויף זיין אָנ-גרייפער מיט דער גאַנצער מאַכט פון זיין גרויסען שטאַרקען קער-פער און ער איז דאָן זעהר געפערליך. די נקבה געבערט מיט איינמאָל בלוז איין קינד. דער יונגער רהינאָצערום האָט אַ רויטליכע, גלאַטע הויט אָהן פּאַלבען. די מוטער זויגט איהם צוויי יאָהר צייט און פארטיידיגט איהם געגען פיינד מיט איהר גאַנצער מאַכט. עס נעמט פון צעהן ביז צוועלף יאָהר ביז ער וואַקסט אויס. דער רהינאָצערום לעבט מייסטענס אָפּגעזונדערט, מאַנכעס מאַך אָבער אויך אין קליינע פּאַמיליעס. ער האָט אָבער אַ שטענדיגען באַגלייטער, דאָס איז אַ פּויגעל מיט דעם נאָמען „מאַדענהאַקער“. ער באַגלייט אימער דעם רהינאָצערום, זיצענדיג אויף זיין רוקען און פאַנגט די פאַרשיידענע אינזעקטען, וועלכע קלייבען זיך אָן אויף זיין קערפער.

די פּערד. — צו דער פּאַמיליע פּערד באַלאַנגען אויך די זעלען, די מויל-זעלען און די זעבראַס. די אַלע חיות האָבען בלוז איין קאָפיטע אָדער איין פינגער. דער איצטיגער פּערד שטאַמט אָפּ פון צענטראַל אַזיען, פון וואַנען ער איז פאַרשפּרייט געוואָרען איבער דער גאַנצער וועלט. אין אַ פּריהערידיגער פּעריאָדע פון דער

ערד (די פאסטערציערע פעריאדע) האָבען פערד געלעבט אויך אין נאָרד-אַמעריקא און זיד-אַמעריקא, אָבער די אלע אמעריקא-נער ספעציעס זיינען אויסגעשטאָרבן. די איצטיגע פערד, וואָס לעבען אין אמעריקא, זיינען געבראַכט געוואָרען פון דער אלטער וועלט. די קלאַטישעס (שטימען) געבערען, נאָך אַ טראָגען פון עלף חדשים, איין קינד, וועלכע זיי זיינען פון 4 ביז 5 חדשים. דאָס יונגגעבאַרענע פערדעל, דער לאַשאַק, שמעלט זיך אויף זיינע פיס אַ פאָר טעג נאָך זיין געבורט און פאַנגט אָן אַרומלויפֿען, און אין אַ פאַרלויף פון אַנדערהאַלבן אָדער צוויי יאָהר איז ער כמעט פאַלשטענדיג אויסגעוואַקסען. די פערד האָבען פון 36 ביז 50 ציינער אין זייער מויל. אַ פערד לעבט פון 20 ביז 30 יאָהר. מאַנכע דערגרייכען אַן עלטער פון 40 יאָהר. דער פערד ווערט גערעכענט אַלס איינס פון די קלינסטע און פעהיגסטע חיות און פון גאַנץ אלטע צייטען האָט דער מענש איהם פאַרוואַנדעלט אין אַ הויז-חיה, וועלכע ברענגט די גרעסטע נוצען.

דער ווילדער עזעל שטאַמט פון אזיען און נאָרד-אַפריקא. אין אזיען לעבען די ווילדע עזלען אין קלענערע מחנות ביי די ברעגעס פון טייכען און ימים. ווינטער צייט קלייבען זיי זיך צונויף אין גרעסערע מחנות און וואַנדערען זוכען שפייז, און אין פריהלינג קומען זיי צוריק צו זייער פריהערדיגען זומער-פלאַץ און צוטיילען זיך צוריק אין קלענערע גרופען. זיי פיטערען זיך אין גרופען פון דריי ביז צוואַנציג. יעדע גרופע האָט איין זכר, וועלכער קעמפפט זעהר ענערגיש, ווען אַן אנדער זכר וויל פארנעמען זיין הערשאַפט. פון וואַנען אונזערע הויז-עזלען שטאַמען אַרויס איז נאָך ניט זיכער פעסטגעשטעלט. מען נעמט אָבער אָן, אַז ער שטאַמט פון אַפריקא. דער עזעל איז אין אַלגעמיין אַ גאַנץ קלונע חיה, מיט פיעל פע-הינקייטען. ער איז אַפט אָבער אַ גרויסער עקשן. די עזעלין געבערט, נאָך אַ טראָגען פון 290 טעג, איין קינד, וואָס ווערט פון איהר געזויגען פון פינף ביז זעקס חדשים. פון דער פאָרונג פון פערד מיט עזלען קומט אַרויס דער מויל-עזעל.

די זעבראַס זיינען עהנליך אין זייער אויסזעהן צו פערד און עזלען. זיי אונטערשיידען זיך אָבער שטאַרק פון זיי מיט זייער געשטרייפטער פעל. די זעבראַ לעבט אין די זידליכע און אָסט-ליכע טיילען פון אַפריקא.

די איבעריגע אַכט לעבענדע פאמיליען פון די הויז-חיות באַד  
לאנגען צו די אַרטיאָדאָקטילען (וואָס די צאָהל פון זייערע קאָפּי  
טעם איז גראָד). זיי זיינען ווי פּאָלגט:

די טייך-פּערד. — פון דער פאמיליע „טייך-פּערד“ לעבט  
איצט בלויז דער היפּאָפּאָטאָמוס (דער אַפּריקאַנער טייך-פּערד).  
דאָס איז אַ גרויסע אומגעלומפּערטע חיה, פון 13 ביז 14 פּוס לאַנג,  
5 פּוס הויך און איבער 5 טויזענד פונט שווער. די היפּאָפּאָטאָמוס  
סען האָבען אַ קורצען דינעם עק, אַ גרויסען פיערקאַנטיגען קאָפּ,  
קליינע אויערען און אויגען, אַ קורצען דיקען האַלז, קורצע פּיס  
מיט פיער קאָפּיטעס אויף יעדען פּוס, און גרויסע געבויגענע אויב  
טערשטע אויגען-ציינער, וועלכע וואַקסען אויס ביי די זכרים אין  
זייערע עלטערע יאָהרען ביז צו אַ לענג פון צוויי אַ האַלב פּוס  
און וועגען ביז 15 פונט. זייער הויט איז אַרום דריי פּערטעל צאָל  
דיק און איז גאַנץ שיטער באַוואַקסען מיט שטייפּע קורצע האָר.  
דעם קאָליר פון זייער קערפּער איז אַ מין קופּער-ברוי, אויבען דונר  
קעלער און אונטען העלער. ווען זיי ווערען אויפגערעגט, שוויצט  
פון זייערע האָר-וואַרצלען אַרויס אַזאַ בלוט-אַרטיגע פּליסיגקייט.  
דער היפּאָפּאָטאָמוס פּאַרברענגט זיין צייט הויפטזעכליך אין  
וואַסער, ער געהט אַרויס פון וואַסער בלויז, ווען ער וויל זיך  
וואַרימען אויף דער זון אָדער ווען ער געפינט ניט אין וואַסער  
גענוג שפּייז. ער פּאַרלאָזט דאָן דאָס וואַסער און געהט זוכען  
שפּייז. מייסטענס טוט ער עס ביינאַכט, ווייל בייטאָג איז ער  
זעהר פּויל. ביינאַכט איז ער אָבער זעהר לעבחהפּט. ער געהט  
דאָן זוכען זיין שפּייז אין וועלדער און אין פעלדער און ער  
גרייפּט אָן אויף זיין וועג וועמען ער באַגעגענט נאָר.

די היפּאָפּאָטאָמוסען האַלטען זיך אויף אין די גרויסע טייכען  
און אָזערעס אין די אינערליכע טיילען פון אַפּריקאַ, וואו זיי  
נעהרען זיך הויפטזעכליך מיט די וואַסער-פּלאַנצען. די נקבה  
געבערט, נאָך אַ שוואַנגערשאַפט פון 7 ביז 8 חדשים, איין קינד,  
צו וועלכען זי איז זעהר איבערגעבען.

חזירים. — די חזירים האָבען צו פיער פינגער אין זייערע  
פּיס, וועלכע זיינען באַדעקט מיט קאָפּיטעס. די פּאָדערשטע צוויי  
פינגער זיינען גרעסער און מעהר ענטוויקעלט אַלס די הינטערשטע.  
זיי געהען בלויז אויף די פּאָדערשטע פינגער, ווערענד די הינט-  
טערשטע באַרירען קוים די ערד. די אויגען-ציינער זיינען ביי די

חזירים שטארק ענטוויקעלט, באזונדערס ביי די זכרים און ספער ציעל די אונטערשטע אויגען-ציינער, וועלכע זיינען אויסגעבויען און שטארצען ארויס פון זייער מויל. די חזירים נעהרען זיך הויפטזעכליך מיט וואַרצלען, גרינסען און פרוכט, אָבער זיי עסען אויך פלייש, נבלות און אלעס וואָס זיי קענען נעמען אין מויל. זיי זיינען ניט קיין איבערקלייבער, זיי עסען אלץ.

דער אייראָפּעאישער ווילדער חזיר לעבט אין געדיכטע וועלדער, מייסטענס אין פייכטע ערטער, וואו ער זאָל זיך קענען קייטלען אין בלאָטע. ער נעהרט זיך מיט פרוכט, מיט וואַרצלען און מיט תבואה, עסט אָבער אויך נבלות, ווען ער געפינט זיי. ער איז זעהר שטארק, לויפט זעהר שנעל און איז זעהר געפערליך ווען ער ווערט אויפגערייצט. ער האָט זעהר שטארק ענטוויקעלטע גרויסע, שפיציגע אויגען-ציינער, וועלכע ער באנוצט אלס וואַפע צום אָנגרייפן. און עס איז זעהר אַ געפעהרליכע וואַפע. ער ווערט זעהר לייכט אויפגערייצט און וואַרפט זיך אויף זיין אָנדרויפער מיט גרויס ווילדקייט. די נקבה געבערט אין פרייהלינג פון 4 ביז 10 קינדער, וועלכע זי זויגט ביז 5 אָדער 6 חדשים און פארטיידיגט זיי מיט איהר גאנצער קראפט און ווילדקייט גענען אָנגרייפער.

דער הירש-חזיר, וועלכער לעבט אין מאָנגאָליען, איז שלאַנק געוואקסען, מיט הויכע פיס, מיט אַ קורצען האַלז, מיט אַ קליינעם לענגליכען אויסגעשטרעקטען קאָפּ, מיט גרויסע רונדע אויגען. די זכרים האָבען באזונדערס גרויסע אונטערשטע אויגען-ציינער, וועלכע זיינען רונד אויסגעבויען און שטארצען ארויס פון זייער מויל ווי הערנער. זיי האָבען אַ דיקע, שאַרסטיגע, גערונצעלטע, שמור ציגע אַשיגרויע הויט, וועלכע איז שיטער באוואקסען מיט שטויפע קורצע האָר. די הירש-חזירים לעבען אין סטאָדעס אין די זומד פינע וואַלד-געגערטען און זיינען אויסגעצייכענטע שווימער. זיי שלאָפען בייטאָג און ביינאַכט געהען זיי ארויס זוכען זייער שפּיז. דער אַפריקאנער ווילדער חזיר האָט זעהר אַ ברייטען קאָפּ מיט דריי גרויסע באַראַדעווקעס, ווי הערנער, פון די זייטען. די זכרים האָבען אויך זעהר גרויסע געבויענע אונטערשטע אויגען-ציינער וועלכע שטארצען ארויס פון זיין מויל ווי הערנער. די דאָזיגע ציינער זיינען זעהר אַ געפעהרליכע וואַפע, ווען דער חזיר גרייפט וועמען עס איז מיט זיי אָן. דער אַפריקאנער ווילדער


חזיר ליענט ביי טאָג פאַרבאָרגען אין אַ הייל אָדער אין אַ לאָך, ווערענד ביינאַכט געהט ער אַרויס זוכען זיין שפּיז. ער געהרט זיך הויפטזעכליך מיט וואָרצלען און מיט גרינסען, אָבער ער עסט אויך אינזעקטען, ווערים און רעפּטילען.

די קעמלען. — די קאָפיטעס פון די קעמלען זיינען אייגענטל'ך ליך מעהר עהנליך צו ברייטע נעגעל ווי צו ווירקליכע קאָפיטעס. זיי האָבען צו צוויי ברייטע פינגער אין יעדען פּוס, וועלכע האָבען אויף זייערע ענדען קליינע נעגעלע-עהנליכע קאָפיטעס. די קעמלען טרעטען אָבער ניט אויף זייערע קאָפיטעס, ווען זיי געהען, ווי דאָס איז דער פּאל ביי די אַנדערע הויף-חיות, וועלכע זיינען ביז איצט באַשריבען געוואָרען, נאָר זיי טרעטען אויף די זיילען פון זייער רע פּיס.

עס זיינען פאַראַן צוויי אַרטען קעמלען: די איינהויקערדיגע און די צוויי-הויקערדיגע. דער איינהויקערדיגער קעמעל איז אומ-געפעהר 9 פּוס לאַנג און אַרום 7 פּוס הויך. ער האָט אַ קליינעם, קורצען קאָפּ, גרויסע אויגען, קורצע אויערען, אַ לאַנגען געבוי-גענעם האַלז, אַ מיטעל-לאַנגען דינעם עק, וואָס איז ביי זיין ענד באַוואַקסען מיט לאַנגע האָר, אַ גרויסע בויך און אַ הויקער אויפ'ן רוקען. זיין פעל איז באַוואַקסען מיט ווייכע וואָלענע האָר, וועל-כע זיינען אויף דעם נאַקען, הויקער, שולטערען און אונטער'ן האַלז באַדייטענד לענגער. אויף דעם הינטערשטען טייל פון זיין קאָפּ האָט ער אַזא דריזע, וועלכע גיט אַרויס אַ שטאַרק שטינקענדע פלי-סינקייט, באַזונדערס ווען עס קומט אָן ביי איהם די פּאַרונגס-צייט. דער איינהויקערדיגער קעמעל איז אַ הויזליכע חיה. אין וויל-דען צושטאַנד געפינט מען איהם איצט אינגאַנצען ניט. ער איז פאַרשפּרייט אין אַפּריקא, אין אַזיען און ער געפינט זיך אויך אין אויסטראַליע, אַמעריקא און אין אייניגע ערטער פון דרום איי-ראָפּא, וואוהין ער איז געבראַכט געוואָרען פון זיין געבורטס-לאַנד. אין אַפּריקא און אין אַזיען איז דער קעמעל פאַר דעם מענשען די ניצליכסטע הויז-חיה. ער ווערט באַנוצט צו רייטען און צו טראָגען משא. ער האָט וועניג גייסטיגע פעהיקייטען, אָבער זעהר פיעל קערפערליכע מעלות, וועלכע מאַכען איהם העכסט נוצ-ליך, באַזונדערס פאַר רייזען אין דער וויסטעניש.

דער קעמעל באַנוגענט זיך פאַר זיין שפּיז מיט פאַרטריי-קענטע גראָזען און גרינסען, ווי שלעכט זיי זאָלען ניט זיין. אין

א נויט עסט ער אויך דערנער און דיסטלען. ער קען אויך אויס־קומען אייניגע טעג אינגאנצען אָהן עסען און אָהן טרינקען. ווען ער קריגט צו עסען זאפטטיגע גראָזען און גרינסען, קומט ער אויס אינגאנצען אָהן וואסער. עס עקזיסטירט אַ גלויבען, אַז דער קעמעל האָט אַ באַזונדערען מאָגען, וואו ער האַלט אָפּגעשפּאַרט קאַלטע וואסער פאר דער צייט פון אַ נויט, און אַז עס טרעפט, דאָס די רייזענדע אין דער וויסטעניש הרג'ענען איינעם פון זייערע קעמלען אַרויסצוקריגען דאָס וואסער פון איהם, כדי צו קיהלען זייער דורשט. דאָס איז אָבער בלויז אַן איינרעדעניש.



צייכנונג 209. — אַן איינהויקערדיגער קעמעל.

דער קעמעל איז אַ רוהיגע און פרידליכע חיה. די זכרים ווען רען אָבער געפעהרליך דורך בייסען און בריקען מיט די פיס, ווען עס קומט די צייט פון זייער געשלעכטליכער פאָרונג. זיי מאַכען דאָן ווילדע, אָפּשרעקענדע עוויות, לאָזען אַרויס ווילדע, משונה'דיגע קולות, און דערזעהענדיג אַן אנדער קעמעל, באַזונדערס אַ נקבה, לאָזען זיי אַרויס פון זייער האַלז אַ גרויסען אָפּשטויסענדען הויט־בלאָז. די נקבה געבערט, נאָך אַ טראָגען פון 11 ביז 13 מאָנאַטען, איין קינד. דער יונג געבאָרענער קעמעל איז באַרעקט מיט צימליך לאַנגע, וואָליגע, ווייכע האָר און ער איז אומגעפעהר דריי פוס הויך. דער צווייהויקערדיגער קעמעל שיידט זיך אונטער פון דעם

איינהויקערדיגען דערמיט, וואָס אנשטאַט איין הויקער אויפ'ן רוקען, האָט ער צוויי הויקערס. זיין קערפּער איז גרעסער און זיינע האַר לענגער און ווייכער, זיינע פּיס זיינען אָבער קירצער. די צוויי הויקערדיגע קעמלען געפינט מען נאָך אין גרויסע מאַסען אין ווילדען צושטאַנד אין מיטעל-אַזיען, אין דעם געגענד פון טיבעט. אין זיינע אַלגעמיינע אייגענשאַפטען איז ער כמעט גלייך צו דעם איינהויקערדיגען קעמל.

צו דער פּאַמיליע קעמלען באַלאַנגען אויך די שאַה-קעמלען אָדער קעמעל-שעפּסען. זיי האָבען אַ קעמעל-ע-הנליכען האַר און קעמעל-ע-הנליכע פּיס. זיי זיינען כאַראַקטעריסטיש דערמיט, וואָס זייערע שפּייעכץ-דריווען גיבען אַרויס אַ גרויסע מאַס שפּייעכץ, מיט וועלכע די דאָזיגע חיות שפּריצען, ווען זיי ווערען אָנגעגריפען. עס עקזיסטירען פּיער פּאַרמען פון די דאָזיגע קעמעל-שעפּסען: די גאַנאַקאַ, די וויקוניאַ, די ללאַמאַ און די אַלפּאַקאַ. בלויז די ערשטע צוויי געפינט מען נאָך היינט אין ווילדען צושטאַנד, די אַנדערע צוויי זיינען שוין אין די אור-אַלטע צייטען פאַרוואַנדעלט געוואָרען אין הויז-חיות.



צייכנונג 210. — אַ ללאַמאַ.

די ללאַמאַס געפינען זיך אין די בערג פון זיד און צענטראַל אמעריקאַ. זיי זיינען באוואקסען מיט לאַנגע וואַלענע האַר, האָבען אַ קורצען, שמאַלען קאָפּ, קורצע אויערען, אַ לאַנגע געבויגענע האַר, עהנליך צו אַ קעמל, און אַ קורצען באוואקסענעם עק, און זיינען אומגעפעהר פיער פוס הויך. זיי לעבען אין פּאַמיליעס און



בלויז אין די טרוקענע יאָהרעס-צייטען, ווען אויף די בערג אין פאראן וועניג שפיין, לאָזען זיי זיך אראָפּ אין די פרוכטבארע טאָלען. די לאַמאָס זיינען פון אמעריקא געבראכט געוואָרען אין אייראָפּא און אין אנדערע וועלט־טיילען. זייער פלייש און מילך ווערט געגעסען, זייער וואָל ווערט באנוצט פאר קליידער און זייער פעל פאר לערער.

די גואנאקאס געפינען זיך מייסטענס אין צענטראל אמעריקא. זיי לעבען אין גרעסערע סטאדעס און זיי זיינען זעהר פאָרויכטיג געגען אנגריף פון אַ פיינד. די סטאדע שטעלט אויס וועכטער ארום דעם פלאץ, וואו זיי פיטערען זיך, און ווען די וועכטער דער-שפירען וועלכע עס איז געפאר, פאנגען זיי אָן הויך מעקען, עהנ-ליך צו שפעסען. זיי לויפען זעהר שנעל און קלעטערען זעהר פלינג און זיכער אויף בערג.

די גואנאקאס זיינען אומגעפעהר זעקס אַ האַלב פוס לאַנג און איבער דריי פוס הויך. זיי האָבען אַ קורצען באוואקסענעם עק, אַ לאַנגען דינעם, געבויענעם האַלז, אַ לאַנגען שמאָלען קאָפּ, לאַנגע אויערען און גרויסע לעבחהפטע אויגען.

די אלפאקאס זיינען מיט דעם געבוי פון זייער קערפער עהנ-ליך צו שעפסען, זיי האָבען אָבער אַ קעמעל־ענהליכען האַלז. זיי האָבען זעהר לאַנגע זיידען־גלאַנציגע וואָלענע האָר פון שווארצען אָדער ווייסען קאָליר. זייער האָר איז אָפט פון 4 ביז 5 צאָל די לענג. זיי געפינען זיך אין די בערג פון פּערו און טשילי, צענטראל אמעריקא, און זיי לעבען אין גרויסע סטאדעס.


די וויקוניאַ איז עטוואָס קלענער פון דער לאַמא און האָט זעהר אַ צערטליכען אויסזעהן. איהר פעל איז באדעקט מיט דינע גע-קרייזעלעכע וואָלענע האָר, וועלכע זיינען אויף דעם אויבערשטען טייל פון קערפער רויטליך־געלעב, וועהרענד אויף דער ברוסט און בויך ווייס. די האָר אויף דער ברוסט און בויך זיינען גאַנץ לאַנגע, אָפט איבער פינף צאָל די לענג. די וויקוניאַס לעבען אין קליינע גרופעס, וועלכע באשטעהען פון זעקס ביז פופצעהן נקבות און איין זכר אָדער וועלכע באשטעהען אינגאנצען פון זכרים. זיי געפינען זיך אויף די בערג פון צענטראל אמעריקא, פון וועלכע זיי לאָזען זיך אראָפּ אין טאָל, בלויז אין די טרוקענע יאָהרעס-צייטען, ווען אויף די בערג קענען זיי געפינען וועניג שפיין. הירשען. — אין דער פאמיליע הירשען עקזיסטירען איצט

זעקס גאטונגען מיט 50 ארטען, וועלכע זיינען פארשפרייט אין די וועלדער און אין די סטעפעס פון אייראָפּא, אזיע, אמעריקא און ביי די נאָרדליכע ברעגעס פון אפריקא. אין אויסטראליען און אין פּאָלינעזיען זיינען זיי אינגאנצען ניטאָ. קיין אויבערשטע שנייד-ציינער האָבען די הירשען ניט. ביי מאַנכע פעהלען אויך די אויגען-ציינער. זיי האָבען צו צוויי קאָפיטעס אויף די פּאָ-דערשטע און הינטערשטע פיס. די זכרים, אין גאנץ זעלטענע פעלע אויך די נקבות, האָבען צווייגענע הערנער, וועלכע פאלען ביי זיי אראָפּ אין אַ געוויסער צייט פון יאָהר און אַנדערע הערנער וואַסען אָפּ אויף זייער פּלאַץ.

דער רעדע-הירש, וועלכער איז פארשפרייט אין אייראָפּא, איז אומגעפעהר זיבען פוס לאַנג און פינף פוס הויך, מיט אַ גאנץ קורצען עק. ער איז שלאַנק אָבער קרעפטיג געבויט, מיט אַ בריי-טער ברוסט, מיט אַ שלאַנקען האַלז, מיטעל-גרויסע אויגען, צוגע-שפיצטע אויערען און הויכע דינע פיס. זיין קערפער איז כאַ-דעקט מיט קורצע, געדיכטע האָר, וועלכע זיינען אויפ'ן האַלז, באַזונדערס פון פּאַרענט, באַדייטענד לענגער. דער קאָליר פון זיינע האָר ענדערט זיך לויט די יאָהרעס-צייטען און לויט זיין עלטער. אין ווינטער איז ער ברוין-גרוי, ווערנער אין זומער איז ער רויטלעך-ברוי. ער געפינט זיך מייסטענס אין די וועלדער פון בערגיגע געגענדען, וואו ער לעבט אין גרעסערע אָדער קלענערע סטאַדעס. ער געהט אַרויס זוכען זיין שפייז מייסטענס ביינאַכט. ער געהט אין פעלדער, אין גערטנער און ער עסט כמעט אלע גרינסען, תבואות און פרוכטען, וועלכע ער געפינט. אין הערבסט עסט ער אויך שוועמלעך און אין ווינטער מאַך און קאָרע פון בוימער. דער ערע-הירש לויפט זעהר שנעל, קלעטערט גוט אויף בערג און איז אַן אויסגעצייכענטער שווימער. זיין חוש השמיעה, זיין חוש הריח און זיין חוש הראיה זיינען באַזונדערס זעהר גוט ענטוויקעלט. אין דער פּאַרונגס-צייט איז ער ווילד און אויפגע-רעגט און ער גרייפט זאָגאר אָן מענשען. די פּאַרונגס-צייט פאנגט זיך אָן ביי די הירשען אָנהויב סעפטעמבער און דויערט ביז אָקט טאָבער. עס פאנגט זיך דאָן אָן אַ קאמפּף צווישען די שטאַרקערע און שוואַכערע זכרים וועגען דעם באַזיץ פון די נקבות. דער שטאַרקערער הירש טרייבט אַוועק די שוואַכערע און ער בלייבט דער הערשער איבער דער סטאַדע. אין דער פּאַרונגס-צייט ווערט

דער האַלז פון הירש באוואקסען מיט לאַנגע האָר און אויף זיין בויך באַווייזט זיך אַ גרויסער שוואַרצער פּלעק. פון מיטען סעפּ-טעמבער אָן, באַזונדערס אין די קעלטערע נעכט, הערט מען דאָס שרייען פון די הירשען, אַ געשריי וואָס איז עהנליך צו דעם ברומען פון אַן אָקס. אַזעלכע געשרייען לאָזען זיי מייסטענס אַרויס, ווען זיי דערשפּירען, אַז ניט ווייט געפינט זיך אַ קאָנקורענט, וואָס וויל אַוועקרויבען די הערשאַפט איבער דער סטאַדע פון זיי. די קעמפּפּע צווישען די הירשען זיינען זעהר בלוטיגע, אָפט מאַכען זיי זיך אין קאַמפּף טויטליכע וואַונדען. מאַנכעס מאָל פאַרפּלעכטען זיי זיך אין קאַמפּף איינער מיט דעם אַנדערען מיט זייערע הערנער, דאָס זיי קענען זיך ניט אָפּרויסען איינער פון אַנדערען און ביידע פאַרלירען זייער לעבען.

נאָהענט צו דעם ערעל-הירש איז דער אַפּריקאַנער הירש און דער נאָרד-אַמעריקאַנישער „עלק“ אָדער „וואַפּיטי“, וועלכער רעכענט



צייכונג 211. — דער אַמעריקאַנער עלק (וואַפּיטי).


זיך אלס דער גרעסטער הירש צווישען די היינט עקזיסטירענדע הירש-שען. א גרויסער הירש איז אויך דער עלען-הירש, וועלכער איז פארשפרייט אין די געגענדען פון באלטישען ים. ער האט גרויסע, ברייטע, פלאטשיגע, פארצווייגטע הערנער און זיין קערפער איז באוואקסען מיט לאנגע האר.



צייכונג 212. — דער אמעריקאנער בולמוז.

איינער פון די גרויסע און כאראקטעריסטישע הירשען איז אויך דער אמעריקאנער „בולמוז“ אָדער „מוז“, ווי ער ווערט גע-וועהנליך קורץ גערופען. ער האט א גרויסען קאפ און זעהר גרויסע, ברייטע, פלאטשיגע, צווייגיגע הערנער. דער „מוז“ האט אין מאנכע הינזיכטען א געוויסע עהנליכקייט מיט דעם באלטישען עלען-הירש.

די זשיראפען. — די פאמיליע זשיראפען ענטהאלט איצט בלויז די איינציגע ארט זשיראפען, וועלכע לעבען אין אפריקא. דער זשיראף צייכענט זיך אויס מיט זיין לאנגען האלז און מיט זיינע הויכע פאָדערשטע פיס. דער פאָדערשטער טייל פון זיין קערפער, פון זיינע קאָפיטעס ביז די ענד פון זיינע הערנער, איז אומגעפעהר צוואַנציג פוס הויך. זיינע פיס האָבען צו צוויי פינגער באַדעקט מיט קאָפיטעס. אויף זיין קאָפּ האָט ער צוויי קורצע גראַדע הערנער, וועלכע זיינען באַוואַקסען מיט הויט. אויך אויף זיין שטערען האָט ער אַ קליינע אַרויסוואַקסונג, ווי אַ האָרן.



צייכנונג 218. — זשיראפען (אויבען אין דער צייכנונג ווערט געצייגט די וואַרם-עהנליכע צונג פון זשיראף).


זיין עק איז אומגעפעהר פיער פוס לאַנג און ענדיגט זיך מיט אַ דיקען האַרבינטעל. זיין פעל איז אַ געפלעקטע. דער גרונד-פארב פון זיין פעל איז זאַמד-געלב. אויפ'ן רוקען עטוואָס דונ-קעלער, אויפ'ן בויך העלער, מיט גרויסע, קאַנטיגע, ראָסט-ברוינע, אָדער שוואַרצע פלעקען איבער דעם גאַנצען קערפער. זשיראַפען לעבען אין גרופעס פון זעקס ביז אַכט, אָפט אויך פון דרייסיג ביז 40 שטיק. דער זשיראַף נעהרט זיך געווענליך מיט גרינע בלעטער און יונגע צווייגלעך פון בוימער, וועלכע ער דערגרייכט מיט זיין לאַנגען האַלז און רייסט אָפּ מיט זיין אייגענטימליכען וואָרס-פער-מיגען צונג. אין אַ נויט עסט ער אויך פארטריקענטע גראָז

דער זשיראַף איז אין אַלגעמיין אַ גאַנץ פרידליכע חיה. ער אַנטלויפט געוועהנליך פון זיינע אָנגרייפער. ער איז אַ באַזונדערס שנעלער לויפער, ער קען לויפען אזוי שנעל ווי אַ גוטער פערד, נאָר מיט מעהר אויסדויער. נאָר ווען עס קומט זיך איהם אויס צו פארטיידיגען, איז ער אויך אַ גוטער קעמפער. ער קעמפט מיט זיינע שטאַרקע פיס, מיט וועלכע ער קען געבען אַזעלכע קרעפ-טיגע קלעפ, דאָס ער קען זאָנאַר אַ לייב אָפטרייבען פון זיך.

די זשיראַפען פאַרען זיך אין פריהלינג, און נאָך אַ טראָגען פון 14 מאָנאַטען, געבערט די נקבה איין קינד, וואָס זי זויגט און ערציהט בי עס ווערט זעלבסטשטענדיג.

**מאַשום-חיות.** — פון דער פאַמיליע מאָשום-חיות, אָדער ביזאַם-חיות, ווי זיי ווערען אויך גערופען, עקזיסטרען איצט בלויז די ביזאַם-ציגען, וועלכע לעבען אין צענטראַל-אַזיען. די ביזאַם-ציגען זיינען הירש-עהנליכע חיות, זיי האָבען אָבער ניט קיין הערנער. זיי זיינען פארשפרייט אין די בערגיגע געגענדען פון אַמור, אינדיע, כינאַ, טיבעט, מאָנגאָליע און אַרום דעם באַיקאַל-זע. די ביזאַם-ציגען האָבען שלאַנקע פיס מיט צוויי קאָפיטעס, די זכרים האָבען לאַנגע שפיציגע אויבערשטע אויגען-צינגער, וועל-כע שטאַרצען אַרויס פון זייער מויל, אַ קורצען דיקען עק און מיטעל-גרויסע אויערען און אויגען. דער קאָליר פון זייער פעל איז טונקעל, רויט-ברוין אָדער געלבלויך-ברוין. זיי זיינען אויס-געצויבענטע שפרינגער און קלעמערער, אָבער זעהר שרעקעדיג. בייטאַג לינגען זיי געווענליך באַהאַלטען, נאָר ווען עס ווערט דונ-קעל געהען זיי אַרויס פון זייער באַהעלטענים זוכען זייער שפייז. זיי עסען גראָז, קרייטיכער, וואָרצלען, גרינסען, יאַגדעס און מאָך.

זיי לעבען פאָרווייז, נאָר ווען עס קומט זייער פאָרונגס-צייט, קלייבען זיי זיך צונויף אין גרעסערע סטאָדעס און עס פאָנגט זיך אָן אַ ביטערער קאָמפּף צווישען די זכרים, וועגען דער הער-שאַפט אין דער סטאָדע. די זכרים לאָזען אַרויס פון זיך אין יענער צייט אַ שטאַרקען מאַשוס אָדער ביזאַם גערוד, וועלכער פאַר-שפּרייט זיך גאַנץ ווייט. זיי פאַרען זיך אין דער צייט פון נאָוועמ-בער ביז דעצעמבער, און אין מאַי געבערט די נקבה איינס אָדער צוויי קינדער, וועלכע זי זויגט און ערציהט, ביז זיי קענען אַליין זיך באַזאָרגען זייער שפּיין.



צייכנונג 214. — רעכטס, אַ ווירדזשיניאַ הירש (אַמעריקאַנער); לינקס, אַ משוס הירש.

די מאַשוס-חיות צייכענען זיך אויס דערמיט, וואָס די זכרים האָבען אויף זייער בויך, צווישען דעם נאָפּעל און זייערע גע-שלעכטס-אָרגאַנען אַזאַ רונדליך הויט-בייטעל, אין וועלכען עס גע-פינען זיך צוויי קליינע עפּנונגען. אין דעם בייטעל געפינען זיך עס די מאַשוס אָדער די ביזאַם דריזען פון דער חיה, וועלכע גיבען אַרויס פון זיך אַזאַ שטאַרקיריכענדרען, זאַלבע-הנליכען שטאָף. דער דאָזיגער שטאָף ווערט שוין פון לענגערע צייטען געברויכט אַלס אַ ווירדזאַמער מעדיצין. אַמאָל איז מאַשוס געווען כמעט די איינ-ציגע מעדיצין וואָס פלעגט איינגעגעבען ווערען אַ גוסס צו פאַר-לענגערען זיין לעבען. איצט ווערט מאַשוס הויפטזעכליך באַנוצט אין דער פאַבריקאַצין פון פאַרפּומען.

צווערן-מאָשום-חיות. — צו דער דאָזיגער פאמיליע באַלאַנז גען די קליינע מאָשום-חיות, וועלכע לעבען אין יאווא, סינגאפור און אין דעם מאַלאַאישען האַלב-אינזל. זיי זיינען זעהר עהרני לייך צו די געווענליכע מאָשום-חיות און מאַנכע זאָפּלאַגען טיילען זיי ניט אויס אין אַ באַזונדערע פאמיליע, נאָר זיי רעכענען זיי אַרײַן אין דער אַלגעמיינער מאָשום פאמיליע. זיי זיינען קליין געוואַקסען אומגעפעהר אַנדערטהאַלבען פּוס די לענג, זיינען זעהר שעהן און קלוג. דער וויכטיגסטער אַרגאנישער אונטערשייד צווישן זיי און די געווענליכע מאָשום חיות באשטעהט אין דעם, וואָס זיי האָבען ניט קיין בלעטער-מאָגען („סדור“).



צייכנונג 215. — אַ מאָשום אָקס.


די האַרן-חיות. — צו דער פאמיליע האַרן-חיות באַלאַנגען די יעניגע חיות, וועלכע האָבען אויסגעהוילטע הערנער, ווי רינדער, שאַף, אַנטעלאָפּען, ציגען, געמזען, בופעלאָקסען, מאָשום-אָקסען און אַז. וו. זיי האָבען אַלע צו צוויי קאָפיטעס אין זייערע פּיס, אויבערשטע שנייד-ציינער און אויגען-ציינער האָבען זיי ניט, זיי שפּייזען זיך מיט גראַז, גרינסען, וואַרצלען און תבואה. עס עקט זיסטירען היינט אַרום דרייסיג גאַטונגען מיט 150 אַרטען. אַ גרוי-סער טייל פּון זיי זיינען פאַרוואַנדעלט געוואָרען אין הויז-חיות אָדער בהמות, ווי מען רופט זיי.

די הויז-רינדער שטעלען מיט זיך ניט פאַר קיין נאַטירליכע ספּעציע. זיי קומען אַרויס פּון אַ גאַנצע רייה פּאָרונגען פּון פאַר-שידענע ספּעציעס. די קעלכער האָבען שוין געווענליך ביי דער



געבורט צוויי שנייד-ציינער און 12 באק-ציינער און אין א פאר-  
 לויף פון 4 וואָכען שניידען זיך ביי זיי ארויס אלע מילך-ציינער,  
 וועלכע פאלען שפעטער ארויס און אויף זייער אָרט וואקסען ארויס  
 די באשטענדיגע ציינער. די טראַג-צייט פון א קוה איז אומ-  
 געפעהר 9 חדשים, אָפט א סך מעהר. עס קומען פאַר פעלע, ווען  
 די טראַג-צייט דויערט 350 טעג. זי געבערט געווענליך בלויז  
 איין קאלב, זעלטען צוויי.

דער מאָסוס אָדער ביזאָס אָקס לעבט אין ווילדען צושטאנד  
 אין נאָרד-אַמעריקא און אין גרינלאַנד. ער איז באַדעקט מיט  
 לאַנגע, געדיכטע דונקעל-ברוינע האָר און האָט קורצע, זעהר קרעפ-



צייכנונג 216. — 1 אַ פראַנגהאַרן אַנטעלאָפּ; 2 אַ באַרג-באָק.

טיגע פיס מיט גרויסע קאָפּיטעס. ער לעבט אין סטאַדעס, גע-  
 ווענליך אין טאַלען, נאָהנט פון אַ טייך. אין ווינטער-צייט פאר-  
 קלייבט ער זיך אין וואַלד און געהרט זיך מיט די פלאַנצען, וועלכע  
 ער געפינט דאָרטען. ער לויפט זעהר שנעל, שפּרינגט גוט און  
 קלעמערט אויסגעצייכענט אויף בערג און פעלזען.

דער אַזיאַטישער בופעל-אָקס שטאַמט פון אַסט-אינדיען און  
 ציילאָן. ער לעבט אין רייך-באַוואַסערטע געגענדען און לעבט צו  
 ליגען אין וואַסער אָדער אין בלאַטע. ער לעבט מייסטענס אין  
 ווילדען צושטאנד, אָבער ער ווערט אויך ניט שווער צוגעוואוינט  
 צום הויז. אַ בופעל-קוה טראַגט 10 חדשים און געבערט איין קינד.

שאָף אָדער שעפּסען זיינען אין ווילדען צושטאַנד בערג־חיות. זיי געהען אַראָפּ אין טאָל בלוז, ווען די בערג ווערען באַדעקט מיט אַ טיפען שנעע און זיי קענען דאָרטען מעהר ניט געפינען קיין שפייז. אויף פּלאַך־לאַנד לעבען בלוז די, וועלכע זיינען פאַרוואַנדעלט געוואָרען אין הויז־שעפּסען. די שעפּסען זיינען שוין אין גאַנץ אַלטע צייטען פאַרוואַנדעלט געוואָרען אין הויז־חיות.



צייכונג 217. — 1 אַ בערג־שעפּס; 2 אַ גאַזעלע.


די טראַג־צייט פון אַ שעפּס איז אומגעפעהר פון 20 ביז 21 וואָכען, אָפט אויך 22 און 23 וואָכען. די מאַרינאָס און ענג־לישע שעפּסען געבערען בלוז איין לעמעלע, די געווענליכע לאַנד־שעפּסען האָבען מייסטענס צוויילינגס, אויך דריילינגס און אָפט פינפלינגס. הערנער האָבען געווענליך בלוז די זכרים, די באַ־ראַנעס.

די ציגען זיינען צוגלייך מיט די שעפּסען אין זייער ווילדען צושטאַנד בערג־חיות. זיי לעבען אין סטאַדעס, זיי קלעמערען און שפּרינגען זעהר געשיקט און זיינען זעהר פאַרוזיכטיג. די הויז־ציגען שטאַמען אָפּ פון ווילדע ספעציעס. די ציגען

זיינען נאנץ מוטיגע חיות, דער באַק, דער זכר פון די ציגען, איז זאָנאר קריגעריש און אָנגרייפֿעריש. די טראַגצייט פון אַ ציג איז אומגעפֿעהר פון 21 ביז 22 וואָכען און זי געבערט פון איינס ביז פֿיער ציגעלעך.

דער העלפֿאָנט. — מאַנכע פון די זאָלאָגען רעכענען דעם העלפֿאָנט אריין אין דער אָרדנונג פון די הויף־חיות, ווערענד אַנ־דערע טיילען איהם אויס אין אַ באַזונדערער אָרדנונג, די אָרד־נונג פון די „ריסעל־חיות“, דאָס הייסט חיות, וועלכע האָבען אַ לאַנגען שנויף אָדער קישקע אַלס זייער נאָז. דער העלפֿאָנט איז איצט די איינציגע עקזיסטירענדע חיה פון דער דאָזיגער אָרדנונג און עס זיינען פֿאַראַן צוויי ספֿעציעס: דער אינדישער העלפֿאָנט און דער אַפֿריקאַנער. דער העלפֿאָנט איז די גרעסטע חיה פון די לעבענדע לאַנד חיות. דער העלפֿאָנט האָט אַ קורצען דיקען קער־פֿער, הויכע קלעצער־אַרטיגע פֿיס, אַ מיטעל־לאַנגען עז, אַ קורצען האַלז, זעהר גרויסע אויערען, קליינע אויגען, אַ לאַנגען נאָז (ריסעל), עהנליך צו אַ שלויך מיט אַ דינעם פינגער ביים ענד, צוויי זעהר גרויסע אויגען־ציינער, בלוז איין אויבערשטען און איין אונ־טערשטען באַק־צאָהן אין יעדער זייט, אַ דיקע געקנייטשטע, ערד־פֿאַרביגע הויט, באַוואַקסען מיט נאָנץ שיטערע שטייפֿע האָר. די צוויי גרויסע אויגען־ציינער, דאָס „עלפֿענביין“, וואַקסען ביי דעם העלפֿאָנט זיין נאָנצען לעבען און וואַקסען אָפט אויס ביז אַ לענג פון 10 פוס און אַ געוויכט פון איבער 200 פונט. געווענליך זיי נען זיי נאָר עטוואָס מעהר ווי זעקס פוס לאַנג און פון 75 ביז 120 פונט שווער. די פֿיער־באַק־ציינער פון דעם העלפֿאָנט זיי נען זעהר גרויסע. יעדער באַק־צאָהן באַשטעהט פון אַ גאַנצע רייה פֿלאַטען, וועלכע זיינען איינע מיט די אַנדערע באהעפט מיט אַזאַ צעמענט. יעדער צאָהן פֿאַרנעמט די גאַנצע יאַסלע פון באַק־ביין. ווען די דאָזיגע באַק־ציינער ווערען אָפֿגעריבען און אויסגעברעקעלט, וואַקסען אַנדערע אָפֿ אויף זייער פֿלאַץ. זעקס מאָל בייטען זיך די דאָזיגע ציינער אין דעם לעבען פון דעם העלפֿאָנט. דעם ריסעל קען דער העלפֿאָנט איינציהען, אויסציהען און ציוניפֿרעדען. ער איז זעהר אַ באַוועגליך גליד, דער העלפֿאָנט קען מיט איהם אָנע־טען, ווי מיט אַ פינגער, דעם קלענסטען געגענשטאַנד. מיט דעם ריסעל נעמט דער העלפֿאָנט שפייז און ווארפט עס אין מויל

אריין, ער זיינט אין איהם אריין וואסער און גיסט עס נאכרעם אין זיין מויל אָדער באשפּריצט זיין קערפּער. ער באַדיענט זיך אויך מיט זיין ריסעל אַלס וואַפּע געגען פּיינר. ער קען מיט איהם געבען זעהר שטאַרקע קלעפּ. ער באַנוצט אויך זיינע גרויסע אויגען־ציינער אַלס וואַפּע און אויך זיינע קלעצער־פּיס, מיט וועל־כּע ער צוטּרעט זיין אָנגרייפּער.




צייכנונג 218. — אַ אינדישער העלפּאַנט.

דער אינדישער העלפּאַנט איז אונגעפּעהר צוועלף פּוס לאַנג און אונגעפּעהר אַזוי הויך. זיין נאָז (ריסעל) איז איבער זעקס פּוס לאַנג. זיינע אויגען־צייהנער זיינען געוועהנליך נאָהענט פּון פינף פּוס די לענג, זיינע פּאָדערשטע פּיס האָבען צו פינף פינגער מיט קאפּיטעס און זיינע הינטערשטע פּיס בלויז פּיער. ער לעבט אין די וועלדער פּון בירמא, סומאַטראַ, ציילאָן און אויף דעם מאַלאַי־אינזעל.

דער אַפּריקאנער העלפּאַנט איז גרעסער ווי דער אינדישער

און ער האָט אויך גרעסערע אויגען־צייהנער, גרעסערע אויערען און אַ לענגערען, אָבער דינערען, ריסעל. אויף די פּאָדערשטע פּיס האָט ער צו פיער פינגער מיט קאָפיטעס און אויף די הינטערשטע — צו דריי. ער לעבט אין די אינערליכע געגענדען פון אַפריקא. די העלפּאנטען לעבען אין קלענערע אָדער גרעסערע סטאָדעס אין גרויסע וועלדער, ווי אויך אין סטעפעס, וועלכע זיינען באַוואַקסען מיט הויכע גראַז און וואו עס זיינען אויך פאראן בוימער. ביי טאָג האַלטען זיי זיך אויף צווישען די געדיכטע בוימער, וועהר




צייכנונג 219 — 1) דער שאַרבען פון אַן אינדישען העלפּאנט. א, די עלפּען־בויגן צייהנער; ב, דער אונטערשטער קינבאַק, וואו עס זיצען די באַק־צייהנער; ג, די נאָזלעכער ביים ענד פון דעם ריסעל. 2) דער אונטערשטער קינבאַק פון העלפּאנט מיט די באַק־צייהנער אין איהם, געזעהען פון אויבען.

רענד ביי נאכט געהען זיי אַרויס זוכען זייער שפּייז. זיי געהען דורך די אוראַלע וועלדער דורכברעכענדיג זיך אַ וועג צווישען די געדיכטע בוימער, איבערווינדענדיג אַלע שטערונגען, וועלכע זיי טרעפּען אין זייער וועג. זיי געהען געוועהנליך לאַנגזאַם, אָבער זיי קענען אויך שנעל לויפּען, דאָס מען קען זיי מיט אַ פּערד ניט דעריאָגען. זיי קענען אויך גוט קלעטערען און זיינען אויסגעצייכענטע שווימער. זיי שלאָפּען אַפּט שטעהענדיג, אָבער אַפּט לעגען

זיי זיך אויך אנדרער, באַזונדערס ווען זיי קומען צו אַ זאמדיגען פּלאַץ. זיי לעבען זיך צו באַדען אין זאַמד, זיי לעגען זיך אַוועק און שימען זאַמד אויף זייער קערפּער מיט זייער ריסעל. דער חוש הראיה איז ביי די העלפּאנטען ניט זעהר שטאַרק ענטוויקעלט, אָבער זיי האָבען אַ זעהר שאַרף ענטוויקעלטען חוש השמיעה און חוש הריח. די העלפּאנטען זיינען זעהר קלוגע חיות און אין דעם אומגאַנג מיט מענשען ענטוויקעלט זיך זעהר פאַרשטאַנד גאַנץ באַזונדערס. זיי זיינען רוהיגע און גוטמוטיגע חיות, זיי גרייפען קיינעם ניט אָן אַפילו ווען זיי לעבען אין דער ווילדערניש. זיי ווערען אויך זעלטען אָנגעגריפען פון אנדערע חיות. עס שיינט, אַז אַפילו די ווילדעסטע רויב־חיות האָבען מורא פאַר זיי. נאָר ווען זיי ווערען גערייצט אָדער אָנגעגריפען, ווערען זיי זעהר בייז און געפעהרליך. זיי געדענקען אַ קרוודע אַ לענגערע צייט און נעהמען אָפּט ראַכע. זיי וואַנדערען אַרום אין סטאַדעס פון 30 ביז 200 שטיק, זיי האַלטען זיך אין אָפּגעשלאָסענע פּאַמיליען און נעהמען ניט אַרײן אין זייער סטאַדע קיין פּרעמדע העלפּאנטען. ווען אַ העלפּאנט האָט זיך אָפּגעריסען פון זיין סטאַדע בלייבט ער לעבען איינזאַם. יעדע סטאַדע האָט איהר פיהרער. אין דער סטאַדע זיינען נקבות פאַראַן מעהר ווי זכרים, אויף זעקס אָדער אַכט נקבות קומט אויס איין זכר. די העלפּאנטען ווערען באַגלייט פון דעם מאָדענהאַקער פויגעל און פון אנדערע. די פויגעלען קלייבען אָפּ די פאַרשידענע אינזעקטען, וועלכע באַפאלען די העלפּאנטען. די הויפּט־נאַהרונג פון די העלפּאנטען באַשטעהט פון בלעך מער און צווייגען, וועלכע זיי רייסען אַראָפּ מיט זייער ריסעל פון די בוימער, זיי עסען אָבער אויך גראַז און אנדערע גרינסען. אין 18 אָדער 22 חדשים נאָך דער פאַרונג געבערט די נקבה איין קינד, וואָס איז אונגעפעהר דריי פוס די הויך, און עס דויערט 25 יאָהר ביז עס וואַקסט אויס, און עס דערגרייכט ערשט זיין פולע העל־פאַנט־קראַפט צו 35 יאָהר. אין דער פרייהייט לעבען העלפּאנטען ביז 150 יאָהר, אין געפאַנגענשאַפט שטאַרבען זיי אָבער יונג. אין געפאַנגענשאַפט ווערען די העלפּאנטען באַנוצט פאַר פאַר־שידענע אַרבייט, וועלכע זיי לערנען זיך שנעל אויס און טוען זיי מיט גרויס געשיקטליכקייט. מען קען זיי זאָגאַר אויסלערנען טאַג־צען און מאַכען פאַרשידענע קונצען. אין די אַלטע צייטען פלעגען זיי באַנוצט ווערען אין מלחמה צו רייטען אויף זיי.

די העלפאנטען ווערען אלץ וועניגער. מענשען האָבען שוין פון די אלטע צייטען אָן אָנגעפאנגען זיך יאָגען נאָך זיי צוליבע זייערע צייהנער, דאָס עלפּענביין.

רויב-חיות (קארניוואָראַ). — די אָרדנונג „רויב-חיות“ אָדער „פלייש-עסער“ נעמט אין זיך אַרײַן די אלע זויג-חיות, וועלכע נעהרען זיך אין גאנצען אָדער הויפטזעכליך מיט דעם פלייש און בלוט פון אנדערע חיות, וועלכע זיי איבערפאלען און מאָרדען. די צייהנער ביי די דאָזיגע חיות זיינען צוגעפאסט צו דער אַרט שפייז



צייכנונג 220. — א, דער פוס פון אַ קאץ מיט די קרעלען איינגעצויגען; ב, דער פוס פון אַ קאץ מיט אויסגעצויגענע קרעלען; ג, דער פוס פון אַ בער; ד, די הינטערשטע פיס פון אַ ים-הונט; ה, דער פוס פון אַ לויב.

מיט וואָס זיי נעהרען זיך. זיי האָבען זעקס אויבערשטע און זעקס אונטערשטע שנייד-צייהנער און צוויי אויבערשטע און צוויי אונטערשטע גרויסע, שפיציגע אויגען-צייהנער. די ערשטע באַק-צייהנער, די אמת'ע מאלארען, זיינען ניט אין גאנצען פלאַך, נאָר האָבען שאַרפע שפיצען. און וואָס בלוטיגער די רויב-חיה איז, אַלץ קרעפטיגער זיינען איהרע רייס-צייהנער און אַלץ וועניגער פלאַכע באַק-צייהנער האָט זי. זייערע פיס ענדיגען זיך מיט פינף אָדער מיט פיער פרייע באַוועגליכע פינגער, וועלכע זיינען באַזאָרגט מיט שטאַרקע קרעלען (נענעל), וואָס אנדערע פון זיי, ווי קעז, לייבען, טיגערס, א. א.ו.ו., קענען זיי איינציהען און אויסציהען (באַהאַלטען די נענעל אָדער זיי אַרויסווייזען). אנדערע פון זיי געהען בלויז אויף די שפיץ-פינגער, ווי קעז, טיגערס, לייבען, א. א.ו.ו. אנדערע ווידער געהען אויף דעם פאָדערשטען טייל פון זייער פאָדעשווע (פוס-זוויל), ווי די ציבעט-קעז, וועהרענד אנדערע, ווי די בערען געהען אויף זייער גאנצע פאָדעשווע. די חושים זיינען ביי די רויב-חיות זעהר גוט ענטוויקעלט: די אויגען גרויס, דער חוש הריח און דער חוש השמיעה באַזונדערס שאַרף און די ליפען האָבען לאַנגע פיהל-האַר. פיעל פון די רויב-חיות האָבען אין הינטער-לייב אַזעלכע דריזען, וועלכע גיבען אַרויס א פליסיגקייט, וואָס האָט זעהר א שלעכטען גערוך, ביי אנדערע, ווי ביי די טכורען און סקאַנקס, איז דער גערוך אַזוי שטאַרק, דאָס זיי פארטרייבען מיט איהם יעדע חיה, וואָס גרייפט זיי אָן.

די רויב-חיות לעבען מייסטענס אין מאַנאָגאָמיע, איין זכר מיט איין נקבה. פיעלע פון זיי לעבען געזעלשאַפטליך, אין קלענערע אָדער גרעסערע גרופען. די רויב חיות ווערען געוועהנליך געבאָרען שוואַך, אונטער-וויקעלט און הילפלאָז און זיי זיינען אַ לענגערע צייט אַפּהענגיג פון זייער מוטערס מילך.

די איצט-עקזיסטירענדע רויב-חיות ווערען איינגעטיילט אין אונגעפעהר 40 גאַטונגען און 300 אַרטען (ספעציעס) און די אַלע גאַטונגען און אַרטען ווערען איינגעטיילט אין 9 פאַמיליעס.

**בערען.** — די בערען זיינען די גרעסטע חיות אין דער אָרד-נונג פון די רויב-חיות, אָבער זיי זיינען וועניגער רויבעריש און בלוט-דורשטיג ווי די אנדערע. אנדערע פון זיי עסען פלייש בלויז צופעליג, וועהרענד זייער הויפט-שפיז באַשטעהט פון פרוכטען, גרינסען, האָנגי, אינזעקטען און יאָגערס. די בערען האָבען גרויסע



לאפעס, מיט שטארקע אָבער ניט שפּיציקע נעגעל. זיי געהען אויף דער גאנצער לענג פון זייערע פּאָדעשוועס (פּוס-זווילען). אַרײַנ-ציהען אָדער „באהאלטען“ זייערע נעגעל קענען זיי ניט. זיי זיינען זעהר גוטע קלעמערער און קענען אויף אַ לענגערע צייט געהן אויפֿ-געשטעלט אויף זייערע הינטערשטע פּיס. די צייהנער ביי די בערען זיינען ניט אין גאַנצען אַזוי ווי ביי אַנדערע רויב־חיות. זייערע באַק-צייהנער זיינען עהנליכערע צו די צייהנער פון די וועניטאַרישע חיות. די בערען האָבען קורצע, קרעפטיגע פּיס, אַ גאַנץ קורצע עק, אַ קורצען, דיקען האַלז, קורצע אויערען און מיטעל־גרויסע אויגען. זייער הויט איז באַדעקט מיט לאַנגע געדריכטע האָר, זיינען באַזונדערס קרעפטיג, זיי דערשטיקען זייערע שטאַרקסטע פּינד דורך אומאַרמען מיט זייערע קרעפטיגע פּאָדערשטע פּיס. זיי לעבען אין די קאַלטע און מעסיגע געגענדען, אין די וואַרעמע געגענד דען געפינט מען זיי בלויז אויף הויכע בערג. דעם גרעסטען טייל פון ווינטער שלאָפען זיי, אָבער זיי ערוואַכען אין מיטען און געהען אַרויס זוכען שפּיז. אין דער יונגער נעהרען זיך די בערען בלויז מיט פלאַנצען און פּרוכטען, פלייש פּאנגען זיי אָן עסען, ווען זיי ווערען עלטער.

דער ברוינער בער, אָדער דער אייראָפּעאישער בער, ווי ער ווערט אויף גערופּען, איז איבער זעקס פּוס לאַנג און פון דריי אַ האַלב ביז פיער פּוס הויך. זיין פעל איז, געוועהנליך, ברוין, עס זיינען אָבער אויף פאַראַן אַזעלכע, וואָס זייער פעל איז גרוי שוואַרצליך מיט ווייסע פלעקען. אין דער יונגער האָט ער אַ וויי-סען, שמאַלען האַלזבאַנד. ער עסט תּבואה, פּרוכט, האָניג, יאַגדעס, שוועמלעך, אינזעקטען, שנעקען, און אין נויט אויך נבלות. ווען ער קען די דאָזיגע שפּיזען ניט געפינען, באַפּאלט ער חיות און בהמות, מאַנכעס מאַל זאָגאַר מענשען. געוועהנליך אָבער גרייפט ער אָן מענשען, בלויז, ווען ער ווערט גערייצט. באַזונדערס געפּעהרליך איז די בערין (בעריכע), ווען איהרע קינדער ווערען אָנגעגריפען. דער ברוינער בער לעבט שטיל און איינזאַם, נאָר אין דער פּאָרונגס־צייט לעבט ער צוזאַמען מיט דער בערין. די פּאָרונגס־צייט איז אין מאַי אָדער יוני, און אין יאַנואַר געבערט די בערין פון איינעם ביז דריי קינדער, וועלכע זי זויגט דריי חדשים. גענוי וויפּיעל אַ בער לעבט איז ניט פעסטגעשטעלט. עס זיינען פּאָרגעקומען פעלע, ווען בערען האָבען געלעבט אין דער געפּאַנ-

גענשאפט 50 יאָהר. ווען עס פאנגען זיך אָן די שטאַרקע ווינטער-קעלטען, פאַרקריכט דער בער אין אַ לאַך פון אַ גרויסען בוים, אין אַ שפּאַלט פון אַ פעלז אָדער אין אַ גרוב און לעגט זיך שלאָפּען. ער איז דאמאלס זעהר פעט, און ווען ער שטעהט אויף ענדע ווינטער פון זיין שלאָף איז ער אין גאנצען אויסגעמאָגערט. עס טרעפט אָפּט, אַז ער כאַפּט זיך אויף פון זיין שלאָף אין מיטען ווינטער און געהט אַרויס פאַר אַ קורצע צייט זוכען שפּייז און לעגט זיך ווידער אַוועק שלאָפּען.

דער בער איז אין אַלגעמיין ניט קיין קלוגע חיה, ער איז דערצו פּויל, גלייכנילטיג און נאַכלעסיג. זיין גרויסע קראַפּט העלפט איהם אָבער אין אַלץ אַרויס. דער בער האָט אַ געפּיהל פאַר מוזיק. מען קען איהם לייכט אויסלערנען טאַנצען נאָך מוזיק און ער האַלט זעהר גענוי דעם טאַקט. אַמאָל איז דער בער געווען פאַרשפּרייט איבער גאַנץ אייראָפּא און טיילווייז אין אַזיע, איצט אָבער איז ער אין מאַנכע געגענדען פון אייראָפּא מעהר אין גאַנצען נייטאָ. אין אַזיען געפינט מען איהם נאָך היינט אין טיבעט, סיריען און אין פּאַלעסטינאַ. די טאַנץ-בערען, וועלכע ווערען אַרומגעפּיהט אויף אויסשטעלונגען, קומען פון די אַלפּען-בערג און פון די קאַרפּאַטען-בערג.

דער סירישער בער איז אין זיין יוגענד גרויברוין, אין זיין עלטער אָבער ווערט ער כמעט אין גאַנצען ווייס. ער געפינט זיך אין די בערג פון ארץ ישראל, באַזונדערס אין לבנון און סיריע. דער שוואַרצער בער אָדער „באַריבאַל“ ווי ער ווערט גערופּען, איז אַן אַמעריקאַנער בער. ער איז אַרום זעקס אַ האַלב פּוס לאַנג און איבער דריי פּוס הויך. ער איז פאַרשפּרייט אין די וועלדער פון נאָרד-אַמעריקאַ. ער געהרט זיך הויפטזעכליך מיט ווענע-טאַרישע שפּייזען, ער באַפּאַלט אָבער אויך אָפּט חיות און בהמות. אַ זעהר געפּעהרליכער בער איז דער אַמעריקאַנער גרויזלי-בער. ער איז גרויס געוואַקסען, אַרום 8 פּוס לאַנג און איז אָפּט טויזענד פּונט שווער. ער האָט לאַנגע, שטאַרקע, קרומע קרעלען (נעגעל), זיין קערפּער איז באַדעקט מיט לאַנגע, קאָלטענעוואַטע דונקעל ברוינע האָר, די קאָפּ-האַר אָבער זיינען קורץ און העל. ער איז רויבערישער פון אַלע אנדערע בערען. ער לעבט הויפטזעכליך מיט פלייש. ער גרייפט זאָגאַר אָן דעם בופּעל-אַקס און אויך מענשען, ווען ער ווערט אפילו ניט גערייצט.

אין זיד־אזיען, כינא און יאפאן איז פארשפרייט דער „קראגען־בער“. ער איז פון מיטעלען וואוקס, מיט א שווארצער פעל און האָט אויף זיין ברוסט אַ גאָפעל־פערמיגען פלעק. ער לעבט מייסט טענס אויף בוימער און שפייזט זיך הויפטזעכליך מיט גרינסען און פרוכטען, בלויז אין אַ נויט באַפאלט ער שעפסען, ציגען און אנדערע קלענערע חיות. אין זיד־אזיען געפינט זיך אויך אַ צוויי־טער אַרט בער, וועלכער איז גרעסער פון דעם קראגען־בער. מען רופט איהם דער „ליפען־בער“, צוליעב זיינע לאנגע באַוועגליכע ליפען. ער איז באַדעקט מיט שווארצע האָר, האָט אויפ'ן ברוסט אַ פּאָדקעווע־הנליכען פלעק, האָט זעהר לאַנגע און שטאַרקע נעגעל.




ציכונג 221. — אַ גרוזלי בער.

נאָר איז ניט רויבעריש. ער נעהרט זיך הויפטזעכליך מיט פלאַנ-  
צען, האַנגי, מוראשקעס און אַנדערע אינזעקטען. ער לעבט מייס-  
טענס אין בערגיגע געגענדען און איז אויך פארשפרייט אין ציילאָן.  
דער אייזבער אָדער פּאָלאַריבער איז זעהר א גרויסע חיה.  
ער איז אַרום 9 פוס לאַנג און דערגרייכט אַ געוויכט פון איבער  
דריטהאַלבען טויזענד פונט. זיין קערפער איז באַדעקט מיט לאַנגע  
ווייסע האָר. ער איז הויפטזעכליך פארשפרייט אין די קאלטע  
פּאָלאַרגעגענדען, אין גרינלאַנד, לאַבראַדאָר, שפיצבערגען און  
נאָוואַיא זעמליא. ער נעהרט זיך הויפטזעכליך מיט ים-הינד און  
מיט פיש. לאַנד-חיות גרייפט ער אָן בלוז אין נויט. ער גרייפט  
אויך אָן מענשען. ער איז אַן אויסגעצייכענטער שווימער און קען  
זיך האַלטען לאַנג אין וואַסער. ווינטער האַלט ער זיך אויף מייס-  
טענס אויף די קריעס פון ים-הקרח (אייז-מעער). די אייזבערין  
געבערט פון איינס ביז דריי קינדער, וועלכע זי זויגט און ערציהט  
און פארטיידיגט געגען פייגד מיט איהר לעבען.

די קאַצען-בערען באַלאַנגען אויך צו דער בערען פאַמיליע.  
זיי זיינען קליינע בערען מיט קאַצען-עהנליכע פוס. די פּאָדעשוועס  
פון זיערע פוס זיינען באַוואַקסען מיט האָר ווי ביי א קאַץ און  
זיי קענען אויך עטוואַס איינציהען און אויסציהען זיערע נעגעל.  
איינער פון דער גאַטונג לעבט אין די בערגיגע געגענדען פון הימאַ-  
לאַיא. מען רופט איהם „פּאַנדאַ“ אָדער „הימאַלאַיאַ ראַקון“. ער  
איז אונגעפעהר דריי א האַלב פוס לאַנג און האָט אַ דיקען פעלציגען  
עק, וועלכער איז איבער אַ פוס די לענג. ער האָט אַ רונדליכען,  
קורצען קאַפּ, קליינע אויערען, דער אויבערשטער טייל פון זיין קער-  
פער איז דונקל-רויט, זיין אונטערשטער טייל שוואַרץ און אויף  
די באַקען לאַנגע ווייסע האָר. ער האַלט זיך אויף מייסטענס אויף  
בוימער, און נערט זיך הויפטזעכליך מיט וועגיטאַרישע שפייזען.  
צו דער גאַטונג קאַצענבערען געהערט אויך דער בענטוראַנג בער,  
וועלכער לעבט אין באַרנעאַ, יאַוואַ און סומאַטראַ. ער האָט אַ  
לאַנגען, האַריגען וויקעל-עק (אַן עק וואָס וויקעלט זיך צונויף),  
וואָס איז כמעט אַזוי לאַנג ווי זיין קערפער. דער בענטוראַנג איז  
אונגעפעהר צוויי מיט דריי פערטעל פוס לאַנג, און זיין עק איז איבער  
צוויי אַ האַלב פוס לאַנג. ער לעבט אויף בוימער, געהט אַרויס  
ביי נאַכט זוכען זיין שפייז, וואָס באַשטעהט הויפטזעכליך פון  
פלאַנצען און פרוכטען.

אין בראזיליען געפינט זיך א גאטונג בערען, וועלכע ווערען גערופען „נאָז־בערען“. זיי זיינען שלאַנק געבויט מיט א קערפער עהנליך צו א מאַרדער, א קורצען האַלז, א לאַנגען, שפיציגען קאָפּ מיט א פאַרלענגערטען שנויצארטיגען נאָז, קורצע, רונדליכע אויער־רען, א לאַנגען, פעלציגען עק, קורצע, קרעפטיגע פיס מיט לאַנגע שפיציגע קרעלען. דער נאָז־בער גואַטי, וועלכער לעבט אין מזרח־בראַזיליען, איז עטוואַס לענגער ווי אַנדערטהאַלבען פוס און אונגע־פעהר א פוס די הויך. זיין עק איז כלויז מיט אייניגע צאָל קירצער ווי זיין קערפער. זיין קערפער איז באַדעקט מיט לאַנגע, געדיכטע האָר, וועלכע זיינען אויף דעם אויבערשטען טייל פון קערפער גרוי־ברוין, און אונטען געלבלויך. אויף די ליפּען און אַרום די אויגען האָט ער ווייסע פלעקען. אין נאָרד־בראַזיליען געפינט זיך אַן עהנליכער בער, וועלכען מען רופט „ווייס־נאָז־בער“, אָדער „ווייס־ריסע־בער“, צוליב זיין ווייסען פאַרלענגערטען נאָז. די נאָז־בערען זיינען אין בראזיליען זעהר פארשפרייט. זיי לעבען אין געזעלשאפט, און נאָר די זכרים זונדערען זיך אָפּ אין א געוויסען עלטער פון דער גרופע און לעבען, אויסער אין דער פאָרונגס־צייט, איינזאם. די נאָז־בערען עסען אי פלאַנצען, אי פלייש. זיי זיינען גוטע קלעמערער און לעבען מייסטענס אויף בויער. די נקבות געבערען פון דריי ביז פינף קינדער, וועלכע וואקסען שנעל אויס.



צייכונג 222. — א ראָקון (וואַש־בער).

וואַש־בערען. — א באַזונדערע פאַמיליע אין דער אָרדנונג פון די רויב־חיות שטעלען מיט זיך פאָר די וואַש־בערען אָדער ראָקונס, וועלכע לעבען אין נאָרד אמעריקא. זיי זיינען אין פיעלעס עהנליך צו די בערען, אָבער זיי האָבען א לאַנגען עק און זיי קענען אביסעל איינציהען און אויסציהען זייערע נעגעל. די וואַש־בערען האָבען א קורצען שנוק, גרויסע, נאָהענט איינע צו די אנדערע ליגענדע

אויגען, גרויסע, רונדליכע אויערען, פארהעלטניסמעסיג הויכע און דינע פיס מיט מיטעלמעסיג שטארקע נעגעל, א לאנגער פעלציגער עק און א לאנגהאָריגע פעל.

דער געוועהנליכער ראקון אָדער וואַשבער איז אונגעפעהר צוויי פוס לאנג און איבער א פוס הויך. זיין פעל איז געלבלויך-גרוי און שווארץ-ברוין, די פאָדערשטע פיס, די אויערען-געגענד, די זייטען פון שנוק און מאָרדע זיינען וויסליך. פון שטערען ביו צום שפיץ פון נאָז און אַרום די אויגען ציהט זיך א שווארץ-ברויער שטרייף, און פון די אויגען ביז צו די שלייפען א געלבלויך-ווייסער שטרייף. זיין עק איז גרוי-נעלב מיט שווארץ-ברויע רינגען און א שווארץ-ברוינעם שפיץ.

דער וואַשבער לעבט אין די וועלדער פון די אינערליכע טיילען פון נאָרד-אַמעריקא, באַזונדערס ביי טייכען און ביי אָזערעס. ער איז זעהר אַ מונטערע חיה, ער איז א גוטער קלעטער רער און א שנעלער לויפער. ער עסט אַלעס, וואָס איהם מאכט זיך. ער לעבט זיסיגקייטען, פרוכט, יאָגערעס, האָניג, באַפאלט נעסטען פון פויגלען און איז אַ געשיקטער פיש-פאַנגער. דעם נאָמען „וואַשבער“ האָט ער באַקומען צוליב דעם, וואָס ער טונקט זיין שפיץ אין וואַסער און וואַשט עס דאָרטען מיט די לאַפעס פון זיינע פאָדערשטע פיס. די נקבה געבערט פון 4 ביז 6 קינדער.

די מאָרדער. — צו דער פאַמיליע „מאָרדער“ באַלאנגען א גאַנצע רייה מאָרדער-הנליכע חיות, ווי דער סייבעל, דער וויעזעל, דער סקאַנק, דער טכויר (שעסקע), דער נערז, דער אָטער, דער הערמעלין, דער דאכס און א גאַנצע רייה אנדערע. אין דער מאַר-דער פאַמיליע עקזיסטירען איצט אַרום 20 גאַטונגען און 80 אַרטען. צווישען זיי געפינען זיך אַזעלכע, וועלכע געהען אויף דער גאַנצער לענג פון זייערע פאָדעשוועס (פיס-זוילען) און אויף אַזעלכע, וועלכע געהען בלויז אויף א טייל פון זייערע פאָדעשוועס. מאנכע פון זיי קענען איינציהען זייערע נעגעל און מאנכע ניט. זייערע רייס-צייהנער זיינען געוועהנליך קליון, פיעל פון זיי זיינען זעהר רויבע-ריש. זיי זיינען פארשפרייט איבער דער גאַנצער ערד, מיט דער אויסנאָהמע פון אויסטראַליען, פאָלינעזיען, די אַנטיילען און מאַדאַ-גאַסקאַר.

דער מאָרדער איז א מיטעל-גרויסע חיה מיט אַ לאַנגען קערפער, מיט אַ מיטעל-גרויסען קאָפּ, אַ צונעשפיצטען שנוק, קורצע אויערען,

מיטעל-גרויסע אויגען, קורצע פיס מיט קורצע שארפע נעגעל, וועלכע קענען איינגעצויגען ווערען, א מיטעלמעסיג לאנגען, דיסען פעלצייגען עק און א לאנג און געדיכט האָריג פעל. אין הינטער-לייב האָט דער מאַרזער אַ דריזע, וועלכע גיט אַרויס אַ זעהר שלעכט-ריכענדע פליסיגקייט.

אין אייראָפּא און אין אַזיען זיינען פאַרשפּרייט צוויי אַרטען מאַרדערס — דער עדעל-מאַרדער אָדער בויס-מאַרדער און דער שטיין-מאַרדער, אָדער הויז-מאַרדער.

דער עדעל-מאַרדער (בויס-מאַרדער) איז איבער אַנדערמאָל בען פּוס לאַנג, איבער אַ האַלבען פּוס הויך מיט אַן עק פּון אונגע-פּעהר אַ פּוס די לענג. אויף דעם אויבערשטען טייל פּון זיין קער-פּער איז ער דונקעל-ברוי, אויף די זייטען און בויך געלבלויך, אויף די פּיס שוואַרץ-ברוי און זיין עק דונקעל-ברוי. דער פּאָדערשטער טייל פּון זיין האַלז איז געלב, אונגעפּעהר דער קאָליר פּון אַן איי-געלעכעל. צווישען די הינטערשטע פּיס האָט ער אַ רויטליך-געלעכען פּלעק, וועלכער איז אַרומגעווימט מיט דונקעל-ברוי. אויף זיין אויבערשטער ליפּ האָט ער וואַנצעס, וועלכע באַשטעהען פּון פּיער דיי הען שיטערע, שטייפּע, לאַנגע האָר. ווינטער-צייט איז זיין פעל אין אַלגעמיין דונקעלער, ווי אין זומער. דער קאָליר פּון די נקבות איז עטוואָס בלאַסער.

די עדעל-מאַרדער האַלטען זיך אויף אין וועלדער אויף די בוימער און מאַכען זיך זייערע נעסטען אין לעכער פּון בוימער, אין פּאַרלאָזענע נעסטען פּון וועווערקעס און פּויגלען, מאַנכעס מאַל אויך אין שפּאַלטען פּון פעלזען. בייטאָג רוהען זיי געווענהליך, וועהרענד ביינאַכט געהן זיי אַרויס אויף געיעג. זיי באַפּאַלען הויז-עופּות, וואַלד-פּויגלען און יעדע יונגע און קלענערע חיה, וועלכע זיי באַגעגענען. זיי עסען אויך פּאַרשיידענע סאָרטען פּרוכט און האָניג. ווען זיי כאַפּען זיך אַרײַן אין אַ היהנער-שטאַל אָדער אין אַ טויבען-נעסט מאַרדען זיי אויס פּיעל מעהר ווי זיי קענען אויפ-עסען. זייער פּאָרונגס-צייט איז אין יאַנואַר אָדער אין פעברואַר און ענדע מערץ אָדער אַנפאַנג אַפּריל געבערט די נקבה פּון 3 ביז 5 קינדער, וועלכע וואַקסען שנעל און קענען שוין אין אייניגע וואָכען קלעטערען אויף בוימער צוזאַמען מיט זייער מוטער. צוליבען זיין שעצבאַרער פעל און צוליבען די גרויסע שאַדענס, וואָס דער מאַרדער פּאַראַוראַכט צווישען די הויז-עופּות און הויז-חיות, ווערט ער זעהר

פארפאָלגט אז ער איז אין מאנכע לענדער כמעט ווי אויסגערָאָט געוואָרען.

דער שטיין־מאַרדער אָדער הויז־מאַרדער איז עטוואַס קלענער פון דעם עדעל־מאַרדער. ער האָט אַ לענגערען קאָפּ, אָכער קירצערע אויערען און קירצערע פיס. ער איז מעהר פארשפרייט אַלס דער עדעל־מאַרדער און קומט אָפטער צו וואָהנונגען פון מענשען. זיין לעבענס־אַרט איז כמעט דיזעלבע ווי פון עדעל־מאַרדער. ער פאָרט זיך אין פעברואַר, און אין אַפּריל געבערט די נקבה פון 3 ביז 5 קינדער. זיין פעל איז וועניגער שעצבאר ווי פון דעם עדעל־מאַרדער.

דער סייבעל (סאָבעל, צאָבעל) איז אַ נאָהענטער קרוב פון דעם מאַרדער, ער איז מיט איהם ניט נאָר פון איין פאמיליע, נאָר אויך פון איין גאַטונג. דער סייבעל איז עטוואַס גרעסער פון דעם מאַרדער, האָט אַ שפיציגערען קאָפּ פון איהם, גרעסערע אויערען און העכערע פיס. דער סייבעל איז באַדעקט מיט גלענצענדע, זיידען־ווייכע האָר, וועלכע זיינען אויף זיין רוקען שוואַרצליך, אויף דעם האַלז און זייטען רויטליך קאסמאַנען־ברוין, אויף דעם פאָדער־שטען טייל פון האַלז אייגעלעכעל קאָליר אָדער אַראַנזש רויט און אויף די אויערען ווייסליך־גרוי. צוליבע דער גרויסער טייערקייט פון זיין פעל ווערט דער סייבעל זעהר שטאַרק פארפאָלגט און איז אין מאנכע געגענדען אין גאַנצען אויסגערָאָט געוואָרען. אַמאָל איז דער סייבעל געווען פארשפרייט פון אוראַל ביז צום בערינגי־ביי, אין דעם גרעסטען טייל פון סיביר און אויך אין נאָרד־וועסט־אַמע־ריקאַ. היינט איז ער בלויז פאַראַן אין אַ קליינעם טייל פון צפון און אויך דאָרטען ווערט ער וועניגער פון יאָהר צו יאָהר. מעהר ווי איבעראַל געפינט ער זיך נאָך אין קאַמשאַטקאַ (סיביר). דער סייבעל איז פונקט אזוי רויבעריש ווי דער מאַרדער. ער געהט אַרויס אויף געיענע מייסטענס ביינאַכט און מאַרדעט אַלע חיות, וועלכע ער קען נאָר בייקומען. ער פאַנגט אויך פיש און עסט אויך תבואה, פרוכט און האָניג. זיין פאָרונגס־צייט איז אין יאַנואַר, און אין צוויי חדשים נאָך דער פאָרונג געבערט די נקבה פון 3 ביז 5 קינדער. דער נאָרד־אַמעריקאַנישער סייבעל איז נעהנטער צו דעם עדעל־מאַרדער ווי צו דעם רוסישען סייבעל. ער איז קלענער פון איהם און האָט גרעכערע האָר פון איהם. זיין פעלץ ווערט וועניגער געשעצט. דער אַמעריקאַנער סייבעל איז ברוין מיט אַ געלבען




ברוסט־פלעק און מיט א גרויען אָדער ווייסען קאָפּ. אויך דער נאָרד־אַמעריקאַנער פישער־מאַרדער ווערט גערעכענט אַלס איינער פון די סייבעל ספּעציעס. ער האָט אַ גאַנץ דונקעלע פעל, כמעט שוואַרץ, זיין קאָפּ, נאַקען און רוקען איז עטוואַס גרוי. ער לעבט נאָהענט פון די ברעגעס פון טייכען, וואו ער גראָבט זיך אויס אַ הויף. ער באַפאַלט פאַרשיידענע קלענערע חיות, וועלכע ער קען בייקומען און ער איז אויך אַ גוטער פיש־פאַנגער.

דער טכויר אָדער שעסקע (אילטיס) איז אַ קליינע חיה מיט אַ לענגליכען קערפּער, אַ מיטעל־לאַנגען האָריגען עק, קורצע פיס און אַ שענהע בריוויג־עלכע פעל מיט לאַנגע, ווייכע האָר. אונטער זיין עק האָט דער טכויר צוויי דריזען, וועלכע גיבען אַרויס אַ זעהר שלעכט ריכענדע פליסיגקייט, ווען דער טכויר ווערט פאַרפאַלגט. דאָס איז די ווירקזאַמסטע וואַפע פון דעם טכויר, נעגען זיינע אַנגריי־פער. דער טכויר איז פאַרשפּרייט אין אייראָפּא און אין אַזיען פון די געמעסינסטע געגענדען ביז די קאַלמע פּאָלאַר־געגנדען. ער לעבט אין וועלדער, אין פעלדער, אין בערג און אין טהאַלען, מייסטענס אין דער נאָהענטקייט פון מענשליכע וואָהנונגען. ער מאכט זיך זיין נעסט אין לעכער פון בוימער, אין ערד־הוילען, אין שפּאַלמען פון פעלזען און ווינטער פאַרקלייבט ער זיך אָפּט אין הויז־שייערס. ער פאַנגט מייז, ראַצען, קראַטען, קראַליקעס, שלאַנגען, פיש, פּרעש, ער באַפאַלט וואַלד־פּויעל און הויז־עופות און עסט אויך פּרוכט און האָניג. ער פּאַרט זיך אין מערץ און צוויי חדשים נאָך דער פּאַרונג געבערט די נקבה פון 4 ביז 6 קינדער, וועלכע וואַקסען כמעט אין גאַנצען אויס אין דריי מאָנאַטען.

דער וויעזעל איז פון איין גאַטונג מיט דעם טכויר. ער איז אַ קליין חיה־לע, מיט אַן אויסגעצויגענעם שלאַנקען קערפּער פון אומגעפּעהר אַ האַלב פּוס די לענג, אַ מיטעל־לאַנגליכען האָריגען עק, קורצע, דינע פיס מיט שאַרפע קרעלען, די אויערען ברייט און רונדליך, די אויגען קליין אָבער זעהר לעבעדיג. זיין פעל איז רויטליך ברוין, און דער ראַנד פון זיין אויבערשטער ליפּ, די אינווע־ניגסטע זייט פון זיינע פיס און זיין בויך איז ווייס. אין ווינטער צייט איז דער וויעזעל אין די צפון געגענדען ווייס־ברוין געפּלעקט. ער איז פאַרשפּרייט אין גאַנץ אייראָפּא און אין נאָרד־אַזיען. מען געפינט איהם אין וועלדער, אין פעלדער און אויף בערג. ער מאכט זיין נעסט אין פּוסטע בוימער, אין ערד־הוילען, א. א. וו. אין

זוינטער-צייט פארקלייבט ער זיך אין קעלערען, אין שויערס, אויף בוידעמער, א. א. וו. ער איז זעהר רויבעריש און בלוט-גיעריג. ער געהט ארויס אויף געיעג מייסטענס ביינאכט. ער פאנגט מייז, ראצען, קראטען, שלאנגען, עקדעשען, אָבער אויך האָזען, קראָליי-קעס, הינער, טויבען און אנדערע פויגלען. אָפט צובייסט ער ביי זיין קרבן בלוזי דעם קאָפּ פון וועלכען ער עסט אויף דעם מאַרד. ער איז זעהר דרייסט און פלינק. ווען מען יאָגט איהם אַרײַן אין אַ פּלאַץ פון וועלכען ער קען ניט אנטלויפען, שטעלט ער זיך אַנט-קעגען און שפּרינגט זיין פאַרפּאַלנער אין געזיכט. זיין ביס איז זעהר קרעפטיג און קען אָפט זיין געפעהרליך.



צייכונג 223. — 1 אַ סקאַנק; 2 אַ וויעזעל; 3 אַן אַמעריקאנער טויבעל; 4 אַ מינק.

דער הערמעלין איז אויך פון איין גאַטונג מיט דעם טכויר. איז אַ קליין חיה'לע פון וועניגער ווי אַ פּוס די לענג מיט אַ מיטעל-לאנגען האָריגען עק. אין זומער צייט איז זיין פעל אויפ'ן רוקען ברױן-רויט און אויפ'ן בויך ווייס, אין ווינטער-צייט איז זיין פעל אין גאַנצען ווייס, נאָר דער עק האָט אַ שוואַרצען שפּיץ. ער איז פאַרשפּרייט איבער גאַנץ אייראָפּא און אין נאָרד און אין מיטעל-אַזיען. אין מאַנכע געגענדען פון סיביר געפינען זיך די הערמעל-לינס אין גרויסע מאַסען. דער הערמעלין איז זעהר אַ רויבערישע, בלוטדורשטיגע חיה. ער איז זעהר דרייסט און פלינק. ער

באפאלט קליינע חיות, פויגלען און רעפטילען. די נקבה געבערט אין מאי פון 5 ביז 8 קינדער, וועלכע וואקסען שנעל אויס. דער פעל פון הערמעלין ווערט זעהר נעשעצט.

דער נערץ איז אויך מיט דעם טכויר פון איין גאטונג. איז א קליינע חיה פון עטוואס איבער א פוס לאנג, מיט א מיטעל־לאנגען האַריגען עק און איז עהנליך אין זיין אויסזעהן צו דעם טכויר. זיינע פינגער זיינען פארבונדען מיט א שוויס־הויט, וועלכע איז באוואקסען מיט האַר. ער האָט א שעהנע, גלאנציגע פעל. די האַר זיינען געדיכט און זיינען ברוין און גרויליך. דער רוקען און דער עק זײַן דונקלער. זיין שנוק איז ווייס און אויף דעם פאָדער־שטען טייל פֿין זיין האַלז האָט ער א געלכליכען אָדער ווייסען פלעק. דער נערץ איז פארשפרייט אין מזרח אייראָפּא, באַזונדערס אין רוסלאַנד. ער האַלט זיך אויף אין איינזאמע געגענדען אין דער נאָהנטקייט פון קלענערע טייכען און אָזערעס. ער איז אן אויסגע־צייכענטער שווימער און ליעבט דאָס וואַסער. ער נעהרט זיך מיט פיש, פרעש, ראקעס אָבער ער מאַרדעט אויך עופות. בייטאָג ליגט ער פארשטעקט אין אַ לאַך פון אַ בוים אָדער אין ערגעץ אן אנדער באַהאַלטעניש, וועהרענד ביינאכט געהט ער אַרויס אויף געיעג. ער פאָרט זיך אין מערץ און אין ענדע אַפּריל אָדער אנפאנג מאי געבערט די נקבה איהרע קינדער.

דער אַמעריקאַנער מינק איז גלייך דעם רוסישען נערץ, ער איז אָבער גרעסער פון איהם, האָט אַ לענגערען עק און אַ שעהנערע פעל. דער מינק נעהרט זיך הויפטזעכליך מיט מייז, ראַצען, פיש, הינער, ענטלעך און וואַלד־פויגלען. ער ליעבט דאָס וואַסער און איז אן אויסגעצייכענטער שווימער. די נקבה געבערט פון 5 ביז 6 קינדער. דער טייך־אָטער און דער ים־אָטער זיינען צוויי וויכטיגע מיטגלידער פון דער מאַרדער־פאַמיליע. דער טייך־אָטער אָדער פיש־אָטער, ווי ער ווערט אויך גערופען, איז אַ לאַנגע אָבער נידריגע חיה. ער איז נאָהנט פון דריי פוס די לענג און בלוז איין פוס הויך. ער האָט אַ לאַנגען, דיקען האַריגען עק, אַ קורצען דיקען האַלז, אַ פאַרהעלטניסמעסיג קליינעם קאָפּ, קליינע אויגען, רונדע אויערען, קורצע פיס, מיט אַ שוויס־הויט צווישען די פינגער. זיין פעל איז אויפֿן רוקען גלאנציג דונקל־ברוין, אויפֿן בויך עטוואַס העלער. אויפֿן קאָפּ האָט ער מייסמענס אַ ווייסען פלעק. ער איז פארשפרייט אין גאנץ אייראָפּא און אויך אין אַ גרויסען טייל


פון דער אזיאטישער סיביר. ער האלט זיך אויף ביי די ברענעם פון טייכען און פון אָזערעס, וואו ער גראָבט זיך אויס הוילען אין דער ערד אונטער'ן וואַסער. אין דער צייט פון אַ פאַרפלייצונג קריכט ער אַרויף אויף בוימער, אָדער מאכט זיך זיין נעסט אין אַ פוסמען בויס. דער טייך-אַטער לויפט שנעל און איז אַן אויסגע- צייכענטער שווימער און טויכער. זיינע חושים זיינען זעהר גוט ענטוויקעלט און איז זעהר קלוג. ער געהט אַרויס אויף זיין געיעג ווען עס ווערט אווענד. אין אונבאוואוינטע פלעצער אָבער געהט ער אויך אַרויס בייטאָג. ער געהרט זיך הויפטזעכליך פון פיש און



צייכנונג 224. — אַן אַמעריקאַנער אָטער.

ראַקעס, וועלכע ער פאנגט שווימענדיג שטראַם אַרויף. ער איז זעהר רויבעריש, ער מאַרדעט יעדע לעבעדיגע באַשעפעניש, וואָס ער טרעפט אין וואַסער. ער מאַרדעט אַרומשווימענדע גענז, ענטלעך, שוואַנען און אנדערע שווימענדע פויגעל. ער פאנגט אויך פרעש און וואַסער-ראַצען. ער מאכט אָפט אויך גרעסערע וואַנדער-רונגען איבער דער יבשה פון איין וואַסער צום אנדערען. ער איז זעהר געפעהרליך מיט זיינע שאַרפע צייהנער אויך פאַר גרעסערע חיות און פאַר מענשען. ער פאַרט זיך מייסטענס ענדע פעברואַר אָדער אַנפאַנג מערץ און די נקבה געבערט אין מאַי פון 2 ביז 4 קינד דער, וועלכע עס געהמט דריי יאָהר ביז זיי וואַקסען פאַלשמענדיג אויס. די פעל פון אָטער ווערט זעהר געשעצט.

דער ים־אָטער איז גרעסער פון דעם טייך־אָטער. ער איז נאָהנט פון 4 פוס לאנג מיט א דיקען געדיכט־באוואקסענעם עק פון אונגעפעהר א פוס די לענג. ער האָט א גאנץ קורצען, דיקען האַלז און זעהר קורצע פאָדערשטע פיס מיט א שוויס־הויט צווישען די פינגער. זיינע הינטערשטע פיס זיינען באַדייטענד לענגער און זיינען ביי זייער ענד אויסגעבילדעט ווי פלוס־פערדערען, עהנליך ווי ביי דעם ים־הונד. זיין פעל איז באַדעקט מיט לאנגע, גלאַנץ ציגע שוואַרץ־ברוינע האָר מיט ווייסע שפיצען און מיט זעהר א ווייכען, ערדלען וואָל־האַר. דער ים־אָטער געפינט זיך ביי די אַמעריקאַנער און אויאַטישע ברעגען פון פאַסיפישען ים (שטילער אָקעאַן). אָבער ער ווערט וואָס ווייטער זעלטענער, ווייל ער ווערט צוליב זיין טייערער פעל זעהר שטאַרק פאַרפּאָלנט. ער לויבט




צייכונג 225. — דער פיעלפראם (וואָלווערין).

זעהר שנעל און שווימט אויסגעצייכענט. מען קען איהם אָבער אויף דער יבשה לייכט פאנגען. ער נעהרט זיך מיט פיש, ראַקעס, מושלען, א. א. ז. וו. ער האַלט זיך געוועהנליך אויף ביים ברעג פון ים, אָבער ער געהט אָפט אויך אַוועק ווייטער פון ברעג. ער ליעבט זעהר צו געהן אויף אייז־קריעס, וועלכע טראָגען איהם אַוועק ווייט אין ים.

דער פיעלפראם (וואָלווערין) איז איינער פון די גרעסטע היות פון דער מאַרדער־פּאַמיליע. ער איז נאָהנט פון דריי פוס לאנג און אַנדערטהאַלבען פוס הויך. ער האָט א קורצען פעלציגען עק, א גרויסען קאָפּ, א דיקע קורצע האַלז, קורצע שטאַרקע פיס מיט שאַרפע קרומע נעגעל און א קרעפטיג געבויטען קערפער. זיין פעל איז באַדעקט מיט לאנגע האָר, אויף די זייטען און אויף די פיס

זיינען די האָר באַדייטענד לענגער. דאָס האָר אויף זיין רוקען און אויף די אונטערשטע טיילען פון די פיס איז שוואַרץ. אויף די זייטען און אויף די פּאַלקעס ברוין־שוואַרץ, מיט אַ העל־גרויען פּלעק צווישען די אויגען און אויערען. דער פּיעלפּראָס איז פּאַרשפּרייט אין די נאָרד־געגנטען פון דער אַלטער וועלט, ווי אויך פון דער נייער וועלט (אַמעריקאַ). ער ליעבט אַם מייסטען צו לעבען אויף די שפיצען פון בערג. ער האַלט כּסדר אין אַרומוואַנדערען, און ער באַפּאַלט קלענערע און גרעסערע חיות. ער באַפּאַלט זאָגאַר גרויסע הירשען און קיה. ער שפּרינגט אַראָפּ פון אַ בוים אויף דעם רוקען פון זיין קרבן און בייסט איהם דורך דעם האַלז. ער נעהרט זיך אָבער הויפּטזעכליך מיט מייז, ראַצען און אַנדערע קליינע חיות. עס ווערט אויך אָנגעגעבען, אַז ער גראָבט אויס טויטע מענש־ליכע קערפּער פון זייערע קברים. געוועהנליך ווייכט ער אויס דעם מענשען, ווען ער איז אָבער אין געפּאהר שטעלט ער זיך אויך דעם מענשען אנטקעגען און גרייפט איהם אָן. דער נאמען „פּיעלפּראָס“ שטאַמט פון דער שוועדישער שפּראַך, און באַדייט „פּעלזען־קאָץ“. אין אַמעריקאַ ווערט ער גערופּען „וואָלווערין“.



צייכונג 226. — דער אַמעריקאַנער דאַכט.

דער דאַכט איז פּאַרשפּרייט אין אייראָפּאַ, אין מיטעל און נאָרד־אַזיען ווי אויך אין אַמעריקאַ. צווישען דער מאַרדער־פּאַ מיליע איז ער פון די וועניגער רויבערישע חיות. ער נעהרט זיך מיט וואַרצלען, פּרוכט, יאַגדעס און אייער, אָבער ער עסט אויך יונגע פּויגלען, יונגע האַזען, קראָמען, מייז, שלאַנגען און עקדעשען, און ווען ער איז אין גרויס נויט עסט ער אויך נבלות. ער גרייפט

זעלטען אָן גענו אָדער ענטלעך. אין אַלגעמיין איז ער ניט קיין גרויסער עסער און איז ניט אַזוי בלוט־דורשטיג, ווי די אנדערע מיטגלידער פון דער מאַרדער פּאַמיליע.

דער דאכס איז אַ צימליך גרויסע חיה. ער איז אומגעפעהר צוויי אַ האַלב פּונד לאנג און אַ פּונד הויך. ער האָט אַ דיקען קער־פער, אַ דיקען האַלז, אַ לאַנגען קאָפּ, קליינע אויגען און אויערען, נידריגע פיס מיט זעהר שטאַרקע נעגעל אויף די פינגער פון די פּאָדערשטע פיס, אַ קורצען, דיקען האַריגען עט און אַ לאַנגהאַריגע פעל. די האַר פון זיין פעל זיינען האַרט, אויפ'ן רוקען ווייס־גרוי און שוואַרץ געמישט, אויף די זייטע רויטליך און אויף די פיס און בויך שוואַרץ־ברוי. זיין קאָפּ איז ווייס מיט צוויי מאַטע שוואַרצע שטרייפּען פון די זייטען. די נקבה איז קלענער און האָט אַ העלערע פעל.

דער דאכס האַלט זיך אויף אין איינזאמע ערטער אין בערגיגע געגענדען, מייסטענס וועלכע זיינען באַוואַקסען מיט וואַלד. ער ליעבט זעהר די זון און ער מאכט זיין נעסט אויף דער וואַלד־זייט. ער גראַכט אויס זיין נעסט טיעף אין דער ערד, פון 4 ביז 5 פונד טיעף, מיט מעהרערע רעהרען אריינצוגעהן און אַרויסצוגעהן. דער דאכס לעבט איינזאם און צוריקגעצויגען. ביינאכט געהט ער אַרויס זוכען זיין שפייז און בייטאָג ליגט ער ביי איינעם פון די אייני־גאנגען פון זיין אונטעראירדישען הויז און וואַרעמט זיך פאַר דער זון. ווען עס קומט אָן דער ווינטער קריכט ער אַריין אין זיין הויז, דרעהט זיך צונויף מיט דעם קאָפּ צווישען זיינע פּאָדערשטע פיס און ווערט אנטשלאָפּען. ער אונטערברעכט אָבער מעהרערע מאָל זיין ווינטער־שלאָפּ און געהט אַרויס זוכען שפייז. ענדע יאָנואַר אָדער אנפאנג פעברואַר איז זיין ווינטער־שלאָפּ געענדיגט. ער פּאַרט זיך אין אַקטאָבער און ער לעבט דאָן צוזאַמען מיט דער נקבה אין איין הויז. אין פעברואַר געבערט די נקבה פון דריי ביז פינף קינדער, וועלכע בלייבען מיט איהר אין נעסט ביז אַקטאָב בער. אויפ'ן צווייטען יאָהר זיינען די יונגע דאכסען שוין אין גאַנצען אויסגעוואַקסען.

דער הונד. — צו דער הונד־פּאַמיליע באַלאַנגען די הינט, די וועלף, פּוקסען, שאַקאַלען און די היענע־הינט. די חיות פון דער האַזיגער פּאַמיליע געהען אויף זייערע פינגער (ניט אויף זייערע פּאדעשוועס), האָבען אַ פאַרהעלטניסמעסיג קליינעם קאָפּ, אַ שפיי־

ציגען שנוק, דינע פיס פון וועלכע די פאָדערשטע האָבען מייס-  
טענס פינף פינגער און די הינטערשטע פיער, טעמפע, ניט צוריק-  
ציהענדע קרעלען (נעגעל) און די מייסטע פון זיי האָבען א לאנגען  
האַריגען עק. די חיות פון דער הונד-פאַמיליע זיינען פארשפרייט  
אין אלע וועלט-טיילען. זיי האַלטען זיך אויף אין וועלדער, סטע-  
פען, וויסטעניש און לעבען אין גרעסטען טייל אין געזעלשאַפט,  
אין קלענערע אָדער גרעסערע מחנות. זיי לויפען זעהר שנעל, די  
מייסטע זיינען אויך גוטע שווימער און קענען אויך קלעטערען און  
שפרינגען. זייער חוש השמיעה און חוש הריח זיינען באַזונדערס  
שטאַרק ענטוויקעלט און זיי באַזיצען גאנץ באַדייטענדע גייסטיגע  
פעהיגקייטען, מיט וועלכע דער הויז-הונד צייכענט זיך גאנץ באַזונ-  
דערס אויס. זיי זיינען אלע רויבעריש, נעהרען זיך מיט דעם פלייש  
פון זויג-חיות און פויגלען, אנדערע אויך מיט פיש. זיי עסען  
נבלות אזוי גוט ווי פריש פלייש. מאַנכע פון זיי עסען אויך  
זעהר גערן ביינער, ראַקעס, רעפטילען, אינזעקטען, פרוכט, וואָרצ-  
לען און אויך גראַז און מאָך.

צו די הינט אין ענגערען זין באַלאַנגען דריי חיות, וועלכע מען  
האָט אַמאָל גערעכענט אַלס די אור-עלטערען פון די איצטיגע הויז-  
הינט און מען האָט דאָריבער די דאָזיגע חיות א נאָמען געגעבען  
אור-הינט. אין דער ווירקליכקייט אָבער איז נאָך ביז היינט ניט  
פעסטגעשטעלט געוואָרען די ריכטיגע אָפּשטאַמונג פון אונזערע  
הויז-הינט. די דריי חיות זיינען: דער קאָלזון, דער אדיאנג און  
דער אַלפען-וואָלף.

דער קאָלזון געפינט זיך אין אינדיען, הימאַלאַיא און טיבעט.  
ער איז איבער דריי פוס לאנג, אונגעפעהר אַנדערטהאַלבען פוס  
הויך און האָט א מיטעל-לאנגען עק. זיין פעל איז באַדעקט מיט  
גערדיכטע, קורצע, ברוין-רויטע האָר, און איז אין זיין אויסזעהן  
זעהר עהנליך צו דעם ווינד-הונט (איינער פון די הויז-הינט). ער  
לעבט אין וועלדער, אויף פעלזען און אויך אין אָפּענע פעלדער.  
די קאָלזונען בילען ניט, אויף געיעג געהען זיי אַרויס אין קלענערע  
אָדער גרעסערע גרופעס און באַפאַלען יעדע חיה, וועלכע זיי באַגע-  
גענען אין זייער וועג. מענשען גרייפען זיי ניט אָן. די נקבה  
געבערט פון 2 ביז 4 אָפּט מעהר) קינדער.

דער אדיאנג געפינט זיך אויף דעם מאַלאַיאישען האַלב אינ-  
זעל, אין סומאַטראַ און יאַוואַ. ער איז קלענער און שוואַכער אַלס



דער קאלון, אָבער אין די מייסטע הינזיכטען איז ער עהנליך צו איהם.

דער אלפען־הונט איז פון דער זעלבער גרויס ווי דער קאלון, ער האָט אָבער א פיעל לענגערען עק פון איהם. ער לעבט אין די בערג פון מזרח און מיטעל־אזיען, זיין פעל איז באַדעקט מיט לאנגע ראַסט־רויטליכע האָר, איז זעהר כיטרע, פלינק און קרעפטיג. ער יאָגט זיך באַזונדערס נאָך הירשען און איז אָפט אויך זעהר געפעהר־ליך פאַר מענשען. יאגד־הינט פאַרפאַלגען איהם ניט.

דער הויז־הונט געפינט זיך איצט אין ערגעץ ניט אין אַ ווירקליכען ווילדען צושטאַנד. ער לעבט שוין פון גאנץ אלטע צייטען צוזאַמען אין חבר'שאפט מיט'ן מענשען. אין מאנכע געגענט־דען לעבען די הויז־הינט אין גרויסע מחנות אָפגעזונדערט פון מענשען. זיי זיינען פאַרווילדערט, אָבער קענען ניט גערעכענט ווערען צווישען די ווילדע חיות. אזא פאַרווילדערטער הונט איז דער „דינגא“, וועלכער לעבט אין אויסטראַליע. ער זעהט אויס ווי דער הויז־ליכער שעפער־הונט. אין זיין ארט לעבען איז ער עהנליכער צו דעם פוקס ווי צום וואַלף. פון וועלכער ווילדער חיה פון דער הינט־פאַמיליע דער הויז־הונט שטאַמט אָפ איז ניט זיכער. עס ווערט אָנגענומען, אז די פאַרשיידענע הויז־הינט אין די פאַרשיידענע לענדער שטאַמען אָפ פון פאַרשיידענע ווילדע חיות אין דער הינט־פאַמיליע. מאנכע שטאַמען פון דעם וואַלף, מאנכע, די קלענערע הינט־ראַסען, שטאַמען, ווי עס ווערט אָנגענונד מען פון דעם שאַקאַל, וויל זיי זיינען עהנליכער צו איהם אין אויס־זעהן און אין זייערע געוואוינהייטען, וועהרענד אנדערע שטאַמען, אפשר, פון דעם פוקס, ווי די הויז־הינט פון גווינעא, וועלכע זיינען עהנליך אין אויסזעהן צום פוקס און בילען ניט. דאָס בילען ווערט אָבער ניט אָנגענומען אַלס אַ הויפט־צייכען פון די הויז־הינט. פאַרלאָזענע אָדער פאַרווילדערטע הויז־הינט הערען אויף בילען. עס עקזיסטירט אויך אַ מיינונג, אז די איצטיגע הויז־הינט שטאַמען אָפ פון אַ ווילדער הונט חיה, וועלכע עקזיסטירט שוין איצט ניט מעהר. דער גרונד איז אָבער, אז מען ווייס נאָך היינט ניט אויף זיכער די ריכטיגע אָפֿשטאַמונג פון די הויז־הינט.

צווישען די הויז־הינט געפינען זיך אַ גרויסע צאָהל פאַרשייד־דענע אַרטען, ראַסען און טיפען, וועלכע ווערען גערופען מיט פאַר־שיידענע נעמען. אנדערע פון זיי זיינען גרעסער ווי וועלף, וועהר־

רענד אנדערע פון זיי זיינען קוים גרעסער פון א וועווערקע. זיי זיינן אויך אזוי פארשיידען אין זייער אויסזעהן, דאָס זיי האָבען וועניג עהנליכקייט איינע צו די אנדערע.

צוליב זיין חבר'שאפט מיט דעם מענשען פון טויענדער יאָהרען, האָט זיך ביי דעם הויז-הונט אויפגעארבייט אַן אונבאַ-גרענצטע צופאַסונגס-פעהיגקייט. פון א פלייש-עסענדע חיה איז ער פאַרוואנדעלט געוואָרען אין אַן אַלעס-עסענדע חיה. דער הויז-הונט עסט אַלעס, פון גרינסען ביז נבלות און עקסקרעמענטען (צאה). ער קען זיך צוגעוועהנען צו יעדער שפייז און צו יעדען קלימאט. ער קען לעבען אין די קאלטסטע געגענדען, ווי אין די הייסעסטע. דער הויז-הונט ווייזט אַרויס זעהר א גרויסען פאַרשטאַנד. ער איז באַזונדערס טריי צו די הויז-מענשען, צווישען וועלכע ער לעבט, און וועלכע ווייזען צו איהם אַרויס פריינדשאפט. ער איז אין אַלגע-מיין זעהר א ריינליכע חיה און זיז א גרויסער פיינד פון מייז און ראצען. מאַנכע פון די הויז-הינט זיינען אויך גרויסע פיינד פון קעץ. וועגען דעם פאַרשטאַנד און טרייהייט פון די הויז-הינט איז אָנגעשריבען געוואָרען א נאנצע ליטעראַטור. דער חוש הריח איז וואונדערליך שטאַרק ענטוויקעלט ביי די הינט, וועלכע האָבען אויפ-געשטעלטע אויערען.

אין די פּאָלאַר-געגענדען ווערען די הינט באַנוצט צום פּאָהרען און צו פיהרען משא. זיי ווערען אויך באַנוצט צו פיהרען משא אין מאַנכע געגענדען פון אייראָפּא, ווי אין דער שווייץ, זיך דייטשלאַנד און אנדערע לענדער. באַזונדערס צייכנען זיך מאַנכע פון די הויז-הינט אויס אויף געיעג (יאַגד-הינט) אויסצושפירען די חיות, אויף וועלכע די יאַגד ווערט געמאַכט. די מייסטע הויז-הינט זיינען אויסגעצייכענטע וועכטער, באַזונדערס די, וועלכע האָבען אויפגעשטעלטע אויערען. אין דער לעצטער צייט האָט מען אָנגעפאנגען באַנוצען די הויז-הינט פאַר פּאָליציי-דיענסט און פאַר קריגס-צוועקען, באַזונדערס ביים אויסזוכען און ראַטעווען די פאַרוואונדעטע אויפ'ן קריגס-פּעלד. אין די הויכע אַלפּען-בערג ווערען געוויסע הינט באַנוצט צום ראַטעווען רייזענדע, וועלכע זיינען דאַרטען פאַרשאַטען געוואָרען מיט שנעע. מאַנכע פון די דאָזיגע הינט האָבען אין דער דאָזיגער אַרבייט באַוויזען ווירקליכע וואונדער.


דער געשלעכטס-טרייב איז ביי די הינט זעהר שטאַרק ענטוויי-

קעלט. די צויג געבערט אין 63 טעג נאָך דער פּאַרונג פון 4 ביז 10 מאַנכעס מאָל זאָגאר 18 הינטלעך, וועלכע זיינען בלינד און טויב. נאָך 9 טעג פאנגען זיי אָן זעהן און נאָך 12 אָדער 14 טעג הערען. די צויג „פאַרלויפט זיך“ (ווערט טראָגעדיג) יעדע פינף מאָנאַט. די יונגע הינטלעך זיינען אין אַ יאָהר צייט כמעט אין גאנצען אויס־געוואַקסען. אין דעם עלטער פון 10—12 יאָהר פאנגען די הינט אָן ליידען פון עלטער־שוואַכקייט. 14 יאָהר איז פאַר אַ הונט אַ זעהר הויכער עלטער. עס קומען אָבער פאַר פעלע, ווען הינט דערלעבען ביז 18 אָדער זאָגאר ביז 24 יאָהר.

די הויז־הינט ליידען פון פארשידענע קראַנקהייטען. די געפעהרליכסטע קראַנקהייט זייערע איז משוגעת. פון אַ בים פון אַ משוגענעם הונט ענטוויקעלט זיך די קראַנקהייט הידראפּאביע (וואַסער־זוכט), וועלכע איז לעבענס־געפעהרליך.

דער וואָלף באַלאַנגט צו דער הונט־גאַטונג. ער איז אונגע־פעהר 4 פוס לאַנג, נאָהנט פון דריי פוס הויך, ציעמליך הויכע דאַרע פיס, לאַנגהאַריגען עק, ברייטע, שפיציגע אויפגעשטעלטע אויערען, און איז זיין גאנצען אויסזעהן עהנליך צו אַ גרויסען הונט. די פעל פון וואָלף איז געוועהנליך גרויגעלב, מיט אַ שוואַרצליכעם מישונג. אויפ'ן בויך און אויף זיין שטערן איז דער קאָליר פון זיין פעל עטוואַס העלער, אָפט ווייסליך־גרוי, אויף די באַסען געלליך. אין זומער האָט דער קאָליר פון זיין פעל אַ מעהר רויטליכע שאַטירונג, וועהרענד אין ווינטער אַ מעהר געלליכע. אין די צפון לענדער איז דער קאָליר פון זיין פעל מעהר גענינגט צו ווייס, וועהרענד אין די דרום לענדער מעהר צו שוואַרץ. די וועלף, וועלכע לעבען אין בערגיגע געגענדען זיינען מייסטענס גרע־סער און שטאַרקער, ווי די, וועלכע לעבען אויף פלאַך־לאַנד. זיי זיין גען אָבער גלייך רויבעריש און בלוט־דורשטיג. די וועלף זיינען פאַרשפרייט איבער גאַנץ אייראָפּא, מיט דער אויסנאַמע פון אייניגע ערטער, וואו מען האָט זיי אויסגעראָט, זיי זיינען אויך פאַרשפרייט אין טיילען פון אזיען און אין גאַרד אַמעריקאַ. די וועלף האַלטען זיך אויף אין געדיכטע וועלדער, אין מאַנכע געגענ־דערן פון אייראָפּא, אין די דרום־לענדער, האַלטען זיי זיך אויף אין סטעפעס, און אין שפּאַניען זאָגאר אין תבואה פעלדער. אין פרייה לינג און אין זומער לויפען זיי אַרום איינציגוויי, אַמאָל צו צוויי און צו דריי, אין הערבסט לעבען זיי אין פאַמיליען און אין ווינטער

קלייבען זיי זיך צונויף אין גרויסע מחנות און לאָזען זיך אַרויס צוזאַמען אויף געיעג. בלויז אין איינזאַמע וועלדער ווייזט זיך דער וואָלף אויף בייטאָג, וועהרענד אין באַפעלקערטע געגענדען ליגט ער בייטאָג באַהאַלטען און געהט אַרויס פון זיין באַהעלטע-ניש, ווען עס ווערט דונקעל. דער וואָלף איז זעהר רויבעריש. ער גרייפט אָן אַלע חיות, וועלכע ער קען בייקומען. ער עסט אויך נבלות און פרוכט. אין הערבסט און אין ווינטער קומט ער געהנר צו די פלעצער, וועלכע זיינען באַוואוינט מיט מענשען, און באַווייזט זיך אָפט אין דערפער און אין שטעדט. ער באַפאַלט שאַף, רינדער און פערד און מאַרדעט פיעל מעהר ווי ער קען אויפ-עסען. אויף רינדער און פערד באַפאַלט אן איינצעלנער וואָלף זעלמען. ער באַפאַלט זיי מייסטענס, ווען ער איז צוזאַמען מיט



צייכנונג 227. — א וואָלף.

נאָך וועלף. מענשען ווייבען די וועלף געוועהנליך אויס, אויסער ווען זיי ווערען זעהר שטאַרק געפייניגט פון הונגער. פרויען און קינדער גרייפען זיי גיכער אָן ווי מענער. ווען דער וואָלף איז ניט הונגעריג איז ער פייג און שרעקעדיג, ווען ער איז אָבער הונגעריג איז ער זעהר דרייסט און שרעקט זיך פאַר קיין זאך ניט אָפּ. די פּאַרונגס-צייט איז ביי וועלף פון ענדע דעצעמבער ביז מיטען פעברואַר. 63 אָדער 64 טעג נאָך דער פּאַרונג געבערט די נקבה אין אַ געשיצטען פּלאַץ פון 3 ביז 9 קינדער, וועלכע זיינען בלינד ביז דריי וואָכען און באַנעהמען זיך ווי קליינע הינטעלעך. עס נעהמט מעהר ווי צוויי יאָהר צייט ביז זיי זיינען פּאַלשמענדיג אויסגעוואַקסען. וועלף לעבען ביז דעם עלטער פון 12 אָדער 15 יאָהר. אין געפאַנגענשאפט פּאַרען זיך וועלף מיט הינט. די

קינדער, וועלכע ווערען געבאָרען פון אזא פאָרונג, זיינען מייסטענס  
עהנליך צו וועלכע ווי צו הינט.

דער פוקס איז באַדייטענד קלענער פון דעם וואָלף, ער האָט  
אויך אַ שפיציגערען שנוק פון איהם און אַ לענגערען קאָפּ-שאַרבּען.  
ער האָט נידעריגע פיס און אַ לאַנגען, ברייטען פעלציגען עק. דער  
פוקס איז אונגעפעהר דריי פוס לאַנג און עטוואַס מעהר ווי א פוס  
הויך. אויף דער אויבערשטער זייט פון זיין עק האָט ער אַ דריזע,  
וועלכע גיט אַרויס א פליסיגקייט פון זעהר אַ שלעכטען ריח.

די גרעסטע און שענהסטע פוקסען געפינען זיך אין די צפון  
געגענטען. דער קאָליר פון געוועהנליכען פוקס איז רויטליך מיט אַ  
גרויער שאַטירונג. אין די דרום-געגענטען, באַזונדערס אין די  
פלאַכע און זומפּיגע פלעצער, זיינען די פוקסען קלענער, שוואַכער  
און וועניגער רויט.

דער געוועהנליכער פוקס, אָדער רויט-פוקס, ווי ער ווערט  
גערופען, איז פארשפרייט אין אייראָפּא, אין נאָרד-אַפריקא, אין  
וועסט-און נאָרד-אַזיען און אין נאָרד-אַמעריקא. ער לעבט פאָר-  
ווייז אין טיפעע הוילען און פעלזען-שפאלטען. ער קלייבט זיך  
אימער אויס זיין נעסט אין אַ פלאַץ, צו וועלכען עס איז שווער  
צוצוקומען. ער ליעבט אָבער ניט אַליין צו גראָבען זיין נעסט, ער  
טוט עס בלויז אין נויט. געוועהנליך באַזעצט ער זיך אין אַ הויל,  
וואָס אַ דאכס האָט פאַרלאָזען און אָפט באַזעצט ער זיך אין דעם  
הויל וואָס ווערט באַוואוינט פון אַ דאכס און ער וואָהנט ביי איהם  
אין שכנות. די אונטער-ערדישע וואָהנונג פון א פוקס האָט, אזוי  
ווי פון דאכס, אויסער א הויפט-איינגאנג, אויך מעהרערע זייטען  
טירען, דורך וועלכע דער פוקס ראַטעוועט זיך, ווען ער ווערט פאר-  
פאָלגט. אין זיין הויל האַלט זיך דער פוקס אויף בלויז אין שלעכטע  
וועטערען, אין די הייסע זומער-טעג, אין דער פאָרונגס-צייט און  
ווי לאַנג די פוקסין (פוקסעכע) דארף זויגען און ערציהען איהרע  
קינדער. אזוי אָבער לויפט דער פוקס אַרום אין וואַלד און אין  
תּבואה-פּעלדער. ער איז קערפּערליך און גייסטיג זעהר באַגאבט.  
ער איז זעהר פאָרויכטיג, האָט אַן אויסגעצייכענטען זכרון און ווייזט  
אַרויס זעהר פיעל פארשטאנד. געוועהנליך געהט דער פוקס אַרויס  
אויף זיין געיעג ביינאכט. אין איינזאַמע ערטער, אָבער, ווי אויך  
אין מייטען זומער און אין קאַלטען ווינטער, ווען די ערד איז  
באָדעקט מיט אַ טיפען שניי, לאָזט ער זיך אויך אַרויס זוכען זיין

שפייז ביימאָג. ער פאנגט מיין, היישעריקען, זשוקעס, בענען, ווערים, וואלד־פויגלען, הויז־עופות, האָזען, קראָליקעס, יונגע היר־שען און אויך פיש און ראַקעס. ער עסט אויך גערן נבלות, זאָגאַר די נבלות פון פוקסען. ער איז אַ ליעב־האבער פון אויבסט (בוימער־פרוכט) און ער באַזוכט אָפט פרוכט־גערטנער. אין דער אומגעג־גענד פון זיין נעסט רויבט ער קיין מאָל ניט. אין אַ פּלאַץ, וואו ער פיהלט זיך זיכער איז ער זעהר רויבעריש, ער מאָרדעט פיעל מעהר ווי ער קען אויפ־עסען. דער פוקס איז אין אַלגעמיין אַ דרייסטע היה, נאָר ווען ער איז הונגעריג איז ער באַזונדערס דרייסט. דער פוקס לעבט, געוועהנליך, איינזאַם. ער פאָרט זיך פון ענדע יאָנאָר ביז מערץ. די פאָרונג קומט פאָר מיטענעם אין דער אונטער־ערדישער וואָהנונג פון דעם פוקס, וואו עס קלייבען זיך צונויף מעהרערע זכרים אַרום איין נקבה. ענדע אַפּריל אָדער אָנפאַנג מאַי געבערט די פוקסין פון 3 ביז 12 קינדער, וועלכע זיינען ביז 10 טעג בלינד. די יונגע פיקסלעך ווערען פון דער פוקסין, איז די ערשטע צייט זאָגאַר פון פוקס, זעהר צערטליך אויפ־געפאַסט און ערצויגען. שפעטער צושיידט זיך דער פוקס מיט זיין פאָר און לעבט אָפּגעזונדערט. די ערציהונג פון די קינדער בלייבט דאן אין גאַנצען פאַר דער פוקסין. זי בריינגט זי מיין, פרעש, זשוקעס און פויגלען. אין יולי פאנגען אָן די יונגע פוקסלעך אַליין אַרויסגעהן אויף געיענ אָדער מיט דער באַגלייטונג פון זייער מוטער. ענדע יולי פאַרלאָזען זיי מיט זייער מוטער אין גאַנצען זייער הוייל און זיי לעבען מיט דער מוטער צווישען די בוימער פון וואַלד אָדער אין תבואה פעלדער. ענדע הערבסט שיידען זיי זיך מיט זייער מוטער און פאנגען אָן פיהרען זייער לעבען פאַר זיך. דער פוקס דערלעבט אַן עלטער פון 12 ביז 16 יאָהר. ער איז אונטערוואָרפען כמעט אַלע קראַנקהייטען, פון וועלכע עס ליידען די הינט, אויך משוגעת. אויך דער בים פון אַ משוגענעם פוקס פאַראַרזאכט הידראפאביע.

עס זיינען פאַראַן אַ גאַנצע רייה פאַרשיידענע ארטען פון פוקסען און פון פאַרשיידענע קאָלירען, פון שוואַרץ ביז ווייס.

די פעל פון פוקס ווערט זעהר געשעצט, באַזונדערס פון דעם בלו־זוקס און פון דעם זילבער־פוקס.

דער שאַקאַל איז אין זיין אויסזעהן און געוואוינהייטען פיעל עהנליך צום פוקס. ער איז אונגעפעהר דריטהאַלבען פום לאנג

און אָנדערטהאַלבען פֿום הויך, מיט אַ לאַנגען פעלציגען עק. דער קאָליר פֿון זיין פעל איז שמוציג גרוי-געלעב, אויפ'ן רוקען דונקעלער, אויף די פּאָלקעס און פֿיס בלאַס רויט און אויף דעם פּאָדערשטען טייל פֿון האַלז און בויך ווייס-געלעבליך. דער שאַקאַל לעבט אין וועסט-און נאָרד-וועסט-אָזיען, אין נאָרד-אַפֿריקאַ, אין מערקוי און אין דאַלמאַציען. ער געהט אַרויס אויף זיין רויב ביינאַכט און ער איז זעהר רויבעריש. ער באַפּאַלט שאַף, עופות און מאָרדעט מעהר ווי ער קען אויפּעסען. פּאַר מענשען האָט ער מוראַ. די שאַקאַלין געבערט אין אַ פּאַרבאָרגענעם פּלאַץ פֿון 5 ביז 8 קינדער, וואוּ זי פּאַרבלייבט מיט זיי צוויי חדשים צייט. יונגע שאַקאַלען, וועלכע ווערען ערצויגען אין געפּאַנגענשאַפט, פּאַרען זיך מיט הינט.

דער היענען-הונט, אָדער סטעפען-הונט, ווי ער ווערט אויך גערופּען, איז אין זיין אַרט לעבען מעהר עהנליך צו אַ היענע איידער צו אַ הונט, ער ווערט אָבער גערעכענט צו דער הונט-פּאַמיליע, צו-ליעב זיינע צייהנער, וועלכע זיינען ווי ביי די חיות פֿון דער הונט-פּאַמיליע. דער היענען-הונט איז פּאַרשפּרייט אין אַפֿריקאַ און אין זעהר אַ רויבערישע און בלוט-דורשטיגע חיה. ער איז איבער דריי פֿום לאַנג, נאָהנט פֿון צוויי פֿום הויך, האָט אַ מיטעל-לאַנגען פעלציגען עק, גרויסע, רונדליכע, אויפגעשטעלטע, כמעט נאַקעטע אויערען, מיטעל-מעסיג הויכע פֿיס, וועלכע האָבען צו פיער פינגער און עס הערט זיך פֿון איהם זעהר אַן איבעלער גערוד. זיין פעל איז ווייס, שוואַרץ און געלעב געפּלעקט. די היענען-הינט לאָזען זיך, געוועהנליך, אַרויס אויף רויב אין מחנות פֿון 30 ביז 40 שטיק. זיי באַפּאַלען אנטעלאָפּען און סטאַדעס שאַף און מאָרדען מיט דער גרעסטער בלוט-דורשט. זיי מאָרדען פיעל מעהר ווי זיי קענען אויפּעסען. זיי רייסען אויף די בייכער פֿון זייערע קרבנות און עסען בלוזי דעם אינגעווייד. זיי באַפּאַלען אויך מענשען. די נקבה געבערט ביז 10 קינדער מיט איינמאַל אין אַ הויך, וואָס זי גראָבט אויס. ווען עס דראַהט איהר אַ געפּאַהר לאָזט זי איהרע קינדער און אנטלויפט.

היענען. — די פּאַמיליע היענען איז אַ קליינע. עס באַלאַנגט צו איהר בלוזי איין נאַטונג מיט דריי אַרטען. די כאַראַקטעריסטישע צייכענס פֿון די היענען זיינען די פּאָלגענדע: זיי געהען אויף זייערע פינגער, האָבען לאַנגע פיער-פינגערדיגע פֿיס, ניט צוריקציהבאַרע גענעל, אויבערשטע רייס-צייהנער מיט דריי שפּיי-

צפון, אונטערשטע רייס-צייהנער מיט צוויי שפיצען, ווי ביי א קאזי. זיי האָבען אַ וואָלף-עהנליכען קאָפּ און אַ נאָך הינטען אַראָפּ געלאָזענעם רוקען. די פאָדערשטע פיס פון די היענען זיינען קרום און העכער ווי די הינטערשטע. זייער קערפער איז דיק און באַוואַקסטען מיט געדיכטע האָר, וועלכע זיינען אויף זייער רוקען פיעל לענגער. זייער עק איז קורץ און באַוואַקסטען מיט לאַנגע געדיכטע האָר. זיי האָבען גרויסע, העסליכע אויערען און קרוימע (אויגען). די היענען לאָזען אַרויס פון זיך אַ זעהר שטארקען איבעלען גערוד און האָבען אַ רייסענדע, זעהר אונאנגענעםע



צייכונג 228. — אַ היענע.

לאַכענדע שטים. די געוועהנליכע היענען געהן אַרויס זוכען זייער שפיז ביינאכט, זיי דערנעהנטערן זיך צו פלעצער, וועלכע זיינען באַוואָהנט פון מענשען און באַפאלען שאַף, ציגען און יונגע חזרים. זיי אנטלויפען אָבער ווי עס ווערט נאָר געמאכט אויף זיי דער קלענסטער אנגריף. זייער באַליעבטעסטע שפיז איז טויטע קער פער פון חיות און מענשען, ווען זיי זיינען אפילו צופולט. די היענען גראָבען אָפט אויף קברים און געהמען אַרויס פון זיי די טויטע קערפער. זיי זיינען פארשפרייט אין זיד-און וועסט-אזיען און באַזונדערס אין אַפריקא. די נקבה גראָכט אויס אַ הויל און געבערט דאָרטען פון 3 ביז 4 קינדער.



די געפלעקטע היענע איז אונגעפעהר 4 פוס לאנג און דריי- האלבען פוס הויך. איהר פעל איז וויסלאך-גרוי און ברוין גע- פלעקט. זי איז זעהר קרעפטיג און איז שטארקער פון די אלע אנדערע ארטען היענען. ווען זי איז הונגעריג איז זי זעהר דרייסט. זי רויבט זאגאר אַוועק קינדער און באפאלט אויך אַמאָל ערוואק- סענע מענשען. זי איז פארשפרייט אין מזרח און אין דרום אפריקא.

די געשטרייפטע היענע איז עטוואס קלענער ווי די געפלעקטע. איהר פעל, וועלכע איז באוואקסען מיט לאנגע האָר, איז געשטרייפט פאַר קווער מיט געלבלויך ווייס-גרויע און שוואַרצע שטרייפן. זי האָט גרויסע נאָקעטע אויערען, און איז פארשפרייט איבער גאנץ אפריקא און אין אַ טייל פון אַזיען. זי קומט אָפט נאָהענט צו מענשליכע וואָהנונגען, נעהרט זיך הויפטזעכליך מיט נבלות און איז זעהר שרעקעדיג. מענשען גרייפט זי קיינמאָל ניט אָן און זי גראַבט אויך ניט אויף קיין קברים.

די ברוינע היענע, וועלכע לעבט אין זיד-אפריקא, איז באַדיי- טענדיק קלענער פון דער געפלעקטער היענע און פון דער געשטרייפ- טער. איהר פעל איז ברוין און אויפ'ן רוקען האָט זי לאנגע האָר. זי נעהרט זיך הויפטזעכליך מיט נבלות, וועלכע ווערען אַרויסגע- ווארפען פון ים, ווען זי איז אָבער זעהר הונגעריג באפאלט זי סטאָדעס שאָף.

ערד-וועלף. — צו דער פאמיליע „ערד-וועלף“ באלאנגט בלויז איין גאטונג מיט דריי אַרטען. די ערד-וועלף ווערען אָפט אַרייני- גערעכענט אין דער פאמיליע פון היענען, ווייל זיי זיינען צו זיי זעהר עהנליך. זיי זיינען אָבער פון די היענען פארשיידען דורך זייערע רייס-ציייהנער און דורך זייערע פאָדערשטע פיס, וועלכע האָבען צו פינף פינגער.

דער ערד-וואָלף איז פארשפרייט אין די וועסטליכע טיילען פון זיד-אפריקא. ער זעהט אויס זעהר עהנליך צו דער געשטרייפ- טער היענע. ער איז אונגעפעהר דריי א האלב פוס לאנג, האָט גרויסע אויערען, אַ מיטעל-לאנגען פעלציגען עק, לאנגע האָר אויפ'ן רוקען, איז פון בלאַס-געלליכען קאָליר, מיט שוואַרצע שטרייפן אויף די זייטען, אַ שוואַרצע קאָפּ און אַ שוואַרצען עקענר. דער ערד-וואָלף געהט אַרויס זוכען זיין רויב ביינאכט, ער באַפאלט הויפטזעכליך שאָף. בייטאָג ליגט ער פארשטעקט אין אַ הויך,

וועלכע ער גראַבט אַליין אויס פאַר זיך. אין איין הוייל לעבען  
מעהרערע ערדוועלך צוזאַמען.


**ציבעט־קעץ.** — די פאַמיליע „ציבעט־קעץ“ איז א ציעמליך  
גרויסע. זי ענטהאַלט 9 גאַטונגען מיט אַן ערך 100 אַרטען. אַנ־  
דערע זאָלאָאָגען טיילען די ציבעט־קעץ זאָגאַר איין אין 30 גאַטונגען.  
אַ טייל פון דער ציבעט־קעץ פאַמיליע האָבען פינף־פינגערדיגע פיס  
און אַ טייל פיער־פינגערדיגע. מאַנכע פון די מיטגלידער פון דער  
פאַמיליע האָבען צוריקציהבאַרע נעגעל און מאַנכע האָבען אונבאַ־  
וועגליכע (ניט צוריקציהבאַרע) נעגעל. די ציבעט־קעץ האָבען אַ  
לאַנגליכען קערפער, אַ לאַנגען עק, אַ שפיציגען שנוק, קורצע, שפּי־  
ציגע אויערען, מיטעל־גרויסע אויגען, קורצע פיס און שטאַרקע רייס־  
צייהנער. די מייסטע פון זיי האָבען צווישען זייער רעקטום (הינט־  
טערלייב עפענונג) און געשלעכטליכע אָרגאַנען אַ דריזע, וועלכע  
טיילט אויס פון זיך אזאַ געלכליכען זאַל־ע־האַלליכען שטאַף, וועל־  
כער ווערט שפּעטער ברוין. דער שטאַף וועלכער ווערט  
גערופּען „ציבעט“, האָט זעהר אַ שטאַרקען ריח, עהנליך  
צו מאָשום (ביזאַם). אַמאָל פלעגט ציבעט זעהר פיעל באַנוצט  
ווערען אין מעדיצינען, איצט ווערט עס געברויכט אין מאַנכע פאַר־  
פּיומען. די ציבעט־קעץ זיינען פאַרשפּרייט בלויז אין דער אַלטער  
וועלט, אין אַמעריקאַ זיינען זיי ניטאָ.

די אַפריקאַנער ציבעט־קאַץ איז איבער צוויי פוס לאַנג, האָט  
לאַנגע האָר אויפ'ן האַלז און אויפ'ן רוקען, איהר פּעל איז אַש־גרוי  
און שוואַרץ־ברוין געפּלעקט און געשטרייפּט, אויף די זיימען פון  
האַלז האָט זי אַ לאַנגען ווייסען פּלעק אַרומגערינגעלט מיט שוואַרץ־  
ברוין, דער וואָרצעל פון עק האָט שוואַרצע רינגען, און זיין ענד  
איז שוואַרץ־ברוין. זי געהט אַרויס אין אווענד זוכען איהר רויב,  
זי פּאַנגט קליינע זויג־חיות, רויבט די אייער פון פּויגעל־נעסטען  
און זי עסט אויף וואָרצעלען און פּרוכט.

די אַזיאַטישע ציבעט־קאַץ איז עטוואַס גרעסער ווי די אַפריקאַ־  
נישע, איהר קערפער איז ברוינגליך־געלעב און דונקעל ראַסט־רויט  
געפּלעקט און געשטרייפּט, איהר קאַפּ איז ווייס געפּלעקט, איהר  
בויך איז ווייסליך, און איהר עק גערינגעלט. זי איז פאַרשפּרייט  
אין מזרח אינדיען און זי גיט אַרויס דעם בעסטען ציבעט.  
אין אַזיען איז פאַרשפּרייט אויך אַן אנדער ציבעט־קאַץ מיט  
דעם נאָמען „ראַסע“, וועלכע האָט זעהר אַ לאַנגען עק, אונגעפּעהר

צוויי פוס, אזוי לאנג ווי איהר קערפער. זי איז רייהענווייז גרוי, נעלברוינליך און שווארץ דונקעל געפלעקט און איהר עק איז אין רינגען. זי געפינט זיך אין אינדיען, אין כינא און אויף מעהרערע אזיאטישע אינזלען.

די גינסטער־קאץ, וועלכע איז פארשפרייט אין די זידליכע טיילען פון אייראָפּא, איז קלענער, ווי די פריהער באשריבענע ציבעט־קאץ. זי איז אומגעפעהר אַנדערהאַלבן פּוס לאַנג, אַ האַלב פּוס הויך מיט אַ לאַנגען עק, אַ קליינעם קאָפּ מיט אַ שפיציגען שנוק. איהר פעל איז געלבלויך גרוי, שווארץ געפלעקט, אונטער די אויגען ווייס געפלעקט און דער עק ווייס גערינגעלט. זי געהט ארויס זוכען איהר רויב ביינאכט, זי פאנגט פארשידענע קליינע חיות און באפאלט הויז־עופות און טויבען. איהר הויפט־שפיז איז אָבער מייז און ראַצען. די פעל פון דער גינסטער־קאץ ווערט זעהר געשעצט.



צייכונג 229. — אַ ציבעט־קאץ.

צו דער ציבעט־קאץ פאמיליע באלאנגט אויך דער איכנימאן, וועלכער איז פארשפרייט אין נאָרד־אַפריקא און אין וועסט־אַזיען. דער איכנימאן איז זיין אויסערליכען אויסזעהן וועניג עהנליך צו די ציבעט־קעץ. ער האָט אַ קליינעם קאָפּ, אַ שפיציגען שנוק, קורצע אויערען, נידריגע פינג־פינגערדיגע פיס מיט אונבאוועגליכע נעגעל (ניט צוריקציהבארע), אַ לאַנגען עק, וועלכער איז ביים וואָרצל זעהר דיק. דער איכנימאן ווערט אריינגערעכענט אין דער ציבעט־קעץ פאמיליע הויפטזעכליך צוליעב דער ציבעט־דרייע, וואָס ער האָט.

דער עגיפטישער איכנימאן, וועלכער ווערט גערופען „פרעה'ס ראץ“, איז איבער צוויי פוס לאנג, איבער אַ האַלב פּוס הויך, און מיט אַן עק, וואָס איז אַנדערהאַלב פּוס לאַנג. ער איז זעהר קרעפֿ-

טיג געבויט, זיין פעל איז באַדעקט מיט לאַנגע גרינליך-גרויע האָר, דער קאָפּ און רוקען דונקעלער און די פיס און ענד פון עק שוואַרץ. ער מאַכט זיך זיין נעסט צווישען געדיכטע שילף-ראָהר וועלדלאַך אָדער צווישען קליינע געדיכטע בוימלעך. ער איז זעהר שרעקע-דיג, פאָרזיכטיג און כיטרע. ער לויפט אַרום בייטאָג און פאנגט קליינע זויג-חיות, פויגלען, שלאַנגען, און אנדערע רעפּטילען, ווערס, א. א. ז. וו. ער באַפּאַלט אויך היהנער-שטייגען און טויבען נעסטען און מאָרדעט פיעל מעהר ווי ער קען אויפּעסען. פון זויג-חיות, פויגלען און עופות זויגט ער בלויז אויס דאָס בלוט, זייער פלייש עסט ער ניט. ער איז אויך אַ ליעכהאַבער פון אייער. ער איז כאַראַקטעריסטיש דערמיט, וואָס איהם שאַדט ניט דער בייס פון גיפטיגע שלאַנגען. די איינוואָהנער פון עגיפּטען באַהויפּטען, אַז ער זוכט אויס די אייער פון קראַקאָדילען און עסט זיי, און אַז ער קריכט אַרײַן אין דעם אָפּענעם האַלז פון שלאַפּענדע קראַקאָדילען און טויט זיי.

אין מזרח-אינדיען געפינט זיך אַן איכניימאַן, וועלכער איז קלענער פון דעם עגיפּטישען. ער איז וועניגער ווי צוויי פוס לאַנג און זיין עק איז כמעט אַזוי לאַנג ווי זיין קערפּער. זיין פעל איז זילבער-גרוי, דער קאָפּ דונקעלער און די פיס שוואַרצליך. ער יאָגט זיך נאָך שלאַנגען, באַזונדערס נאָך דער גיפטיגער בריען-שלאַנג, וועלכע ער עסט זעהר גערן. איהר גיפט שאַדט איהם ניט. ער ווערט אין אינדיען געהאַלטען אין די הייזער פאַר דעם צוועק אויס-צוראָטען מיין, ראַצען, שלאַנגען און סקארפּיאנען.

אייער פון דער איכניימאַן גאַטונג מיט דעם נאַמען „מעלאָן“ געפינט זיך אויך אין אייראָפּא, ער איז פאַרשפּרייט אין אנדא-ליזיען, שפּאַניען. ער איז איבער דריי פוס לאַנג, פון דונקעל-גרויען קאָליר, העל געשפּרינקעלטע פיס און נאָז. דער ענד פון זיין עק איז שוואַרץ און זיין פאָדערשטער טייל פון האַלז און בויך איז כמעט אין גאַנצען נאַקעט.

די קעץ. — צו דער פאַמיליע „קעץ“ באַלאַנגען אונגעפּעהר 60 אַרטען, וועלכע זיינען פאַרשפּרייט איבער אַלע וועלט-טיילען, אויסער אויסטראַליען. די חיות פון דער קעץ-פאַמיליע זיינען די מייסטע אויסגעשפּראַכענע פלייש-עסער אין דער אָרדנונג פון רויב-חיות. זיי באַפּאַלען הויפּטזעכליך וואַרעם-בלוטיגע חיות און צו-רייסען זיי. די חיות פון דער קעץ-פאַמיליע, צו וועלכער עס בא-

לאנגען די הויזקעז, די ווילדע קעז, די לייבען, מיגערען, לעמ-  
 פערטען, יאגוארען, פאנטהערען, לוקסען, פומאס, א. א. וו., האָבען  
 אַ רונדען קאָפּ, אַ שטאַרקען קורצען האַלז, אַ לאַנגען עק, מיטעל-  
 מעסיגע הויכע פיס מיט פינף פינגער אין די פאָדערשטע און פיער  
 אין די הינטערשטע, שטאַרקע, שאַרפע קרעלען (נעגעל), וועלכע  
 קענען איינגעצויגען און אויסגעצויגען ווערען, שטאַרקע רייס-  
 צייהנער, פון וועלכע די אויבערשטע האָבען צו דריי שפיצען און די  
 אונטערשטע צו צוויי, אַ האַרטע שאַרסטיגע האָרנארטיגע הויט  
 אויף דער אויבערשטער זייט פון זייער צונג. זיי געהען אויף  
 זייערע פינגער, שטייל און גערוישלאָז. זיי זיינען שנעלע לויפער  
 און וואונדערבארע שפּרינגער. מאַנכע פון זיי קענען שפּרינגען אַ  
 שטרעקע, וואָס איז פון 10 ביז 15 מאָל לענגער פון זייער קער-  
 פער. מאַנכע זיינען אויך גוטע קלעטערער און אויך גוטע שווי-  
 מער אין אַ נויט, ווייל אין אַלגעמיין ליעבען זיי ניט זעהר דאָס  
 וואַסער. זיי זיינען זעהר קרעפטיג, די גרעסערע אַרטען קענען מיט  
 איין קלאַפּ פון זייער לאַפּע דערשלאָגען אַ גרויסע חיה, און זיי  
 קענען מיט זייער מויל אוועקשלעפען אַ זעהר גרויסע משא. זייערע  
 חושים זיינען זעהר גוט ענטוויקעלט. ביי די קלענערע חיות פון דער  
 קעץ-פּאַמיליע זיינען די שוואַרץ אַפּלען פון די אויגען לענגליך און  
 בייטאָג ווערען זיי אזוי שמאָל, אַז זיי זעהן אויס ווי דינע שפּאַל-  
 טען. אָבער אין דער פינסטערניש, אָדער אין צאָרן ווערען זייערע  
 שוואַרץ-אַפּלען כמעט אין גאַנצען רונד. זיי האָבען אויף זייערע  
 אויבערשטע ליפען, מאַנכע אויך איבער זייערע אויגען, לאַנגע  
 שטייפע האָר, וועלכע דיענען זיי אַלס פיהל-אַרגאַנען. די מייסטע  
 פון זיי האָבען זעהר אַ שטאַרקען ענטוויקעלטען חוש הריח און זיי  
 ליעבען גוט שמעקענדע פלאַנצען און בלומען. זייער רויב באַפאַ-  
 לען זיי מיט אַ שפּרונג. מאַנכע פון זיי קוועלען זייער קרבן אַ  
 געוויסע צייט, ווי זיי וואַלטען זיך שפיעלען מיט איהם, איידער  
 זיי טוימען איהם. ווען זיי האָבען זייער רויב ניט געפאַנגען  
 מיט'ן ערשטען שפּרונג, מאַכען זיי מייסטענס ניט קיין צווייטע  
 פּראָבע. פאַר מענשען האָבען אַפילו די גרעסטע חיות פון דער  
 קעץ-פּאַמיליע אנפאַנגס מורא. ווען זיי האָבען אָבער אַ פאָר מאָל  
 פּרוּבירט באַפּאַלען אַ מענשען און איהם באַזיענט, יאָגען זיי זיך  
 נאָך מענשען-פּלייש מעהר ווי נאָך אַלע אנדערע. די נקבות געבע-  
 רען פון איינס ביז זעקס קינדער, און זיי זיינען זעהר צערטליכע

און טרייע מוטערס. די זכרים קימערען זיך זעלטען וועגען זייערע קינדער, אָפּט באַפּאַלען זיי זאָגאַר און עסען זיי אויף, באַזונדערס, אין די ערשטע טעג פון זייער געבורט, ווען זיי זיינען נאָך בלינד. די באַקאַנטעסטע און פאַרשפּרייטעסטע חיה פון דער קעז' פּאַמיליע איז די הויז-קאַז. פון וועלכער אַרט ווילדע קאַז זי שטאַמט אָפּ איז ניט אין גאַנצען זיכער, מען נעהמט אָבער אָן, אַז זי שטאַמט פון דער פּאַלביקאַז, אָדער נובישע קאַז, ווי זי ווערט אויך גערופען, וועלכע לעבט אין אַ ווילדען צושטאנד און איז פאַרשפּרייט פון פּאַלעסטינאַ און עגיפטען ביז צום אויבערשטען טייל פון טייך נילרוס. די פּאַלבי קאַז לאָזט זיך אויך לייכט צוגע-וועהנען צום הויז. ביי די אַלטע עגיפטער איז די קאַז געווען די הייליגסטע חיה. ווער עס האָט גע'הרג'עט אַ קאַז איז באַשטראַפּט געוואָרען מיט'ן טויט. די עגיפטישע געטין באַסט איז פּאַרגע-שטעלט מיט אַ קאַצען-קאַפּ, וואָס איז עהנליך צו דעם קאַפּ פון אַ פּאַלביקאַז. אויך די אנדערע אָפּבילדונגען פון קעז, וועלכע מען האָט געפונען אויף אַלטע עגיפטישע דענקמעלער זיינען עהנליך צו דער פּאַלבי קאַז. פון עגיפטען איז די פּאַלביקאַז פאַרשפּרייט געוואָרען אין אזיע, ווי אין כינאַ און יאַפּאַן. דאָרטען האָבען זיך ווי עס שיינט, דורך פּאַרונגען פון דער פּאַלביקאַז מיט אנדערע אַרטען קעז געשילדערט נייע ראַסען קעז. . . . און גריכענ-לאַנד איז די קאַז ביז צום 4טען יאהר-הונדערט געווען אין גאַנצען אונבאַקאַנט. שפעטער אָבער האָט זיך די הויז-קאַז אויך פאַר-שפּרייט אין איטאַליען און גריכענלאַנד. ערשט מיט אייניגע הונד-ערט יאָהר שפעטער האָט זי זיך אויך פאַרשפּרייט אין די אנדערע לענדער פון אייראָפּאַ. זי איז אויך פריה געבראכט געוואָרען אין אַמעריקאַ און אין אויסטראַליען. עס שיינט אָבער, אַז ניט אַלע הויזקעז שטאַמען אָפּ פון דער פּאַלביקאַז, אנדערע, ווי עס זעהט אויס, שטאַמען פון פאַרשידענע פּאַרונגען מיט וואַלד-קעז.

די הויזקאַז האָט זיך דורך איהר הויז-לעבען א סך וועניגער געענדערט ווי דער הונד. אין איהר איז נאָך פיעל געבליבען פון דער אַמאָליגער וואַלד-זעלבסטשמענדיגקייט. די קאַז איז וועניגער צוגעבונדען צו די מענשען ביי וועלכע זי לעבט, ווי דער הונט. זי איז מעהר צוגעבונדען צו דעם הויז ווי צו די מענשען. אָפּט פאַר-לאָזט זי אין גאַנצען די מענשען צווישען וועלכע זי לעבט, און לויפט אַוועק אין וואַלד און פאַרבלייבט דאָרטען אַ לענגערע צייט.

זי טוט עס געוועהנליך אין זומער. אין הערבסט קומט זי האלב-פארווילדעט צוריק צו דעם הויז וואָס זי האָט פאַרלאָזען. די קאָץ געהט, געוועהנליך, לאַנגזאַם, ציערליך, מיט געמאַס-טענע טריט, שטיל און גערוישלאָז. זי קען אָבער אויך שנעל לויפן פֿען און מאַכען גרויסע שפרונגען. זי שפּרינגט אָפּט 10 פּוס הויך. זי קלעמערט זעהר פלינג און ווען זי פאַלט דרעהט זי זיך אימער אויס אַזוי, אַז זי זאָל פאַלען אויף איהרע פּיס און בלייבען שטעהן. זי האָט זעהר אַ שאַרפען געהער און אויך אַ שאַרפען חוש הריח. זי איז דרייט און מוטיג, נעמט אויף אַ קאַמף מיט דעם גרעסטען הונט. די קעץ שלאָגען זיך אָפּט אויך צווישען זיך, באַזונדערס ביינאַכט. מיט די הויזמענשען ווערט זי זעהר אינטים באַפריינדעט, אָבער אָפּט קען זי אין מיטען פריינדשאַפט גאַנץ אונערוואַר-טעט אָנפאַנגען קרעלען און בייסען.

די הויפט־שפייז פון קעץ זיינען מייז; ראַצען פאַנגען ניט אַלע, מאַנכע האָבען מורא פאַר ראַצען. זיי פאַנגען אויך אַמאָל פּרעש, עקדעשען און שלאַנגען. עפּטער אָבער פאַנגען זיי פּויגלען, באַפאַלען זאָגאַר האָזען און קראָליקעס און געהען אויך פאַנגען פּיש. די פּאַרונגס־צייט ביי די קעץ איז ענדע פּעברואַר אָדער אָנפאַנג מערץ און אָנפאַנג יוני. 55 טעג נאָך דער פּאַרונג געבערט די קאָץ פון 5 ביז 6 בלינדע קעצלעך, וועלכע פאַנגען אָן זעהן אויף דעם 9טען טאָג. די קאָץ איז זעהר אַ טרייע מוטער און פּאַרטיי־דיגט זיי מיט גרויס איבערגעבענהייט און מוט. זי דאַרף זיי אויך פּאַרטיידיגען פון קאָטער, וועלכער עסט זיי אויף, ווען ער געפינט זיי. אין דער צייט, וואָס די קאָץ זויגט איהרע קינדער ווייזט זי אַרויס גרויס מיטלייד און פריינדשאַפט אויך צו אַנדערע יונגע קליינע היפּלאָזע חיות. זי פּאַסט דאַן אויף און קאַרמעט מיט גרויס צערמליכקייט קליינע הינטלעך, קליינע האָזען און זאָגאַר יונגע מייז און ראַצען.

ווי שוין באַמערקט זיינען פאַראַן פאַרשידענע ראַסען צווישען די הויז־קעץ, אָבער די מייסטע פון זיי האָבען דיזעלבע געוואוינדי־הייטען. אין כינאַ איז פאַראַן אַ הויז־קאָץ מיט אַראָפּגעלאָזענע אויערען און מיט לאַנגע זיידען־ווייכע האָר. די כינעזער קאַרמע־נען די דאָזיגע קעץ און עסען זייער פלייש. די אַנגאַראַ־קאָץ האָט זעהר לאַנגע, זיידען־ווייכע האָר, פון ווייסליכען, געלליכען אָדער גרוי־ווייסליכען קאָליר. אויף דעם אינוועל מאַן געפינט זיך אַ

קאץ, וועלכע האָט ניט קיין עק. איהרע הינטערשטע פיס זיינען לענגער, ווי די פאָדערשטע און זיינען זעהר שטאַרק ענטוויקעלט. זי שפּרינגט און קלעטערט אויסגעצייכענט און אונערמיעדליך און מאכט אָן פארוויסטונגען צווישען די פּויגלען. אין סומאטרא זיינען פאראן קעץ, וועלכע האָבען עקען בלוז, ווען זיי זיינען יונג און קליין, ביסלעכווייז אָבער ווערט דער עק פארשוואונדען און ווען זיי וואקסען אויס האָבען זיי אין גאנצען קיין עק ניט. די הויזקעץ ליידען פון פארשידענע קראנקהייטען, וועלכע קענען אָפט אָנגעשטעקט ווערען צו מענשען. זיי ליידען אויך פון משוגעת־קראנקהייט. אַ ביס פון אַ משוגע'נע קאץ איז געפעהרליך.

די ווילד־קעץ אָדער וואלד־קעץ זיינען ציעמליך גרויס. זיי דערגרייכען אַ לענג פון איבער דריטהאלבען פוס און נאָהענט פון אָנדערטהאלבען פוס הויך. זיי זיינען קרעפטיג געבויט און האָבען אַ ציעמליך גרויסען, דיקען קאָפּ. זייער פעל איז באַדעקט מיט לאנגע געדיכטע האָר, וועלכע זיינען ביי די זכרים שווארץ־גרוי און ביי די נקבות געלבלויך־גרוי. דאָס געזיכט איז רויט־געלעב מיט פיער שווארצע שטרייפען. זיי האָבען אויך אַ לאַנגען דונקלען שטרייף אויפ'ן רוקען און מעהרערע דונקלע קווער־שטרייפען אויף די זייטען. זייער בויך איז געלבלויך, שווארץ געפלעקט, די פיס האָבען שווארצע שטרייפען, אויף דעם פאָדערשטען טייל פון האַלז האָבען זיי אַ ווייסען פלעק און אויפ'ן עק שווארצע רינגען. די וואלד־קעץ זיינען פארשפרייט איבער גאנץ אייראָפּא, אויסער אין די נאָרדליכע טיילען. זיי לעבען מייסטענס אין געדיכטע וועלדער אין בערגיגע געגענדען. זיי מאַכען זיך זייערע נעסטען אין פוסטע בוימער, אין לעכער פון פעלזען צווישען קוסטארניקעס, אָדער אין פאָרלאָזענע הוילען פון פוקסען און דאָכסען. ווינטער־צייט באַזע צען זיי זיך אויך אָפט אין היי־שייערס. די וואלד־קאץ פיהרט אַן אָפגעזונדערטען, איינזאַמען לעבען. ביינאכט געהט זי ארויס זוכען איהר רויב. איהר הויפט־רויב זיינען מייז און ראַצען, אָבער זי פאנגט אויך פּויגלען, הויז־עופות, האַזען, קראַליקעס און אויך יונגע הירשען און פיש. זי פאָרט זיך אין פעברואַר און אין אַפּריל געבערט זי פון 5 ביז 6 קינדער, וועלכע בלייבען אייניגע טעג בלינד. זי איז ניט איבריגס טריי צו איהרע קינדער און פארטיידיגט זיי ניט אין אַ געפאהר. זי פאָרט זיך אויך מיט הויז־קעץ. פאַר מענשען האָבען די וואלד־קעץ מורא, אָבער ווען זיי ווערען אָנגעגריי



פען פארטיידיגען זיי זיך זעהר מוטיג און ווערען געפעהרליך. זיי קעמפען אויך ערפאלגרייך מיט די גרעסטע הינט. אין געפאני גענשאפט געוועהנען זיי זיך צו צום הויז ווי הויזקעץ.

אין אינדיען געפינט זיך א ווילדע קאץ, וועלכע איז באדייט מענר קלענער. מען רופט איהר די „צווערג-קאץ“. זי איז אונגע- פעהר אַנדערטהאלבען פום לאנג אָבער זי איז זעהר רויבעריש און בלוטדורשטיג. זי לעבט מייסטענס אויף בוימער און נעהרט זיך הויפטזעכליך מיט פויגלען.

צו די קלענערע חיות פון דער קעץ-פאמיליע באַלאַנגט אויך דער לוקס אָדער לינקס פון וועלכען עס עקזיסטירען אייניגע אַרטען.



צייכונג 230. — אן אַמעריקאַנער לוקס (לינקס).

דער זומפֿ-לוקס, וועלכער לעבט אין אַפריקא און אַזיען און איז ציעמליך שטאַרק פאַרשפּרייט אין עניפּטען, מייסטענס אין פּלאַכע, זומפּיגע געגענדען, איז אומגעפעהר דריטהאלבען פום לאַנג, פאַרהעלטניסמעסיג קורצע פיס, א מיטעלמעסיג גרויסען קאָפּ, האָט אַ ברוינליך גרויע פעל מיט דונקעלע שטרייפּען, זיין בויך איז געלב, דער עק איז דונקעל גערינגעלט און מיט אַ שוואַרצען שפיץ, און איז אין זיין אויסזעהן זעהר עהנליך צו אַ גרויסער קאץ. ער לויפט אַרום זוכען זיין שפּייז בייטאָג און ביינאַכט. ער פּאַנגט מייז, ראַצען, האָזען, העהנער, טויבען און אַנדערע פויגעל. מענ- שען גרייפט ער ניט אָן. ער פּאַרט זיך מיט קעץ און לאָזט זיך צוגעוועהנען צום הויז.

דער וויסטען-לוקס איז עטוואַס קלענער ווי דער זומפֿ-לוקס. זיין פעל איז דונקעל-געלב אָדער ברוין-רויט און ניט געפלעקט.


דער פּאָדערשטער טייל פון האַלז און זיין בויך איז ווייסליך, אויף זיין אויבערשטער ליפּ האָט ער אַ שוואַרצען פּלעק און אויף די שפיצען פון די אויערען שפיציגע האָר פינזלען. ער לעבט אין די וויסטענישען פון אַפּריקאַ און אינדיען. ער פּאָנגט קליינע זייג-חיות און פּויגלען און איז זעהר ווילד.

באַדייטענד גרעסער איז דער וואַלף-לוקס. ער דערגרייכט אַ לענג פון 4 פּוס און אַ הויך פון צוויי אַ האַלב פּוס, איז זעהר קרעפטיג געבויט, מיטעלמעסיג הויכע, שטאַרקע פּיס, לאַנגע צוגע-שפיצטע אויערען מיט שוואַרצע שפיציגע פינזעל-פּערמיגע בינטלעך האָר אויף די שפיצען פון זיינע אויערען, לאַנגע וואַנצעס אויף זיין אויבערשטער ליפּ און אַ צוויי-שפיציגען באָרד. דער אויבערשטער טייל פון זיין קערפּער איז רויטליך-גרוי, רויט-ברויין אָדער גרוי-ברויין געפּלעקט, וועהרענד זיין פּאָדערהאַלז, זיינע ליפּען און די קריי-זען אַרום זיינע אויגען זיינען ווייס. זיין עק איז גערינגעלט און מיט אַ שוואַרצען שפיץ. דער וואַלף-לוקס איז פּאַרשפּרייט אין אייראָפּאַ, באַזונדערס אין רוסלאַנד, און אין סקאַנדינאַווען. ער האַלט זיך אויף אין וועלדער, נאָר ער באַווייזט זיך אויך אָפּט נאָהנט פון דערפּער. ער איז אַן אויסגעצייכענטער שפּרינגער און קלעטערער, האָט זעהר אַ שאַרפען חוש הראיה און חוש השמיעה און איז זעהר כיטרע און פּאַרויכטיג. אויף זיין רויב געהט ער ביינאַכט. ער פּאָנגט פּויגלען, און פּאַרשיידענע קלענערע זייג-חיות. ער באַפּאַלט אויך שאַף און קליינע הירשען, און מאָרדעט מעהר וויפּיעל ער קען אויפּעסען. מענשען מיינט ער אויס, אָבער ווען ער ווערט אָנגעגריפּען אָדער פּאַרוואונדעט פּאַרטיידיגט ער זיך זעהר מוטיג און ווערט געפּעהרליך. די נקבה געבערט 10 וואַכען נאָך דער פּאַרונג פון צוויי ביז דריי קינדער. דאָס פּלייש פון וואַלף-לוקס איז זעהר געשמאַק און זיין פעל ווערט זעהר געשעצט. אין נאָרד אַמעריקאַ געפינט זיך דער פּאַלאַר-לוקס אָדער פּוקס-לוקס. זיין פעל איז ברוינליך זילבער-גרוי און שוואַך געפּלעקט. ער לעבט ווי דער וואַלף-לוקס.

באַדייטענד גרעסערע, שטאַרקערע און מעהר רויבערישע חיות אין דער קעיד-פּאַמיליע זיינען די פּאַנטהער-קעץ, צו וועלכע עס באלאנגען די לעמפּערטען (לעאַפּאַרדען), די יאַגואַרען און די פּאַנ-טהערען.

דער אַמעריקאַנער יאַגואַר איז נאָהנט פון פינה פּוס די לענג און


איבער צוויי א האלב פוס הויך. זיין פעל איז באדעקט מיט קורצע, געדיכטע, ווייכע האָר. אויף זיין האלז, ברוסט און בויך זיינען די האָר אביסעל לענגער. ער איז רויטליך-געלב מיט שווארצע פלע-קען, אָדער מיט געבלויך-רויטע שווארץ געראנדעטע רינגען, וועלכע האָבען אין מיטען איינעם אָדער צוויי שווארצע פונקטען. עס זיי-נען אויך פאראן יאנוארען וואָס זייער פעל האָט אן אנדער קאָליר, מאנכע זיינען זאָנאר כמעט שווארץ. דער יאָנאר געפינט זיך אין זיד-אמעריקא און אין די זידליכע טיילען פון נאָרד-אמעריקא. ער לעבט אין די וועלדער ביי די ברעגעס פון טייכען און זומפען. בייטאָג ליגט ער באהאלטען אין די הויכע גראָז פון די סטעפעס, אין



צייכונג 231. — א יאָנאר.

היילען אָדער צווישען געדיכטע בוימער. ווען עס ווערט אווענט לאָזט ער זיך ארויס אויף זיין רויב. ער פאנגט און מאָרדעט קלענערע און גרעסערע זויג-חיות ווי אויך אליגאטאָרען און שילד-קראטען. ער איז זעהר שטארק. מיט זיין קראפט קענען זיך נאָר פאָרגלייבען לייבען און טיגערס. זיינע חושים זיינען שטארק ענטוויקעלט און שאַרף, ער איז א גוטער שווימער און א גוטער קלעטערער, זיין גאנג איז לייכט, שטיל און פלינק. ער איז זעהר רויבעריש און מאכט אָן פארוויסטונגען צווישען פּיח, פערד און מויל-עזלען. אין אלגעמיין מאָרדעט ער בלוז אין שטיק אָבער מעהר ווי צוויי מאָל עסט ער ניט פון דעם פלייש פון זיין קרבן.

צו נבלות ריהרט ער זיך אפילו ניט אָן. דאָס ערשטע מאָל, ווען ער זעהט אַ מענשען אנטלויפט ער פון איהם, אָבער ווען ער זעהט אַ מענשען עטליכע מאָל הערט ער אויף מורא צו האָבען פאַר איהם און גרייפט איהם אָן, און ווען ער האָט איין מאָל פארווכט מענשען-פלייש ווערט ער פאַר מענשען זעהר געפעהרליך. ער יאָגט זיך נאָך מענשען-פלייש מעהר ווי נאָך אַלע אַנדערע. אויף פאַרביגע מענשען פאַלט ער גיכער אָן ווי אויף ווייסע. ווען ער גיט איין מאָל אַ שפרונג אויף זיין רויב און האָט עס ניט געפאנגען, מאכט ער ניט קיין צווייטע פּראָבע צו שפּרינגען, נאָר ער טרעט אָפּ. ווען מען קוקט איהם שטרענג אָן אין די אויגען אנטלויפט ער מיט טענס. אין דער פּאַרונגס-צייט לעבט ער אייניגע וואָכען צוזאַמען מיט דער נקבה, וועלכע געבערט פון צוויי ביז דריי קינדער. די איבריגע צייט לעבט ער אַפּגעזונדערט.



צייכנונג 232. — אַ לעמפּערט.

דער לעמפּערט (לעאָפּאַרד) איז עטוואָס גרעסער ווי דער יאַנאַר, אָבער ער איז עהנליך צו איהם אין קערפּער-בוי און אין אויסזעהן. ער איז בלאָס רויטליך געלב, אויף דעם רוקען דונקל-לער, מיט שוואַרצע שטרייפּען און לענגליך רונדע פּלעקען אויפ'ן געזיכט, קליינע שוואַרצע פּלעקען אויף דעם פּאַדער-קערפּער און אויף די פּיס און רויט-געלבע פּלעקען מיט שוואַרצע ראַנדען אויף דעם רוקען און די זייטען. עס זיינען אויך פאַראַן לעמפּערטען, וועלכע זיינען כמעט אין גאַנצען שוואַרץ. ער געפינט זיך כמעט אין גאַנץ אַפּריקאַ.

דער לעמפּערט איז זעהר קרעפטיג, דרייסט און קלוג. ער לעבט אין די וועלדער פון אַפּריקאַ. קלעמערט אָפּט אַרויף אויף

די גרויסע בוימער און רוהט דאָרטען. ער איז ניט קיין שנעלער לויפער, אָבער ער קען מאַכען ריזיג גרויסע שפרונגען. ער איז אויך א גוטער שווימער. ער מאָרדעט אַלע חיות, וועלכע ער קאָן נאָר בייקומען, און ער מאַכט פאַרוויסטונגען אין סטאַדעס שאָף און רינדער. דערוואַקסענע מענשען גרייפט ער געווענהליך ניט אָן, קינדער אָבער רויבט ער, וואו ער געפינט זיי נאָר. די נקבה געבערט פון 3 ביז 5 קינדער.

עהנליך צו דעם לעמפערט איז דער אַזיאַטישער פּאַנטהער. ער האָט דעם זעלבען קאָליר פון דעם אַפריקאַנער לעמפערט, אָבער ער איז אנדערש געפלעקט. ער איז אויך אַביסעל גרעסער פון איהם, ער איז אַרום זעקס אַ האַלב פּונד לאַנג. ער געפינט זיך אין דרום און מזרח אַזיען, אויך אין פּאַלעסטינאַ, קליין־אַזיען און קאווקאַז. אין ציילאָן געפינט זיך דער שוואַרצער פּאַנטהער.

דער זונדאָ-פּאַנטהער האָט אַביסעל אַן אנדער קערפּער־בוי, ווי די אַנדערע. ער האָט אַ קלענערען קאָפּ, אַ לענגערע האַלז, אַ לאַנגער געשטרעקטען קערפּער און זעהר אַ לאַנגען עק, וועלכער איז אָפט לענגער ווי זיין קערפּער. די פּלעקען פון זיין קערפּער זיינען קליינע אָבער אַזוי געדיכט, דאָס זיין פעל באַקומט אַ שוואַרץ־בלויען אָפּגלאַנץ.

אין אַזיען געפינט זיך אַ קלענערער פּאַנטהער, דער אירביס, וויא ער ווערט גערופען. ער איז אונגעפעהר 4 פונד לאנג, האָט הויכע פיס, אַ לאַנגען עק און געקרייזעלטע וואַליגע האַר. ער גע־פינט זיך אין מיטעל־אַזיען ביז סיביר. ער באַפּאַלט זיין רויב מייסטענס שפּרינגענדיג פון אַ בויס.

נאָך אַ קלענערער פּאַנטהער געפינט זיך אין די זידליכע טיילען פון נאָרד־אַמעריקאַ און אין נאָרד־בראַזיליען. מען רופט איהם די „פּאַרדעל־קאַץ“. ער איז אַרום 3 פונד לאנג, אויפ'ן רוקען ברוינד־ליך־גרוי און אויפ'ן בויך געלבלויך ווייס. ער איז באַדעקט מיט רייען שוואַרצע פּלעקען און זיין עק האָט שוואַרצע רינגען. ער לעבט אין געדיכטע, גרויסע וועלדער, וואו ער רויבט זויג־חיות און פויגעל. ער קומט אַמאָל אויך צו אַ באַוואוינטען פּלאַץ און מאַכט אָן פאַרוויסטונגען צווישען די הויז־עופות. ער לעבט אין פּאַרען.

דער טיגער איז די גרויזאַמסטע חיה אין דער קעץ־פּאַמיליע. ער דערגרייכט אַ לענג פון איבער זעקס פונד און אַ הויך פון נאָהנט דריי פונד. די נקבות זיינען קלענער. ער איז אויסערסט שטאַרק

געבויט און באזיצט א גוואלדיגע קראפט. מיט איין קלאפ פון זיין לאפע קען ער דערשלאָגען א גרויסע חיה, און ער קען אוועקטראָגען א מענשען, זאָגאר א פערד אָדער אן אַקס מיט זיינע קרעפטיגע צייהנער אין מויל. די האָר פון זיין פעל זיינען קורץ און גלאט, אויף די באַקען זיינען די האָר לענגער. זיין גרונד־פארב איז ראַסטיגעלב, אויפ'ן רוקען דונקעלער און אויף די זייטען העלער. זיין בויך, די אינוועניגסטע זייטען פון די פיס, זיין הינטער־לייב, די ליפען און דער אונטערשמער טייל פון זיינע באַקען זיינען ווייס. זיין עה, וועלכער איז איבער דריטהאלבען פוס לאַנג, איז דונקעל גערננעלט און פון רוקען צום בויך און צו דער ברוסט ציהען זיך שרעגע שווארצע שטרייפען.

דער טיגער געפינט זיך אין אזיען אין דריי פארשיידענע ארטען: דער סיבירישער טיגער, דער בענגאלישער טיגער און דער יאווא טיגער. ער האַלט זיך אויף אין וועלדער אָדער אין גרויסע קוסטאָריקעס. ער קומט אָפט נאָהנט צו באַוואוינטע פלעצער, צו דערפער און שטערט. זיינע באַוועגונגען זיינען זעהר שנעלע, ער קען לויפען אַ לאַנגע צייט ניט ווערענדיג מיעד, ער קלעמערט זעהר געשיקט אויף בוימער און שווימט אַריבער ברייטע טייכען. ער לויפט אַרום זוכען זיין רויב בייטאָג ווי ביינאכט. ער באַפאלט זיין רויב מיט אַ שנעלען שפרונג און לאָזט אין איהם אַריין זיינע שאַרפע שטארקע נעגעל מיט אַזא קראַפט דאָס די וואונד דען, וועלכע ער מאכט מיט זיי, זיינען כמעט אימער טויטליך. דער טיגער שאַנעוועט ניט קיין חיה, אויסער דעם העלפאנט, דעם רהינאָצערס און דעם ווילדען בופעל־אַקס. ווען דער טיגער האָט איינמאָל פאַרזוכט מענשען־פלייש ווערט ער פאַר דעם מענשען זעהר געפעהרליך. ווען דער טיגער האָט זיין רויב ניט געפאנגען מיט זיין ערשטען פארמאָסטענעם שפרונג, מאכט ער מעהר ניט קיין פראַבע עס צו פאנגען מיט אַ צווייטען שפרונג. נאָר ווי ווילד און בלוטדורשטיג דער טיגער איז ניט, צייגט ער דאָך ניט אַרויס אין געפאָהר קיין גרויס מוט. ווען ער ווערט פאַרפאָלגט זוכט ער צו אנטלויפען, אָבער ניט צו קעמפען.

די טיגערין טראָגט 105 טעג און געבערט פון 2 ביז 3 קינדער, זעלטען, 5 קינדער.

דער לייב, וועלכער ווערט גערופען דער קעניג פון די חיות, איז אויך ניט מעהר ווי אַ מיטגליעד פון דער קעץ־פאָמיליע. ער

האָט אַ קורצען, קרעפטיגען קערפער, וואָס דער הינטערשטער טייל פון איהם איז באוואקסען מיט קורצע גלאטע איינפארביגע האָר, וועהרענד דער פאָדערשטער טייל, דער האלז און די ברוסט ביז'ן האַלבען רוקען איז באוואקסען מיט אַ לאַנגע, געדיכטע גריווע, אָבער בלויז די זכרים האָבען אזא גריווע און ניט די נקבות. עס זיינען אָבער אויך פאראן אַרטען לייבען, וואָס אויך די זכרים האָבען ניט קיין גריווע. דער לאַנגער עק פון לייב ענדיגט זיך מיט אַ דיקען בינטעל האָר.

דער בערבער לייב, וועלכער איז ענטוויקעלטער ווי אַלע אנדערע לייבען, איז אומגעפעהר פינף פוס לאַנג און אַרום דריי פוס הויך. זיין עק איז איבער דריטהאלבען פוס לאַנג. ער האָט אַ ברייטע ברוסט, אַ גרויסען ברייטען קאָפּ, רונדליכע אויערען און פאר- העלטניסמעסיג קליינע אויגען. זיין קאָליר איז רויטליך-געלעב



צייכונג 283. — דער שאַרבען און צייהנער פון אַ לייב.

אָדער בלאַס-ברויין. זיין גריווע איז געמישט מיט שוואַרץ. יונג- געבאָרענע לייבען זיינען איבער אַ פוס לאַנג, זיי האָבען ניט קיין גריווע און אויך ניט קיין בינטעל האָר אויפ'ן שפיץ עק. זיי זיינען באדעקט מיט וואַליגע גרויליכע האָר, אויפ'ן קאָפּ און אויף די פיס שוואַרץ געפלעקט, אויפ'ן רוקען אַ שוואַרצע ליניע און אויף די זייטען שוואַרצע דינע שטרייפען. די פלעקען מיט די שטרייפען ווערן רען אָבער פארשוואַנדען שוין אין דעם ערשטען יאָהר פון דעם יונגען לייב און אויף דעם דריטען יאָהר וואקסט איהם אויס אַ גריווע. דער בערבער-לייב איז אַמאָל געווען פארשפרייט איבער גאנץ אַפריקא, איצט געפינט ער זיך בלויז אין מאַנכע טיילען פון אַפריקא, ווי אין טוניס, אַלזשיריען, מאַראָקאָ און אין דער אומ-

געגענד. אין אנדערע טיילען פון אַפריקא זיינען פארשפרייט די זענענאל-לייבען און די קאַפּ-לייבען, וועלכע זיינען עהנליך צו דעם בערבער-לייב. אין אַזיען איז פארשפרייט דער פערזער לייב, ער איז פארשפרייט פון פערזיען ביז אינדיען.

דער לייב לעבט מיסטענס אָפּגעזונדערט און יעדער לייב האָט זיין געביעט, וואו ער געהט אַרויס זוכען זיין רויב, אָפּט אָבער קלייבען זיך צונויף מעהרע לייבען צוזאַמען אַרויסצוגעהן אויף געיעג. דער לייב געהט זוכען זיין רויב ביינאַכט. בייטאַג ליגט ער באהאַלטען אין אַ געשיצטען אָרט, וואו ער גראַבט אויס אַ פּלאַכע גרוב, אין וועלכע ער האַלט זיך אויף אַזוי לאַנג ווי ער קען אין דער אומגעגענד געפינען גענוג שפייז און ווי לאַנג ער פיהלט זיך זיכער. ער באַזעצט זיך אויך אָפּט אין דער נאַכבאַרשאַפט פון דערפער. ווען ער געהט אַרויס ביינאַכט זוכען זיין רויב ברילט ער אָפּט אַזוי שטאַרק, דאָס אַלע חיות פון דער אומגעגענד ווערען אויפגעציטערט. געוועהנליך עסט ער ניט קיין נבלות, נאָר ווען ער איז אין נויט איז אויך נבלה ביי איהם אַ שפייז. דער לייב גיט אָפּט אַ שפּרונג פאַר אַ שטרעקע פון איבער 30 פוס. ער שפּרינגט אַרויף אויף דעם רוקען פון אַ פּערד אָדער פון אַן אָקס און מיט איין ביס בייסט ער דורך די האַלז פון זיין קרבן. שאַקאַלען און אויך גרעסערע חיות דערשלאָגט ער מיט איין קלאַפּ פון זיין לאַפּע. האַלטענדיג אַ צוויייעהריגען רינד אין זיינע צייהנער שפּרינגט ער אַריבער אַ פאַרקען פון 10 פוס הויך. מענשען ווייכט ער אנפאַנגס אויס, אָבער ווען ער האָט איינמאָל פאַרוזכט מענשען-פלייש ווערט ער פאַר מענשען זעהר געפּעהרליך. ווען ער באַגעגענט אַ מענשען אָדער חיה גרייפט ער זיי ניט אָן גלייך, נאָר ער רוקט זיך אָפּ 10 אָדער 12 טריט ווייט פון זיי, אַז ער זאָל קענען געבען אַ שפּרונג אויף זיי. אָהן אַ שפּרונג גרייפט ער ניט אָן. ווען מען בלייבט שטעהן ריהיג און מען קוקט איהם אָן שטרענג אין די אויגען וואגט ער ניט צו מאַכען דעם שפּרונג און ער געהט אַוועק. ווען מען אנטלויפט פון איהם איז מען פאַרלאָרען. לאַנגערען אין וועלכע עס ברענט פייער באַפאַלט ער ניט. ווען ער האָט געגעבען אַ שפּרונג צו פאַנגען זיין רויב און עס איז איהם ניט געלונגען, דאַן שפּרינגט ער ניט אַ צווייטען מאָל, נאָר ער אנטלויפט. דער טיגער איז אין אַלגעמיין דרייסטער פון איהם. דער טיגער ווייכט איהם ניט אויס, נאָר נעהמט אויף אָפּט אַ קאַמף מיט איהם. דער



לייב ווערט אָבער זעהר מוטיג און דרייסט, ווען ער איז שטארק הונגעריג, אָדער ווען ער ווערט אָנגעגריפען.

ווען עס קומט די פּאָרונגס-צייט פון די לייבען, יאָגען זיך אָפט מעהרערע פון זיי נאָך איין לייבין (לייביכע) און עס קומען אַרויס צווישען זיי בלוטיגע קעמפע. ווען אָבער די לייבין האָט אויסגע-קליבען איינעם פון זיי ציהען זיך די איבריגע צוריק. 15 אָדער 16 וואָכען נאָך דער פּאָרונג געבערט די לייבין צווישען געדיכטע בויער, נאָהנט פון א וואסער, פון איינס ביז זעקס קינדער (מייס-טענס פון 2 ביז 3), וועלכע זי האָדעוועט מיט גרויס צערטליכ-קייט. זי זויגט זיי אונגעפעהר 6 חדשים און נאכדעם פאנגט זי זיי אָן בריינגען רויב. דער לייב העלפט איהר אין דעם. ווען די יונגע לייבעלעך וואַקסען אַביסעל אונטער, פארלאָזט דער לייב דער לייבין מיט זיינע קינדער און פיהרט ווידער אַן איינזאמען לעבען. אין זאָאָלאָגישע גערטנער האָט מען געבראכט צו פּאָרונגען צווישען לייבען און טיגערס. די קינדער, וועלכע ווערען פון די דאָזיגע פּאָרונגען געבאָרען זיינען בלוז נקבות. זיי האָבען א קאָפּ פון א לייב און דעם קערפער פון א טיגער. דער לייב לעכט ביז אַן עלטער פון 30 יאָהר. אין געפאנגענשאפט לעבען מאנכע לייבען ביז 70 יאָהר.

וואַסער-רויב חיות. — צו דער פּאַמיליע וואַסער-רויב חיות באַלאַנגען די ים-הינט, די ים-בערען, די ים-לייבען, די וואַלאַראַסען, די ים-העלפאנטען, און אייניגע אַנדערע. די דאָזיגע פּאַמיליע ווערט אויף גערופען מיט דעם נאָמען די ים-הינט פּאַמיליע. די אלע חיות פון דער דאָזיגער פּאַמיליע זיינען צוגעפאסט צו א לעבען אין וואַסער, זייערע צייהנער זיינען אָבער גאנץ דיזעלכע ווי ביי די אַנדערע רויב-חיות און זיי זיינען רויבערישע פלייש-עסענדע חיות. אַנדערע זאָאָלאָגען טיילען אויס די וואַסער-רויב חיות אין א באַזונדערע אָרדנונג, וועלכע ענטהאַלט דריי פּאַמיליען: (1) וואַסער-רויב חיות וועלכע האָבען אויערען-מושלען (אויסערליכע אויערען) און, דיקע, לאנגע פיס, ווי די ים-בערען און ים-לייבען; (2) חיות אָהן אויערען-מושלען און שוואכע פיס, ווי די ים-הינט; (3) חיות מיט גרויסע, לאנגע פיס, מיט גרויסע לאנגע עק-צייהנער, וועלכע שטאר-צען זיי אַרויס פון מויל און אָהן אויערען מושלען, ווי דער וואַלאַראַס. דער ים-הונט האָט אַ שפינדעל עהנליך קערפער (פון פּאָרענט דיקער און נאָך הינטען דינער), קורצע, געדיכטע, גלאטע האָר, א

קליינעם, רונדליכען קאפ, אָהן אויער־מושלען, גרויסע אויגען, פאר שליסבארע נאָזלעכער און אויערען (כדי וואסער זאָל אין זיי ניט אריינקומען), קורצע פאָדערשטע פיס מיט קרעלען (נעגעל) אויף די פינגער, הינטערשטע פיס עהנליך צו פלוספּעדערען, א קורצען עק און א שוויס־הויט צווישען די פינגער. דער געוועהנליכער ים־הונט איז אומגעפעהר זעקס פוס לאַנג (די נקבות זיינען גרעסער ווי די זכרים), איז געלביך־גרוי און אויפ'ן רוקען ברוין אָדער שווארץ געפלעקט. ער געפינט זיך ביי די ברעגען פון אטלאַנטישען ים אין אייראָפּא, ביי די ברעגעס פון מזרחיים (אַסטזעע) און פון ווייסען ים, ביי שפיצבערגען, גרענלאַנד און נאָרד־אַמעריקא. ער האלט זיך מייסטענס אויף 30 מייל פון ברעג, אָפט אָבער קומט ער אַריין אין די טייכען, וועלכע פאלען אַריין אין ים. ער איז אַן אויסגעצייכענטער שווימער און טויכער, אָבער מעהר ווי 8 מינוטען קען ער אונטער'ן וואסער ניט בלייבען. ער שלאָפט מייסטענס שווימענדיג אין וואסער, אָבער אָפט קריכט ער אַרויס אויפ'ן ברעג, אויף אַ פעלזען אָדער אויף אַן אייז־קריע צו וואַרעמען זיך אויף דער זון, זיך אָפצורוהען אָדער צו שלאָפען. ער געהרט זיך מיט פיש, מיט ראַקעס און מיט מאַלוסקען. זיינע חושים זיינען גוט ענטוויקעלט. אין דער צייט פון פאָרונג קומט דער ים־הונט אַרויס אויפ'ן ברעג און די נקבה געבערט איהרע קינדער (איינס אָדער צוויי) אויף דער יבשה אין אַ פאָרוואַרפענעם, אונבאוואוינט־טען פּלאַץ. זי איז זעהר אַ געטרייע מוטער, זי זויגט זיי און ער־ציהט איהרע קינדער מיט גרויס צערטליכקייט און פארטיידיגט זיי מיט גרויס מוט אין מאַמענט פון אַ געפאהר. די ים־הינט ווערען זעהר פיעל געפאנגען צוליב זייער פעל און צוליב דעם וואָס זיי מאַכען גרויסע פאָרוויסטונגען צווישען די פיש. פאַר די גרענ־לענדער זיינען די ים־הינט דער יסוד פון זייער עקזיסטענץ. זייער פעלען באַנוצען זיי פאַר קליידער, זייער פלייש צום עסען, זייער פעט אַלס אויל פאַר באַלייכטונג און הייצונג, זייערע ביינער פאַר ווערקצייג, זייערע אָדערען אַלס פאָדים צו נעהען, א. א. ז. ו. אין געפאנגענשאפט לעבט ער ניט לאַנג, ער געוועהנט זיך אָבער זעהר גוט צו צו מענשען.

דער ים־בער איז באַדייטענד גרעסער ווי דער ים־הונט. ער איז ביז 10 פוס לאַנג (די נקבות זיינען פיעל קלענער, זיי זיינען בלויז אַ העלפט די לענג פון די זכרים). ער האָט פארהעלטניס־


מעסיג א לאנגען שפיציגען בערען-עהנליכען קאפ, מיט קליינע אויסערליכע אויערען, א קליינעם מויל, גרויסע אויגען, פלוס-פערדע-רען-עהנליכע פאָדערשטע פיס, ברייטע און לאנגע הינטערשטע פיס, א ברוינע פעל, וועלכע איז פון פאָרענט ווייס געשפרענקעלט. ער געפינט זיך ביי די ברעגעס פון פאָטאָגאָניען, אין וועסט-אפריקא, ביי די פאלקען-אינזלען, אין בערינג ים און אין אייניגע אנדערע ערטער. ער האַלט זיך מיסטענס אויף מעהרערע מיילען פון ברעג און מאכט אָפט נאנץ ווייטע וואנדערונגען אין ים. אין דער פאָרונגס-צייט קומט ער אַרויס אין אַן איינוואמען אָרט אויפ'ן ברעג, וואו ער פארבלייבט אַ לענגערע צייט אָהן עסען. איין זכר האָט אַרום זיך פון 9 ביז איבער 40 נקבות. די נקבה געבערט איין קינד, זעלטען צוויי, וועלכע זי זויגט, ערציחט און פארטיי-דיגט. די ים-בערען ווערען זעהר פארפאָלגט צוליבע זייער פעל און צוליבע זייער פלייש.

דער ים-לייב איז באַדייטענד נרעסער ווי דער ים-בער. ער דערנרייכט אַ לענג פון איבער 16 פוס (די נקבה איז פיעל קלענער). ער געפינט זיך ביי די ברעגעס פון נאָרד-אמריקא און פון אזיען. פון ים קומט ער אָפט אַרײן אין די טייכען. זיי זיינען זעהר בייז, ווילד און קרעפטיג, אָבער זעהר שרעקעדיג. זיי אנטלויפען פון מענשען, זיי קעמפען בלויז ווען זיי זיינען אין גרויס געפאהר. זיי ווייזען דאן אַרויס אַ גוואלטיגע קראפט. זיי עסען פיש, ראַקעס, מאלוסקען און פאנגען אויך וואַסער-פויגעל, ווי מעווען און פיג-זויגען. זיי ווערען פארפאָלגט צוליבע זייער פעל און פעטס.

דער ים-העלפאנט (בלויז דער זכר) האָט אַ לאנגען ריסעל (שנויץ) עהנליך צו אַ העלפאנט. געוועהנליך איז דער ריסעל אַרום אַנדערטהאלבען פוס לאַנג, נאָר ווען דער ים-העלפאנט ווערט אויפ-גערעגט און צאָרנדיג ציהט זיך זיין ריסעל דאָפעלט אזוי לאנג אויס. דער ים-העלפאנט איז זעהר אַ גרויסע חיה, ער איז אונגעפעהר 22 פוס לאַנג, האָט זעהר אַ דיקען קערפער און וועגט איבער דריי טויזענד פונט. אַמאָל האָבען זיך די ים-העלפאנטען געפונען אין גרויסע מאַסען ביי די זיד-אַמעריקאנישע ברעגעס. זיי זיינען אָבער פון דאָרטען אויסגעראַט געוואָרען און מען קען זיי איצט בלויז געפינען אויף די קערגעלען און אנדערע איינוואמע אינזלען. ער קומט אַרויס אויפ'ן ברעג אין אויגוסט, ווען עס קומט זיין פאָרונגס-צייט, און פארבלייבט אויף דער יבשה ביז די נקבה געבערט און

ערציהט די קינדער, אונגעפעהר ביז פעברואר אָדער מערץ. און דאָן פארשווינדעט ער ווייטער אין ים. ער איז זעהר א פוילע חיה און ער ווערט פארפאָלגט צוליעב זיין פעל.

דער וואַלראָס (ים־פּערד) איז אומגעפעהר אזוי גרויס ווי דער ים־העלפאנט. ער האָט פארהעלטניסמעסיג אַ קליינעם קאָפּ, אַ דיקען, לאנגען קערפּער, קיין אויסערליכע אויערען, דיקע, גרויסע פיס מיט טעמפע נעגעל און די פינגער זיינען פארבונדען מיט א שוויים־הויט. זיין קורצער עק איז עהנליך צו אַ שטיק דיקע הויט.



צייכונג 234. — (1 אַ וואַלראָס; 2 אַ ים־הונט.)

זיין פעל איז דיק, פון ברוינעם קאָליר און כמעט נאקעט. דאָס כאַראַקטעריסטישע פון דעם וואַלראָס איז, וואָס ער האָט ציזוי גרויסע, לאנגע אויגען־צייהנער, וועלכע שטארצען איהם אַרויס פון מויל ווי ביי אַ העלפאנט. די דאָזיגע צייהנער דערגרייכען אָפּט אַ לענג פון איבער צוויי פוס און זיי ווערען כמעט אזוי געשעצט ווי העלפאנט־ביין.

דער וואַלראָס האָט זיך מיט אַ פיער הונדערט יאָהר צוריק געפונען אין גאנץ גרויסע מאַסען ביי די ברעגעס פון שאַטלאַנד, איצט אָבער געפינט מען איהם בלויז אין גרענלאַנד, אין שפיצבערג־

גען, נאָוואַיאַ זעמליא, אַלאַסקאַ און אין נאָך אַ פּאָר פּלעצער פּון די פּאָלאַר געגענדערן, און אויך דאָרטען ווערען זיי אַלץ וועניגער צוליעב דעם סיסטעמאַטישען געיעג וואָס ווערט אויף זיי געפיהרט. די וואַלאַראַסען לעבען נאָהנט פּון ברעג און האַלטען זיך אויף די מייסטע צייט אויף דער יבשה אָדער אויף אייז-קריעס, וואו זיי שלאָפּען גאַנצע טעג. ווען דער וואַלאַראַס ווערט אָנגעגריפּען פּאַר טידיגט ער זיך מיט דער גרעסטער ווילדהייט, מייסטענס קומען איהם אנדערע וואַלאַראַסען צו הילף. אין דער פּאַרונגס-צייט פיהרען די וואַלאַראַסען אָן בלוטיגע קעמפע צווישען זיך. דערביי בריִלען זיי זעהר הויך. אזוי איז זייער שטים עהנליך צו דעם ברומען פּון אַ קוה. די נקבה געבערט אויפ'ן ברעג בלויז איין קינד. די וואַלאַראַסען זיינען אויסגעצייכענטע שווימער אָבער אויף דער יבשה זיינען זיי זעהר אונגעשיקט און ווען זיי דערפיהלען אַ געפּאָהר וואַרפען זיי זיך וואָס שנעלער אין וואַסער. זיי געהערן זיך מיט פיש, מושלען און פּאַנגען אויך זויג'חיות אַלס זייער רויב. זיי ווערען פּאַרפּאָלגט צוליעב זייערע צייהנער, הויט און פעט פּון וואָס עס ווערט פּאַבריצירט טראָן. די נאָרדליכע פעלקער, די עסקימאָסען און אנדערע עסען אויך דאָס שוואַרצע פלייש פּון דעם וואַלאַראַס.

**האַלב-אַפּען.** — אַ באַזונדערע אָרדנונג פּון די זויג'חיות שטעט לען מיט זיך פּאָר די האַלב-אַפּען. מאַנכע זאָאָלאָגען רעכענען זאָנאַר אַרײַן די האַלב-אַפּען אין דער אָרדנונג פּון די אַפּען (מאַלפּעס), אָבער די פּאַרשיידענהייט צווישען די האַלב-אַפּען און אַפּען איז אַ צימליך גרויסע, און עס איז גלייכער אַז מען זאָל זיי איינטיילען אין צוויי באַזונדערע אָרדנונגען.

די האַלב-אַפּען האָבען אַ שלאַנקען קערפּער, וועלכער איז באַדעקט מיט ווייכע, וואָליגע האָר, זייער קאָפּ איז עהנליך צו דעם קאָפּ פּון די רויב'חיות, זייערע צייהנער קען מען רעכענען אַלס אַ צווישען-שטופּע פּון די אינזעקטען-עסערע חיות און רויב'חיות, זיי האָבען גרויסע אויגען און די מייסטע פּון זיי אויך גרויסע אויערען. זייערע פּאָדערשמע און הינטערשמע גליעדער (הענד און פיס) זיינען כמעט דאָסזעלבע ווי ביי די אַפּען. די פּאָדערשמע גליעדער זיינען קירצער ווי די הינטערשמע, ביידע פּון זיי האָבען לאַנגע פינגער און דער גראָבער פּוס-פינגער קען זיך אויסבויען

געגענאיבער די אנדערע פינגער ווי דער גראָבער פינגער פון דער האַנד, דאָס הייסט, אַז זייערע פיס זיינען עהנליך צו זייערע הענד, אַזוי ווי ביי די אַפען. אַמאָל האָט מען אָנגענומען, אַז די האַלבע אַפען און די אַפען האָבען פיער הענד און מען פלעגט זיי רופען די פיער־הענטיגע חיות. אין דער ווירקליכקייט אָבער זיינען זייערע הינטערשטע גליעדער ניט קיין הענט נאָר פיס, און בלויז די פינגער פון זייערע פיס זיינען אויסגעבילדעט אויף דעם זעלבי־גען אופן ווי פון די הענט. זייער מאָרד איז קלענער און איינ־פאָכער ווי ביי די אַפען. די מייסטע פון די האַלבע־אַפען האָבען לאַנגע עקען, כמעט אַלע פון זיי זיינען נאכט־חיות און נעהרען זיך מיט אינזעקטען און קליינע ווירבעל חיות. זיי זיינען אויסגעציי־כענטע קלעטערער און פארבריינגען זייער מייסטע צייט אויף בוי־מער. די מייסטע פון זיי געפינען זיך אין מאַדאָנאָסקאר און אויף די דערבייאַגע אינזלען, אנדערע פון זיי געפינען זיך אויף די מזרח אינדישע אינזלען און אין אַפריקא.

די איצט עקזיסטירענדע האַלבע־אַפען ווערען איינגעטיילט אין 13 נאַטונגען און אַן ערך 60 אַרטען, וועלכע ווערען גרופירט אין דריי פאַמיליען, ווי פאָלגט:

1) די „פינגער־פאַמיליע“, צו וועלכער עס באלאָנגען די האַלבע־אַפען, וועלכע האָבען אויף אַלע פאָדערשטע און הינטערשטע פינגער, אויסער די גראָבע פינגער, קרעלען (שפיציגע נעגעל) און לאַנגע פעלציגע עקען. צו דער דאָזיגער פאַמיליע בלאָאָנגט בלויז דער אי־אי. ער לעבט אין מאַדאָנאָסקאר, זיין קערפער איז אומגעפעהר אַנדערטהאַלבען פוס לאַנג, וועהרענד זיין דיקער פעלציגער עק איז כמעט צוויי פוס לאַנג. ער האָט זעהר אַ גרויסען קאָפּ, גרויסע נאָקעטע אויערען, אויסגעשטארצטע אויגען, דינע פינגער מיט שפיר־ציגע נעגעל און ברייטע דוימען (די גראָבע פינגער) מיט פלאַכע נעגעל אויף די הענט. זיין פעל איז ברוינליך־שוואַרץ, זיין געזיכט רויטליך־גרוי, די שטייפע האָר פון זיין עק זיינען דונקעל און די שטייפע לאַנגע האָר ביי די ווינקלען פון זיין מויל און איבער זיינע אויגען זיינען שוואַרץ. ער לעבט אין די באַמבוס־וועלדער פון מאַדאָנאָסקאר און איז אַ פאַלשטענדיגע נאכט־חיה. ער נעהרט זיך מיט אינזעקטען, מיט צוקער־ראָהר און מיט דעם זאפט פון די באַמבוס־בוימער. ער איז זעהר אַ פוילע חיה און האָט מורא פאר

ליכט.

(2) די „לאנגפֿיס“ פאמיליע, צו וועלכער עס באלאנגען די האַלבֿאַפּען, וועלכע האָבען קרעלען בלויז אויף די צווייטע און דריטע פּוסֿ־פּינגער, וועהרענד אויף די איבריגע פינגער האָבען זיי פלאכע נעגעל; דער פּוסֿ־ביין מיט וועלכען דער טריט איז פאראיי־ניגט איז שטאַרק פאַרלענגערט און זייער עק איז זעהר לאנג און שיטער באַוואַקסען מיט האָר. פון די איצט עקזיסטירענדע האַלבֿאַפּען באלאנגט צו דער דאָזיגער פאמיליע בלויז דער „געשפּענסט־אַה“ (קאָבאַלדמאַקי), וועלכער געפינט זיך אויף סומאַטרא, באָרי־נעאַ, און אויף אייניגע פון די דערבייאַגע אינזלען. דער „נע־שפּענסט אַה“ איז אַ קליין חי'ה'לע פון אומגעפּעהר אַ האַלב פּוסֿ־לאַנג, מיט אַ גרויסען רונדען קאָפּ, זעהר גרויסע אויגען און גרויסע אויערען, קורצע פּאָדער־גליעדער און לאַנגע הינטער־גליעדער און אַ גאַנץ לאַנגען דינעם עק, וועלכער איז ביי זיין ענד באַוואַקסען מיט לאַנגע האָר. זיין פעל איז געלכ־ברוי־גרוי, אויפ'ן קאָפּ און אויפ'ן רוקען דונקעלער און אויפ'ן בויך וויסליך. ער לעבט אין געדיכטע וועלדער, אליין אָדער פּאַרווייז, נעהרט זיך מיט אינוועקט טען, עקדעשען און מיט אַנדערע קליינע חיות. ער עסט אויך פּרוכט. צוליב זיין אויפפאַלענדען, זאָנדערבאַרען אויסזעהן האָט ער באַקומען דעם נאמען „געשפּענסט־אַה“.


(3) די לעמורידען פאמיליע, צו וועלכער עס באלאנגען די האַלבֿאַפּען, וועלכע האָבען קרעלען בלויז אויף דעם צווייטען פּוסֿ־פינגער, וועהרענד אויף די איבריגע פינגער האָבען זיי פלאכע נעגעל. זי איז די גרעסטע פאמיליע פון די האַלבֿאַפּען, עס באלאנגען צו איהר 11 גאַטונגען מיט איבער 50 אַרטען, וועלכע זיינען פאַר־שפּרייט אין אַפּריקאַ, אין מזרח אינדיען און אין דרום־כינאַ. צו דער דאָזיגער פאמיליע באלאנגט דער לעמור, אָדער פּוקס־אַה, דער לאָרי, דער בערען־מאַקי, דער צווערנ־מאַקי, דער אויערען־מאַקי און מעהרערע אַנדערע.

דער לעמור (פּוקס־אַה) לעבט אין די געדיכטע וועלדער פון מאַדאַגאַסקאַר און די דערבייאַגע אינזלען. ער האָט אַ פּוקס־עהנליכען קאָפּ, אַ לאַנגען פעלציגען עק, און אַ ווייך־האַריגע פעל. בייטאַג ליגט ער באַהאַלטען צווישען די געדיכטע צווייגען פון די בוימער, ביינאכט לאָזט ער זיך אַרויס מיט אַ גרויסען געשרוי אויף געיעג. ער פאנגט אינזעקטען, יונגע פויגעל און אַנדערע

קליינע חיות. זיין הויפט נאָהרונג איז אָבער פרוכט. די לעמורען זיינען מייסטענס פרידליכע חיות.

דער בערען-מאקי האָט אַ בערען-עהנליכען קאָפּ, איז אַ קליינע חיה פון אונגעפעהר אַ פוס לאנג, האָט כמעט אין גאנצען ניט קיין עק, דער ערשטער פינגער פון זיינע הענט און פיס איז קורץ און קליין, זיין אויבערשטער טייל פון קערפער איז באַדעקט מיט ראָסט-ברוינליך-גרויע האָר, זיין געזיכט איז דונקעל-ברויין און זיין בויך העל-גרוי, זיינע פאָדערשטע און הינטערשטע גליעדער זיינען גלייך לאַנג.

דער אויערען-מאקי געפינט זיך אין אַפריקא און אין די דער-



צייכונג 235. — (1 אַ שפּין-אַף; (2 אַ פּוקס-אַף; (3 אַ מערען-אַף.



בייאגע אינולען. ער האָט אַ שלאַנקען קערפער, אַ גרויסען קאָפּ און זעהר גרויסע, הויטיגע נאָקעטע אויערען, וועלכע לעגען זיך צונויף אין פאַלטען און פאַרשליסען די אויערען-עפענונגען, ווען עך שלאָפּט. ער האָט גרויסע אויגען, מיטעל-לאַנגע פּאָדערשטע און הינטערשטע גליעדער און זיין פעל איז באַדעקט מיט לאַנגע, געדיכטע האָר. דער אויערען-מאָקל איז אַ נאכט-חיה און זעהר רויבעריש. ער פאנגט פאַרשיידענע קליינע חיות. ער עסט אָבער אויך פּרוכט. זיינע חושים זיינען זעהר גוט ענטוויקעלט, באַזונדער דערם שטארק ענטוויקעלט איז זיין געהער.

דער לאָרי אָדער פּויל-אַף איז אַ קליין חיה'לע מיט אַ שלאַנקען קערפער, אַ גרויסען קאָפּ, גרויסע אויגען, מיטעל-גרויסע אויערען, לאַנגע, דינע הענט און פיס און אַ קוים באַמערקבארען עק. דער לאָרי שלאָפּט בייטאָג אין אַ לאָך פון אַ בוים און ביינאכט געהט ער אַרויס זוכען זיין שפייז, וואָס באַשטעהט פון אינזעקטען און קליינע פּויגלען. ער עסט אויך פּרוכט. ער געפינט זיך אין מורח-אינדיען און אין די דערבייאַגע אינולען. אין מורח-אינדיען געפינט זיך אויך אַן אַנדער אַרט לאָרי, וועלכער איז באַדייטענדר גרעסער און דיקער, ווי דער פריהער באַשריבענער. מען רופט איהם דער פּלומפּ-לאָרי, צוליב זיין פּלומפען אויסזעהן. ער איז איבער אַ פוס לאַנג, האָט אַ דיקען קערפער און קורצע גליעדער.

די פּרימאטען. — די ערשטע און העכסטע אָרדנונג פון די זייג'חיות איז, צו וועלכער עס באלאנגען די אַפען (מאַלפעס) און צו וועלכער עס באלאנגט אויך דער מענש, דער „האָמאָ סאַפּיענס“, (די שכל חיה). זי זוערט גערופען די אָרדנונג פון די „פּרימאטען“. די אַפען זיינען פון אַלע חיות די מייסט עהנליך צו מענשען סאַי קערפערליך סאַי גייסטיג. ביי יונגע אַפען איז דער קאָפּ מעהר מענשען-עהנליך ווי ביי די עלטערע. ווען די אַפען ווערען עלטער וואָסען זייערע באַקען-ביינער און דער קין-ביין אויס פיעל גרעסער, ברייטער און פיעל מעהר אַרויסגעשטאַרצט ווי ביי דעם מענשען. די נאָז לויפט זיך ביי די אַפען צוזאַמען מיט די ליפען און נאָר ביי איין אַרט שטאַרצט די נאָז באַדייטענדר אַרויס פון גע-זיכט. די צייהנער ביי די אַפען זיינען עהנליך ווי ביי מענשען, אָבער דאָך איז פאראן אַ באַדייטענדר אונטערשייד. זייערע אויגען-צייהנער זיינען פיעל גרעסער און שטאַרצען מעהר אַרויס.

צווישען די אויגען־צייהנער און באַק־צייהנער איז ביי די אַפען פאַר  
ראַן אַ ליידיגער רוים, און די אויבערשטע און אונטערשטע אויגען־  
צייהנער קומען צוזאַמען ניט איינע אויף די אַנדערע, ווי ביי מענער  
שען, נאָר איינע פאַרביי די אַנדערע, ווי ביי די רויב־חיות. די אויגען  
פון די אַפען שטעהען נעהנטער איינע צו די אַנדערע ווי ביי מענשען.  
זייערע אויערען האָבען ניט קיין לעכעלעך. דער גראָבער פּוס־  
פינגער איז ביי די אַפען אויסגעבילדעט אויפ'ן זעלביגען אופן ווי  
דער גראָבער האַנט־פינגער. זיי קענען דאָריבער אָנגרייפֿען יעדע זאָך  
מיט זייערע פּיס פּונקט ווי מיט זייערע הענט. ביי די מייסטע  
פון זיי זיינען די הענט באַדייטענד לענגער ווי די פּיס. אַ טייל פון די  
אַפען שטעלען זיך אָפּט אויף און געהען ווי מענשען, אָבער זייער  
גאַנג איז אומגעלומפערט און ניט זיכער. צום קלעטערען זיינען  
זיי אַמבעסטען צוגעפּאַסט. דער קערפּער פון די אַפען איז באַדעקט  
מיט געדריכטע האָר, אויסער אייניגע טיילען פון געזיכט, די האַנט־  
פּלעכען, די פּוס־זוילען (פּאַדעשוועס) און דער געזעס. זייערע נירען  
זיינען איינפאַכער אויסגעבילדעט און באַדייטענד קלענער ווי ביי  
מענשען. די מוסקלען זיינען ביי מאַנכע אַרטען באַזונדערס שטאַרק  
ענטוויקעלט און זיי באַזיצען אַ גרויסע קראַפּט. די הוישן זיינען  
ביי די אַפען זעהר גוט ענטוויקעלט. די מייסטע פון זיי באַזיצען  
אַ באַזונדערס גוט ענטוויקעלטען נאָכאהמונגס טאַלאַנט (נאָכצוטאָן  
אַלץ וואָס מענשען טוען). פּיעלע נאַטור־פּאַרשער האָבען באַזוויזען,  
אַז די אַפען באַזיצען אויך עטוואַס אַזעלכעס, וואָס קען אָנגערופּען  
ווערען שפּראַך, און אין דער לעצטער צייט האָבען מאַנכע נאַטור־  
פּאַרשער זיך גענומען צו שטודירען די „שפּראַך“ פון די אַפען.  
די הויפט שפּייז פון די אַפען איז פּרוכט. זיי עסען אויך אינזעקטען.  
אין דער געפּאַנגענשאַפּט געוועהנען זיי זיך איין צו עסען כמעט  
אַלע שפּייזען, וואָס מענשען עסען. זיי בריינגען דאָס שפּייז אין  
מויל מיט זייערע הענט, אָדער מיט זייער עק, מיט וועלכען זיי  
קענען זיך זעהר גוט באַדיענען, ווי מיט אַ האַנט. מאַנכע אַרטען  
אַפען לעבען אין מאַנאַנאַמיע (איינ־ווייבעריי), וועהרענד אַנדערע  
אין פּאָליגאַמיע (פּיעל־ווייבעריי). די נקבות לעבען אָפּגעזונדערט פּאַרווייז,  
מאָל בלויז איין קינד. די ערשטע לעבען אָפּגעזונדערט פּאַרווייז,  
וועהרענד די צווייטע אין גרעסערע פּאַמיליען, וועלכע ווערען גע־  
פּיהרט פון דעם עלטעסטען זכר אין דער פּאַמיליע. מייסטענס  
לעבען זיי אויף בוימער, און זיי האַלטען זיך אויף אין די הייסע

גענערדען. אין געפאנגענשאפט לעבען די אפען ניט-לאנג, זיי ווערען קראנק אויף די לונגען און מאָגען און שטארבען.  
 די איצט עקזיסטירענדע אפען, ווערען איינגעטיילט אין פאָל-גענדע דריי פאמיליען, וועלכע ענטהאלטען 25 גאטונגען מיט איבער 230 ארטען:

(1) די קרעלען-פאמיליע, צו וועלכער עס באלאנגען די אפען, וועלכע האָבען שפייגיגע נענעל אויף זייערע פינגער, אויסער די גראָבע פינגער אויף וועלכע זיי האָבען ברייטע פלאַכע נענעל. די אפען, וועלכע באלאנגען צו דער דאָזיגער פאמיליע זיינען קליין געוואקסען, מייסטענס בלוז עטוואס גרעסער ווי וועווערקעס. זייער קערפער איז באוואקסען מיט געדיכטע, וואָליגע האָר, זיי האָבען אַ לאנגען פעלציגען עק, אַ רונדליכען קאָפּ, אַ פלאַטשיגע נאָז מיט זייטליכע נאָזלעכער און אויסגעשטארצטע אויערען, וועלכע זיינען אָפט פון אויבען באוואקסען מיט בינטלאך האָר. זיי לעבען אין געזעלשאפט, פארבריינגען די מייסטע צייט אויף בוימער און געהרען זיך מיט פרוכט און אינזעקטען. צו דער דאָזיגער פאמיליע באלאנגט בלוז איין גאטונג מיט אונגעפעהר 30 ארטען, פון וועל-כע די מעהר באקאנטע זיינען די זיידען-אפען, די לייבען-אפען און רויטעל-אפען. די זיידען-אפען האָבען ווייכע, וואָליגע, געדיכטע זיי-דען-ארטיגע האָר. די לייבען-אפען האָבען אַ גריווע עהנליך צו אַ לויב. זיי זיינען קליין געוואקסען, פון 7 ביז 8 צאָל (אינטשעס) לאנג, זייער קאָליר איז אַליוו-ברוינליך, אויפ'ן רוקען ווייס-געלעב געפלעקט, מיט אַ לאנגער געלליכע גריווע, מיט אַ שווארצען גע-זיכט, שווארצע הענט און פיס און אַ לאנגען שווארצען עק. עהנ-ליך צו דעם לייבען-אָף איז דער רויטעל-אָף. ער איז עטוואס גרע-סער און האָט אַ פיעל לענגערען עק. זיין געזיכט האָט אַ ברוינליכען פלייש-פארביגען קאָליר, זיינע הענט און פיס זיינען געלליך-ברויין, זיין גריווע איז דונקעל-ברויין און זיין קערפער איז רויט-געלעב. ער געפינט זיך אין די וועלדער פון בראַזיליען. ער לעבט אין פאמיל-יען, איז שרעקעדיג, מיסטרויאיש און ווערט לייכט אויפגערעגט.

(2) די ברייטנעזער פאמיליע, צו וועלכער עס באלאנגען די אפען, וועלכע האָבען ברייטע פלאַטשיגע נעזער מיט ווייט אָפגע-טיילטע נאָזלעכער. אַלע זייערע פינגער האָבען פלאַכע, ברייטע נענעל, ווי ביי מענשען, די מייסטע פון זיי האָבען אַ לאנגען עק. אייניגע פון זיי האָבען אויף זייער צונגיבין אַ גרויסען ביינערנעם

בלאז דורך וועלכען זייער שטימע ווערט באדייטענד פארשטארקט. די שטימע פון די דאזיגע איז זעהר שרייענד און ברילענד. מען רופט זיי דעריבער „בריל־אפען“ אָדער „שריי־אפען“. די אלע אפען, וועלכע באלאנגען צו דער פאמיליע „ברייט־נעזער“ געפינען זיך בלויז אין אמעריקא (אין די הייסע געגענדען) און זיי ווערען דאריבער אויך גערופען „אפען פון דער נייער וועלט“. זיי זיינען מייסטענס קלענער פון די אפען פון דער אלטער וועלט, זיי זיינען אויך וועניגער ווילד און געוועהנען זיך איין שנעלער און לייכטער מיט מענשען. די פאמיליע ענטהאלט 10 נאטונגען מיט אונגעפעהר 80 ארטען, וועלכע ווערען איינגעטיילט אין עטליכע אונטער־פאמיליען, לויט דער ענטוויקלונג פון זייער עק. אנדערע האָבען שוואכער ענטוויקעלטע און קירצערע עקען, און אנדערע האָבען לאַנגע ווי־קעלעקען אָדער גרייפ־עקען (אזעלכע עקען וועלכע קענען זיך צונויפוויקלען און קענען אָנגרייפֿען, ווי אַ האַנט). צווישען די מעהר באַקאנטע זיינען די בריל־אפען, נאכט־אפען, שפינען־אפען, וואָל־אפען, טייִוועל־אפען און אייניגע אנדערע.

די בריל־אפען זיינען מיטל־גרויסע חיות מיט אַ דיקען קער־פער, אַ גרויסען, הויכען קאָפּ, אַן אַרויסגעשטעלטען שנוק, מיט אַ ביינערנעם בלאַז אויף זייער צונג־ביין און מיט אַ לאַנגען גרייפ־עק. זיי זיינען באַדעקט מיט געדיכטע האָר, אויף דער מאָרדע שטאַרק פאַרלענגערט ווי אַ באָרד. זיי זיינען פאַרשפּרייט אין די געדיכטע ווילדער פון זיד־אַמעריקאַ, וואו זיי פאַרבּריינגען די מייסטע פון זייער צייט אויף בוימער, אויף וועלכע זיי שלאָפען אויף. זיי בריי־לען און שרייען זעהר הויך און שטאַרק. זיי נעהרען זיך מיט בלע־טער, קנאָספען, פּרוכט, אייער און יונגע פּויגלען. דער רויטער־בריל־אָפּ געפינט זיך אין בראַזיליען און אין קאָלאָמביאַ. ער איז אונגעפעהר צוויי אַ האַלב פּוס לאַנג און מיט אונגעפעהר אַזאַ לאַנגען עק. דער קאָליר פון זיין קערפער איז רויטליך־ברון, זיין געזיכט בלויז־שוואַרץ. ער לעבט אָפּט אין גרעסערע געזעלשאַפטען. דער שוואַרצער בריל־אָפּ איז עטוואַס קלענער. ער איז גלאַנציג שוואַרץ, די נקבה און די יונגע ניט־ערוואַקסענע בריל־אָפּען זיינען עטוואַס רויטליך. ער געפינט זיך אין די געדיכטע וועלדער פון פאַראַגוואַי און פאַרטויבט די אומגעגענד, וואו ער געפינט זיך, מיט זיין שרייען און ברילען. די איינוואַהנער עסען זיין פלייש זעהר גערן און זיין פּעל ווערט באַנוצט פאַר פּעלצען.

די נאכט-אפען לעבען אין די געדיכטע וועלדער פון די הייסערע טיילען פון זיד-אמעריקא. זיי האָבען א לאנגען אָבער שוואכען עק (ניט קיין גרייפס-עק), א קליינעם רונדען קאָפּ, גרויסע אויגען און קליינע אויערען. בייטאָג ליגען זיי באַהאַלטען אין לעכער פון בוימער, וועהרענד ביינאכט געהען זיי אַרויס זוכען זייער שפיין, וואָס באַשמעהט פון פויגלען, פרוכט און גרינסען. דער נאכט-אָפּ קלעמערט אין שפּרינגט אויסגעצייכענט. ער האָט מורא פאַר ליכט, און ביינאכט, אָדער ווען עס איז דונקעל לייכטען זיינע אויגען. די נאכט-אָפען לעבען פאַרווייז און איין מאָל אַ צונופגע-קומענע פאַר לעכט אזוי צוגעבונדען און טריי, דאָס ווען איינס פון דער פאַר שטארבט, לעבט אויך דאָס צווייטע ניט לאנג מעהר.

די שפינען-אָפען האָבען אַ שלאַנקען קערפּער, אַ רונדליכען קאָפּ, לאנגע גלידער, גאנץ קליינע אָדער אין גאנצען פעהלענדע גראָבע פינגער און א זעהר לאנגען עק. אין זייער אויסזעהען האָבען זיי א געוויסע עהנליכקייט צו אַ שפּין. זיי לעבען אויף בוימער, אין וועלכע זיי קלאַמערען זיך פעסט אָן מיט זייערע הענט און פיס, און ווערען דאָריבער אויך גערופען „קלאַמער-אָפען“. זיי לויפען זעהר שנעל, מייסטענס לויפען זיי אַרום אין גרופען פון 6 אָדער 12 שטיק. זיי ווערען געפאנגען פון מאנכע אינדיאנער שבטים צוליב זייער פעל און זייער פלייש.

די וואל-אָפען געפינען זיך אין די געדיכטע וועלדער ביי דעם אמאָזאָנען-טייך אין פּערו און אַרינאקא. זיי זיינען נידריג געבויט, האָבען אַ גרויסען, רונדען קאָפּ, קליינע אויערען, אַ לאנגען, קרעפֿ-טיגען וויקעל-עק און זייער קערפּער איז באַדעקט מיט געדיכטע, וואָליגע האָר, וועלכע זיינען אויף דער ברוסט באַדייטענד לענגער. זיי זיינען גוטמוטיגע חיות און נעהרען זיך מיט פרוכט.

דער טייזעל-אָפּ געפינט זיך אין מאַראַניאָן און אַרינאָקא, איז זעהר ווילד און בייז און האָט אַן אַפּשרעקענדען אויסזעהן. זיין קערפּער איז איבער אַ פוס מיט אַ פּערטעל לאנג, מיט אונגעפעהר אזאַ לאנגען עק. זיין קאָליר איז שוואַרץ אָדער דונקעל ברוין, — די געדיכטע האָר אויף זיין רונדען קאָפּ זעהן אויס ווי אַ יאַרמולקע און ער האָט אַ לאנגען שוואַרצען באָרד. צוליב זיין יאַרמולקע און באָרד האָבען איהם די דייטשען אַ נאָמען געגעבען „יודען-אָפּ“. (3) די שמאָל-געזער פאַמיליע, צו וועלכער עס באַלאנגען די אָפען מיט שמאָלע, מענשען-עהנליכע געזער. די אָפען פון דער


דאָזיגער פּאַמיליע זיינען עהנליכער ווי אַלע אנדערע צום מענשען. זייער געזיכט האָט מייסטענס וועניג האָר און די מייסטע פון זיי האָבען בערד. אנדערע פון זיי האָבען באַקען־קעשענעס. ביי מעהרערע פון זיי זיינען די גראָבע פינגער פון די הענט קורץ און וועניג ענטוויקעלט, וועהרענד די גראָבע פינגער פון די פיס זיינען לאַנג און גוט ענטוויקעלט. זייער עק איז קורץ און ביי מאַנכע פעהלט ער אין גאַנצען.

די אַפען פון דער שמאַל־נעזער פּאַמיליע געפינען זיך אין דער אַלטער וועלט, אין אַזיען און אַפריקאַ. זיי זיינען זעהר קרעפטיג און זיי פארטיידיגען זיך מיט שטיינער אָדער שטעקענס, וועלכע זיי באַנוצען אַלס וואַפען.

מען טיילט די שמאַל־נעזער אַפען איין אין דריי אונטער־

פּאַמיליען:

1) הונד־אַפען, אַזעלכע וואָס האָבען אַ הונד־עהנליכע געזיכט, געהען אויף אַלע פיער, האָבען עקען און באַקען־קעשענעס. צו דער דאָזיגער אונטער־פּאַמיליע באַלאַנגען 7 גאַטונען מיט אונגעפעהר 70 אַרטען, צווישען זיי די פּאָוויאַנען אָדער מאַנדרי־לען, די באַבואַינען, די מאַקאַקען און דשעלאַדען.



צייכנונג 286. — אַ מאַנדריל.

דער פאווואן אָדער מאַנדריל איז א גרויסע, שטארקע חיה מיט א צייהנער-געביס עהנליך ווי ביי די רויב-חיות, מיט גרויסע, שפיציגע, שטארקע רייס-צייהנער, א צונטער-רויטען נאָז, מיט בלויע איינגעגראָבענע שטרייפן פון ביידע זייטען נאָר מיט א קורצען עק. זייע האָר זיינען אויבען דונקעל בלו-גריין, אויף דער ברוסט געלבלויך און אויפ'ן בויך ווייסליך. זיינע הענט און אויערען זיינען שוואַרץ און דער געזעס בלוי און רויט. די מאַנדרילען געהען אימער אויף אַלע פיער, קיינמאָל ניט שטעהענדיג. זיי געפינען זיך הויפטזעכליך אין אַפריקא, וואו זיי לעבען אויף די בערג און נעהרען זיך מיט וואַרצלען, פרוכט, אייער, אינזעקטען און שנעקען. זיי זיינען ווילד און בייז. איינע צו די אנדערע און צו זייערע קינדער ווייזען זיי אָבער אַרויס גרויס ליעבע. פון מענשען אנטלויפען זיי, נאָר ווען זיי זיינען געצוואונגען נעהמען זיי אויף א קאמף מיט איהם. זיי פארטיידיגען זיך אויך גאנץ מוטיג געגען רויב-חיות, וועלכע באפאלען זיי.

די מאַנטעל-פאווואינען זיינען באַדעקט מיט לאַנגע האָר, וועל-כע וואַקסען אויס ביי די עלטערע פון זיי, באַזונדערס ביי די זכרים ווי אַ מאַנטעל. זיין געזיכט האָט אַ פלייש-קאָליר און זיין געזעס פיער-רויט. זיי לעבען אין גרעסערע גרופען פון 100 ביז 150 שטיק. זיי פארטיידיגען זיך געגען זייערע אָנגרייפער מיט שטיי-נער, וועלכע זיי ווארפען אין זיי.

דער באַבואין וועלכער לעבט אין אַבעסיניע, אין קאָרדאָפאן און אין אנדערע מיטעל-אַפריקאַנישע לענדער איז זעהר אַ קלוגע חיה און מען קען איהם אויסלערנען מאַכען פאַרשידענע קונץ-שטיק. ער איז איבער דריי פוס לאַנג מיט אַן עק פון איבער אַנדערטהאַל-בען פוס לאַנג, דער אויבערשטער טייל פון זיין קערפער איז גרינג-ליך-ברוין, דער אונטערשטער טייל העלער און די באַקען ווייסליך-געלב.

די דשעלאַרדען זיינען גאנץ גרויסע אַפען. זייער קערפער איז באַוואַקסען מיט לאַנגע שוואַרץ-ברוינע האָר, מיט אַ לאַנגע געל-ברוינע גרויזע, זייערע אויגען זיינען באַוואַקסען מיט זעהר לאַנגע, נעדיכטע ברעמען. זייער געזיכט איז שוואַרץ, אויפ'ן ברוסט האָבען זיי צוויי נאַקעטע העל-רויטע פלעקען, אַ העל-רויטען נאַקעטען שטרייף אויף דעם פאָדערשטען טייל פון האַלז, וואָס זעהט אויס ווי אַ האַלד-באַנד און העל-רויטע אויגען-לעדלעך. זיי לעבען אויף


די הויכע בערג פון אביסיניען אין גרעסערע גרופען. פון מענשען  
אנטלויפען זיי.

די מאקאקען ווערען איינגעטיילט אין דריי גרופען: מיט  
לאנגע עקען, מיטעל-לאנגע עקען און גאנץ קורצע עקען. די קורצ-  
עקיגע זיינען פארשפרייט אין נאָרד-אפריקא, אין כינא און אין  
יאפאן, וועהרענד די לאנגע-עקיגע אין אַסט-אינדיען. די מאקאקען  
זיינען מיטעל-גרויסע אפען, געוועהנליך פון אונגעפעהר צוויי פוס  
לאנג. דער באָרד-מאקאק, וועלכער לעבט אין מאלאכא, איז אָבער  
בעדייטענער גרעסער, ער איז איבער דריי פוס לאנג, ער האָט אַ  
גרויסען געדיכטען ווייסען באָרד, אַ גלאַנציגע, שוואַרצע פעל, אַ  
פוס לאַנגען עק מיט אַ בינטעל האָר ביים ענד. דער טערקישער  
מאקאק אָדער הונדס-אַפ, ווי ער ווערט אויך גערופען, איז אונגע-  
פעהר דריטהאלבען פוס לאנג, איז כמעט אין גאַנצען אָהן אַן עק,  
האָט אַ פלייש-פאַרביגע געזיכט, מיט אַ געדיכטען געלבווייסליכען  
באָרד, דער אויבערשטער טייל פון זיין קערפער איז גרינליך-ברוין,  
דער אונטערשטער טייל העלער, די פיס און הענד רויטליך-געלעב.  
ער לעבט אין מאַראַקאָ, אַלשיר, טונים און גיבראַלטאַר. איז זעהר  
קלוג, געשיקט און קרעפטיג. ער פארטיידיגט זיך געגען אָנגרייפער  
מיט שטיינער, וועלכע ער וואַרפט אין זיי. דער יאָוואַנער מאקאק  
איז אונגעפעהר צוויי פוס לאנג מיט אונגעפעהר אזא לאַנגען עק.  
דער אויבערשטער טייל פון זיין קערפער איז אָליווען-ברויןליך  
גרוין, זיין אונטערשטער טייל ווייסליך-גרוין, הענד, פיס און עק  
שוואַרצליך, דאָס געזיכט בלוין-גרוין און צווישען די אויגען ווייס-  
לעך. ומען קען איהם אויסלערנען מאַכען פארשיעדענע קונדשטיק.  
(3) מענשען-עהנליכע אַפען (אַנטראָפּאָידען), צו וועלכע עס  
באַלאַנגען די אַפען, וועלכע האָבען ניט קיין עקען און האָבען ניט  
קיין באַקען-קעשענעס. אַזעלכע זיינען פאַראַן פיער גאַטונגען: דער  
גאַריאַל, שימפאַנזע, אַראַנג-אוטאַן און גיבאָן.

די גיבאָנען לעבען אין די געדיכטע וועלדער פון אַסט-אינ-  
דיען און אין די דערבייאַיגע אינזלען. זיי האָבען אַ שלאַנקען  
קערפער, וועלכער איז אונגעפעהר דריי פוס לאנג, אַ קליינעם,  
רונדען קאָפּ אין זעהר לאַנגע הענד. לויט דעם געבוי פון שאַרבען,  
פון צייהנער-געביס און דעם אויסזעהן פון זיין געזיכט איז דער  
גיבאָן זעהר עהנליך צו אַ מענשען. די גיבאָנען ווערען איינגע-  
טיילט אין 5 אַרטען, דער גרעסטער פון זיי איז דער שוואַרצער



סיאמאנג. ער איז איבער דריי פוס הויך, האָט אַ קליינעם שטערען, אַ פלאַטשיגע נאָז און אַ גרויס מויל. ער לעבט אין סומאַטראַ. די גיבאָנען קלעטערען זעהר געשיקט אויף בוימער און מאַכען שפרונגען פאַר שטרעקען פון 40 פוס ווייט. זיי געהען אויפגע- שטעלטערהייד, אזוי ווי ומענשען, אָבער אונגעשיקט. ווען זיי דאר- פען אנטלויפען וואַרפען זיי זיך אויף אַלע פיער. זיי זיינען אין אַלגעמיין שרעקעדיג. דער מוטיגסטער צווישען זיי איז דער הולאָק, וועלכער לעבט אין בענגאַלען. ער גרייפט זאָגאַר אַן מענשען. דער סיאמאנג איז אַ גרויסער פייגלינג. די סיאמאנגען לעבען אין גרויסע מחנות, זיי אנטלויפען אָבער ביי יעדען אָנגריף און בלויז די מוטער פארטיידיגט די קינדער. די גיבאָנען געהערן זיך מיט בלעטער, פרוכט, בוימער-פרעש, עקרעשען, אייער און פויגעל. ביי זונען אויפגאַנג און זונען-אונטערגאַנג פאַנגען זיי אָן שרייען מיט



צייכונג 237. — (1) אַ פאַרגלייך צווישען אַ שאַרבען פון אַ מענשען (ב) און אַ שאַרבען פון אַן אַראַנגיאַומאַן (א); (2) אַ פאַר- גלייך צווישען האַנט (א) און פוס (ב) פון אַ שימפאַנזי אין די האַנט (ג) און פוס (ד) פון אַ מענשען.

זייערע שטארקע, שאלענדע שטימען, וועלכע הערען זיך פאר גאנץ ווייט.

דער גארילא איז צווישען די מענשען-עהנליכע אפען דער נרעסטער. ער איז איבער זעקס און א האלב פוס הויך, האט א נרויסען קאפ מיט א הויכען שארבען, קליינע אויערען און אויגען.



צייכנונג 238. — א גארילא.

א פלאטשיגע נאָז, קרעפטיגע צייהנער מיט שאַרפע אויגען-צייהנער, זיין קערפער איז באזונדערס שטאַרק געבויט, זיינע הענד זיינען ניט פיעל לענגער ווי ביי אַ מענשען און ער באזיצט אַ ריעזיגע קראפט. די נקבות זיינען פיעל קלענער אַלס די זכרים, און זיינען שלאַנקער געבויט. ביי די יונגע גאָרילאַס איז דער קאָפּ גאַנץ בעזאָנדערס מענשען-עהנליך. די הויט פון גאָרילאַ איז שוואַרץ, צורונגעלט און שיטער באוואַקסען מיט האָר, בעזאָנדערס איז זעהר שיטער באוואַקסען זיין ברוסט און בויך. זיין געזיכט, האַנד-פּלעך כען און פּוס-זוילען האָבען אינגאַנצען ניט קיין האָר. דער קאָליר פון זיינע קאָפּ-האַר איז ברוין-רויט, פון די איבריגע טיילען פון קערפער שוואַרץ-ברוי און גרוי-ברוי.

די גאָרילאַ לעבען אין די געדיכטע, פייכטע וועלדער, וועלכע זיינען נאָהנט צו די ים-ברעגען אין די טראָפישע געגענדען פון וועסט-אַפריקא. זיי האַלטען זיך אויף מייסטענס אויף בוימער, אויף וועלכע זיי קלעטערען זעהר געשיקט. זיי נעהרען זיך מיט פּרוכט, אייער, פּויגלען און צוקער-ראָהר. אַרום 20 פּוס הויך פון דער ערד בויט זיך דער גאָרילאַ אויס פון שטיקער-האַלץ אויף שטאַרקע צווייגען אַ נאַכט-לעגער, וועלכען ער בעט אויס מיט בלעך-טער און מאַך. אָבער ער בלייבט ניט לאַנג אויף איין אָרט. נאָך אַ דריי אָדער פיער טעג געהט ער אַוועק אויף אַן אַנדער פּלאַץ און בויט זיך אַ נייעם נאַכט-לעגער. אויף דער ערד געהט דער גאָרילאַ אויף אַלע פיער, און ער אַנטלויפט ביי דעם קלענסטען גערויש. ווען ער ווערט אָבער אָנגעגריפען און קען ניט אַנטלויפען, דאַן קעמפט ער זעהר ווילד און מיט זיין גאַנצער ריעזיגער קראַפט. יונגע גאָרילאַס, וועלכע זיינען געפאַנגען געוואָרען, האָבען זיך אַרויסגעצייגט העכסט קלוג און פּערנינפטיג. זיי לעבען אָבער ניט לאַנג אין געפאַנגענשאַפט.

דער אַראַנג-אוטאַן, וועלכער ווערט אויך אָפט גערופען „וואַלד-מענש“, איז קלענער ווי דער גאָרילאַ. זיין קאָפּ איז עטוואָס שפיציג, אויף די באַקען האָט ער אַזעלכע געשוואַלסטען, וועלכע זעהען אויס ווי אַ באַקען-באָרד, זיין נאָז איז פּלאַטשיג, אויגען און אויערען קליין, צייהנער שאַרף און שטאַרק, די הענד זעהר לאַנג און אַ שטאַרקער, קרעפטיג געבויטער קערפער, וועלכער איז באַדעקט מיט דונקעל ראַסט-רויטע האָר, אויפ'ן רוקען און בויך גאַנץ שיטער און אויף די זייטען געדיכטער. די האָר אויפ'ן געזיכט זיינען עהנליך

צו א באַרד. די האַנד־פלעכען און די פינגער האָבען אין גאנצען ניט קיין האָר. די זכרים זיינען גרעסער ווי די נקבות און זיי זיינען אויך באַוואַקסען מיט האָר מעהר ווי די נקבות. דער קאָפּ און דאָס געזיכט פֿון יונגע אַראַנג־אוטאַנען זיינען מעהר מענשען־עהנליך. וואָס אינגער זיי זיינען, אַלץ עהנליכער זיינען זיי צו מענשען. זיי האָבען זעהר אַ שטאַרקע, הויכע שטימע, וועלכע מען קען הערען פֿון גאַנץ ווייט. די אַראַנג־אוטאַנען לעבען אין סומאַטראַ און באַרנעא אין זומפּיגע וועלדער. זיי האַלטען זיך אויף מייסטענס אויף בוימער אויף וועלכע זיי קלעמערען זעהר געשיקט און געהען פֿון איין צווייג צום צווייטען. זיי געהען אָבער אויף די קנעכלעך פֿון זייערע פּיס און ניט אויף די פּאָדעשוועס. ביינאַכט שלאָפט




צייכנונג 239. — א יונג קינד פֿון אַ שימפּאַנזי.

דער אַראַנג־אוטאַן אין אַ נעסט, וועלכען ער בויט אויס פֿון צווייגען אַן ערף 40 אָדער 50 פּוס הויך פֿון דער ערד. ער בלייבט אָבער ניט לאַנג אין איין נעסט. בייטאָג געהט ער אַרויס זוכען זיין שפּייז. ער עסט פּרוכט, בלעמער, קנאַספּען און יונגע צווייגלעך. אויף דער ערד קומט ער אַראָפּ זעלטען און ער געהט דאָן אויף אַלע פּיער. פֿאַר אַ מענשען האָט ער ניט איברייגס מורא, ער נעהמט אויף אַ קאמפּף מיט איהם, ווען ער ווערט אָנגעגריפען. דויב חיות ווייכען איהם אויס. אין דער געפּאַנגענשאַפט צייגען

די יונגע אָראַנג-אוּטאַנען אַרויס פּיעל פאַרשטאַנד. זיי זיינען אָבער אָפט טרויעריג.

דער שימפּאַנזע איז קערפּערליך אין מאַנכע הינזיכטען ווער ניגער עהנליך צום מענשען ווי די אַנדערע מענשען-עהנליכע אָפּען, אָבער מיט זיינע גייסטיגע פּעהיגקייטען איז ער נעהנטער צו דעם מענשען ווי אַלע אַנדערע אָפּען.

דער שימפּאַנזע איז אונגעפּעהר פינף פּונד הויך, אַנדערע אַ ביסעל ניעדריגער, אַנדערע עטוואָס העכער, ער האָט אַ גרויסען





אויף די הענד און פיס לענגער געוואקסען. זיין מאָרדע איז באַ-  
וואַקסען מיט ווייסע האָר, זיין געזיכט האָט אין גאַנצען קיין האָר  
ניט און איז פון אַ גרוי־געלביכען קאָליר, צווישען די אויגען  
עטוואָס דונקעלער, די האָר פון זיינע הענד און פיס זיינען ברוין.  
דער שימפּאַנזי לעבט אין די אינערליכע טיילען פון אַפריקאַ.  
ער האַלט זיך אויף אין די וועלדער און לעבט פּאַרווייז אָדער אין  
פּאַמיליען און בויט פאַר זיינע קינדער גרויסע נעסטען אויף בוימער.  
ער געהט אויפגעשטעלטערהייד, אָבער ער קען זיך ניט האַלטען  
פּאָלשטענדיג גראַד. ווען ער דאַרף זיך שנעלער באַוועגען, וואַרפט  
ער זיך אויף אַלע פיער. ער געהט אויף די קנעכלעך פון זיינע  
פיס און ניט אויף די פּאָרעשוועס. ער איז אַ געשיקטער קלעמערער  
און שפּרינגער. ער געהרט זיך מיט פּרוכט, בלעטער, וואָרצלען.  
ער עסט אָבער אויך אינזעקטען, פּויגלען, אייער, ראַצען און אַנדערע  
קליינע חיות. ווען מעהערע שיימפּאַנזעס זיינען צוזאַמען מאַכען  
זיי מאַרגענס און אָווענדס, אָפט אויך ביינאַכט, אַזא ליאַרם, אַז  
דער גאַנצער וואַלד אַרום ווערט פּאַרטויבט. געגען אַן אַנגריף  
פון אַ מענשען וועהרען זיך די שיימפּאַנזעס זעהר ענערגיש און  
מוטיג. אין דער געפּאַנגענשאַפט קען מען זיי אויסלערנען פּאַר-  
שיידענע אַרבייטען און קונץ־שטיק. זיי לערנען זעהר גערן, ווייזען  
אַרויס פיעל פּאַרשטאַנד און ליעבען נאָכצוטאָן פיעל זאַכען, וואָס  
דער מענש טוט. זיי זיינען אימער טעטיג, מייסטענס לוסטיג,  
שטיפעריש, גוטמוטיג און ליעבען צו מאַכען פּאַרשיידענע קונצען.  
זיי לעבען אָבער ניט לאַנג אין געפּאַנגענשאַפט. זיי ווערען קראַנק  
אויף לונגען־שווינדרוכט און שטאַרבען.

דער מענש (האָמאָ סאַפּיענס, די שכל חיה) צייכענט זיך אויס  
מיט זיין אויפגעשטעלטען גראַדען גאַנג, מיט זיינע ענטוויקעלטע  
גרויסע געהירען, מיט זיין שפּראַך און מיט זיין שכל. זאָגאַר אַ  
פיער־יעהריג קינד פון די בושמענען אין אויסטראַליען האָט דאָ-  
פּעלט גרעסערע געהירען ווי דער גרויסער גאָרילאַ.  
די וויסענשאַפט, וועלכע באַשעפּטיגט זיך מיט דער אויספּאַר-  
שונג פון די מענשליכע ראַסען, ווערט אָנגערופּען אַנטראָפּאָלאָגיע.

## קאפיטעל איין-און-צוואנציג.

לעבען און פארניכטונג פון לעבען. — פארמערונג און אויסראַטונג. — די מלחמה פאר'ן לעבען. — די אָפהענגיקייט פון מינים איינע פון די אַנדערע. — די נאַטירליכע צוכט-וואַהל. — די צופאַסונגס-פעהיגקייט. — דאָס קאַמוניסטישע לעבען.

### דער קאַמפּף פאַר עקזיסטענץ.

לעבען און פארניכטונג פון לעבען. — פון די באשרייבונגען, וועלכע מיר האָבען געגעבען אין די פריהערדיגע קאפיטלען וועגען די פארשיידענע חיות, קען מען זעהן, אז דאָס לעבען פון די חיות שטעלט מיט זיך פאַר אַ גרויסע, אומאויפהערליכע מלחמה פאַר עקזיסטענץ און לעבען, און פארניכטונג פון לעבען איז דער רע-זולטאַט פון דער דאָזיגער גרויסער מלחמה. אלע חיות, גרויס און קליין, שפייזען זיך מיט לעבעדיגע אָרגאַניזמען (פלאַנצען אדער חיות), אָדער מיט זייערע טויטע קערפער. יעדע חיה איז, וואָס, איהר גאַנצען לעבען פאַרנומען מיט דער פארניכטונג פון אַנדערע לעבענס אָדער מיט דער פאַרזעהרונג פון די טויטע קערפער פון אַנדערע באשעפענישען. כדי די עקזיסטענץ פון די באשעפענישען, וועלכע דינען אלס שפייז פאַר אַנדערע, זאָל ניט פאַרניכטעט ווערען, מוזען זיי זיין גענוג פרוכטבאַר און זיך פאַרמעהרען אין אַ געניגענדער מאָס, אויסצופילען די באשטענדיגע פאַרלוסטען, וועלכע זיי ליידען, כדי אויפצוהאַלטען זייער מין. וואָרום, אויב זייער אייגענער מין וועט פאַרניכטעט ווערען, וועלען אויך מוזען פאַרשווינדען די באשעפענישען, וועלכע נעהרען זיך מיט זיי, בלייב בענדיג אָהן שפייז. ווען די פלאַנצען זאָלען ניט אויספילען זייערע רייען צו דעקען זייערע פאַרלוסטען, וואָלטען די חיות, וועלכע נעהרען זיך מיט זיי, מוזען פאַרשווינדען, צוליעב מאַנגעל אין שפייז. און ווען די חיות, וועלכע נעהרען זיך מיט פלאַנצען, וועלען פאַרשווינדען, וועלען האָן אויך מוזען פאַרשווינדען די פלייש-עסענדע חיות, ווייל זיי וועלען ניט האָבען וועמען צו עסען.



די פרוכטבארקייט אין דער נאטור איז אָבער אזוי גרויס, דאָס עס שפּראַצן אַרויס אַ סך מעהר פּלאַנצען, ווי עס איז פּאַראַן פּר זיי פּלאַץ צו וואַקסן, און מעהר חיות ווערן געבאָרען, וויפּיעל עס קענען בלייבן לעבען.

ווען יעדע פּלאַנצע און יעדע חיה וואָלט זיך קענען פּאַרמעהרען אומגעשטערט, לויט די פּרוכפּערונגס-פּעהיגקייטען וואָס יעדע פּון זיי באַזיץט, וואָלט אין אַ פּאַרלויף פּון אַ געוויסער צייט איין מין געקענט אָנפּילען די גאַנצע וועלט און וואָלט ניט איבערגעלאָזען קיין פּלאַץ פּאַר די אַנדערע מינים. אַ פּלאַנצע, וואָס פּראָדוצירט בלויז צוויי קערענדלעך אַ יאָהר, וואָלט געקענט ברענגען איבער אַ מיליאָן (1,048,576) פּלאַנצען פּון איהר מין אין אַ משך פּון 21 יאָהר, ווען קיין קערענדעל זאָל ניט געהן פּאַרלאָרען, נאָר יעדעס זאָל אַרויסשפּראַצן און אויסוואַקסן. מאַכע פּראָטאָזאָען, וועל-כע פּאַרמעהרען זיך זעהר שנעל, וואָלטען פּול געמאַכט דעם גאַנצען ים אין איין וואָך צייט, ווען זיי וואָלטען ניט פּאַרניכטעט ווערען און פּאַרצעהרט ווערען פּון אַנדערע ים-באַשעפּענישען. אַ ים-אַלל לענט, ווי עס ווערט באַהויפּטעט, 15 מיליאָן אייער. ווען פּון יעדער איי זאָל אַרויסקומען אַן אַלל און די אַרויסגעקומענע אַללען זאָלען זיך כּסדר אזוי פּרמעהרען אומגעשטערט, וואָלט אין אַ משך פּון צעהן יאָהר צייט דער גאַנצער ים באַשטאַנען פּון אַ געדיכטער מאַסע אַללען. ווען אַלע אייער פּון אַ הויז-פּליג וואָלטען זיך ענטוויקלען, און די פּליגען, וואָס וואָלטען פּון זיי אַרויסגעקומען, וואָלטען האָבען גענוג שפּייז און די פּאַסענדע טעמפּעראַטור פּאַר זייער עקזיסטענץ, און מען זאָל זיי לאָזען לעבען און זיך פּאַר-מעהרען אומגעשטערט, דאַן וואָלט אין אַ גאַנץ קורצער צייט די גאַנצע לופּט פּון דער שטאָרט, וואו דאָס וואָלט פּאַסירען, ווערען פּאַרוואַנדעלט אין אַ געדיכטער מאַסע פּון פּליגען. דאָסזעלבע וואָלט זיין מיט די היישעריקען אויף די פּעלדער, מיט די שמעץ-טערלינגען א. א. ו. אָבער מיט דער גרויסער, אומגעהויער פּרוכ-פּערונג פּון לעבען קומט אין דערזעלביגער צייט אויך פּאַר אַן אומגעהויער גרויסע פּאַרניכטונג פּון לעבען און די קוועלען פּון לעבען. מיליאָנען פּליגען ווערען פּאַרניכטעט צוליב מאַנגעל אין שפּייז; מיליאָנען ווערען פּאַרשלאָנגען פּון אינזעקטען-עסענדע פּויגלען; מיליאָנען קומען אום דורך קעלט, דורך רעגען אין אַנ-דערע אורזאַכען. דערצו ווערט אַ גאַנץ גרויסער טייל פּון די אייער,

וואָס די פליגען לעגען, אינגאנצען ניט ענטוויקעלט, זיי ווערען פארניכטעט, איידער עס קומען פון זיי ארויס פליגען. דער ענד-רעזולטאט איז, אז די צאָהל פליגען פארגרעסערט זיך ניט פון יאָהר צו יאָהר. דאָסזעלבע פאסירט אויך מיט אנדערע אינוועסטען און מיט אלע אנדערע חיות.

ווען די פארמעהרונג פון מענשען וואלט פארגעקומען אָהן שום שטערונגען, ווען אלע מענשען וואָלטען געשטאַרבען בלויז מיט זייער נאַטירליכען טויט פון עלטער, וואָלט אין טויזענד יאָהר, ווי דאָרוין, האָט אויסגערעכענט, דער ערד־קוגעל געווען אזוי געדיכט פול מיט מענשען, דאָס עס וואָלט אפילו קיין פלאַץ ניט געווען פאר זיי צו שטעהן צונויפגעדריקטערהייט. די העלפאנטען זיינען זעהר ניט קיין פרוכטבארע חיות. די נקבה פון א העלפאנט ברענגט אויף דער וועלט, אין דעם משך פון איהר הונדערט יאָהריגען לעבען, ניט מעהר ווי זעקס קינדער. דאָך וואָלטען פון איין פאָר העלפאנטען אין א משך פון 8 הונדערט יאָהר געווען 19 מיליאָן העלפאנטען אויף דער וועלט, און אין א פארלוף פון נאָך א פאָר הונדערט יאָהר וואָלט די גאנצע ערד געווען געדיכט באַדעקט מיט העלפאנטען.

אין דער ווירקליכקייט ווערט די צאָהל העלפאנטען ניט גרעסער. אין אלגעמיין בלייבט די צאָהל פון די פאָרשיידענע מינים חיות, ווען זיי לעבען אין זייער נאַטירליכען צושטאנד, אומגעפעהר דיזעלביגע פון יאָהר צו יאָהר. עס איז פאראן אין די וועלדער אומגעפעהר דיזעלבע צאָהל וועווערקעס און פויגלען אין איין יאָהר ווי אין א צווייטען, און עס זיינען פאראן אזויפיעל שמעטערלינגען אין די פעלדער, פרעש אין די סאזשעלקעס און ווערס אין דער ערד איין יאָהר ווי דעם אנדערען. אונטער דעם איינפלוס פון דעם מענשען ווערען פילע חיות וועניגער. צו זייערע געווענליכע נאַטירליכע פארלוסטען קומט נאָך צו די פארניכטונגען, וואָס דער מענש מאכט צווישען זיי און זיי ווערען דעריבער וועניגער. אָבער דאָרטען, וואו עס ווירקט ניט די פארניכטונגס־קראַפט פון מענשען, בלייבט די צאָהל אומגעפעהר דיזעלבע פון יאָהר צו יאָהר. איין מין קען זיך ניט פארמעהרען צופיעל, ווייל די אנדערע מינים דארפען אויך האָבען פלאַץ וואו צו לעבען און שפייז זיך צו נעהרען. עס קומט פאָר א באַשטענדיגער קאמפף צווישען איין מין און דעם צווייטען און צווישען די מיטגליעדער פון דעמעלביגען

מין גופא פאר א שטיקעל פלאץ און פאר אביסעל שפייז אויף דער וועלט אום צו קענען עקזיסטירען. עס קומט פאר אן אייביגער קאמפף פאר דער עקזיסטענץ.

און כאראקטעריסטיש איז אין דעם דאָזיגען קאמפף, וואָס עס מוז אימער בלייבען אין א געוויסער מאָס א גלייכגעוויכט אין דער צאָהל פון די פארשיידענע מינים באשעפענישען, וועלכע פילען אָן אונזער ערד־קוגעל. איין מין הענגט אָפּ פון דעם צווייטען מיט זיין עקזיסטענץ. ווען עס זאָלען, למשל, אויסגעראָט ווערען די אינזעקטען פון אונזער ערד־קוגעל, וועלען אויך מוזען פארשווינדען די פויגלען און וואַנדערע באשעפענישען, וועלכע געהרען זיך מיט אינזעקטען. אלס אן אינטערעסאנטער ביישפּיעל קען אונז דיענען א פאל מיט א געוויסען אינזעקט, וועלכער איז אריבערגעבראכט געוואָרען פון אויסטראַליען אין קאליפאָרניען, אין די פאראייניגטע שטאַטען פון אמעריקא. דער דאָזיגער אינזעקט, וועלכער האָט, צוליב זיין אויסזעהען, געקראָגען אין אמעריקא דעם נאָמען „וואטעקיסען שופּ“, איז זעהר שעדליך פאר אַראַנזשען בויער אין אַ פאַרלויה פון עטליכע יאָהר האָט זיך דער דאָזיגער אינזעקט אזוי שטאַרק פאַרמעהר אין קאליפאָרניען, דאָס עס איז געווען א געפאָהר, אַז אלע אַראַנזשען גערטנער וועלען דאָרטען פאַרניכטעט ווערען. פאַרשיידענע פאַרניכטונגס־מיטלען זיינען געגען איהם אָנגעווענדעט געוואָרען, אָבער זיי האָבען וועניג געהאַלפּען. ענדליך האָט מען אוועקגעשיקט אַן אינזעקטען פאַרשער אין אויסטראַליען, אַז ער זאָל אונטערזוכען, אויב דער דאָזיגער געפעהרליכער שופּען אינזעקט האָט ניט וועלכען עס איז ספּעציעלען נאַטירליכען פיינד אין דעם לאַנד, פון וועלכען ער שטאַמט. נאָך אַ לאַנגער אונטער־זוכונג האָט דער אינזעקטען־פאַרשער אויסגעפונען, אַז עס עקזיסט־טירט אין אויסטראַליען אַ קליינער זשוק (באַבעלקע), פון דעם מין „משה רבינו'ס קיהעלע“, וועלכער שפייזט זיך מיט די שופּען־אינזעקטען און פאַרניכטעט זיי אין גרויסע מאַסען. מען האָט דעריבער געבראכט פון אויסטראַליען אין קאליפאָרניא אייניגע פון די דאָזיגע קליינע באַבעלקעס און מען האָט זיי פאַרטיילט אין אייניגע פון די אַראַנזשען גערטנער, וועלכע זיינען פאַרפּעסעט געוואָרען מיט די שופּען־אינזעקטען. די באַבעלקעס, האָבענדיג גענוג שפייז, האָבען זיך שנעל פאַרמעהרט דאס מען האָט זיי געקענט פאַרשפרייטען איבער אַלע אַראַנזשען גערטנער פון קאליפאָרניע.

אין אַ פאַרלויף פון אַ פּאָר יאָהר איז די צאָהל פון די דאָזיגע באַבעלקעס געווען אזא גרויסע, דאָס זיי האָבען כמעט אינגאַנצען פאַרניכטעט די שופּען־אינזעקטען. אָבער מיט דער פאַרניכטונג פון די שופּען־אינזעקטען, האָבען אויך אָנגעפאַנגען צו פאַרשווינדען די באַבעלקעס, ווייל זיי האָבען מעהר קיין נאַהרונג ניט געהאַט, ווייל קיין אַנדער זאך ווי שופּען־אינזעקטען עסען זיי ניט. און ווי די באַבעלקעס האָבען אָנגעפאַנגען פאַרשווינדען, האָבען זיך צוריק אָנגעפאַנגען פאַרמעהרען די שופּען־אינזעקטען. עס איז דעריבער נויטיג געווען אויפצוהאַלטען אַ געוויסע צאָהל שופּען־אינזעקטען, כדי די באַבעלקעס זאָלען ניט פאַרשווינדען.

מיר זעהען דאָ אַ באַזונדערס כאַראַקטעריסטישען פאַל פון דער דירעקטער אָפהענגיקייט פון איין מין פון דעם צווייטען. אָבער עס זיינען פאַראַן אַ סך אַזעלכע פעלע אין דער נאַטור, וואו עס עקזיסטירט אַזא דירעקטע אָפהענגיקייט.

אין אַלגעמיין קומט דער קאַמפּף פאַר עקזיסטענץ פאַר אויף דריי אופנים: (1) צווישען די מיטגלידער פון איין מין און אַ צווייטען; (2) צווישען די מיטגלידער פון דעמזעלביגען מין; (3) מיט די באַדינגונגען פון לעבען.

קיין איינציגע באַשעפעניש קען ניט אויסמיידען דעם דאָזיגען קאַמפּף אין זיינע אָנגעגעבענע פאַרמען. אין מאַנכע געגענדען אָדער צייטען איז איין פאַרם פון קאַמפּף שווערער און ווירקט פאַרניכטענדער, וועהרענד אין אַנדערע ערטער איז אַ צווייטע פאַרם פון קאַמפּף אַמישטאַרקסטען. מייסטענס אבער איז דער קאַמפּף צווישען די מיטגלידער פון איין און דעמזעלביגען מין שטאַר־קער, ווי דער קאַמפּף צווישען די מיטגלידער פון פאַרשיעדענע מינים. דער באַשטענדיגער קאַמפּף פאַר עקזיסטענץ איז פאַרבונדען מיט אַן אומגעווענער גרויסער צאָהל קרבנות. עס בלייבען לעבען בלויז די, וועלכע קענען דעם קאַמפּף דורכטראָגען. עס ווערען דעריבער פון יעדען מין געבאָרען פיעל מעהר, ווי עס קענען בלייבען לעבען און אויסוואַקסען. יעדע באַשעפעניש קעמפּפט פאַר איהר שפייז, פאַר איהר לעבען און צו באַשיצען איהרע קינדער, אָבער בלויז אַ טייל פיהרט דורך אַט דעם קאַמפּף ערפּאָלגרייך, די אי־בעריגע פאַלען אין קאַמפּף צוליב איין אורזאַכע אָדער אַ צווייטער. די נאַטירליכע צוכט־וואַהל. — אין דעם קאַמפּף פאַר עקזיסטענץ לעבען איבער מייסטענס די, וועלכע זיינען בעסער צוגע־

פאסט אויסצוהאלטען דעם קאמפף און ארויסצואווייזען א גרע-  
סערען און שטארקערען ווידערשטאנד. די אָבער, וועלכע זיינען  
וועניגער צוגעפאסט צום קאמפף, די, וועלכע זיינען ניט פעהיג  
ארויסצואווייזען קיין שטארקען ווידערשטאנד, זיינען די ערשטע,  
וועלכע ווערען פארניכטעט. ווען א קארשון יאגט זיך נאָך טויבען,  
וועט די ערשטע פאלען אלס קרבן די, וועלכע פליהט לאנגזאמער  
זוי אלע אנדערע. ווען א מחנה וואַראַכייטישיקעס געפינען זיך אין  
א פלאץ, וואו עס איז ניטאָ גענוג שפיז פאר אלעמען, וועלען די  
פלינקערע און שטארקערע זיין די ערשטע צו פארבאפען דאָס  
ביסעל שפיז און פאר די לאנגזאמערע און שוואכערע וועט וועניג,  
אָדער גאָרניט בלייבען. די שוואכערע ווערען אוועקגעשטויסען פון  
די שטארקערע און די לאנגזאמע ווערען אריבערגעיאגט פון די פלינ-  
קערע. עס זיינען די יעניגע באשעפענישען, וועלכע קענען זיך  
וועניגער צופאסען צו די ענדערונגען פון וועטער, וועלכע זיינען  
די ערשטע אומצוקומען פון קעלט אָדער פון היץ. אין דער גרוי-  
סער מלחמה פאר'ן לעבען בלייבען דעריבער פון יעדען מין די  
שטארקערע, די פלינקערע, די מעהר פעהיגע און די וועלכע קענען  
זיך בעסער צופאסען צו די לעבענס-באדינגונגען. און פונקט ווי  
דער פיה-ציכטער, דער וואָס האָדעוועט בהמות, פארבעסערט זיין  
סטאדע דורך דעם, וואס ער נעמט ארויס פון איהר די שוואכערע,  
די קליין-געוויקסיגע און שוואך-ענטוויקעלטע און לאָזט איבער צו  
האָדעווען די שטארקערע, די גרויס-געוויקסיגע און די בעסער ענט-  
וויקעלטע, אזוי טוט אויך די נאטור. און זי טוט עס אויף אַ  
גרויסען, ריזיגען מאַשטאב. עס קומט פאָר אין דער נאטור אַ  
באַשטענדיגע רייניגונג פון די מינים, די שוואכערע און וועניגער  
צוגעפאסטע ווערען ארויסגעוואָרפען און פארניכטעט און עס בליי-  
בען אין יעדען מין די שטארקערע און די מעהר צוגעפאסטע צום  
קאמפף פון לעבען. אָט דער דאזיגער פראצעס אין דער נאטור  
ווערט גערופען די נאַטירליכע צוכט-וואַהל, אדער דער  
אויסוואהל פון דער נאטור. עס הייסט, אז די נאטור קלייבט אויס  
פון יעדען מין די יעניגע, וועלכע קענען זיך אַמבעסטען צופאסען  
צום לעבען און אויסשטעהן דעם שווערען קאמפף פאר עקזיסטענץ,  
ווען די באדינגונגען פון לעבען אין א געוויסען פלאץ ענ-  
דערען זיך, צוליעב וועלכע עס איז אורזאכען, און דורך דעם ווערט  
פאר א געוויסען מין באשעפענישען אונטערגליך צו עקזיסטירען,

פיהרענדיג דעמזעלביגען ארט לעבען, ווי עס האָט פריהער געפיהרט, דאָן מוז עס פאָרקומען איינס פון די דריי: אָדער דער מין מוז אויסוואַנדערען פון דעם פלאַץ, אָדער ער מוז זיך צופאַסען צו די נייע באַדינגונגען, אָדער ער מוז פאַרניכטעט ווערען. מיר ווייסען, אז פיעלע פויגלען, ווי אויך אנדערע באשעפענישען וואַנדערען אויס, ווען עס קומט אָן דער ווינטער און די באַדינגונגען פון לעבען ווערען אומגינסטיג פאַר זיי, כדי צו זוכען אַ וואַרימען געגענד, וואו עס איז מעגליך פאַר זיי צו עקזיסטירען. ווען היישעריקען פאַר-מעהרען זיך אין איין פלאַץ אין אַזאַ גרויסער מאַס, דאָס זיי קענען דאָרטען קיין נענוג שפייז ניט געפינען, הויבען זיי זיך אויף הויך אין דער לופט און פליהען דאָרטען אַרום, ביז זיי באַגעגענען אַ ווינט, וואָס טראַגט זיי אַוועק פאַר הונדערטע מיילען ווייט אין אַ פרוכטבארען געגענד, וואו זיי לאָזען זיך אַרונטער און געפינען נענוג שפייז פאַר זיך. אין די פאַלאַר געגענדען געפינט זיך אַ מוידע-העליכע חיה'לע, וואָס ווערט גערופען „לעמינג" און איז אַזוי גרויס, ווי אַ געווענליכער ראַץ. דאָס דאָזיגע חיה'לע האָט די טבע אויסצואוואַנדערען פון צייט צו צייט און קומט אין ריזיג-גרויסע מחנות אין נאָרוועגיע און שוועדען. די לעמינגס באַזוכען די דערמאָנטע לענדער ניט רעגעלמעסיג, אַמאָל קומען זיי איין מאָל אין פינף יאָהר, מאַנכעס מאָל איין מאָל אין אַכט אָדער צעהן יאָהר און אַמאָל בלויז איין מאָל אין צוואַנציג יאָהר. זיי קומען אין ריזיג-גרויסע מאַסען, מאַרשירענדיג ווי אַן אַרמעע אין גע-שלאָסענע רייען, אימער אין דערזעלביגער ריכטונג, ניט קוקענדיג אויף אַלע שטערונגען און הינדערנישען וועלכע זיי טרעפען אין זייער וועג. זיי שווימען אַריבער ברייטע טייכען און גרויסע אָזערעס פון מעהרערע מיילען און מאַרשירען אימער פאַרווערטס צו זייער ציעל. אויף זייער וועג מאַכען זיי אָן גרויסע פאַרוויס-טונגען אין די פעלדער, וועלכע זיי געהען דורך, אָבער נאָך גרעסערע פאַרוויסטונגען ווערען געמאַכט אין זייערע רייען דורך זייערע פאַרשיידענע פיינד, וועלכע פאַרפאַלגען זיי. אַלע רויב חיות, בערען, וועלף, פוקסען, וויזעל-טהירען, ווילדע קעץ, הינט, אַדלערס, קאַרשונען, פאַלקען א. א. וו. יאָגען זיך נאָך זיי און פאַרניכטען זיי אין די טויענדע. אַ באַזונדער ענערנישען קאַמפּף ווערט געגען די לעמינגס געפיהרט דורך די נאָרוועגישע און שוועדישע פויערים, וועלכע ווענדען אָן גענען די אומגעבעטענע געסט אַלע

סאָרטען פאַרניכטונגס־מיטלען. זאָגאַר די הויז־חיות און בהמות געמען אַן אַנטייל אין דער פאַרניכטונג פון די לעמינגס. זיי צו־טרעטען זיי מיט די פיס און צובייסען זיי מיט זייערע צייער. אַחוץ די פאַרניכטונגען דורך זייערע אויסערליכע פיינד, קומען אום טויזענדער פון די לעמינגס אויפ'ן וועג דורך פאַרשיידענע שטרויכלונגען און קראַנקהייטען. קיינער פון די אויסגעוואַנדערטע לעמינגס קערט זיך ניט אום צוריק אַהיים. דער גרעסטער טייל פון דער אַרמעע קומט אום דורך פאַרפּאָלונגען און קראַנקהייט און די איבערגעבליבענע מאַרשירען פּאַרווערטס ביז זיי קומען צום ים און לאָזען זיך אַוועק שווימען אין איהם אין דערזעלביגער ריכטונג פון זייער מאַרש, ביז זיי קומען אום אין די כוואַליעס. די אַרמעע איז דאָן אינגאַנצען פאַרניכטעט. קיינער פון די לעמינגס בלייבט ניט לעבען אין נאָרוועגען אדער אין שוועדען. ווען דער וואַנדער־מאַרש איז פאַריבער, קען מען קיין איינציגען לעמינג ניט געפינען אין לאַנד. די דאזיגע זאָנדערבארע אויסוואַנדערונג, וועלכע ענדריגט זיך מיט דער פּאָלשטענדיגער פאַרניכטונג פון די אויס־וואַנדערער, איז אבער א דורכאויס נויטיגע פאַר דער אויפהאַלטונג פון דעם מין פון די לעמינגס. דורך דעם, וואָס אַ גרויסע אַרמעע לעמינגס וואַנדערען אויס פון זייער געבורטס־אַרט, וואו שפייז איז פאַראַן אזוי וועניג, באַקומען די איבערגעבליבענע אַ מעגליכ־קייט אויפצוהאַלטען די עקזיסטענץ פון דעם מין.

אַבער ניט אַלע חיות קענען אויסוואַנדערען. זיי מוזען זיך דעריבער צופאַסען צו די געענדערטע באַדינגונגען, כדי אויפצו־האַלטען זייער מין, אָדער פאַרניכטעט ווערען. מאַנכע אינדי־ווידומס פון דעם מין באַזיצען וועלכען עס איז קליינעס פאַרטייל אין דעם געבוי פון זייער קערפּער איבער די אַנדערע אינדיווידומס פון זייער מין און זיי קענען זיך בעסער צופאַסען צו די נייע באַדינגונגען, בלייבען זיי לעבען, ווערענד די אַנדערע פון דעם מין שטאַרבען אויס. זאָגען מיר, למשׁל, אַז אין אַן אָרט, וואו זשיראַפּען האָבען געלעבט, איז די ערד, צוליעב וועלכער עס איז אורזאָכע געבליבען אינגאַנצען נאַקעט פון גראַז, און די זשיראַפּען האָבען זיך געמוזט שפייזען בלויז מיט די בלעטער און יונגע צווייגלעך פון הויכע בוימער. די זשיראַפּען, וועלכע האָבען גע־האַט עטוואָס אַ לענגערען האַלז, זיינען געווען בעסער צוגעפאַסט צו די באַדינגונגען אין וועלכע זיי האָבען געדאַרפט לעבען, זיי

האָבען געקענט צוקומען צו די בלעטער און גרינע צווייגען פון די הויכע בוימער און זיי זיינען דעריבער געבליבען עקזיסטירען, וועהרענד די אנדערע מיט די עטוואָס קירצערע העלזער האָבען געמוזט אויסשטארבען. אָדער לאַמיר זאָגען, אז אין אַ פּלאַץ, וואו שפּעסען האָבען געלעבט, איז אָנגעקומען זעהר אַ שטרענגע קעלט. צווישען די שפּעסען האָבען זיך געפונען אייניגע, וועלכע האָבען געהאט עטוואָס לענגערע און געדיכטערע וואָל, ווי די אלע אנדערע. זיי האָבען אַלזאָ די גרויסע קעלט געקענט איבערלעבען, וועהרענד די אנדערע זיינען אויסגעפראָרען געוואָרען. די זשיראַ פּען מיט די לענגערע העלזער, וועלכע זיינען געבליבען לעבען, האָבען געבראַכט קינדער אויף דער וועלט, וועלכע האָבען אויך געהאט לענגערע העלזער, ווי געווענליך, און די שפּעסען מיט די לענגערע און געדיכטערע וואָל, וועלכע זיינען געבליבען לעבען, האָבען אויך געבראַכט קינדער, וועלכע האָבען געהאט לענגערע און געדיכטערע וואָל ווי געווענליך, און אויף אזא אופן ענטוויקעלט זיך דורך מעהרערע דורות און דורך ווייטערע צופאַסונגען צו די געענדערטע לעבענס־באַדינגונגען זשיראַפּען מיט גאַנץ לאַנגע העל־זער און שפּעסען מיט זעהר לאַנגע און געדיכטע וואָל.

אַ גאַנץ קליינער פּאַרטייל, עטוואָס אַ לענגערער האַלז, עט וואָס לענגערע געדיכטערע האָר, עטוואָס אַ שטאַרקערער צאָהן אָדער נאָגעל, עטוואָס אַ שאַרפּערע ראַיה אָדער געהער און יעדער אנדער פּאַרטייל, ווי קליין ער זאל ניט זיין, קען אַריבערוועגען דעם וואַנשאַל אין דעם לעבענס־קאַמפּף צו גונסטען פון זייערע באַ־זיצער און פון זייער נאָכקומענשאַפּט.

די צופאַסונגס־פּערהיגקייט. — אָט די דאָזיגע קליינע פּאַר־טיילע, וואָס בלויז איינצעלנע פון דעם מין האָבען באַזעסען, און דורך וועלכע זיי האָבען געהאט די מעגליכקייט זיך צוצופאַסען. צו די לעבענס־באַדינגונגען, מוזען מיט דער צייט ווערען די איי־גענשאַפּטען פון דעם גאַנצען מין. די יעניגע מיטגלידער פון מין, וועלכע האָבען די קליינע פּאַרטיילע ניט געהאט, האָבען זיך ניט געקענט צופאַסען צו די באַדינגונגען פון לעבען און האָבען געמוזט פאַרשווינדען, זיי האָבען דעם מין זייערע ניט געקענט אויפהאַלטען. עס בלייבט, אַלזא, די אויסגעוועהלטע, וועלכע האָבען געהאט אַ געוויסען פּאַרטייל אין דעם געבוי פון דער ענטוויקלונג פון זייער קערפּער, דורך וועלכען זיי האָבען זיך בעסער געקענט צופאַסען



צום לעבען, און איבערגעבענדיג בירושה די מעלות פון זייער קער-  
פער צו די דורות, וואָס קומען פון זיי אַרויס, בלייבט דער מין  
עקזיסטירען.

ווען עס ענדערען זיך אָבער צוריק די באַדינגונגען פון לעבען,  
זאָגען מיר, למשל, אז אין דעם פּלאַץ, וואו די שעפּסען מיט לאַנגע,  
געדיכטע וואָל, וועלכע האָבען דורך דעם דאָזיגען פּאַרטייל זייערע  
געקענט אַריבערלעבען די קאַלטע וועטערען, וועלכע זיינען דאָרטען  
אַנגעקומען, האָט זיך דער קלימאַט ווידער געענדערט און עס  
זיינען דאָרטען ניט מעהר פאַראַן קיין קעלטען, דאן וועט די לאַנגע,  
געדיכטע וואָל פון די שעפּסען, וואָס איז פריהער געווען פאַר זיי  
אַ מעלה, גאָר ווערען אַ חסרון און קען ברענגען צו זייער פאַר-  
ניכטונג. די שעפּסען פון ענגלאַנד, למשל, וואָס זייערע לאַנגע,  
געדיכטע וואָל איז צוגעפאַסט צו דעם קיהלען, פייכטען ענגלישען  
קלימאַט, זיינען אין אַ גאַנץ קורצע צייט אויסגעשטאַרבען, ווען  
מען האָט זיי געבראַכט אין קובא, ניט נאָכלאָזענדיג נאָך זיך קיין  
דור. אין דעם הייסען קלימאַט פון קובא איז די לאַנגע, געדיכטע  
וואָל פון די ענגלישע שעפּסען געווען אַ חסרון. אין אַ הייסען  
קלימאַט וועלען בלייבען לעבען די שעפּסען, וועלכע האָבען קורצע  
און שיטערע וואָל.

די צופאַסונגס-פּערהיגקייט דריקט זיך אויס אין פאַרשיידענע  
פּאַרמען. יעדע באַשעפעניש מוז האָבען די פּערהיגקייט צו באַ-  
זאָרען זיך מיט שפּייז, זיך צו באַשיצען געגען פיינד און צו  
באַשיצען איהרע קינדער. זי האַרף זיך קענען צופאַסען צו די  
אויסגערעכענטע אויפגאַבען, אָבער פריהער ווי אלץ האַרף זי זיך  
קענען צופאַסען צו דער אומגעבונג, אין וועלכער זי לעבט. באַ-  
שרייבענדיג די פאַרשיידענע חיות און זייער לעבענס-אַרט אין די  
פריהערדיגע קאַפיטלען פון דעם בוך, האָבען מיר אין די מייסטע  
פּעלע אָנגעצייגט אויף דער ספּעציעלער צופאַסונג פון די אָרגאַנען  
פון די באַשעפענישען צו דעם אַרט לעבען, וועלכע זיי פיהרען,  
און די שפּייזען, וועלכע זיי געברויכען. די שטאַרקע נעגעל און  
שאַרפע ציינער פון די רויב-חיות, די שאַרפע און שטאַרקע נעגעל  
און שנאָבלען פון די רויב-פּוויגעל; די לאַנגע פיס און לאַנגער  
שנאָבלעל פון שטאַרד, וועלכער באַדזשעט אַרום אין זומפען צו  
זוכען זיין שפּייז; די לאַנגע האַלז פון זשיראַף, וועלכער האַרף  
זיך שפּייזען מיט די בלעטער פון בוימער; דער לאַנגער, דינער

און שארפער שטעכער פון דעם מוק, וועלכען ער שטעכט אריין אין לייב פון זיין קרבן צו זויגען זיין בלוט; דער שטארקער דינער שנאָבעל פון דעם האַלץ-פיקער פויגעל, מיט וועלכען ער פיקט אויס לעכער אין די בוימער, כדי אַרויסצונעמען די ווערם, וועלכע באַ- האַלטען זיך דאָרטען — אָט די אַלע פאַרשיידענע ענטוויקעלטע אָרגאַנען זיינען אַ פּראָדוקט פון דער צופאַסונגס-פּע-היגקייט אָדער צופאַסונגס-נויטווענדיגקייט פון די פאַרשיידענע באַשעפענישען אין דעם קאַמפּף פאַר זייער עקזיסטענץ. מיר האָבען אויך אַנדער געוויזען אויף די פאַרשיידענע אָרגאַנען אָדער מיטלען, מיט וועלכע די פאַרשיידענע באַשעפענישען באַנוצען זיך פאַר זייער שוץ געגען פיינד אָדער אַנדערע געפאַהרען. מיר האָבען אויך אָנגעוויזען ווי די פאַרשיידענע חיות באַשיצען זייערע קינדער א. א. וו. — דאָס זיינען אַלץ פאַרשיידענע פאַרמען פון צופאַסונגס-פּע-היגקייט אָדער צופאַסונגס-נויטווענדיגקייט אין דעם קאַמפּף פאַר עקזיסטענץ און אויפצוהאַלטען דעם מין.

דאָס קאָמוניסטישע לעבען. — אַ גרויסער פּאָרטייל אין דעם קאַמפּף פאַר עקזיסטענץ איז דאָס קאָמוניסטישע אָדער גע- זעלשאַפּטליכע לעבען, וואָס מאַכע באַשעפענישען פיהרען. די מוראַשקעס זיינען קליינע, שוואַכע באַשעפענישען, אָבער זיי זיי- נען שטאַרק מיט זייער פאַראייניגונג און מיט זייער קאָמוניסטישען לעבען, וואָס זיי פיהרען. די מייסטע מוראַשקעס זיינען שוואַכע באַשעפענישען און זיי האָבען אַ סך פיינד. אַ סך חיות זוכען זיי אַלס זייער רויב, דאָך זיינען די מוראַשקעס די מייסט פאַרשפרייטע אינזעקטען און זיינען זעהר ערפאַנגרייך אין דער גרויסער מלחמה פאַר'ן לעבען. דאָס האָבען זיי צו פאַרדאַנקען זייער קאָמוניסטי- שען לעבען. דאָסזעלבע איז מיט די ביענען. דער איינצעלנער ביען איז שוואַך, אָבער דאָס קאָמוניסטישע לעבען, וואָס זיי פיהרען, מאַכט זיי שטאַרק. מאַכען אַן אנגריף אויף אַ ביענען-קאָמונע איז געפעהרליך אפילו פאַר די גרעסטע און שטאַרקסטע חיה. די חיות, וועלכע לעבען אין קאָמונעס, זיינען בעסער באַ- זאָרגט מיט שפייז און מיט שוץ פאַר זיך און פאַר זייערע קינדער און זיי זיינען אין אַלגעמיין בעסער צוגעפאַסט צו דעם קאַמפּף פאַר עקזיסטענץ.